

**ЦѢЛЕБНЫЯ**  
**СИЛЫ ПРИРОДЫ.**

**ПОЛНЫЙ**  
**ЦѢЛЕБНЫЙ ТРАВНИКЪ**

или

подробное описаніе отечественныхъ лекарственныхъ растений, ихъ дѣйствія, сбора, храненія, приготовленія и употребленія при врачеваніи болѣзней.

Составлено по указаніямъ извѣстѣйшихъ ученыхъ медиковъ и народныхъ врачей.



**САНКТПЕТЕРБУРГЪ.**

Въ типографіи Скарятина, Фонарный переулокъ, въ домѣ Фрынка

**1 8 7 1.**



**ЦѢЛЕБНЫЯ  
СИЛЫ ПРИРОДЫ.**

**ПОЛНЫЙ  
ЦѢЛЕБНЫЙ ТРАВНИКЪ**

или

подробное описаніе отечественныхъ лекарственныхъ растений, ихъ дѣйствія, сбора, храненія, приготовленія и употребленія при врачеваніи болѣзней.

Составлено по указаніямъ извѣстѣйшихъ ученыхъ медиковъ и народныхъ врачей.



**САНКТПЕТЕРБУРГЪ.**

Въ типографіи Скарятина, Фонарный переулокъ, въ домѣ Фрынка

**1 8 7 1.**

## ПРЕДИСЛОВІЕ.

Исторія большей части вѣрнѣйшихъ лекарствъ доказываетъ, что открытіемъ цѣлебныхъ свойствъ многихъ изъ нихъ, мы обязаны простому народу.

Не смотря на суевѣріе и предразсудки простолюдиновъ, нельзя отрицать, чтобы нѣкоторые изъ употребляемыхъ ими средствъ, особенно изъ растений, по особенному дѣйствию, не заслуживали вниманія врачей; почему народная медицина и представляетъ несомнѣнно матеріаль, заслуживающій самага серьезнаго вниманія и изученія ея со стороны ученыхъ медиковъ.

Подробное изслѣдованіе отечественныхъ растеній и домашнихъ лекарствъ нашихъ простолюдиновъ, можно предсказать заранѣе, обогатило бы медицинскую науку весьма важными свѣдѣніями. Къ сожалѣнію, мы почти не имѣемъ сочиненій, посвященныхъ этому предмету, за исключеніемъ развѣ неоконченнаго труда г. Капшинскаго. Этотъ то пробѣлъ и побудилъ насъ предпринять изданіе настоящей книги, цѣль которой будетъ уже достигнута, если она вызоветъ другія, подобнаго же рода, дополняющія ея изданія.

---

## ВСТУПЛЕНИЕ.

### О сборѣ, приготовленіи, сохраненіи и употребленіи отечественныхъ растений.

Растенія отечественныя дикорастущія, бываютъ всегда дѣйствительнѣе воспитываемыхъ искусственно въ садахъ и разсадникахъ.

При культурѣ оныхъ, нѣтъ почти возможности соблюсти всѣ нужныя для ихъ развитія условія, доставляемыя имъ природою въ мѣстахъ ихъ естественнаго произрастанія, почему цѣлебная сила ихъ необходимо ослабѣваетъ и видъ подвергается измѣненіямъ.

Такъ многія врачебныя растенія, произвольно растущія на поляхъ, горахъ, въ лѣсахъ, рѣкахъ и болотахъ, бывъ перенесены въ ботанической садъ на тучную почву, дѣлаются великорослыми, полноцвѣтными и многосочными; но сила ихъ чрезъ то значительно уменьшается или вовсе теряется.

Такъ наприм. цикорій дикій (*cichorium Intybus*), лѣсная морковь (*daucus sylvestris*), буддырьянъ дикій (*valeriana sylvestris s. officinalis*) и проч. Почему и не удивительно, ежели выписываемыя изъ аптекъ таковыя лекарственныя травы, бываютъ нерѣдко мало-дѣйствительны; напротивъ, одна гореть дикорастущихъ растеній, сорванныхъ въ томъ же климатѣ, но на своемъ природномъ мѣстѣ, въ приличное время года и притомъ хорошо сбереженныхъ, часто дѣйствуетъ сильнѣе.

Успѣхъ сельскихъ лекарей въ излеченіи иногда самыхъ застарѣлыхъ болѣзней одними извѣстными, невинными травами зависитъ единственно отъ собирая оныхъ ежегодно на природныхъ своихъ мѣстахъ, также отъ надлежащаго приготовленія и сбереженія отъ вліянія воздуха и температуры, которыя болѣею частью измѣняютъ или вовсе уничтожаютъ цѣлебную силу дѣйствительнѣйшихъ растеній.

Опытный врачъ, при всемъ своемъ знаніи, часто, полагаясь на одобреніе ученыхъ медицинскихъ журналовъ, выписываетъ изъ аптекъ привозныя средства нерѣдко безъ всякаго успѣха, что зависитъ часто отъ того, что привезенныя издалека растительныя вещества, во время пути, потеряли уже всю силу.

Нерѣдко также случается, что и свѣжія природныя наши растенія, лежа въ аптекахъ долгое время въ кучѣ, подвергаются броженію, плесени и гнилой порчѣ.

А потому, для надлежащаго испытанія врачебныхъ силъ отечественныхъ нашихъ растеній и приготовленія изъ оныхъ дѣйствительнѣйшихъ лекарствъ, могущихъ замѣнить иноземныя медицинскіе припасы, должно стараться:

- 1) собирать извѣстныя врачебныя растенія въ ихъ естественномъ климатѣ и на той самой почвѣ, на которой природа намъ ихъ предоставляетъ;
- 2) выбирать способное время и погоду, въ которую врачебныя растенія болѣе изобилуютъ своими цѣлительными силами,
- и 3) слѣдовать принятому способу приготовленія и храненія оныхъ, который заключается въ слѣдующихъ правилахъ:

### I. Корни (radices).

Корни однолѣтнихъ растеній должно выкапывать въ глубокую осень того же лѣта, когда листы опадутъ и стволы увянутъ, и въ началѣ весны, прежде чѣмъ листы или цвѣты начнутъ развиваться. Двулѣтніе и многолѣтніе корни то же собираются весною или, по необходимости въ нихъ, можно выкапывать ихъ осенью, по увяданіи листьевъ и стеблей, которые подъ осень нарочно обрѣзываютъ, чтобы чрезъ то корень былъ сочнѣе и полнѣе.

При выборѣ оныхъ должно отдѣлять частицы трухляя, поврежденныя, деревяныя и согнившія да и самую, прильнувшую къ нимъ землю омыватъ холодною водою. Доброту корней показываетъ здоровый ихъ видъ, полнота и цѣлость внѣшней кожицы, въ которой лучшая сила ихъ содержится.

Обмываніе благовонныхъ корней, имѣющихъ въ себѣ ароматныя, смолистыя и летучія частицы, оставляется, потому что чрезъ это можетъ послѣдовать не малая потеря дѣйствительнѣйшихъ частицъ. А потому довольно будетъ и одного отпранія прямыхъ кореньевъ сухимъ полотенцемъ, или, высушивъ умѣренно, потомъ уже очистить прильнувшую къ нимъ пыль и другіе сорныя порошки.

Толстые и сочныя корни, разрѣзавъ въ длину пластинками или въ кружки и наизавъ на нити, развѣшивать въ тепломъ тѣнстомъ мѣстѣ, продуваемомъ вѣтромъ, или ихъ можно высушивать на скоро въ печѣ, самую умѣренною теплотою,

размѣшивая или переворачивая ихъ чаще, и потомъ содержать въ деревянныхъ ящикахъ въ сухомъ и холодномъ воздухѣ, чтобы не могли отсырѣть, заплесневѣть, или быть червями и гниlostiю испорчены.

Слишкомъ сочные корни, требующіе очень продолжительнаго на воздухѣ высушиванія, отъ чего они теряютъ много цѣлительныхъ своихъ силъ, также слишкомъ клейкіе, удобно на открытомъ воздухѣ окисающіе, не худо высушивать въ скорости печною умѣренною теплотою.

Благовонные корни, одаренные тонкими силами или скоро улетающими частицами, сохранять должно въ стеклянныхъ, хорошо-закупоренныхъ сосудахъ и притомъ въ тѣнистомъ холодномъ мѣстѣ, возобновляя сборъ оныхъ ежегодно. Корни одаренные летучестію, которые имѣютъ большую силу въ свѣжемъ своемъ состояніи, чѣмъ въ сухомъ, какъ-то: хрѣвъ, ирѣ, кле-щеница, безвременный цвѣтъ, переступень и т. п., собравъ въ приличное время года, хранить въ погребѣ, зарывъ оныя въ сухой песокъ.

Древесные корни, слишкомъ толстые, такъ же корни и сочные стебли, очищенные и разрѣзанные пластинками, въ лѣтнее время высушиваются одною солнечною теплотою, и тѣмъ сохраняются отъ плесени, не подвергаясь большому жару, разрушающему ихъ дѣйствительную силу.

## II. Травы и листья (*herbæ et folia*).

Травы и листья сильно пахучихъ или душистыхъ растений должно собирать молодые, сочные, довольно зеленые, пахучіе, передъ развертываніемъ ихъ цвѣтныхъ почекъ. Однолѣтнія растенія собираются, когда листья совершенно распустились и цвѣтъ начинаетъ развиваться, двухлѣтнія—до прозябенія стебля, многолѣтнія въ началѣ ихъ разцвѣтанія, или когда уже цвѣсты начинаютъ.

Травы и листья зеленеющія, во все лѣто собирать можно; но весеннее время къ этому предпочитается; притомъ избирается хорошая и сухая погода, когда растенія не овлажняются ни утреннею, ни вечернею роскою; а потому ясный день и самое полуденное время для срыванія травъ разцвѣтающихъ, или отцвѣтающихъ уже, признаны способнѣйшими.

Собравши очистить листья отъ твердыхъ стебельковъ и отъ гнилыхъ, поблекшихъ или постороннихъ листочковъ. Травы собираемыя съ стеблями, связываютъ въ пучки и вѣшаютъ въ тѣнистомъ, солнцемъ согрѣваемомъ и вѣтромъ свободно продуваемомъ мѣстѣ. Листы же одни, въ подобномъ этому мѣстѣ, для скорѣйшаго высушиванія и предохраненія отъ порчи или гниlosti, разстилать можно тонкими слоями.

При высушиваніи многихъ, а особенно сочныхъ листовъ, не бесполезно употреблять искусственную теплоту—комнатную или умѣренную печную; при чемъ сила ихъ и естественный цвѣтъ весьма удобно сохраняются \*). Листья же омега цестраго (*coniium maculatum*) и подобныхъ ему растений, одаренныхъ тонкимъ летучимъ веществомъ, по высушеніи тотчасъ истереть въ порошокъ и хранить въ стеклянномъ сосудѣ, хорошо закупоренномъ.

Есть вѣрное примѣчаніе, что природныя наши растенія, въ деревняхъ ежегодно заготавливаемые и собираемые въ сухое лѣто, суть дѣйствительнѣе и лучше, сохраняемыхъ въ аптекахъ, иноземныхъ.

Опытные деревенскіе знахари всѣ вообще целебныя растенія, собранныя ими во время (около Иванова дня) и на своихъ природныхъ мѣстахъ, умѣютъ хорошо сберечь отъ сырости, плесени, гнилой порчи и другихъ поврежденій, уничтожающихъ лучшія ихъ силы. Они привѣшиваютъ ихъ въ мѣшкахъ или кувлякахъ въ сухомъ мѣстѣ, сырыя же содержатъ въ холодныхъ покояхъ или погребахъ, куда бы морозъ не могъ проникнуть. Свѣжіе корни, назначаемые для разводу, хранятъ тоже въ погребахъ, зарывъ въ песокъ, и весною высаживаютъ.

При храненіи травъ и листьевъ должно остерегаться, чтобы не смѣшивать ихъ съ другими растеніями, особенно сильно-дѣйствующими или ядовитыми, которыя всегда быть должны сохраняемы отдѣльно, или въ различныхъ мѣстахъ. Равнымъ образомъ, для избѣжанія худыхъ послѣдствій, могущихъ произойти отъ испорченныхъ или согнившихъ растеній, должно ихъ тотчасъ отдѣлить и не употреблять въ составленіе лекарствъ; но нѣкоторые корыстолюбивые аптекари рѣдко выполняютъ это правило, имѣющее столь важное вліяніе на здоровье. Замѣтитъ должно, что нововысушенные корни, травы, сѣмена, плоды и корни бываютъ сильнѣе годовалыхъ, оставшихся.

### III. Цвѣты (flores).

Цвѣты собирать должно какъ только они примѣтно распустятся, и когда плодотворная пыль ихъ еще не улетѣла изъ цвѣтныхъ пестиковъ; когда же они нѣсколько дней уже цвѣли, то въ такомъ случаѣ теряютъ свою силу, а отцвѣтшіе совсѣмъ негодятся. Временемъ для собиранія цвѣтовъ назначается хо-

---

\*) По Фаренгейтову термометру опредѣляется средняя степень теплоты: отъ 90 до 100 градусевъ; теплота кипящей воды простирается отъ 200 — 212 град. Реомюровъ термометръ, точку кипѣнія показывасть 80 град.



рошая ясная погода, когда роса солнечными лучами уничтожена будетъ.

Ежели цвѣты бываютъ такъ мелки, что ихъ срывать со стебельковъ невозможно, тогда собираются они съ травными цвѣтными верхушками (*summitates*), начинающими распускаться. Почти всегда собираютъ одни цвѣтные лепесточки (*petala*), безъ ихъ одвѣтниковъ или чашечки (*calix*), исключая ароматныя растенія, напр. лаванда, розмаринъ; равнымъ образомъ цвѣты ромашки, тысячелиственника и проч. собираются вмѣстѣ съ ихъ цвѣтными головками, содержащими въ этихъ частяхъ врачебную силу.

Эти нѣжныя части растеній требуютъ скорѣйшаго высушиванія, чѣмъ листья и травы, если хотятъ, чтобъ онны удержали свой естественный цвѣтъ и силу; наилучшимъ образомъ это дѣлается помощію искусственной теплоты. Цвѣты, не имѣющіе летучихъ частицъ, сохраняются въ ящикахъ; одаренные же эфирнымъ масломъ, хранить должно въ склянкахъ, завязанныхъ плотно пузыремъ и бумагой, притомъ въ сухомъ и холодномъ мѣстѣ.

#### IV. Сѣмена и плоды (*semina, fructus*).

Сѣмена собираютъ совершенно зрѣлыя, но прежде, чѣмъ они сами выпадутъ изъ своего сѣменохранилища (*capsula*), или произвольно отдѣлятся отъ растенія, созрѣвая вмѣстѣ съ сѣменными коробочками. Они не требуютъ для сушенія своего иной теплоты, какъ только сухаго воздуха, свободно провѣиваемаго. Наилучшимъ образомъ сохраняются сѣмена въ собственныхъ коробочкахъ, содержащихся въ сухомъ мѣстѣ, или въ ящикахъ, для сего опредѣленныхъ.

Сѣмена сочныя и масляныя всячески беречь должно отъ горькости или промозглости; равнымъ образомъ и мучныя должны быть избираемы сухія, цѣлыя, полныя, а тощія или морщиноватыя и высохшія выбрасываются. Содержащія существенное или летучее масло, тоже должны быть свѣжія и полныя; напротивъ, неимѣющія вкуса и запаха, или пустыя, негодятся.

Выборъ сѣменъ производится посредствомъ опущенія ихъ въ воду: плавающія на поверхности оной выбрасывать; а потонувшія на дно, высушивъ для сбереженія ихъ, содержать должно въ сухомъ и прохладномъ мѣстѣ.

Плоды и сочныя ягоды собираются тоже совершенно зрѣлыя, исключая, когда неспѣлыя потребны будутъ въ заготовленіе.

По высушеніи ихъ сохранять нужно отъ плесени, гнилости и наѣдомыхъ; когда же примѣнены будутъ поврежденными, во врачеваніе употреблять не должно. Для заготовленія въ прокъ, зрѣлыя плоды толвуть, выжимаютъ сокъ и увариваютъ оный

до густоты патоки, а потомъ берегаютъ въ глиняныхъ или стеклянныхъ банкахъ.

#### V. Корки дерева и шишки (cortices, ligna, turiones).

Врачебныя дерева, корки и вѣтви или стебли кустарниковъ всего лучше срѣзывать весною, отдѣляя отъ нихъ мохъ, прильнувшія гнилыя частицы и проч. Нѣкоторые врачи совѣтуютъ древесныя шишки (*turiones*) и почки (*gemmae*), изобилующія сокомъ, снимать въ началѣ весны, прежде развертыванія листовъ, побѣги (*stipites*) обрѣзывать подь осень; ибо въ это время онѣ болѣе изобилуютъ дѣйствительнымъ сокомъ. Корки (*cortices*) съ кустарниковъ снимать осенью, а съ деревьевъ въ глубокую зиму, или при наступленіи весны; ибо онны въ сказанное время весьма удобно отстаютъ отъ дерева. Избираютъ въ сему преимущественно молодыя здоровыя деревья.

Для высушенія нужна умѣренная теплота; но благовонныя ихъ части нужно защищать отъ прикосновенія атмосфернаго воздуха, сырости и проч.

Наконецъ тѣ цѣлительныя растенія, которыя долгимъ храненіемъ или высушиваніемъ лишаются самой дѣйствительной своей силы, необходимо нужно употребить всегда свѣжими, а въ особенности весною для приготовленія такъ-называемыхъ противуцинготныхъ или кровочистительныхъ соковъ (*succi purificantes*). Такого рода суть цикорій, одуванчикъ, жеруха, щавель и проч.

Если природныя наши растенія будутъ собираемы по объясненнымъ здѣсь правиламъ и притомъ берегаемы съ надлежащимъ раченіемъ и осторожностію, то, безъ всякаго сомнѣнія, по своей испытанной пользѣ и свойствамъ, въ новѣйшія времена открытымъ, могутъ дѣйствительно замѣнять пространныя медицинскіе припасы, и бывъ введены въ такое же употребленіе, доставятъ большіе успѣхи въ излеченіи разнородныхъ болѣзней.

---

### Предварительныя свѣдѣнія о цѣлебныхъ свойствахъ растеній и ихъ дѣйствиіи на человѣческій организмъ.

Жизнь и здоровье наше поддерживаются питаніемъ. Мучное вещество, крахмальное, клейкое, сахарное, и получаемое изъ хлѣбныхъ зеренъ, кореньевъ и плодовъ—образуютъ животную слизь (*mucus animalis*), которая не только питаетъ, но и претворяется въ существо наше дѣйствіемъ воспроизводительной системы (*systema reproductivum*) или органическихъ силъ.

1) *Клейкая жидкость* или *слизь (mucilago)* многолѣтнихъ растений и деревьевъ, содержащая въ клетчатой плевѣ и собственныхъ каналахъ, или между лубомъ и заболонью (*liber, alburnum*), служить для питанія и образованія всѣхъ частей произрастенія. Она выступаетъ иногда наружу, или исходитъ въ корень; жидкость эта удобно окисаетъ и изобилуетъ угольною кислотою (*acid. carbonic.*)

Въ чистомъ своемъ состоянїи запаха и вкуса не имѣетъ, растворяется въ водѣ и съ нею соединяетъ жирныя масла (*olea pinguia*) и даже смолистыя вещества (*resinosa*); отъ жару и стужи не твердѣетъ, но въ продолженїи времени переходитъ въ гнилость, изобилующую азотомъ; изъ водянаго раствора осаждается прибавленїемъ ерѣпкаго виннаго спирта (*alcohol*) въ видѣ желе или студени (*gelatina.*)

Обладаетъ способностью притуплять остроты, умягчать жесткїя и на пряженныя части, уменьшать раздражимость мышечныхъ волоконъ и укрощать воспалительную боль, происходящую особенно отъ поглощенныхъ острыхъ ядовъ (*venena acra*).

2) *Крахмалъ (amylum)* есть не что иное, какъ сухая слизь, осажденная самою природою въ клетчатой плевѣ растений, которая бываетъ иногда съ экстрактно-смолистымъ началомъ соединена; рождается же по испаренїи водяной части, теряя при томъ азотное начало (*azoticum*). Вареный съ водою крахмалъ, въ продолженїи времени, окисаетъ и наконецъ покрывается плесенью (*mucor*). Настоякою чернильныхъ орѣшковъ (*tinctura gallarum*) отдѣляется въ видѣ бѣлаго сладковатаго порошка. Помощїю ерѣпкой селитряной кислоты (*acid. nitric.*) извлекается сахарная и укусная кислота (*acid. oxalic. et acetic.*)

Свойства имѣетъ подобныя предъидущей слизи; сверхъ того болѣе питаетъ, потому что удобнѣе перемѣняется въ нашу органическую сферу; укрощаетъ кровотеченія и поносы.

3) *Бѣлковина (albumen)*, тоже находится во многихъ частяхъ растений, особенно въ хлѣбныхъ зернахъ. Она служитъ лучшимъ питанїемъ для нашего тѣла, восстанавливая животную матерїю, смягчая напряженныя или жесткїя части и уменьшая спазмы и боли, происходящїя отъ сильнаго раздраженія. При разрывѣ или поврежденїи цѣлости (*solutio continui*), склеиваетъ и соединяетъ, образуя животный клей (*gluten*), отдѣляемый пасочными сосудами.

По химическому свойству, различествуетъ отъ слези (*mucus*) тѣмъ, что имѣетъ большую часть азота и скорѣе согниваетъ. Бѣлочное вещество свертывается отъ жару и отъ кислоты; помощїю селитряной кислоты извлекается азотный газъ или селитряный (*gas azotic s. nitrosum*), перегонкою получается газъ водородно-углекислый (*g. hydrogeneo-carbonic*) и пригорѣлое масло (*ol. empyreumatic.*)

4) *Камедь (gummi)* происходит изъ сухой слизи растений, такимъ же образомъ, какъ и крахмалъ, отличаясь отъ него только прозрачностью. Качества имѣеть тѣже, т. е. соединяетъ воду съ маслами, умягчаетъ напряженныя части, утоляетъ боли и доставляетъ тѣлу питаніе.

5) *Сладко-сахарныя вещества (dulcia-saccharina)*. Изъ опытовъ г. Морво видно, что сахаръ есть ничто иное, какъ слизь растений, пресыщенная кислородомъ (*mucilago oxydata*), потому что всякая слизь растительная тѣмъ удобнѣе перемѣняется въ сахарное вещество, чѣмъ больше насыщается кислородомъ (*oxygenium*); сахарное же вещество, будучи лишено онаго, перемѣняется въ слизь.

Каждое растение, содержащее въ себѣ сахарное начало, будучи подвержено броженію (*fermentatio*) и перегонкѣ (*destillatio*), даетъ винный спиртъ.

Сахарная слизь имѣеть свойство: масляныя и смолистыя вещества соединять съ водою и поспѣшествуетъ растворенію оныхъ или смѣшенію съ тѣлесными соками; притомъ питаетъ, притупляетъ остроту желчи, отвращаетъ запоры (*obstipationes*). Многія, питаясь однимъ сахаромъ, достигли долготѣйшей жизни. Сыропы, вывариваемые изъ сладкихъ растений, служатъ для приправы кушанья, напитковъ и лечебныхъ средствъ, имѣющихъ противный вкусъ.

6) *Кисло-сладкія и кислыя вещества (acida-dulcia et acida)*. Къ нимъ принадлежатъ плоды, содержащія сахарное вещество, слизь и лимонную или яблочную кислоты (*acid. citrici*). Качества и силу имѣють предъидущихъ, т. е. доставляютъ тѣлу легкое питаніе, утоляютъ непомерную жажду, укрощаютъ лихорадочный жаръ, отвращаютъ запоръ, поправляютъ цинготную порчу соковъ, противудѣйствуютъ гнилости, и весьма полезны какъ въ желчно-гнилыхъ горячкахъ, такъ и въ поносахъ того же рода (*dysenteria biliosoputrida*).

7) *Кислота уксусная (acidum aceticum)*, приготовляемая изъ винной жидкости, подвергаемой вторичному броженію; во 100 частяхъ этой кислоты содержится: 44 кислорода (*oxygenium*), 50 углерода (*carbonium*) и 5 частей водорода (*hydrogenium*).

Свойство имѣеть приятно-летучимъ запахомъ ободрять, слабая органическія части сжимать, лихорадочный жаръ укрощать и бредъ въ нервныхъ горячкахъ (*f. typhoides*) утолять. Хорошій винный уксусъ (*acetum vini*), настоянный малиною (*baccae rubiidae*), прибавляемый къ питью больныхъ, производитъ упомянутыя дѣйствія, открывая притомъ кожныя поры, умѣряя волненіе крови и препятствуя воспаленію важнѣйшихъ органовъ.

Полезна уксусной кислоты чрезвычайная для ослабленія усилительныхъ ядовъ (*venena narcotica*), и укрощенія головной боли отъ угара. Уксусная примочка разводитъ ушицы, стягиваетъ

кровоточивыя раны или порубленія и унимаетъ маточныя непомярныя проволочки (*profluvia uterina*).

8) *Масляно-жирныя* (*oleosa—pinguia*). Свѣже-выжатое масло изъ тучныхъ сѣмянъ запаху почти не имѣетъ; вкусъ нѣжный, нѣсколько сладковатый, заимствуемый отъ слизи и сахарнаго вещества, служащихъ основаніемъ къ питанію.

Свойство имѣютъ горѣть съ дымомъ или сажею и копотью; на открытомъ воздухѣ, притягивая кислородъ, скоро горѣкнуть; растворяются въ винномъ спиртѣ, со щелочами (*alcalina*) составляютъ мыло, растворяемое въ водѣ и алкоголь; содержатъ большую часть углерода, нежели водорода.

Дѣйствуютъ химически, лишая части кислорода, укрощая излишнее напряженіе волоконъ, смягчая раздраженіе, утоляя боли и спазмы и поспѣшествуя испражненіямъ; отъ глисть (*vermes*) служатъ превосходнымъ средствомъ, также и отъ острыхъ ядовъ. Жирное масло, втираемое въ кожу, помогаетъ въ ядовитыхъ угрызеніяхъ змѣй и насекомыхъ, защищаетъ тѣлесныя части отъ дѣйствія сыраго холоднаго воздуха и простуды, препятствуя также къ вступленію въ тѣло повальной заразы (*contagium populare*).

Маковое и орѣховое масла приличіе даются внутрь; льняное и конопляное употребляются снаружи, для составленія мазей, пластырей, промывательныхъ и проч.

9) *Смолистыя вещества* (*resinosa*) суть такія части растений, которыя содержатъ въ себѣ настоящую смолу (*resina*), растворяемую въ винномъ спиртѣ, въ летучихъ и постоянныхъ маслахъ и въ водѣ посредствомъ слизи (*mucilago*) или перегонки; горятъ съ дымомъ и сажею, со щелочами образуютъ смоляное мыло (*sapo resinosis*).

Сухую перегонкою извлекаются: углекислый-водородъ, угольная кислота, пригорѣлое масло и кислотная вода. Опытами дознано, что эфирныя масла и натуральныя бальзамы, лишившись водорода и втянувъ большое количество кислорода, перемѣняются въ смолистое вещество.

Тенардъ и Гэ-Люссакъ показали, что во 100 частяхъ смолы содержится: 75 углерода, 15 водорода и 10 частей кислорода.

Сверхъ упомянутыхъ составныхъ началъ, природа въ органическомъ царствѣ растений часто производитъ безчисленныя перемѣны, по испытанію другихъ новѣйшихъ химиковъ. Такъ напр. ремень и чемерица содержатъ смолистое вещество, соединенное то со щелочнымъ, то съ экстрактно-камеднымъ началомъ, отдѣляемымъ посредствомъ виннаго спирта, или вывариванія съ водою.

А потому и дѣйствіе оныхъ въ животномъ тѣлѣ бываетъ различное. Смолистыя вещества, по своему болѣе постоянному свойству, производятъ мѣстное раздраженіе гораздо продолжи-

тѣльнѣе, нежели летучія вещества (*volatilia*). Тѣ наиболѣе смолы, которыя имѣютъ мыльное свойство (*resinae saponaceae*), побуждая желудокъ и кишка сплѣно и продолжительно, производятъ не только живѣйшія отдѣленія сосудисто-мокротной слезы, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, раздражая мышечныя волокны, причиняютъ часто сверхъестественныя движенія и чрезвычайныя чувствованія.

Подобное раздраженіе производятъ смолисто-острыя вещества (*resinoso-acria*) будучи извнѣ приложены, воспаляя кожу и умножая новыя отдѣленія и загноенія.

Смолистыя вещества, летучія или соединенныя съ эфирнымъ масломъ (*resinosa-aetherea*), принятыя внутрь, побуждаютъ желудокъ, умножаютъ отдѣленія даже отдаленнѣйшихъ частей, возбуждаютъ нервную систему и такимъ образомъ производятъ живѣйшее дѣйствіе во всемъ тѣлѣ. Наконецъ, тѣ слабыя смолистыя вещества, которыя суть прянаго свойства (*aromatica*), побуждая продолжительно пищеварительныя органы, дѣйствуютъ единственно ободряя и укрѣпляя.

10) *Бальзамическія (balsamica)*. Бальзамы натуральныя различаются отъ смолы какъ жидкостію своею, такъ и по содержанию летучаго камфарнаго масла (*ol. volatile camphorinum*). Всѣ бальзамы имѣютъ въ себѣ: то эфирное масло, то смолистое начало, то особенную кислоту, которою синіе соки растений перемѣняются въ красный цвѣтъ и воду дѣлаютъ кисловатою.

Кислота оныхъ бываетъ большею частью росно-ладонная (*acid. benzoic.*), горючаго свойства, совершенно растворимая въ алкоголь; перегонкою въ закрытыхъ сосудахъ образующая булавчатые кристаллы; сухою перегонкою измѣняется въ уксусную кислоту.

Бальзамическія вещества имѣютъ силу волосяныя сосуды (*vasa capillaria*), побуждать и умножать отдѣленія (*secretiones*). Явленія эти происходятъ не только въ желудкѣ и кишкахъ, но и въ отдаленныхъ частяхъ, умножая особенно отдѣленіе мочи и испарины. Вѣроятно также, что эти средства поправляютъ отдѣленіе сукровицы упомянутыхъ сосудовъ и потому называются *раноуплотнительными (vulneraria)*.

11) *Масляно-эфирныя или летучія масла (olea volatilia)* суть самыя ближайшія къ натуральнымъ бальзамамъ. Различаются отъ постоянныхъ тучныхъ маселъ (*olea pinguis fixa*) пронизательнымъ запахомъ, острымъ вкусомъ и великою летучестью, такъ что накапавъ на бумагу не оставляютъ пятенъ; горятъ безъ копоти и сажи, растворяются въ винномъ спиртѣ и даже воду сообщаютъ свой запахъ, по большей части плаваютъ на поверхности оной, нѣкоторыя же густоватыя, по тяжести своей, опускаются на дно, какъ-то: розовое масло (*ol. rosarum*). Въ продолженіи времени, эфирныя масла портятся отъ притяженія

кислорода изъ воздуха и дѣлаются острыми, разѣдающими корочныя пробки, которыми были закупорены; избылдуютъ большею частію водорода и меньшею углерода.

Силу имѣютъ чрезвычайно побуждающую, умножая особенно дѣйствіе или чувствительность (*sensibilitas*) органическихъ нервовъ, сосудовъ и животную теплоту (*caloric animale*), отъ чего силы желудка и кишки возвышаются, пищевареніе удобнѣе совершается и вѣтры (*flatus*) изгоняются.

Тѣмъ чище и летучѣе существенныя масла (*olea aetherea*), тѣмъ пріятнѣе бываютъ для обонанія, посредствомъ которыхъ чувственная сила мозговыхъ нервовъ умножается и бодрость всѣхъ чувствъ возвышается. Между тѣмъ, по летучему и водородному своему началу имѣютъ то особенное свойство, что послѣ скоро-проходящаго возбужденія (*incitatio fugax*), при послѣдовавшей перемежкѣ онаго, умножаютъ отдѣленія и испраженія, и такимъ образомъ прекращаютъ спазмы и другія сверхъестественныя раздраженія, а потому называются *противусудорожными летучими средствами* (*antispasmodica volatilia*).

Благовонныя масла (*olea fragrantia*) пріятно-летучее свое начало сообщаютъ также винному спирту и водѣ, которые тоже возбуждаютъ мозговые нервы, укрощаютъ органическія спазмы и, поощряя волосяныя сосудцы, способствуютъ отдѣленіямъ, каждому испаренію и отдѣленію мокротъ, но гораздо слабѣе самихъ маслъ.

Другія летучія масла, притяженіемъ кислорода образующія камфору (*olea camphorina*), силу кровеносныхъ и волосяныхъ сосудовъ чувствительно и продолжительно возбуждаютъ, умножая притомъ жаръ въ тѣлѣ, хотя на языкѣ и въ нѣщепріемномъ горлѣ производятъ впечатленіе холода, по своему обыкновенному летучему испаренію.

Къ этому роду принадлежатъ: мятное, розмаринное и шалфейное масла, которыя продолжительнымъ испареніемъ осаждаются или переходятъ въ камфору.

По свидѣтельству Тромсдорфа, камфора рождается также изъ терпентиннаго масла (*olea terebentinae*), прохожденіемъ чрезъ оное сухихъ паровъ соляной кислоты (*acid. muriat.*).

Ежели летучее масло въ соединеніи своемъ имѣетъ экстрактно-горькое, или смолистое, или водяное вещество, то оно продолжительно дѣйствуетъ на нервную и мышечную системы, возбуждая постоянно желудокъ и кишки, изгоняя скорѣе вѣтры и усиливая движеніе жидкостей, умножаетъ теплоту всего тѣла. Извнѣ будучи приложено, побуждая кожныя сосудцы и ускоряя отдѣленія, производитъ разводящее дѣйствіе (*discutiens*).

*Пригорѣлыя масла растений* (*olea empyreumatica*), содержащія уголь или сажу и несовершенную кислоту, не только сильнѣе раздражаютъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ уничтожаютъ жаръ и

волненіе крови. Средства эти полезны въ астенической ломотѣ (*arthriti anomalae*), равно какъ и винная настойка сажи (*tinctura fuliginis*), одобряемая Меллиномъ и рекомендуемая Г. Каменецкимъ въ маточныхъ припадахъ (*anomaliae uterinae*); но для нѣжныхъ особъ или полнокровныхъ и рѣзкаго сложенія людей негодятся.

Вонючія вещества (*graveolentia*), которыя имѣютъ противный запахъ, производятъ также особенное дѣйствіе на нервы, потому что отвратительный духъ дѣлаетъ тошноту, или такъ возбуждаетъ чувственную силу, что болѣзненное побужденіе иногда перестаетъ. Нѣкоторыя изъ этихъ скоро-проходящихъ побужденій, въ продолженіе перемежки, умножаютъ равномерно всѣ тѣлесныя отдѣленія. А потому вонючія средства имѣютъ силу утолять спазмы и боли нервнаго свойства (*neuralgiae*); полезны также въ чревныхъ судорожныхъ завалахъ (*neurantistases*) и отъ глиствъ (*vermes*); почему и называются *противуглистными* (*anthelminthica*), коихъ дѣйствіе зависитъ отъ упомянутой противусудорожной силы.

Впрочемъ польза этихъ средствъ не для всѣхъ бываетъ одинакова, потому что противный запахъ, у людей имѣющихъ нѣжные нервы, производитъ болѣзненные припадки, какъ-то: головную боль, круженіе и обмороки. Нѣкоторыя, по горячительному своему свойству, производятъ сильный приливъ крови (*impetus sanguinis*) къ важнѣйшимъ органамъ; по этому надлежитъ употреблять оныя съ осторожностію полнокровнымъ и имѣющимъ въ немъ особенное отвращеніе (*antipathia*).

12) *Спиртныя вещества* (*spirituosa*). Всѣ произрастенія и плоды, содержащія сахарное вещество разведенное водою, на открытомъ воздухѣ, при 70 град. Фаренгейтова термометра, подвергаемы броженію, послѣ внутренняго возмущенія всей массы и отдѣленія угольной кислоты, переменяются въ винно—кислую жидкость. Вина натуральное и искусственное тѣмъ лучше бываютъ, чѣмъ большее количество содержатъ сахарнаго начала и долѣе сохраняются.

*Старое вино*, нѣсколько спиртоватое и избыточное углекислымъ газомъ, удивительно ободраетъ нервы, восстанавливаетъ упавшія силы, скорѣе проходитъ чрезъ мочевые пути и гонитъ потъ; а потому съ большою пользою употребляется въ нервныхъ лихорадкахъ и гнидыхъ горячкахъ съ пятнами (*f. petechiales*), давая больнымъ каждый часъ по столовой ложкѣ.

Изъ вино-сахарной жидкости перегонкою извлекается винный спиртъ (*spiritus vini*), который очищается повтореннымъ двойнымъ и прибавленіемъ солякислой извести (*calx muriatica*), или древеснаго угля и сѣрной рѣзкой кислоты (*acid. sulphuric.*). Такимъ образомъ получается алкоголь, который легче воды какъ 792 : 1000. Обыкновенный же спиртъ (*spiritus vini*), извлекае-



мый изъ хлѣбныхъ зеренъ (*frumenta*), имѣеть удѣльную тяжесть отъ 930—935 къ 1000 воды.

Винный спиртъ имѣеть запахъ летучій, пронизательный, вкусъ горячительный, силу чрезвычайно побуждающую, горитъ синеватымъ пламенемъ безъ дыму и копоти. По опытамъ Сосюра, основныя начала онаго суть: 43 части углерода, 37 кислорода, 15 водорода и 5 азота. Имѣеть свойство растворять смолистыя вещества, жирныя и эфирныя масла, самородныя бальзамы, экстрактную часть растений и мыльныя вещества.

Для врачебнаго употребленія избирается винный спиртъ немѣющій никакой пригорѣлости (*empyreuma*), для составленія лекарственныхъ настоекъ (*incturae*) и къ извлеченію смолисто-экстрактныхъ и горькихъ частей изъ растений. Снаружи употребляемый, раздражаетъ и укрѣпляетъ слабыя части; будучи смѣшанъ съ уксусомъ, разводитъ ушибы, уменьшаетъ кровотеченіе свѣжихъ порубленныхъ ранъ и помогаетъ изцѣленію переломленныхъ костей.

Винный спиртъ, съ крѣпкимъ уксусомъ перегоняемый, даетъ уксусную несть (*naphtha aceti*), имѣющую пріятнѣйшій ароматный запахъ, такой же вкусъ и весьма летучее вещество. Польза этого средства величайшая: въ нервныхъ лихорадкахъ, гнилыхъ горячкахъ, поносахъ, простудной ломотѣ, боляхъ роженицъ, спазмахъ, судорожныхъ маточныхъ припадкахъ и отъ усыпительныхъ ядовъ (*venena narcotica*). Даютъ на сахаръ по 10—20—40 капель, или съ наливкою Мауна (*infus. valerianae*), для возбужденія ослабѣвшихъ нервовъ и умноженія кожной испарины. Извѣтъ втирають въ виски при обморокѣ, даютъ нюхать и прикладываютъ къ гнилымъ болящимъ зубамъ (*dentes sariosi*).

13) *Усыпительныя (narcotica)* суть такія средства, которыя чувственную силу уменьшаютъ; дѣйствуютъ же они подобно летучимъ масламъ и спиртнымъ веществамъ, которыя сначала сильно побуждая чувствительность, наконецъ приводятъ ее въ ослабленіе. По этому, какъ усыпляющія, такъ и спиртныя средства, производя опьяненіе и постепенно возбуждая жизненную силу, поспѣшествуютъ тѣлеснымъ отдѣленіямъ и наводятъ сонъ.

Многія изъ усыпительныхъ средствъ, имѣющихъ горько-тошнотавое свойство, будучи полезны для людей, въ тѣлахъ животныхъ низшаго класса часто производятъ губительныя дѣйствія; такъ напр. квассія, горькій миндаль, полынь и т. под. умерщвляютъ мухъ, птицъ, ящерицъ и рыбъ. Другія усыпительныя, имѣющія ядовитый запахъ и горько-острое начало, какъ-то: лавровишневое дерево (*p. lauro-cerasus*), красавица (*atr. belladonna*) и пѣлибуха (*s. nux-vomica*), по опытамъ Пэаффа, Вельтера и Еммерта, весьма ядовиты и для людей. Свойство оныхъ

зависитъ отъ щелочно-летучаго и азотнаго начала, разрушаемаго кислотами.

Новѣйшіе химики открыли, что усыпительные яды, сверхъ горько-остраго вещества, содержатъ весьма летучую кислоту берлинской лазури (*acid. borussic.*) и азотное начало (*azoticum*). Изъ этого видно, что азотъ, соединенный съ водородомъ и малымъ количествомъ кислорода, сообщаетъ этимъ средствамъ весьма летучее свойство, и дѣйствіе ихъ, сильно распространяющееся по всему тѣлу и превосходящее спиртно-эфирныя вещества.

Усыпительно-ядовитыя вещества дѣйствуютъ большею частію на нервы спиннаго хребта, уменьшая чувствительную силу и возбуждая раздражительную. Извнѣ, будучи приложены къ нервамъ, чувствительную силу оглушаютъ, но въ мышцахъ производятъ особенную боль и раздражимость.

По этому очевидно, что усыпительныя средства преимущественно возбуждаютъ сердце и сосуды, отъ него происходящія; умножаютъ крѣпость и скорость жилогенія (пульса), побуждаютъ волосяныя сосудцы не только къ скорѣйшимъ отдѣленіямъ, но даже къ воспаленіямъ (*inflammationes*), растворяютъ застоя вѣгъ и самую кровь дѣлаютъ жиже. Между тѣмъ чувствительная сила уменьшается и наконецъ вовсе исчезаетъ, особенно въ желудкѣ; если же и нервы вмѣстѣ поражаются, то дѣлаются трясенія, спазмы и жестокия боли. А потому заключить должно, что средства эти могутъ дѣйствовать на цѣлый организмъ.

14) *Горько-экстрактныя вещества (amaro-extractiva)*. Очень многія растенія имѣютъ чистое горькое начало (*princip. amarum*), извлекаемое водою и виннымъ спиртомъ, которое даже однимъ вкусомъ открывается; однако надлежитъ хорошенько различать отъ предъидущихъ горько-усыпительныхъ средствъ.

Горько-экстрактное начало заимствуетъ свой вкусъ отъ полуокисленнаго угля (*carbo hemioxydatum*), которое притяженіемъ большаго количества кислорода дѣлается сладкимъ, и потому многія растенія такимъ образомъ получаютъ средній вкусъ между горькимъ и сладкимъ.

Горько-чистое начало удобнѣе растворяется въ винномъ слабомъ спиртѣ, а сладковато-горькое извлекается горячею водою, какъ видно изъ приготовленія врачебныхъ настоевъ и наливокъ (*tincturae, infusae*). Этимъ способомъ можно отдѣлять мучное вещество даже изъ смолисто-горькихъ и острыхъ кореньевъ.

Синій цвѣтъ горькихъ растеній отъ кислотъ перемѣняется въ красный, отъ щелочей въ зеленый, а отъ желѣзнаго купороса въ оливковый.

Горькія средства доставляютъ постоянное и мѣстное побужденіе, въ особенности желудку, котораго силы укрѣпляются;

равно и другіе смѣжные органы, опредѣленные для отдѣленія, къ лучшему дѣйствию тоже побуждаются, а потому и называются желудочными (*stomachica*) или поправляющими желчь (*bilem corrigentia*).

Въ особенності же средства эти помогаютъ въ худомъ пищевареніи (*digestio laesa*), зависящемъ отъ слабости мышечныхъ волоконъ. Для этой цѣли служатъ болѣе горько-опьяняющія и вяжущія средства (*amaro-aromatica, adstringentia*), содержащія нѣсколько летучаго масла, ежели примѣчается слабость во всемъ тѣлѣ; ибо отъ укрѣпленія желудка и другихъ внутренностей, поправляются отдѣленія желчи, сока поджелудочной железы (*succus pancreaticus*), дѣлается правильное смѣшеніе соковъ, разводятся застои мочротъ, свободное движеніе крови и восстановление правильныхъ дѣствий во всемъ организмѣ.

Что горькія вещества дѣйствуютъ на твердыя и жидкія части нашего тѣла, то первое подтверждается крѣпостію мышечныхъ волоконъ, получаемую отъ правильнаго смѣшенія питательнаго сока и ускоряемаго отдѣленія посредствомъ мышцъ, дѣйствующихъ на жидкости. Второе доказывается тѣмъ, что животныя, питающіяся горькими растениями, получаютъ въ мясѣ, молокѣ и другихъ сокахъ такой же вкусъ; иногда же самое горько-красильное начало сообщается испражняемымъ влагамъ.

Сколько полезны горькія средства, не менѣе и вредны могутъ быть они тогда, ежели пищеварительные органы страдаютъ не отъ слабости, но отъ засоренія оныхъ или нечистоты (*sordes gastricae*). Замѣчено также, что продолжительное употребленіе горькихъ веществъ производитъ опьяненіе или головокруженіе у людей слишкомъ нѣжныхъ и великою раздражимостью одаренныхъ; у полнокровныхъ причиняютъ приливъ къ важнѣйшимъ органамъ, одышку, пострѣлъ (*apoplexia*) и водяную болѣзнь (*hydrops*).

15) *Вяжущія чистыя (adstringentia pura.)* Вяжущій вкусъ растений зависитъ отъ собственнаго начала, именуемаго дубильнымъ (*tanninum s. pr. coriarium*) имѣющаго свойство животному студень гсущать и укрощать гнилость. Сверхъ онаго начала многія вяжущія средства содержатъ такъ же кислоту чернильныхъ орѣшковъ (*acid. galic.*), имѣющую большое количество углерода и водорода, меньшую же кислорода, который болѣе находится въ другихъ растеніяхъ кислаго свойства.

Вяжущее начало удобно растворяется въ винномъ спиртѣ и водѣ, желѣзными окисями (*oxida ferri*) осаждается въ видѣ чернаго или темно-пурпуроваго цвѣта, отъ селитряной кислоты (*acid. nitric.*) перемѣняется въ кислочную или сахарную кислоту (*ac. oxalic.*); ядкая щелочь (*kali causticum*), прибавляемая къ наливкѣ чернильныхъ орѣшковъ, отнимаетъ чистый экстрактъ. И самая природа, вяжущее свойство не зрѣлыхъ плодовъ перемѣняетъ въ мыльно-кислый нѣжный экстрактъ, когда оное при

совершенной зрѣлости соединится съ кислочною и яблочною кислотами (*acid. malic.*).

Парафъ тоже замѣтилъ, что вяжущее горьковатое начало, притяженіемъ большаго количества кислорода, дѣлается сладковатымъ, растворяется въ водѣ и пѣнится подобно мылу; синій цвѣтъ растеній перемѣняется въ красный, съ известковою водою зеленѣеть, синѣть и дѣлаетъ отсѣдъ розоваго цвѣта, которыя измѣненія зависятъ единственно отъ кислоты чернильно-орѣшковой.

Вяжущія средства по своему началу подобное дѣйствіе производятъ, какъ въ живомъ тѣлѣ, такъ и надъ мертвыми волокнами, что самое дубленіе кожъ доказываетъ. Если вяжущее начало сгущаетъ животный клей (*gluten animale*), то слѣдуетъ, что и соединеніе плотныхъ частей укрѣпляетъ, дѣлаетъ ихъ жесткими и твердыми, да и самыя влаги отъ умноженной связи створоживаются, какъ видно изъ мѣстнаго прикладыванія этихъ средствъ.

Дѣйствіе оныхъ нельзя отвергнуть и на отдаленныя части, производимое сочувствіемъ сжиманія и переносимое кругообращеніемъ крови. Принятыя внутрь, или снаружи приложенныя, они въ короткое время урощаютъ кровотеченіе, укрѣпляютъ слабыя части, останавливаютъ излишнее потѣніе, отражаютъ гнилость астеническихъ язвъ, поправляютъ сукровицу и поспѣшествуютъ заживленію оныхъ.

Полезны также вяжущія средства въ слабости всего тѣла (*atonia corporis*), зависящей отъ недостатка связи и упругости плотныхъ частей; при сильной вялости и недостаточномъ движеніи мышечныхъ волоконъ (*torpor fibrarum*), отъ чего дѣлаются нерѣдко застои влагъ, поносы кровавые и сывороточные (*profluvia sanguinea et serosa*), маточныя кровотеченія у блѣднолицыя женщины, и упорное теченіе бѣлей (*leucorrhoea*); также въ мокротномъ теченіи, бывающемъ у обоихъ половъ (*blenorhoea muliebri et virilis*), которое зависитъ отъ одной только слабости железъ мочеваго канала; въ золотушномъ слезотеченіи (*epiphora scrophulosa*), непошѣрномъ слюноотеченіи или плеваніи (*ptyalismus*), мокротномъ долговременномъ поносѣ, выпаденіяхъ внутренностей, грыжахъ и вывихахъ, происходящихъ отъ великаго расслабленія (*laxitas*).

Въ астеническихъ сыпяхъ (*exanthemata atenica*), зависящихъ отъ великой нѣжности мышечныхъ волоконъ (*teneritas fibrae*), вяжущія средства тоже помогаютъ; но если оныя происходятъ отъ какой-нибудь остроты (*acrimonia*), негодятся; поэтому и въ язвахъ острыхъ остерегаться должно. Напротивъ, цыготныя язвы (*ulcera scorbutica*), золотушныя (*scrophulosa*) и происходящія отъ худаго питанія или худосочія (*cachexia*), средства

эти, поправляя сукровицу (*sanies*) и поспѣшествуя отдѣленію хорошаго гноя, способствуютъ много къ заживленію.

Отеклыя опухоли или сывороточныя (*tumores serosi*), тоже требуютъ вяжущихъ средствъ. Впрочемъ, ежели какія нибудь теченія (*profluvia*), сыпи и язвы, хотя бы казались астеническими (*passiva*), однако долговременностію сдѣлались безвредными, таковыя предоставить должно натурѣ, ибо уничтоженіе оныхъ, равно какъ и остановленіе обыкновеннаго пота, и закрытіе застарѣлыхъ язвъ, можетъ причинить не только худыя послѣдствія, но и ускорить смерть.

Еще надо напомнить: слишкомъ долгое употребленіе вяжущихъ средствъ не можетъ остаться безъ вреда; ибо долговременнымъ сжиманіемъ дѣлаются грубыми и жесткими, гибкіе члены твердыми, пріятная молодость перемѣняется въ преждевременную старость. И самыя опухоли отъ этихъ средствъ, употребляемыхъ долге надлежащаго времени, такъ затвердѣваютъ, что наконецъ перемѣняются въ скірреую окрѣпость (*scirrhositas*).

16) *Вяжущія горькія* или прянныя (*adstringentia amaro-aromatica*). Растенія, имѣющія горьковязущій или пряный и бальзамическій вкусъ, свойство это получаютъ отъ внутренняго соединенія вяжущаго начала съ горькимъ экстрактомъ, летучимъ масломъ и смолистымъ бальзамомъ. Качества свои сообщаютъ какъ винному спирту, такъ и горячей водѣ.

Силу имѣютъ побуждать всѣ органическія системы, укрѣпляя слабыя силы желудка, ободряя нервы, поощряя сосуды къ движенію, умножая кругообращеніе крови и животную теплоту, поспѣшествуя отдѣленіямъ и возстановляя надлежащую крѣпость мышцъ при ослабленномъ состояніи всего тѣла.

Употребляются преимущественно въ перемѣняющихся лихорадкахъ, нервныхъ и гнилыхъ, равно и другихъ астеническихъ болѣзняхъ.

17) *Испражняющія смолисто-острыя* (*purgantia resinoso-acria*). Сюда принадлежатъ: всѣ слабительныя и рвотныя средства (*cathartica, emetica*), которые, побуждая отдѣлительные органы къ испраженію, наконецъ ослабляютъ умноженную дѣятельность всѣхъ органическихъ системъ, какъ-то: первыхъ путей, кровеносныхъ сосудовъ, всасывающихъ, нервной и мышечной.

Легкія слабительныя (*laxantia mitiora*), побуждая червообразное движеніе кишечнаго канала, производятъ испраженія безъ раздраженія. Проносныя крѣпкія (*purgantia fortiora, drastica*), имѣющія мыльно-смолистое свойство и острый вкусъ, сильно раздражая желудокъ и кишки, по сочувствію органическихъ нервовъ, производятъ умноженныя испраженія съ рѣзомъ (*tortura*), болью и судорожными движеніями.

По этому слѣдуетъ съ большею осторожностію назначать

приемы оныхъ, ограничивая преимущественно употребленіе въ долговременныхъ или недихорадныхъ болѣзняхъ (*m. diuturni*), гдѣ примѣчается большая слабость (*torpor*) кишечнаго канала.

Полезь оныхъ бываетъ огромная, ежели нужно сдѣлать какое-нибудь отвлеченіе (*revulsio*) отъ важнѣйшихъ частей къ кишкамъ; ежели надѣяться можно, что застарѣлыя кожныя болѣзни (*m. cutanei chronici*), могутъ быть облегчены или совершенно истреблены помощію продолжительнаго кишечнаго испражненія, которымъ, не ослабляя силъ, чрезъ сочувственное раздраженіе, часто вылечиваются самыя упорныя болѣзни, какъ-то: водяная, параличъ, падухая и проч.

Видъ, въ которомъ приличіе даются слабительныя средства, также наблюдать должно; легкія — можно употреблять въ водяномъ растворѣ, или наливкѣ (*inf. laxativum*), смолисто-острыя удобнѣе растворяются въ винѣ или спиртныхъ жидкостяхъ. По этому случаю дѣлаются спиртныя настойки (*tincturae*), ревеня, колоцинтовъ, черемицы и проч.

Такъ какъ послѣднія сильнѣе и продолжительнѣе раздражаютъ кишки, то оныя соединять должно съ клейкими веществами (*mucilaginoso*) или съ сахаромъ, яичнымъ желткомъ и нѣжными маслами (*olea blanda*). Дѣтямъ, по природѣ имѣющимъ особенную чувствительность и раздражимость, приличіе давать въ молочныхъ растворахъ, или эмульсіяхъ.

Рвотныя средства (*emetica, vomitoria*), составляетъ множество растений, которыя содержатъ смолисто-экстрактное вещество. Многія изъ оныхъ долговременнымъ вареніемъ оказываютъ мочегонное дѣйствіе (*diuretica*). Оба эти свойства удобно укрощаются уксусомъ и другими кислотами произрастеній (*acida vegetabilia*). Летучія части рвотныхъ средствъ вовсе теряются, ежели чрезъ долгое время будутъ находиться на открытомъ воздухѣ, или худо сберегаемы, что и о прочихъ разумѣется.

Сила оныхъ, въ особенности раздражая желудокъ и нервныя пучки онаго или сплетенія (*plexus nervosi*), производитъ сверхъестественное движеніе мышечныхъ волоконъ столь сильно, что дѣлается рвота, отъ которой и болѣзненное побужденіе кишекъ часто перестаетъ. А потому такимъ образомъ утоляются спазмы, боли и самыя немощныя кишечныя испражненія прекращаются чрезъ возбужденное сочувствіе нервовъ.

Въ малыхъ учащенныхъ приемахъ (*dosi refracta*), средства эти, производя одну только тошноту (*nausea*), и весьма легко побуждая желудочныя нервы, оказываютъ большую пользу въ чревныхъ завазахъ (*stases abdominales*), спазмахъ и другихъ болѣзненныхъ припадкахъ.

Такимъ образомъ вылечиваются поносы, происходящіе отъ простуды, ревматизма, маточныя судорожныя припадки, непо-

мѣрные астеническія кровотеченія, грудныя мокротныя болѣзни, мокротная чахотка (*phtisis pituitosa*), долговременная одышка (*astma*), зарожденіе грудной водяной болѣзни (*hydrothorax incipiens*) и воспаленія, сопровождаемыя спазмами, коимъ подвержены бываютъ роженицы (*peritonites puerperalis*). Въ соединеніи съ экстрактомъ бѣлены (*extr. hyosciami*) и мятнымъ сахаромъ (*eleosaccharum menthae*), укрощается судорожный кашель (*tussis ferina*) или коклюшь.

Изъ русскихъ рвотныхъ растений: корень подлѣсника или копытника (*rad. asar. europei*), по опытамъ Каменецкаго, есть самое надѣянтѣйшее средство. Дается въ порошокѣ, водяной и винной наливкѣ.

18) *Разъѣдающія смолисто-острыя вещества (rodentia resinosa-acria)*. Многія чрезвычайно острые или ѣдкия растенія, собственное начало получаютъ отъ смолистаго вещества, соединеннаго съ ѣдкою щелочью (*kali caustic.*), по которымъ жгучая сила оныхъ умножается. Будучи приложены къ кожѣ или инымъ тѣлеснымъ частямъ, производятъ въ оныхъ воспаленія, отдѣленія верхней кожицы, растравленіе сосудовъ и извлеченіе сукровицы или пасоки; по прошествіи же раздраженія, оказываютъ хорошее нагноеніе (*suppuratio*). По такому дѣйствию называются средства эти нарывными и разъѣдающими (*vesicatoria, escharotica*), въ худосочныхъ тѣлахъ производятъ иногда опасное воспаленіе, переходящее въ антоновъ огонь (*gangraena*).

Употребляются снаружи какъ отвлекающія (*revellentia*), для уничтоженія внутреннаго воспаленія важнѣйшихъ частей, для извлеченія острой пасоки чрезъ кожу и для травленія мясной дичи (*caro fungosa*), зараждающейся въ астеническихъ язвахъ (*ulcera atonica*). Нарывныя средства не только мѣстно дѣйствуютъ, но, по всеобщему возбужденію твердыхъ ослабѣвшихъ частей, ускоряя болѣзненные отдѣленія (*secretiones morbosae*) и возвышая жизненные силы, поспѣшествуютъ перелому болѣзней (*crisis morborum*).

Острыя или ѣдкия смолистыя вещества, употребляемыя внутрь, требуютъ большой осторожности; даются же въ самыхъ малыхъ приемахъ, въ соединеніи съ клейко-масляными или мягчительными средствами, притупляющими ѣдкое свойство оныхъ (*involventia*). По содержанію смолистаго начала, удобнѣе растворяются въ крѣпкомъ винномъ спиртѣ.

19) *Щелочныя вещества (alkalina)*. Щелочь, поташъ, или травяная соль (*kali, potassa, sal herbarum*) получаютъ изъ золы многихъ деревьевъ и травъ, извлекаемыя горячею водою и выпариваніемъ приводимыя въ сояныя кристаллы. Нечистый поташъ (*cineres clavellati*), имѣющій черноватый цвѣтъ, содержитъ экстрактное вещество растеній, которое еще не совершенно пережжено. Почему нѣкоторые особенную силу приписываютъ поли-

ной соли (*sal absinthii*), кудряваго волчца (*s. cardui benedictae*) и проч.

Должно согласиться, что, по различной почвѣ земли, многія растенія содержатъ также поташъ, соединенный съ селитряною, или соду съ соляною кислотою. Въ первомъ случаѣ образуется селитра (*nitras potassae*), во второмъ обыкновенная поваренная соль (*urias potassae*), находящая преимущественно въ приморскихъ растеніяхъ, именуемыхъ солянками (*salsola kali s. soda salicornia herbacea*) и проч.

Поташъ, напитанный вино-каменною кислотою, составляетъ вино-щелочную соль (*supertartras potassae*) или креморъ-тартаръ.

Очищенный поташъ и сода имѣютъ одинаковыя свойства; первый принадлежитъ царству растеній, вторая минеральному или ископаемому. Изобилуютъ азотомъ, преимущественно приимчаемымъ въ летучей щелочи (*ammonium*), имѣющей сродство съ тѣлами животныхъ. Вкусъ имѣютъ собственный щелочной, въ водѣ удобно растворяются; кислородъ весьма скоро притягиваютъ изъ воздуха, съ жидкими кислотами образуютъ среднія соли (*salia neutra*). Сильные соки растеній переимѣняютъ въ зеленый цвѣтъ, желтый — въ темно-красный и фиолетовый.

Въ тѣлѣ животныхъ дѣйствуютъ химически, разлагая кислоту не только въ первыхъ путяхъ, но и въ отдаленнѣйшихъ органахъ; соединяясь съ мочевою кислотою (*acid. uric.*) растворяютъ камни (*calculi, uroliti*), уничтожаютъ подагрическіе и лютотные фосфорно-известковые наросты и металлическія окиси (*oxyda*), особенно свинцовыя и ртутныя, принятыя внутрь; притяженіемъ кислорода уничтожаютъ ядовитое оныхъ дѣйствіе.

Поташъ, напитанный угольною кислотою (*kali carbonicum*) имѣетъ не столь острое свойство, какъ пережженный (*k. purum*), которые, побуждая всасывающіе и волосяные сосуды и самыя желѣзы (*glandulae*), умножаютъ отдѣленія, всасываніе и уничтожаютъ пасочные застои (*stases lymphaticae*). Наблюдения Гумбольдта и другихъ подтверждаютъ, что щелочныя средства, вбравая желудочную кислоту, укрощаютъ спазмы и другіе нервныя припадки, зависящіе отъ матеріальной причины, побуждающей чувственную силу къ сверхъестественнымъ движеніямъ (*motus abnormes*).

Въ соединеніи съ горькими веществами уничтожаютъ желудочную щемоту или изжогу (*cardialgia, pyrosis*), желчную рвоту и зеленый дѣтскій поносъ (*alvus viridis infantum*), происходящій отъ овисанія желудочнаго сока (*succus gastric. acescens*). Пользная соль или поташъ, въ соединеніи съ водяною валівкою ревеня (*inf. rhei kalinum*), величайшую пользу доставляетъ младенцамъ; ванная поташная настойка горечавки (*tinctura kalina-gentianae*), принимаемая по столовой ложкѣ по утру и въ вечеру, помогаетъ болѣе взрослымъ.



Въ повальномъ кровавомъ поносѣ (*dysenteria popularis*), сопряженномъ съ кислотою и промозглою отрыжкою, или съ желчною зеленоватою рвотою (*vomitus prasinus*), упомянутыя средства, съ прибавленіемъ вишневаго клея (*gummi cerasorum*) или другихъ клейкихъ средствъ (*mucilaginoso*), служатъ для этого лучшими лекарствами. Поташъ, въ соединеніи съ сѣрою, разрушаетъ животныя окиси свинца, ртути и мышьяка (*oxida venenata plumbi, hydrargyri, arsenici*). Мятчелль давалъ это средство съ успѣхомъ въ началѣ злокачественныхъ лихорадокъ (*f. malignae*) для уничтоженія гнилости, или тлетворной кислоты (*acid. septic.*).

Поташъ, отсырѣвшій на воздухѣ (*liquor kali carbonici*), побуждая нѣжно кишки и чревныя сосуды, разводитъ густыя мокроты, уничтожаетъ завалы (*abstrucciones*), гонитъ мочу и растворяетъ каменную древу (*lithiasis*), принимая по 10—20 и 30 капель съ чистою водою и продолжая ежедневно въ теченіи мѣсяца. При этомъ весьма полезна вода щелочно-углекислая (*aqua therpitica alcalina*), или, по методу Маскагни: растворивъ 2 драхмы углекислаго поташа (*kali carbonici*) въ одномъ фунтѣ сельтерской воды (*aqua selterana*), принимать 3 раза въ день по чайной чашкѣ.

Углекислый поташъ, дѣйствуя на пасочную систему, направляетъ кислоту порчу пасови, разводитъ золотушныя опухоли или застой (*stases systematis lymphatici*). Поташный растворъ внутрь и извнѣ употребляемый, разводитъ молочные переносы (*metasyncrises lactae*), твердыя комотныя опухоли (*tophi arthritici*), водяные отеки и уничтожаетъ кожныя долговременныя сыпи (*impetigines exanthemata*). По опытамъ Руста, въ соединеніи съ горькими экстрактами (*extracta amara*), излечиваетъ золотушныя застарѣлыя язвы (*ulcera scrophulosa*) и вторичное мокротное теченіе изъ мочеваго канала (*blenorrrhaea secundaria*).

Наконецъ, перемежное употребленіе то поташа, то усыпительныхъ средствъ (*narcotica*), Шницъ рекомендуетъ: въ судорожныхъ корчахъ, судорожномъ сведеніи челюсти (*trismus*), столбнякѣ (*tetanus*), истерикѣ и желудочныхъ спазмахъ; даже страшная водобоязнь (*hydrophobia*), происходящая отъ укушенія бѣшеныхъ животныхъ, укрощается и вовсе уничтожается: ежели 2 скрупула углекислаго поташа, растворивъ въ 2 унціяхъ воды, принимать каждые 2 часа по 2 столовыхъ ложки, давая попеременно по 1 грану опія, или экстракта бѣлены (*extr. hyosciami*) по 2 гр. и больше, притомъ посадить больного въ ванну изъ зольнаго щелока приготовленную (*balneum lixivii*) и поставить промывательное (*clysmo*), изъ того же щелока съ мыломъ составленное.

Съ уменьшеніемъ опасности, продолжать одинъ поташный растворъ, состоящій изъ 1 скрупула поташа; раствореннаго въ

6 унц. мятной или ромашечной наливки (*inf. menthae v. chamomilae*), подслащенной сиропомъ, или медомъ.

Поташъ, вареніемъ съ пережженою известью (*calx usta*) составляетъ ѣдкій щелокъ (*lixivium caustic.*), который имѣетъ жгучій вкусъ, силу чрезвычайно раздражающую органическія части и уничтожающую яды животныхъ, бѣшенство (*rabies*) и венерическую болѣзнь (*syphalis*). Основываясь на этомъ, многіе врачи заключали, что всѣ ѣдкія вещества изъ растеній, суть героическія средства, служація къ разрушенію венерическаго яда, бѣшеныхъ животныхъ и другихъ ядовъ.

Бганъ Бланъ и Фордиве, ѣдкій поташъ (*kali caustic.*) единственнымъ средствомъ поставляютъ къ растворенію камня въ мочевыхъ путяхъ. Секретныя средства Жюрина и Шиттика состояли въ томъ, что давали ѣдкій поташъ отъ 1—3 гранъ, разведши въ крѣпкомъ овсяномъ или ячномъ отварахъ.

Масляное мыло, составленное изъ ѣдкаго щелока и жирнаго масла (*sapo oleosus*), Ганеманъ почитаетъ надежнѣйшимъ средствомъ въ отравленіяхъ мышьякомъ и другими острыми металлическими окисями (*oxyda metallica*), растворивъ этого мыла 1 фунтъ въ 4 фунтахъ воды, и давая каждую четверть часа по столовой ложкѣ, пока окажется спасительная рвота.

Снаружи ѣдкимъ поташомъ истребляются бородавки, очищаются мозолеватыя, дурнаго свойства язвы (*ulcera callosa, caecoetha*) и венерическія получаютъ гораздо лучшій видъ, нежели отъ ртутныхъ средствъ. Дюссосу впрыскиваніемъ и закладываніемъ янговъ, напитанныхъ растворомъ ѣдкаго поташа, истреблять мясную грыжу (*sarcocelle*); въ мозолистыхъ свищахъ (*fistulae callosae*) производитъ хорошее загноеніе (*supuratio benigna*); лютныя опухоли, намачиваемыя этимъ растворомъ, приходятъ въ разрѣшеніе.

Если 1 драхму ѣдкаго поташа растерѣть съ 2 частями масла и прибавить 1 унцію воды, то этимъ средствомъ уменьшаются паршивые струпы и удобно отдѣляются (*tinea capitis*) равно и члены лишенные чувства (*membra resoluta*) отъ параличнаго ослабленія нервовъ возбуждаются такимъ втираніемъ. При венерическомъ долговременномъ теченіи (*blenorrrhaea syphilitica*) полезно впрыскивать растворъ, состоящій изъ 1 грана ѣдкаго поташа и 1 унціи чистой воды.

Наконецъ ванны, съ ѣдкимъ щелокомъ приготовляемыя (*balnea lixiviosa*), растворяя 2 унціи ѣдкаго щелочнаго камня (*lapis caustic.*) въ обыкновенномъ щелокѣ, изъ воды приготовленномъ (*lixivium e cineribus lignorum*), весьма полезны для возбужденія органическихъ нервовъ, при судорожномъ состояніи ихъ конечностей. Ванны эти, повторенныя одинъ или два раза въ день, или черезъ день, сажая больного на нѣсколько минутъ, дѣйствительными оказались въ судорожномъ сведеніи всего тѣла или

столбнякъ (*tetanus*), корчномъ трясеніи (*chorea*) и въ другихъ жестокихъ нервныхъ припадахъ. Пленкъ похваляетъ въ оцѣпенелости отъ ранъ (*tetanus traumat.*), водобоязненномъ бѣшенствѣ (*hydrophobia*) и гнилости костей запястья (*caries metastasi*). Въ столбнякъ, бывающемъ у лошадей (*tetanus equorum*), одно обмываніе этимъ растворомъ помогаетъ, но волоса послѣ онаго лезутъ.

20) *Противудѣйствующія средства (alesiteria, antidota)* суть такія противудѣйствующія вещества (*reagentia*), которыя ядовитое свойство растительныхъ ядовъ, животныхъ и минеральныхъ, не только поправляютъ, но и разрушаютъ вредныя оныхъ дѣйствія въ тѣлѣ человѣческомъ.

Токсическимъ ядовитымъ называютъ то твердое дѣйствіе вещества, вошедшаго въ экономію живаго тѣла, которое становится смертоноснымъ не только случайно, напр. отъ вліянія болѣзненнаго состоянія, старости, пола, но болѣе самостоятельно и постоянно (физиологически) вредитъ организму въ высокой степени. не соразмѣрной ни приему, ни количеству и т. д. дѣйствующаго вещества.

Значитъ ядомъ должно бы называть всякое вещество, которое производитъ только-что означенныя дѣйствія.

Судебная медицина, или лучше судья, для отличія отъ заразительныхъ случаевъ, ограничила еще болѣе понятіе о ядѣ, по которому ядъ въ организмѣ не возрождается и не переносится на другіе. Но нельзя установить научнаго различія между ядомъ и заразою или миазмомъ; уже самое понятіе о ядѣ весьма шатко, и относится къ относительному различію степени дѣйствующаго тѣла, а вовсе не къ существеннымъ его свойствамъ. Бываютъ также заразительныя вещества, которыя не могутъ возрождаться въ человѣческомъ организмѣ, какъ ядъ бѣшеной собаки, а иные хотя возрождаются, но только въ исключительныхъ случаяхъ, какъ сифилитическій ядъ въ извѣстныхъ субъектахъ, оспенный ядъ въ привитыхъ коровьею оспою. Наконецъ, сверхъ того, судья тотчасъ бы присоединилъ заразу къ категоріи ядовъ въ судебномъ смыслѣ, если ее гдѣ-либо употребляли съ преступнымъ умысломъ ко вреду другихъ.

Почти всѣ убѣдились, что удовлетворительное опредѣленіе и понятіе о ядѣ, соответствующее предмету и всѣмъ требованіямъ, невозможно. Потому въ сціентифическомъ отношеніи должно отъ того отказаться, если не желаемъ называть ядомъ все, что не просто механически причиняетъ необыкновенно-вредное дѣйствіе. Тогда, напр. поваренная и глауберова соли должны быть считаться ядами, если онѣ въ значительныхъ приемахъ производятъ обильный поносъ, изнеможеніе или же смерть; также, напр. хининъ и желѣзо, если отъ чрезмѣрнаго количества и неправильнаго употребленія вообще, они приносили бы больному существенный вредъ или смерть. Судебной медициной

слѣдуетъ принимать понятіе «ядъ» лишь съ этой стороны; для нея могутъ считаться ядами всѣ тѣла, которыя, дѣйствуя не просто механически, производятъ въ какомъ-нибудь особомъ случаѣ, при виновномъ поступкѣ, вредное или смертоносное дѣйствіе, хотя эти вещества, при другихъ обстоятельствахъ, не обладаютъ ядовитымъ свойствомъ. Полиція, для прісмотра за здоровьемъ, присовокупляетъ къ вышеозначенному понятію, что для нея составляютъ уже ядъ вещества, которыя въ малыхъ даже пріемахъ дѣйствуютъ вредно и притомъ легко могутъ придти въ соприкосновеніе съ организмомъ.

Въ весьма малыхъ пріемахъ, яды дѣйствуютъ не иначе, какъ всѣ лечебныя средства вообще, потому что такія крошечныя количества не имѣютъ «токсическаго» дѣйствія. Капля разжиженной синильной кислоты,  $\frac{1}{20}$  грана стрихнина, дѣйствуютъ вообще не вредно, не ядовито, и потому не могутъ называться «ядами». Если же мѣстное дѣйствіе яда становится такъ сильно, что оно можетъ считаться токсическимъ, то можно отличить троякій видъ этихъ дѣйствій или измѣненій пораженной части.

1) Пораженная часть раздражается въ высочайшей степени, даже образуются застой крови, выпотѣнія, словомъ воспаленіе, и при самомъ сильномъ дѣйствіи, мѣстное омертвленіе.

Такимъ образомъ дѣйствуютъ самыя сильныя, раздражающіе, острые яды, напр. мышьякъ, рвотный камень и другія растворимыя металлическія соли, шпанская муха, молочай и другія растительныя вещества.

2) Прикоснувшаяся часть разрушается, и ея вещества уничтожаются отъ химическаго дѣйствія.

Такимъ образомъ дѣйствуютъ мѣстно-ѣдкія вещества, вообще всѣ тѣла, которыя чрезвычайно сильно могутъ соединяться химически съ органическими составными частями тканей, напр. бѣлковинными веществами и т. д., какъ щелочи, кислоты, нѣкоторыя металлическія соли и др. (азотно-кислая окись серебра, хлористая сурьма, квасцы, желѣзный купоросъ).

3) Матеріальнаго измѣненія самой пораженной части незаметно, но угнѣтается, даже уничтожается отправление периферическихъ, какъ чувствительныхъ, такъ и двигательныхъ нервовъ мышцъ, и образуется параличъ.

Этотъ образъ дѣйствія вообще рѣдокъ и всего менѣе изслѣдованъ. Такъ синильная кислота, при прикосновеніи къ губамъ, къ концу язвы, къ концамъ пальцевъ производитъ онемѣненіе и нечувствительность этихъ частей. Говорятъ, наркотическія вещества, введенныя въ вырѣзанное сердце, немедленно останавливаютъ его трепетаніе, и приложенныя на двигательныя нервы мышцъ, прекращаютъ ихъ раздражимость.

Въ рѣдкихъ случаяхъ, острые яды (какъ мышьякъ), въ большихъ пріемахъ, причиняютъ скорую смерть, между тѣмъ,

какъ прикасавшіеся части, напр. желудокъ и кишечный каналъ, не измѣнились обынновеннымъ или вообще замѣтнымъ образомъ.

Исходы этихъ мѣстныхъ дѣйствій ядовъ могутъ быть различны. Если поврежденная часть и не подвергается такому измѣненію, что она быстро разрушается или глубоко поражается въ строеніи, то тѣмъ не менѣе это можетъ сдѣлаться позднѣе. Въ болѣе благоприятномъ случаѣ она поправляется совершенно, или остаются нѣкоторыя измѣненія въ строеніи, какъ-то: рубцы, гипертрофія и отвердѣлости, стриктуры, хроническія длительносущія воспалительныя, раздражительныя состоянія или разстройства, которыя долго еще замѣтны въ отравленномъ, по видимому чисто функциональному свойству и состоятъ, напр. въ боли, коликахъ, судорогахъ живота и т. д.

Яды характеризуются преимущественно отдаленными дѣйствіями, потому что особенно эти перемѣны и разстройства важнѣйшихъ процессовъ нашей экономіи всего скорѣе угрожаютъ опасностью и смертью, образовались ли онѣ отъ всасыванія веществъ или лишь посредственно и второстепенно отъ мѣстноповрежденныхъ, разрушенныхъ частей. Но мы при томъ не можемъ придавать вездѣ большаго значенія мѣстнымъ дѣйствіямъ ядовъ, потому что сила общихъ конституціональныхъ дѣйствій, также какъ и быстрота ихъ появленія и смертнаго исхода, совсѣмъ не соотвѣтствуютъ мѣстнымъ дѣйствіямъ.

На мозгъ и нервную жизнь дѣйствуютъ преимущественно наркотическія въ тѣснѣйшемъ смыслѣ: алкоголь, спиртные напитки, щавелевая кислота и пр., а на спинной мозгъ—чилибуха и другія вещества, содержащія стрихнинъ и брузинъ, нигротоксинъ, можетъ быть и синильная кислота.

Нѣкоторыя вещества, кажется, имѣютъ необыкновенно сильное вліяніе не на одни нервныя центры, но и на *сердце* и *кровообращеніе*, такъ что, можетъ быть, въ прекращеніи сердцебиенія и кровообращенія можно искать ближайшую причину смерти. Такимъ образомъ дѣйствуютъ наркотическія, аконитъ, синильная кислота, наперстянка; въ меньшей степени щавелевая кислота, ядъ упасъ-антиаринъ. При другихъ, кажется, должно всего ближе искать причины смерти въ *прѣстановленіи дыхательнаго процесса* (можетъ быть въ параличѣ дыхательно-мышечныхъ снарядовъ и ихъ нервовъ), отчего происходитъ асфікція, смерть отъ задушенія. Это, повидимому, бываетъ съ многими наркотическими (опіумъ и др.), также синильною кислотою, по-крайней-мѣрѣ когда она приноситъ смерть. При другихъ (стрихнинъ, брузинъ) судорожныхъ стягиванійъ дыхательныхъ и выдыхательныхъ мышцъ, мѣрное и нормальное ихъ дѣйствіе превращается, дыханіе становится затруднительнымъ и наконецъ невозможнымъ. Асфікція поспѣшествуютъ нѣкоторыя

вещества, можетъ быть, еще тѣмъ, что они въ тоже время производятъ судороги въ гортани, и потому еще болѣе препятствуютъ нужному току воздуха въ дыхательныхъ путяхъ; такъ дѣйствуютъ углекислый и нѣкоторые другіе газы, когда они выхажются въ концентрированномъ видѣ. Въ загадочномъ видѣ кажутся пораженія *легочной паренхимы*, которыя бывають отдаленными слѣдствіями дѣйствій очень многихъ ядовъ и особенно наблюдаются при сублиматѣ и другихъ меркуріальныхъ, рвотномъ камнѣ, мышьякѣ и многихъ острыхъ растительныхъ веществахъ. Тутъ въ легкихъ и слизистой оболочкѣ дыхательныхъ вѣтвей замѣчается высокая степень тяжести, даже кровяной подтекъ, добулярное воспаление или опеченіе и т. д.

Наконецъ бывають яды самые загадочныя, отъ которыхъ кажется преимущественно и чрезвычайно быстро (можетъ быть на подобіе фермента) измѣняется *смышеніе кровяной массы*, нарушается и даже совершенно прекращается нормальное усвоение веществъ. Такъ дѣйствуютъ, напримѣръ, сѣрнистый водородъ, газъ отхожихъ мѣстъ, угаръ; къ нимъ присоединяются нѣкоторые животныя яды, напримѣръ: змѣнный и сибирская язва, ядъ сала. Медленнѣе, но подобнымъ же образомъ, повидимому, дѣйствуютъ: мышьякъ, свинецъ, мѣдь, ртуть и металлы (Либихъ).

Въ судебномъ отношеніи часто весьма нужно знать, какъ *быстро* являються вообще ядовитыя дѣйствія различныхъ веществъ, особенно въ отдаленныхъ органахъ. Но этой быстроты точно опредѣлить нельзя, потому что она отчасти зависитъ отъ индивидуальности отравленнаго, отъ состоянія мѣста воспріятія, а особенно отъ пріема и раствора или растворимости яда. Кроме того симптомы, которые замѣтны въ отравленномъ при жизни, сами по себѣ не всегда такого рода, чтобы по нимъ можно было узнать существующія отравленія и особенно опредѣлить положительныя свойства отдѣльнаго яда. Однако при умышленныхъ отравленіяхъ обыкновенно употребляются сильныя пріемы яда, а отъ этого дѣйствія его должны появляться съ наибольшаю скоростью; значитъ, если обнаруживаются характеристическіе признаки отравы какимъ-либо извѣстнымъ веществомъ, напр. мышьякомъ, опіемъ, стрихниномъ, *непосредственно* или *скоро* послѣ употребленія пищи или питья, то можно съ вѣрностію заключить, что произошло отравленіе тѣмъ или другимъ веществомъ, особенно когда отравленный былъ передъ тѣмъ здоровъ. Если же подозрительныя признаки являються лишь *черезъ* продолжительное время послѣ употребленія яствъ, то становится невѣроятнымъ, что произошло отравленіе, уже потому, что явленіе его при значительныхъ пріемахъ, всегда наступаетъ *скоро* и даже *непосредственно*.

И *изъ* этого однако же бывають исключенія, особенно при

веществахъ, которые не дѣйствуютъ преимущественно, раздражая мѣстно на подобіе острыхъ тѣлъ, такъ наприм. послѣ употребленія ядовитыхъ грибовъ и алкоолоидовъ, даже въ значительныхъ приѣмахъ, признаки отравленія часто являются довольно поздно, отъ первыхъ лишь черезъ 24 часа и позднѣе.

При подозрѣніи или увѣренности, что было отравленіе, прежде всего должно разумѣть, по предшествовавшему ему обстоятельству или настоящимъ симптомамъ, частію также по остаткамъ или изверженнымъ рвотою частямъ подозрительнаго вещества, съ каковымъ ядомъ и каковымъ его количествомъ имѣемъ дѣло, соотвѣтственно чему должно располагать терапевтическія пособія.

Часто столь затруднительное распознаваніе—не считая вышеозначенныхъ условій — дѣлается всего вѣрнѣе возможно-подробнымъ знаніемъ дѣйствія отдѣльныхъ веществъ; общія правила приносили бы наконецъ мало пользы, изъ болѣзней, которыя ошибочно могутъ быть приняты за отравленія важнѣйшія: ущемленныя грыжи, заворотъ кишекъ, простыя колики, воспаленіе я перфарадія желудка и кишечнаго канала; далѣе — хотя рѣже — тифъ, воспаленіе матки, апоплексія черепнаго и спиннаго мозга, легочное кровоизліяніе и эмфиземъ, разрывъ сердца и аневризмовъ большихъ артеріальныхъ стволовъ, вскрытіе легочной каверны въ полость грудной плевры.

При леченіи важно обратить особенное вниманіе на болѣзненное состояніе, а не на одну причину отравленія.

Относительно надлежащаго леченія можно отличать *три періода*:

1) Ядъ пріобщенъ организму еще недавно, напримѣръ проглоченъ; ядовитыя дѣйствія только что начались или ихъ можетъ быть еще вовсе нѣтъ.

2) Послѣ употребленія яда прошло уже нѣсколько времени и дѣйствія его достигли уже высокой, даже высочайшей степени.

3) Первые острые степени ядовитаго дѣйствія, или признаки отравленія давно прошли, но замѣтны еще послѣдовательныя дѣйствія съ остатками прежнихъ разстройствъ, такъ-называемое хроническое отравленіе.

По этимъ различнымъ эпохамъ, также по различнымъ мѣстамъ, воспріявшимъ ядъ, какъ и по его плотному, капельно-жидкому или газообразному состоянію должно измѣнять терапевтическія пособія.

## ПЕРВАЯ ЭПОХА.

Тутъ есть еще надежда, скорымъ удаленіемъ или нейтрализациею и прекращеніемъ дѣйствія яда, пріостановить его дальнѣйшее, сильнѣйшее вліяніе; для того прежде всего должно ста-

раться о его выведении изъ тѣла. По мѣсту введенія и по яду, измѣняется и самый способъ.

Иногда ядъ нарочно или случайно вводится въ доступныя назвѣ части, въ заднепродольный каналъ, въ слизистую оболочку женскихъ дѣтородныхъ органовъ, въ полость рта и, особенно, въ наружные покровы. Въ такихъ случаяхъ удаляютъ совершенно отраву, смываніемъ, вспрыскиваніями, сдуваніемъ, или разрушаютъ (наприм. при ядовитыхъ укушеніяхъ, ранахъ) пораженную часть ѣдкими средствами, особенно сурьмянымъ масломъ и ѣдкимъ кали. Минеральныя вещества (ѣдкое кали, сульфидъ, мышьякъ) можно въ тоже время нейтрализовать приличными противоядіями. Если угрожаетъ опасность перехода яда въ кровь, то стараются сколько возможно предотвратить это, приставленіемъ рожковъ, высасываніемъ помощью рта, перевязкою между мѣстомъ дѣйствія яда и сердцемъ; часто стараются предупредить опасность общаго отравленія поддерживаніемъ (наприм. порошкомъ кантаридовъ) продолжительнаго нагноенія. Если вдыхались ядовитыя газы, то можно попытаться препятствовать ихъ дѣйствию нейтрализующими, разлагающими веществами; такимъ образомъ можно вдыхать ртомъ или ноздрями разные другіе газы.

Обыкновенно мы имѣемъ дѣло съ ядами, попавшими въ желудокъ и кишки. Въ этомъ случаѣ служатъ три показанія, которыя однако выполняются обыкновенно вмѣстѣ, именно: сколько возможно развести ядовитыя вещества (для подобной цѣли служатъ и плотныя тѣла, наприм. уголь, магнезія, мѣлъ) внѣшними жидкостями, вывести ихъ рвотою и наконецъ препятствовать ихъ всасыванію соответствующими другими веществами (противоядіями, антидотами),

Какъ уже сказано, эти различныя цѣли должно имѣть въ виду и достигать *всѣхъ вмѣстѣ*. Но послѣдовательность ихъ выполненія можетъ измѣняться, смотря по ядовитому веществу. Такъ сильно-ѣдкія вещества (какъ кислоты и щелочи) требуютъ прежде всего нейтрализаціи, чтобы они и при рвотѣ не повредили кишки и полости рта еще болѣе; иныхъ же не должно разжижать водою и т. д., чтобы не способствовать ихъ растворенію и дѣйствию (наприм. мышьякъ). Въ другихъ же случаяхъ приступаютъ сначала къ выведенію и растворенію вещества, тѣмъ болѣе, что средства, соответствующія этимъ показаніямъ, обыкновенно всего ближе подъ руками.

Съ этою цѣлью должно наполнить желудокъ, какъ можно скорѣе, ближайшими, первыми попавшимися жидкостями: теплою водою, одною или съ мыломъ, молокомъ, жирнымъ масломъ (со- вѣтуетъ смѣшивать его съ кипяткомъ), яйцами сбитыми съ водою и т. п., избирая при томъ всегда такую жидкость, которая при веществахъ сами по себѣ трудно растворимыхъ, не способ-



ствовала бы ихъ растворенію. Если подъ рукой есть желудочный насосъ, то имъ можно удалить растворенныя вещества и совершенно опорожнить и вымыть желудокъ повтореннымъ наполненіемъ его водою (трубочкою). Но приспособленіе желудочнаго насоса отнимаетъ обыкновенно много времени, а потому должно стараться выводить яды другими способами. Одно наполненіе желудка раздражающими средствами обыкновенно способствуетъ уже рвотѣ. Но, вообще, всего лучше употребить сильное *рвотное*, особенно при наркотическихъ отравленіяхъ. Даютъ *рвотный корень*, *рвотный камень*, *цинковый* и *мѣдный купоросы* въ сколько возможно большихъ приемахъ. При отравѣхъ растительными веществами совѣтуютъ употребленіе минеральныхъ рвотныхъ, при отравѣхъ минеральными веществами — *ипекажуанговый корень*. Но если уже представляется показаніе на рвотное, то кажется всего лучше выбирать самыя дѣйствительныя; при весьма острыхъ ядахъ и ѣдкихъ веществахъ; въ случаяхъ, гдѣ уже видны всѣ признаки воспаленія желудка, употребленіе рвотныхъ вообще сомнительно. Тутъ должно стараться возбудить рвоту наполненіемъ желудка жидкостями, щекотаніемъ глотки и давленіемъ желудка, при нуждѣ влистами съ рвотнымъ камнемъ. Тутъ также весьма полезенъ желудочный насосъ, если его тотчасъ можно достать.

*Нейтрализація* или *разложеніе* ядовитыхъ веществъ производится противоядіями. Они дѣйствуютъ благотворно тѣмъ, что дѣйствительно уничтожаютъ ядовитыя вліянія веществъ, превращая ихъ въ соединенія, которыя болѣе не растворяются, или, по крайнѣй мѣрѣ, не могутъ энергически соединяться съ веществами ткани и крови (какъ наприм. при отравѣ ѣдкими щелочами — кислоты; при отравѣ кислотами — щелочныя вещества), или производятъ трудно растворимыя и даже совсѣмъ нерастворимыя соединенія (какъ наприм. при отравѣхъ свинцовымъ сахаромъ, солено-кислымъ баритомъ — сѣрная кислота и сѣрно-кислыя щелочи). Другіе же наконецъ дѣйствуютъ тѣмъ, что просто разлагаютъ ядъ (наприм. хлоръ, при отравѣ сѣрнымъ водородомъ), или сами разлагаются имъ (наприм. жирныя вещества, при отравѣ ѣдкимъ кали) и образуютъ безвредныя, хотя и растворимыя соединенія.

Несправедливо называютъ противоядіями и такія вещества, которыя не просто химически нейтрализуютъ, разлагаютъ или связываютъ яды на самомъ мѣстѣ употребленія, но дѣйствуютъ благоприятно лишь тѣмъ, что разрѣшаютъ ядовитыя вещества (наприм. уголь, магнезія), или могутъ уничтожить болѣе или менѣе отдаленныя дѣйствія яда, какъ это бываетъ, наприм. съ амміакомъ при отравѣхъ синильной кислотой; съ кофе при наркотизаціи, съ морфіемъ при отравѣ стрихниномъ. Они скорѣе заслуживаютъ названіе обыкновенныхъ цѣлебныхъ средствъ, и

миѣніе, что нѣтъ, такъ-называемаго, конститутіональнаго противоядія, стало теперь общимъ. Лучшія противоядія всегда тѣ, которыя образуютъ съ ядами нерастворимыя соединенія; но эти соединенія должны быть нерастворимы не только въ водѣ, но и въ жидкостяхъ желудка и кишечнаго канала. Противоядія никогда не должны сами дѣйствовать ядовито, точно какъ и вновь образовавшіяся соединенія, происходящія отъ химическаго дѣйствія на ядовитое вещество; потому, наприм. сѣрнистый водородъ — недовозлительное противодѣйствующее средство при отравѣ мышьякомъ.

Избравъ надлежащее противоядіе, его даютъ въ достаточномъ количествѣ частыми приемами. Не рѣдко множество воды, съ которою ихъ смѣшиваютъ, возбуждаетъ также рвоту, или служитъ, по крайній мѣрѣ, для разжиженія яда, гдѣ это слѣдуетъ.

Важнѣйшія и часто употребляемыя противоядія (и цѣлебныя средства) въ отравленіяхъ, находятся въ слѣдующей таблицѣ.

Я Д Ы.	Противоядія и противодѣйствующія средства.
Мышьякъ.	Гидратъ окиси желѣза, углекислое желѣзо, влажный гидратъ сѣрнисто-желѣзной окиси (Bouchardat et Sandras), известковая вода.
Сурьмяныя вещества, рвотный камень.	Танинъ, отвары дубильныхъ веществъ, наприм. коры дуба и хины, чернильных орѣшковъ.
Свинцовыя соли, мѣдный купоросъ.	Сѣрно-кислыя щелочи (англійская и глауберова соли), гидратъ сѣрнисто-желѣзной окиси (Bouchardat et Sandras), бѣлокъ, клейковина съ мыломъ (Taddey).
Мѣдныя соли, мѣдный купоросъ.	Бѣлокъ, пектинокислыя соли, молоко, сахаръ, гидратъ сѣрнисто-желѣзной окиси, смѣсь цинковыхъ и желѣзныхъ опилокъ.
Ртутныя соли, йодный сублиматъ.	Бѣлокъ яйца, животная студень, пшеничная клейковина, сѣристое желѣзо (Mialhe), гидратъ сѣрнисто-желѣзной окиси, смѣсь цинковыхъ и желѣзныхъ опилокъ (Bouchardat et Sandras), дубильныя отвары.

Я Д Ы.	Противоядія и противодѣйствующія средства.
Серебряныя соли, адскій камень.	Поваренная соль и другія растворимыя хлористыя соединенія, хлористый калий, колодезная вода.
Цинковыя соли, цинковый купоросъ, оловянная соль, хлористое олово.	Дубильныя отравы, молоко, бѣлокъ и яйца, двууглекислый натръ.
Ѣдкія щелочи, Ѣдкое кали, Ѣдкій амміакъ.	Жирныя масла, разведенныя растительныя кислоты, уксусъ, лимонный сокъ.
Ѣдкія земли, Ѣдкая известь.	Углекислые щелоки, углекислыя воды, жирныя масла, яйца, уксусъ.
Селитра.	Гидратъ желѣзной окиси, слизистыя вещества, молоко, бѣлокъ, опій.
Баритъ, баритовыя соли (растворимыя).	Сѣрнокислыя щелочи и земли, англійская соль, горькая минеральная вода.
Сѣрныя печени, сѣрнистый калий.	Хлористая известь, слизистыя вещества, молоко.
Йодъ.	Крахмалъ, пшеничная мука съ водой.
Минеральныя кислоты, растительныя кислоты; сѣрная, соленая, селитренная и друг. кислоты.	Углекислыя щелочи и земли, мѣлъ, известковая и мыльная вода.
Щавелевая кислота.	Гидратъ извести, растворимыя известковыя соли.
Синильная кислота.	Амміакъ, хлоръ, горныя масла, эфирныя масла, свицидаръ, желѣзная закись съ окисью.
Сѣрнистый водородъ.	Хлористый газъ, хлористая известь, хлористый калий.

\*

Я ДЫ.	Противоядія и противодѣйствующія средства.
Хлорный газъ.	Сѣрнистый водородъ.
Хлорная вода, хлористая щелочь.	Бѣлокъ съ водой, углекислыя щелочи, земли, мѣль.
Фосфоръ.	Жженая магнезія, слизистыя вещества, бѣлокъ.
Кантариды.	Камфора, опій.
Камфора.	Опій.
Опій.	Танинъ, дубильныя отвары, кофе, амміакъ, уксусъ, лимонный сокъ.
Алкалоиды, какъ морфій, стрихнинъ и друг.	Дубильныя отвары, кофе, камфора, амміакъ. Противъ стрихнина также морфій.
Ядовитые грибы.	Эфиръ нафты, кофе, поваренная соль.

## ВТОРАЯ ЭПОХА.

Тутъ дѣйствіе яда, по крайнѣй мѣрѣ, въ мѣстопріятіяхъ, появилось уже въ сильной степени, и ядъ, случайно или нарочно, выведенъ уже рвотою или часть его перешла въ составъ крови. Отъ того польза противоядій становится очень сомнительною и выведение ядовитыхъ веществъ вообще уже мало полезно. Съ другой стороны, никогда нельзя положительно опредѣлить, что тѣхъ веществъ дѣйствительно нисколько не осталось въ желудкѣ. Потому кажется всего лучше и въ этой эпохѣ, сначала, дѣйствовать какъ въ первой, и стараться о выведеніи, разжиженіи яда, или давать противоядіе. Впрочемъ, должно поступать по обыкновеннымъ правиламъ врачебной науки, какъ противъ мѣстныхъ, такъ и противъ конституціонныхъ дѣйствій и припадковъ.

Если отравка совершилась ѣдкими веществами, то и полость рта, губы и сосѣднія части представляются пораженными. При отравкахъ острыми ядами должно приступать вообще къ успокоительнымъ, облегчительнымъ, даже антилогическимъ средствамъ. Внутри, при воспаленіи желудка и кишекъ, даютъ эмуль-

сію, опіяты, каломель; при простой чрезмѣрной рвотѣ — углекислоты и пахучія смѣси, и заставляютъ больного наблюдать строгую діету. Если острыя раздражающія вещества извергаются задне-проходною кишкою, то ее должно защищать отъ ихъ дѣйствія клистирами, выпрыскиваніями жирныхъ маслъ. При наркотизаціи, леченіе также должно соображаться, сколько возможно, съ частными случаями; употребляютъ мѣстныя, даже общія кровоизвлеченія, холодныя примочки на голову, если нужно — холодныя обливанія; въ другихъ случаяхъ употребляютъ слегка возбуждающія вещества: кофе, раздраженія кожи, иногда кислоты, укусы. Вотъ вообще средства, къ которымъ должно прибѣгать въ подобномъ случаѣ.

При асфикціи (наприм. ядовитыми газами, большими приѣмами наркотическихъ веществъ) стараются прежде всего возобновить задержанное дыханіе. Потому должно осторожно вдвухать воздухъ въ дыхательное горло, или, напротивъ, смотря по обстоятельствамъ, стараться вытянуть изъ бронхіальныхъ вѣтвей или легочныхъ пузырьковъ остановившійся воздухъ, смѣшанный съ пѣнистою жидкостію (*Albert Marc*). При продолжительныхъ судорогахъ гортани приступаютъ къ трахеотоміи. Свѣжій воздухъ, также холодный, продолжительныя обливанія, мѣстныя кровоизвлеченія на головѣ или у задняго прохода, раздраженія кожи и т. д., оказываютъ часто самое лучшее дѣйствіе. Если причиною задушенія были наркотическія вещества, то послѣ предварительнаго употребленія названныхъ средствъ, даютъ въ началѣ рвотныя, цинковый купоросъ, а позднее — противоядія, наприм. дубильный и хинный отваръ, концентрированный отваръ зеленого чая и друг.

### ТРЕТЬЯ ЭПОХА.

Терапевтическій способъ соображается тутъ совершенно съ состояніемъ, съ мѣстными пораженіями, также съ разстройствомъ въ матеріальной метаморфозѣ, или смѣшеніи крови и т. д. Послѣ дѣйствія острыхъ ядовъ (наприм. кислотъ, ѣдкихъ щелочей) нерѣдко остаются замѣтныя измѣненія въ строеніи, какъ-то: въ глоткѣ, желудкѣ, тонкой кишкѣ гипертрофіи и затвердѣлость стѣнокъ, суженіе, образовавшееся вслѣдствіе стягиванія рубцовой ткани послѣ значительной потери вещества. Въ другихъ случаяхъ остаются такъ-называемое раздражительное состояніе кишечнаго канала, невралгическія страданія, судороги. Тутъ всего дѣйствительнѣе строгая діета и другія гигиеническія мѣры, иногда купаніе, омовеніе, леченіе холодною водою; также опіяты, щелочныя, минеральныя и углекислыя воды.

Если хроническія отравленія, происходящія отъ минеральныхъ веществъ (мышьяка, свинца, ртути), причиняютъ болѣе

значительныя измѣненія въ смѣшеніи питаній и размѣнѣ веществъ вообще, вмѣстѣ съ одними или другими безпорядками нервной системы мышечныхъ аппаратовъ, и даже параличъ, то такое состояніе часто безнадежно. Во всякомъ случаѣ мы однакоже должны стараться возстановить, надлежащими средствами, правильное смѣшеніе крови и т. д., и выдѣлить остатки ядовитаго вещества черезъ отдѣлительныя аппараты (кожу, почки и проч.), употребленіемъ приличныхъ минеральныхъ водъ, особенно теплыхъ, внутрь и въ видѣ купаній, леченіе холодною водою, и подобныя, болѣе діетическія, способы врачеванія, кажутся и тутъ общають всего болѣе.

---

# КЛАССИФИКАЦІЯ

отечественныхъ цѣлебныхъ растений и растительныхъ веществъ, по главнымъ составнымъ началамъ и дѣйствию оныхъ на нашъ организмъ \*)).

---

## КЛАССЪ I.

### Питательныя (Nutrientia),

которыя, вознаграждая потерю животной матеріи, въ большемъ или меньшемъ количествѣ, дѣйствуютъ незначительно и медленно.

#### I. МУЧНЫЯ (FARINOSA),

Бобы, *vicia faba*.

› турецкіе, фасоль, *phaseolus vulgaris*.

Горохъ, *pisum sativum*.

Гречиха, гречка, дикуша, *polygonum fagopyrum*.

Калужница, хлѣбница болотная, *calla palustris*.

Картофель, *solanum tuberosum*.

\* Каштанъ дикій, *aesculus hippocastanum*.

\* Миндаль дикій, бобовникъ, *amygdalus nana*.

\* Овесъ, *avena sativa*.

Просо, боровое пшено, *panicum, milliaceum et italicum*.

Пшеница яровая и озимая, *triticum aestivum et hybernium*.

Пшеничка турецкая, ячки, *zea mays*.

\* Рожь, жито, *secale cereale*.

Торица, *spargula arvensis*.

Чечевица, *eryum lens et ervilla*.

Чилимъ, водяные орѣхи, *trapa natans*.

\* Ячмень, *hordeum dysticum et vulgare*.

---

\*) Означенныя звѣздочками, по опытамъ прежнихъ и новѣйшихъ врачей, признаны дѣйствительнѣйшими въ пользованіи разнородныхъ болѣзней.

## II. КЛЕЙКО-СЛИЗИСТЫЯ (MUCILAGINOSA).

- \* Вишня, *prunus cerasus*.
- \* Квиты, айва, *pyrus cydonia*.
- \* Мохъ исландскій, *lichen islandicus*.
  - » степной, *l. esculentus*.
- \* Просвирки, калачики, *malva rotundifolia*.
- \* Просвирнякъ большой, *althaea officinalis*.
- \* Рожа, *alcea rosea*.
- \* Салезъ, кокушница, *orchis morio*.

## III. БѢЛКОВИННЫЯ (ALBUMINOSA).

- Артишокъ, *synaga scolymus*.
- Борщъ широколистый, *heracleum spondylium*.
- \* Вероника ручейная, *veronica beccabunga*.
- Капуста заячья, *sedum telephium*.
  - » огородная, *brassica oleracea*.
- \* Кервель, *scandix cerefolium*.
- Козлецъ, ужомникъ, *scorzonera humilis*.
- Козлобородъ луговой, чортова борода, *tragopogon pratense*.
- Крапива большая, *urtica dioica*.
  - » бѣлая глухая, *lamium album*.
  - » малая, *urtica urens*.
- Ландышъ многоколѣнчатый, купено, *convallaria polygonatum*.
- Лебеда садовая, *atriplex hortensis*.
- Маргаритка, скороспѣлка, *bellis perennis*.
- Марь красная, *chenopodium rubrum*.
- \* Марь треугольная, *chenopodium botrys*.
- \* Молодикъ большой, *sempervivum tectorum*.
- Огуречникъ, *borago officinalis*.
- Огурецъ, *cucumis sativus*.
- \* Одуванчикъ, кульбаба, *leontodon taraxacum*.
- Осоць, молочай огородный, *sonchus oleraceus*.
- \* Пеонія, Марьянъ корень, *paeonia officinalis*.
- Первоцвѣтъ, баранчикъ, *primula veris*.
- \* Песочная осока, *carex arenaria*.
- \* Петрушка, *apium petroselinum*.
- Портулакъ, *portulaca oleracea*.
- \* Пырей, *triticum repens*.
- \* Рѣпейникъ, лапушникъ, *arctium lappa*.
- Рѣпа, *brassica rapa*.
- Салатъ, *lactuca sativa*.
- Сельдерей, *apium graveolens*.
- Снитъ, дягица, *aegopodium podagraria*.



Спаржа, *asparagus officinalis*.

\* Пихорій, *cichorium intibus*.

Шпинатъ, *spinacia oleracea*.

#### IV. КЛЕЙКО-ПРЯНЫЯ (MUCIAGINOSO-AROMATICA).

\* Морковь, *daucus carotta*.

Пастернакъ, *pastinaca sativa*.

Синеголовникъ полевой, *elyngium campestre*.

Трюфель, *lycoperdon tuber*.

#### V. СЛАДКО-САХАРНЫЯ (DULCIA, SACCHARINA).

Арбузъ, каунъ, *cucurbita citrullus*.

Береза, *betula alba*.

\* Виноградъ, *vitis vinifera*.

Кленъ, *acer platanoides*.

Груши сладкія, *pyrus communis*.

Абрикозы, морели, *prunus armeniaca*.

Свекла бѣлая, свекловица, *beta cicla*.

Свекла красная, бураки, *beta vulgaris*.

\* Солодковый корень, *glycyrrhiza glabra*.

\* >           черный, *polypodium vulgare*.

Черешня, *prunus avium*.

\* Черносливъ, *p. domestica*.

\* Шелковица, тутовое дерево, *morus alba et nigra*.

Яблоки сладкія, *pyrus malus*.

#### VI. КИСЛО-СЛАДКІЯ (ACIDODULCIA).

Ежевика, *rubus fruticosus*.

\* Земляника, *fragaria vesca*.

\* Княженица, *rubus aroticus*.

Крыжовникъ, *ribes grossularia*.

\* Малина, *rubus idaeus*.

\* Морошка, *r. chamaemorus*.

\* Смородина красная, *ribes rubrum*.

\* >           черная, *r. nigrum*.

\* Чашковое дерево, *mespilus germanica*.

#### VII. КИСЛЫЯ (ACIDA).

\* Барбарисъ, *berberis vulgaris*.

\* Брусника, *vaccinium vitis idææ*.

\* Бузина черная, *sambucus nigra*.

\* Вишня, *prunus cerasus*.

- Калина, *viburnum opulus*.  
Кислица рогатая, *oxalis corniculata*.  
\* > щавельная, *o. acetosella*.  
\* Клюква, *vaccinium oxycoccos*.  
Рябина, *sorbus aucuparia*.  
\* Тернъ, *prunus spinosa*.  
\* Черника, *vaccinium myrtillus*.  
\* Щавель кислый, *rumex acetosa*.

### УШ. МАСЛЯНЫЯ ЖИРНЫЯ (OLEOSA-PINGUIA).

- Арбузное сѣмя, *semen cucurbitæ citrulli*.  
Дынное сѣмя, *cucumis melo semen*.  
\* Конопля, *cannabis sativa*.  
\* Бунжутъ, *sesamum orientale*.  
\* Ленъ, *linum usitatissimum*.  
\* Макъ бѣлый, *papaver album somniferum*.  
Огуречное сѣмя, *cucumis sativus*.  
\* Орѣхъ грецкій, *juglans regia*.  
> лѣсной, *coryllus avellana*.  
Подсолнечникъ, *helianthus annuus*.  
\* Сурѣпица, дикая рѣпа, *brassica napus*.  
Тыквенное сѣмя, *semen cucurbitæ peponis*.

## К Л А С С Ъ П.

### Побуждающія положительно (*Incitantia positive*).

которыя, умножая дѣятельность органическихъ системъ, возста-  
новляютъ потерянное равновѣсiе, или правильность во всемъ  
организмѣ.

### I. УГЛЕКИСЛЫЯ СРЕДСТВА (CARBONICA),

т. е. постоянно побуждающія систему нервную, или чувстви-  
тельную (*incitantia-permanentia systematis nervosi*.)

#### 1. Смолистыя (*Resinosa*).

- \* Клещевина, турецкая конопля, *ricinus communis*.  
\* Колоцинты, горькая тыква, *cucumis colocynthis*.  
Повилика, *convolvulus sepium*.  
Придорожная иголка, *rhamnus catharticus*.

## 2. Острыя (*Acria*).

- \* Авранъ дикій, *gratiola officinalis*.
- \* Баранья трава, *agnica montana*.
- \* Бедренецъ каменистый, *pimpinella saxifraga*.
- »           черный, *p. magna*.
- Береза, *betula alba*.
- \* Безвременный цвѣтъ, *colchicus autumnale*.
- Блошница ѣдкая, *erigeron acris*.
- Борщъ широколистный, медвѣжья лапа, *heracleum sphondylium*.
- Бузникъ, красная бузина, *sambucus ebulus*.
- Вороній глазъ, Паридова трава, *paris quadrifolia*.
- Вшивопрудное сѣмя, кавалерская шпора *delphinium staphysagria*.
- \* Вѣтвеница пострѣльная, сонъ, трава *anemone pratensis*.
- \* Вѣтвеница лѣсная, а. *nemorosa*.
- Горецъ водопечерный, *polygonum hydropiper*.
- »           почечуйный, *p. persicaria*.
- Горичникъ, хвостовая трава, *peucedanum officinale*.
- \* Горчица бѣлая, *sinapis alba*.
- »           садовая бѣлая, *brassica eruca*.
- »           черная, *sinapis nigra*.
- \* Гулявица чихотная, *achillea ptarmica*.
- Девясиль меньшей, *inula dysenterica*.
- \* Жабникъ вредный, болотный, *ranunculus sceleratus*.
- »           огненный, *r. flammula*.
- »           полевой, *r. arvensis*.
- »           узлокоренный, *r. bulbosus*.
- »           чистотѣльный, *r. ficaria*.
- »           ѣдкій, *r. acris*.
- »           язычный, *r. lingua*.
- \* Жеруха, крессъ водяной, *sisymbrium nasturtium*.
- »           струйчатая, *s. sophia*.
- Зеленика, баранецъ, *lycopodium selago*.
- \* Зубной корень, *sachris odontalgica*.
- Каперсовый кустъ, *sarraris spinosa*.
- Катранъ, *rambe orientalis*.
- \* Клещеница, змѣй трава, *arum maculatum*.
- \* Конскій чеснокъ, *teucrium scordium*.
- \* Копытень, подлѣсникъ, *asaugum europaum*.
- Косатицъ болотный, сабельникъ, *iris pseudoacorus*.
- »           сибирскій пѣтушокъ, *iris sibirica*.
- »           синій, *i. germanica*.
- Крессъ садовый, *lepidium sativum*.
- \* Курслѣцъ меньшей, *anagallis arvensis*.
- Ластовичный корень, струковатое зелье, *asclepias vincetoxicum*.

- Левкой, *cheiranthus cheiri*.  
\* Ложечная трава, *cochlearia officinalis*.  
\* Ломаность, жигунецъ, *clematis erecta*.  
Копельникъ, конская грива, *euroatorium cannabinum*.  
\* Лукъ, цибуля, *allium sera*.  
Молодилъ острый, *sedum acre*.  
Молочай болотный, *euphorbia palustris*.  
    > плащевый, *e. repis*.  
    > придорожный, *e. lathyris*.  
    > солнечный, *e. helioscopia*.  
\* Мыльная трава, *saponaria officinalis*.  
Нищя трава, *clematis vitalba*.  
Ноготки, *calendula officinalis*.  
Норочникъ водяной, *scrophularia aquatica*.  
    > узлокоренный, *s. nodosa*.  
\* Ольха, *betula alnus*.  
Омела, *viscum album*.  
\* Орѣхъ грецкій, *juglans regia*.  
\* Папоротникъ женскій, *polypodium filix foemina*.  
\*     > мужской, *p. f. mas*.  
\* Пасленъ сладкогорькій, *solanum dulcamara*.  
Переступень, параличная рѣпа, *brunia alba*.  
\* Перець волчій, волчье лыко, *daphne mezereum*.  
Персикъ, шептала, *amygdalus persica*.  
\* Плаунъ, *lycorodium clavatum*.  
Подмаренникъ мягкій, *galium mollugo*.  
    > настоящий, *g. verum*.  
    > шероховатый, *g. aparine*.  
\* Пулавка огненная, *anthemis pyrethrum*.  
Рѣдька, *garbanus sativus*.  
\* Рѣпейникъ, лапушникъ, *arctium lappa*.  
Свирѣзка аптечная, *erysimum officinale*.  
    > варварина, *e. barbarea*.  
    > чесночная, *e. alliaria*.  
Сердечникъ луговой, полевой крессъ, *cardamine pratensis*.  
Синеголовникъ полевой, *eryngium campestre*.  
Солянка травяная, *salicornia herbacea*.  
Росянка круглолистная, *drosera rotundifolia*.  
\* Татарникъ, *onopordium acanthium*.  
\* Фиалка пахучая, *viola odorata*.  
    > собачья, *v. canina*.  
    > трицвѣтная, аютины глаза, *v. tricolor*.  
\* Хрѣнь, *cochlearia armoracia*.  
\* Чемерица, геллеборъ черный, *helleborus niger*.  
    > бѣлая, *veratrum album*.  
\* Чеснокъ, *allium sativum*.

- \* Чистотѣль большой, *chelidonium maius*.
- Шерошница гортанная, *asperula cynanchica*.
- > душистая, ясенникъ, *a. odorata*.
- Шлемовникъ, *scutellaria gallericulata*.
- Ярутка полевая, клопецъ, *thlaspi arvense*.

### 3. Пряно-душистая (*Aromatico-ætherea*).

- \* Анисъ, ганусъ, *pimpinella anisum*.
- Базиликъ, душица, *osimum basilicum*.
- \* Божіе дерево, *atremisia abrotanum*.
- \* Бузина, самшикъ, *sambucus nigra*.
- Буквица бѣлая, первоцвѣтъ, *primula veris*.
- \* Вероника, *veronica officinalis*.
- Гвоздика полевая, *dyanthus plumarius*.
- \* Донникъ, буркунъ, *trifolium melilotus*.
- \* Донской, или козацкій можжевельникъ, *juniperus sabina*.
- \* Душица, материнка, *origanum vulgare*.
- \* Ель, *pinus abies*.
- Естрагонъ, драгунъ-трава, *artemisia dracunculus*.
- Жизненное дерево, *thuja occidentalis*.
- Золотоцвѣтъ Ивановъ, *chrysanthemum leucanthemum*.
- \* Иръ, косатикъ душистый, *acorus calamus*.
- \* Кадило, пахлунъ, *teucrium chamaepitys*.
- Калушеръ, *tanacetum balsamita*.
- \* Кирказонъ, кокорникъ, *aristolochia clematitidis*.
- \* Кишнець, воляндра, *coriandrum sativum*.
- \* Кминъ, *cuminum cuminum*.
- Коперь французскій, *laserpitium gallicum*.
- Крапива глухая, *lamium album*.
- Лилія бѣлая, кринъ, *lilium album*.
- Липа, *tilia europaea*.
- \* Лиственница, *pinus larix*.
- \* Маіоранъ кошечій, *teucrium marum*.
- \* Можжевельникъ, яловець, *juniperus communis*.
- Нефорощъ бѣлая сибирская, *artemisia rupestris*.
- > черная, *a. contra*.
- Осина, *populus tremula*.
- Осокоръ душистая, *populus balsamifera*.
- \* Очанка, дубровка, *teucrium chamaedrys*.
- \* Перець стручатый, турецкій, *capsicum annuum*.
- \* Петрушка, *apium petroselinum*.
- \* Пижма, дивая рябинка, *tanacetum vulgare*.
- Пихта, *pinus picea*.
- \* Полынь, *arthemisia absinthium*.
- Пол. римской, *a. pontica*.

- Пулавка вонючая, *anthemis cotula*.  
Ромашка маточная, *matricaria parthenium*.  
\* > простая, *m. chamomilla*.  
\* > римская, *anthemis nobilis*.  
\* Рута, пиганъ, *ruta graveolens*.  
\* Сосна боровая, *pinus sylvestris*.  
\* Тимонъ, полевой анисъ, *carum carni*.  
Теревинтъ, фицашковое, терпентинное дерево, *pistacia terebinthus*.  
Тополь, *populus alba et nigra*.  
\* Укропъ волоскій, *anetum foeniculum*.  
\* Фиалка пахучая, *viola odorata*.  
Цытварное сѣмя, *artemisia contra*.  
Чернобыльникъ обыкновенный, *a. vulgaris*.  
    > полевой, *a. campestris*.  
Чернушка, *nigella sativa*.  
Чистецъ, горный укропъ, *seseli annuum*.

## II. ВОДОРОДНЫЯ СРЕДСТВА (HYDROGENICA),

летучія, побуждающія систему чувственно-жильную (*incitantia difusidilia systematis nervosi*).

### 1. Пряно-комфорныя (*Aromatico-camphorata*).

- \* Богородская трава, *thymus serpyllum*.  
Буквица, *betonica officinalis*.  
Бѣлокопытникъ чумный, *tussilago petasites*.  
\* Дягиль, *angelica, archangelica*.  
    > лѣсной, *a. sylvestris*.  
Змѣеголовникъ молдавскій, *dracosephalum moldavicum*.  
\* Зоря, любистикъ, *legusticum levisticum*.  
\* Императорскій корень, *Imperatoria ostruthium*.  
Жамфарная трава, *samphorosma monspeliensis*.  
\* Лавенда, *lavendula spica*.  
Ландышъ майскій, *convallaria majalis*.  
\* Маюранъ, *origanum maiorana*.  
\* > кошечій, *teucrium marum*.  
\* Марь благовонная, *chenopodium ambrosioides*.  
\* Маунъ, буддырьянъ, *valeriana officinalis*.  
\* Мелисса, пчельникъ, *melissa officinalis*.  
\* Мята водная, *mentha aquatica*.  
    > кошечья, *pereta cataria*.  
    > вудрявая, *mentha crispa*.  
    > лѣсная, *m. sylvestris*.  
\* > перечная, *m. piperita*.

- \* Полей, *m. pulegium*.
- Пуховникъ безстебельный, *carlina acaulis*.
- \* Розмаринъ, *rosmarinus officinalis*.
- \* Тимьянъ, тимьянъ простой, *thymus vulgaris*.
- Чаберъ, чебрець, *satureja hortensis*.
- \* Ясенець, бадьянъ дикій, *dictamnus albus*.

## 2. Спиртные (*Spirituosa*).

- \* Винный спиртъ, *spiritus vini gallicus*.
- \* Вино бѣлое, *vinum album*.
- \* > красное, *v. rubrum*.
- Грушовка, *v. rugosum*.
- Хлѣбный спиртъ, водка, *spiritus frumenti*.
- \* Яблонька, сидръ, *v. pomaceum*.

## 3. Усытительныя (*Narcotica*).

- \* Багунь, клоповникъ, *ledum palustre*.
- Бѣлена, *hyosciamus albus*.
- \* Блекота черная, *h. niger*.
- Бузикъ, *sambucus ebulus*.
- \* Дурманъ, *datura stramonium*.
- > малый, дурнишникъ, *xanthium strumarium*.
- \* Кашкара, пьяная трава, *rhododendron chrysanthum*.
- Кервель лѣсной, дикая петрушка, *cherophyllum sylvestre*.
- Колосница лѣсная, змѣиная трава, *stachis sylvatica*.
- \* Красавица, сонная одурь, *atropa belladonna*.
- Кушинчики, водяныя маковки, *nymphaea alba et lutea*.
- \* Лавровишневое дерево, *prunus laurocerasus*.
- Ландышъ, *convallaria majalis*.
- Лютикъ волкобойный, *aconitum lycoctonum*.
- \* Лютикъ, прострѣльная трава, *a. napellus*.
- Макъ полевой, *papaver rhoeas*.
- \* > садовый, *p. somniferum*.
- \* Мухоморъ, *agaricus muscarius*.
- Мянука, жидовская вишня, *physalisalk ekengi*.
- \* Наперсточная трава, наперстокъ красный, *digitalis purpurea*.
- Омегъ малый, бѣшеница водяная, *cicuta virosa*.
- \* Омегъ пестрый, болиголовъ, *conium maculatum*.
- Паридова трава, *paris quadrifolia*.
- \* Пасленъ сладкогорькій, *solanum dulcamara*.
- Пахучка сухоягодная, *myrica gale*.
- \* Пеонія, *paeonia officinalis*.
- Покрикъ, адамова голова, *atropa mandragora*.
- Пасленъ черный, псинки, *solanum nigrum*.

- Пролѣска, куръ-зеле, *mercurialis annua et perennis*.  
\* Салатъ ядовитый, дикій ластукъ, *lactuca virosa*.  
Собачникъ, пещій языкъ, *synoglossum officinale*.  
Тисъ, красное дерево, *taxus baccata*.  
\* Табакъ, тютюнъ, *nicotiana tabacum et rustica*.  
\* Укропникъ водяной, *phellandrium aquaticum*.  
\* Хмѣль, *humulus lupulus*.  
\* Шафранъ, *crocus sativus*.

### III. КИСЛОРОДНЫЯ СРЕДСТВА (OXYGENICA),

побуждающія систему мышечную (*incitantia systematis musculi*).

#### 1. Кислоты растений (*Acida vegetabilia*).

См. вл. I. Разрядъ 6. 7.

#### 2. Горькія экстрактивные (*Amara-extractiva*).

- \* Брусничная трава, *vaccinium vitis idaea*.  
\* Будра ползучая, *glechoma hederacea*.  
\* Волчець вудрявый, *centaurea benedicta*.  
\* Волчокъ, хелишникъ, *ononis arvensis et spinosa*.  
\* Горечавка желтоцвѣтная, *gentiana lutea*.  
\* Гулявица тысячелистная, деревей, *achillea millefolium*.  
\* Девясиль большой, усманъ, *inula helenium*.  
Дрокъ, *genista tinctoria*.  
Дымница, земляной дымъ, *fumaria officinalis*.  
    > орѣшистая, *f. bulbosa*.  
\* Звѣрбой синій, иссопъ, *hyssopus officinalis*.  
\* Золототысячникъ, *gentiana centaureum*.  
Золотоцвѣтъ, Ивановъ цвѣтъ, *chrysanthemum leucanthemum*.  
\* Истодъ горькій, *polygala amara*.  
Конопельникъ, конская грива, *eupatorium cannabinum*.  
Львинокъ, сердечная трава, *leonurus cardiaca*.  
Лишай грудной, *lichen pulmonarius*.  
\* > исландскій, *l. islandicus*.  
    > сплетенный, *l. plicatus*.  
    > черведоносный, *l. cocciferus*.  
Маргаритка, бѣльцы, *bellis perennis*.  
Молодилъ большой, живучка, *sempervivum tectorum*.  
    > острый, *sedum acre*.  
Нефорощъ бѣлая, сибирская, *artemisia rupestris*.  
Ноготки, *calendula officinalis*.  
Персиковые листы, *amygdalus persica*.



- Повилика, крапивная малпа, *cuscuta europaea*.  
\* Пырей, *triticum repens*.  
Ревень черенковый, *rheum rhabarbaricum*.  
\* Р. красноватый, сибирский, *r. undulatum et cruentum*.  
Свербежница, одышная трава, *scabiosa arvensis*.  
Самшитъ, *buxus sempervirens*.  
Свербежница подкушенная, дявольское окушение, *s. succisa*.  
Татарникъ Марьянъ, *carduus marianus*.  
\* Толокнянка, *arbutus uva ursi*.  
\* Хасмиъ, одуванчикъ, *leontodon taraxacum*.  
Хвощъ обыкновенный, *equisetum hyemale*.  
Хвощъ полевой, *e. arvense*.  
\* Хмѣль, *humulus lupulus*.  
\* Цихорей, *cichorium intybus*.  
Чертополохъ доскутный, *centaurea phrygia*.  
    >    хохлатый, *c. calcitrapa*.  
\* Шандра бѣлая, *magrubium vulgare*.

### 3. Вяжущія. (*Abstringentia, Styptica*),

- \* Вахта, трлестникъ водяной, *menyanthes trifoliata*.  
Вербейникъ полусечный, луговой чай, *lysimachia nummularia*.  
Вербовникъ, плакунъ вербный, *lythrum salicaria*.  
\* Вившиникъ болотный, *geum rivale*.  
Горець птичій, спорышъ, *polygonum aviculare*.  
\* > сердечный, эмбевикъ, *p. bistorta*.  
Груша, *pyrus communis*.  
Грушовка дикая, *pyrola rotundifolia*.  
Губка листовничная, *boletus laricinus*.  
    > пахучая вѣтловая, *b. salicis, suaveolens*.  
\* Дождевикъ, *lyscoperdon bovista*.  
\* Дубъ, *quercus robur*.  
Желтникъ, кожевенное дерево, *thus coriaria*.  
Журавлиникъ Робертвъ, *geranium Robertianum*.  
\* Завязникъ, завязной корень, *tormentilla erecta*.  
\* Земляничный корень, *fragaria vesca*.  
Змѣвикъ двудомный, кошечья лапа, *gnaphalium dioicum*.  
    >    кустарный, *g. stoechas*.  
\* Ильмъ, берестъ, *ulmus campestris*.  
Каперсовый кустъ, *sapparis spinosa*.  
Крушина, *rhamnus frangula*.  
\* Марева, крапъ, *rubia tinctorum*.  
Могильница, барвнянокъ, *vinca minor*.  
Подмаренникъ желтый, сывороточная трава, *galium verum*.  
    >    шерховатый, *g. aparine*.

- Попутникъ, *plantago major*.  
Пятилистникъ, *potentilla reptans*.  
Росникъ, львиная лапа, *alchemilla vulgaris*.  
Рябина, *sorbus aucuparia*.  
Савина стрѣла, бедренедъ италійскій, *poterium sanguisorba*.  
\* Сальный корень, лошаково ухо, *symphytum officinale*.  
Селезеночникъ рѣдковолосый, *asplenium trichomanoides*.  
Снить боярская круглолистная, *bupleurum rotundifolium*.  
Сокольникъ волосатый, мышье ушко, *hieracium pilosella*.  
Таволга шишковислая, лабазникъ, *spiraea filipendula*.  
\* Терновникъ дикій, острокровъ, *ilex aquifolium*.  
\* Тернъ, *prunus spinosa*.  
\* Труть древесный, *boletus igniarius*.  
\* Тутовое черное дерево, *morus nigra*.  
Чашковое дерево, *mespilus germanica*.  
\* Червеница, воловикъ красильный, *anhusa tinctoria*.  
\* Черника, *vaccinium myrtillus*.  
\* Чернильные орѣхи, *quercus cerris*.  
Черноголовъ, *prunella vulgaris*.  
Чистоустъ царскій, *osmunda regalis*.  
\* Щавель водяной, *rumex hydrolapathum*.  
    > конскій, остролистный, *r. acutus*.  
    > кудрявый, *r. crispus*.  
    > туполистный, *r. obtusifolius*.  
Яворъ, чинаръ, *platanus orientalis*.  
\* Ясенъ, *fraxinus excelsior*.

#### 4. Вязущія-пріяны (*Styptico-aromatica*).

- \* Верба бѣлая, ветла, *salix alba*.  
    > козья, *s. caprea*.  
    > ломкая, *s. fragilis*.  
\*   > пятижужная, ива, *s. pentandra*.  
Глазница, очная помощь, *euphrasia officinalis*.  
Глухая крапива, *lamium album*.  
\* Гравилатъ, гвоздичникъ, *geum urbanum*.  
Дубровка пирамидная, *ajuga pyramidalis*.  
Золотушникъ, золотая розга, *solidago virga aurea*.  
\* Каштанъ дикій, *aesculus hippocastanum*.  
Линнея сѣверная, *linnaea borealis*.  
Рѣпникъ благовонный, *agrifonia eupatoria*.  
\* Роза бѣлая, *rosa centifolia*.  
\*   > дивая, *r. canina et sylvestris*.  
\*   > красная, *r. gallica*.  
Розовый корень, *rhodiola rosea*.  
Сирень, бузокъ, *syringa vulgaris*.

Таволга илемная, парица луговъ, spiraea ulmaria.

Черемха, prunus padus.

\* Шалфей, salvia officinalis.

### К Л А С С Ъ Ш.

#### Побуждающія отрицательно (Incitantia negative),

которыя уменьшаютъ умноженную дѣятельность органическихъ системъ, ослабляя оныя непосредственно или посредственно.

#### 1. СРЕДСТВА, ОСЛАБЛЯЮЩІЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО,

или непосредственно (debilitantia positiva, directa).

А. МУЧНЫЯ,

В. СЛИЗИСТЫЯ,

С. КИСЛЫЯ и

Д. УСЫПИТЕЛЬНЫЯ,

которыя предложены въ I и II классахъ.

#### 2. ОСЛАБЛЯЮЩІЯ ПОСРЕДСТВОМЪ УМЕНЬШЕНІЯ,

или испражненія тѣлесныхъ жидкостей (debilitantia indirecta, s. evacuantia).

#### А. Слабительныя легкія (*Laxantia, cathartica*).

Золотуха желтая, василисникъ, thalictrum flavum.

\* Клещевина, турецкая конопля, ricinus communis.

Лебеда садовая, atriplex hortensis.

\* Ленъ слабительный, linum catharticum.

Марь трехугольная, chenopodium bonus henricus.

Персиковые цвѣты, flores amygdali persicae.

Плоды кисло-сладкіе, fructus acidulo-dulces.

\* Терновые цвѣты, flores pruni spinosae.

\* Черносливъ, prunus domestica.

\* Шиповникъ, rosa canina.

Шпинатъ, spinacia oleracea.

#### В. Проносныя крѣпкія. (*Purgantia drastica*).

\* Авранъ дикій, gratiola officinalis.

\* Безвременный цвѣтъ, colchicum autumnale.

Бузина красная, sambucus ebulus.

\* » черная, s. nigra.

Зеленица, баранецъ, lycoperidium selago.

\* Колодинты, горькая тыква, cucumis colocynthis.

Крушина, *hamnus frangula*.

› игольчатая, придорожная иголка, г. *cathartica*.

Лиственничная губка, *boletus laticinus*.

Переступень, *hyosia alba*.

Повилика, *convolvulus serium*.

Полъска, *mercurialis annua*.

\* Ревень, *genm undulatum et rharonticum*.

Фиалка трицвѣтная, *viola tricolor*.

\* Чемерица бѣлая, *verathrum album*.

\* › черная, *helleborus niger*.

### С. Рвотныя (*Emetica*).

\* Авранъ дикій, *gratiola officinalis*.

Бувичный корень, *betonicae officin. radix*.

\* Жабникъ огненный, *ranunculus flamula*.

\* › язычный, г. *lingua*.

\* Копышень, подлѣсникъ, *asarum europaeum*.

\* Табакъ, *nicotiana, tabacum*.

\* Фиалка пахучая, *viola odorata*.

› собачья, *viola canina*.

## ДИЭТИЧЕСКІЯ ПРАВИЛА,

соблюденіе коихъ необходимо при леченіи растительными  
веществами.

### I.

Въ большей части случаевъ, особенно же во всѣхъ хроническихъ болѣзняхъ, сообразное опредѣленіе діеты гораздо важнѣе употребленія лекарствъ въ тѣсномъ смыслѣ, и діета, во всякомъ случаѣ, должна быть тѣсно связана съ прочими способами леченія.

Для больныхъ и выздоравливающихъ, какъ и при одной склонности къ тѣмъ или другимъ страданіямъ, всегда должно выбирать пищу и питье сообразно обстоятельствамъ, т. е. онѣ должны соответствовать состоянію пищеварительныхъ органовъ и процессовъ, питанію и смѣшенію крови, превращенію, дневному употребленію и утратѣ веществъ. Кромѣ того должно обратить особенное вниманіе на испраженіе, аппетитъ и природное побужденіе больного, далѣе на отравленіе легкихъ, почекъ, кожи, органовъ кровообращенія, вообще на всѣ выдѣленія тѣла, дыхательный процессъ, теплоту, силу, чувствительность и раздражительность всего тѣла, потому что, сообразно имъ и ихъ разстройствамъ и припадкамъ должно опредѣлить діету. Напр. должно знать, нужно ли доставить тѣлу болѣе питательныя, животныя (азотныя) вещества или болѣе растительныя, безазотныя (такъ назыв. дыхательныя средства); далѣе нужно ли ускорить или ограничить образованіе жира, желчи, мочевой кислоты и теплоты, должно ли способствовать къ превращенію, къ окисленію бѣлковыхъ веществъ, такъ назыв. протенныхъ тѣлъ, или нѣтъ. Если притомъ употребляютъ лекарства, то діета должна поддержать дѣйствія ихъ, по крайней мѣрѣ не мѣшать имъ.

Въ терапевтическомъ отношеніи можно различать *растительную, молочную и питательную пищу*.

### 1. Растительная пища.

Она состоитъ изъ сладкихъ и кисловатыхъ плодовъ (напр. винограда, костянковыхъ плодовъ), богатыхъ водою, сахаромъ, камедью, пектиномъ, растительными кислотами, растительно-кислыми солями и др.; далѣе изъ сушеныхъ плодовъ (чернослива, винныхъ ягодъ, финиковъ, изюма), зелени, особенно кореньевъ (грибы, отчасти также картофель, уже принадлежать къ питательной, пластической діетѣ), изъ хлѣба, особенно хорошаго бѣлаго (съ небольшою поваренною солью), въ маломъ количествѣ. Для питья служатъ тутъ ключевая вода, также сыворотка, вообще индифферентныя, напр. слизистыя жидкости и т. п.

Вообще эти вещества считаются удобоваримыми, по крайней мѣрѣ въ малыхъ приѣмахъ, отчасти уже потому, что въ нихъ мало составныхъ частей, нуждающихся въ особенныхъ приготовительныхъ процессахъ въ желудкѣ и тонкой кишкѣ. Если же они содержатъ многія неваримыя, нерастворяющіяся вещества, напр. древесину, свернувшійся бѣлокъ и др., то они часто долго остаются въ кишечномъ каналѣ, при большомъ количествѣ легко производятъ вѣтры, даже рвѣзъ въ кишкахъ, поносъ или запоръ, смотря по обстоятельствамъ, и оставляютъ значительное количество фекальныхъ массъ. Изъ всѣхъ веществъ, употребляемыхъ въ пищу, они всего меньше раздражаютъ пищеварительные пути, и утрата пищеварительныхъ соковъ незначительна. Для крови и превращенія веществъ они доставляютъ особенно воду и такъ назыв. дыхательныя вещества, а напротивъ мало пластическихъ, потому, при долгомъ исключительномъ употребленіи, тѣло худѣетъ и не сохраняется на долго, всего менѣе въ холодныхъ климатахъ. При этой діетѣ отдѣленіе слизистой оболочки и мочи вообще умножается, а кожей (и легкими) выдѣляется больше воды, углекислоты и т. д. По значительному содержанію легко-окисляющихъ веществъ, эта діета, можетъ быть, затрудняетъ до известной степени дѣйствіе кислорода на бѣлковыя вещества или протеины тѣла крови и самыхъ органовъ, и такимъ образомъ, повидимому, можетъ уменьшать, при обстоятельствахъ, образованіе теплоты, сгущаемость крови (высшія окиси протеина), также мочевину и мочевую кислоту. Уменьшается также сила и скорость сокращенія сердца, кровообращенія, также количество кровяныхъ шариковъ, питаніе, особенно мышцъ, и жиръ исчезаетъ, особенно при долгомъ употребленіи кисловатыхъ плодовъ. Даже мозгъ и душевное отправленіе могутъ наконецъ претерпѣвать вліяніе этой діеты; раздражительность, такъ назыв. эротическое состояніе, склонность къ болѣе сильнымъ душевнымъ возбужденіямъ часто уменьшаются, но нерѣдко вѣдствъ съ тѣмъ и понятливость и сила воли и все душевное стремленіе.

*Большимъ* эта діета назначается обыкновенно какъ прохладительная, освѣжающая, ослабляющая, противовоспалительная и уменьшающая раздраженіе. Всего чаще пользуются ею (напр. плодами и ихъ соками) при воспалительныхъ, вообще остропривливыхъ и экссудативныхъ страданіяхъ, при лихорадкѣ; она составляетъ важную часть противовоспалительнаго леченія. Далѣе при такъ назыв. полнокровіи и его дѣйствительныхъ или мнимыхъ послѣдствіяхъ, напр. при раздражительномъ состояніи спиннаго и черепнаго мозга, при склонности къ приливамъ, къ такъ назыв. дѣятельному кровотеченію, геморроидальнымъ страданіямъ и т. д.; при ожирѣніи отъ обильной пищи (тутъ съ частымъ движеніемъ на свѣжемъ, прохладномъ воздухѣ), при ломотѣ, каменной болѣзни, съ такъ назыв. мочекислымъ расположеніемъ. Наконецъ, при раздражительномъ состояніи желудка и кишечнаго канала, при хроническомъ разстройствѣ пищева-ренія, если нѣтъ особеннаго расположенія къ накопленію вѣт-ровъ.

Вообще эта діета *не годна* для грудныхъ младенцевъ и ста-риковъ, у которыхъ пищевареніе совершается съ незначи-тельною силою; далѣе, для выздоравливающихъ, слабыхъ, весьма нервныхъ и чувствительныхъ лицъ, вообще въ случаяхъ, гдѣ нужна болѣе крѣпительная пища; также при золотухѣ, легочной чахоткѣ, рагѣ, мозговикѣ и подобныхъ злокачественныхъ лож-ныхъ образованіяхъ; напротивъ, хвалили тутъ исключительную растительную пищу; однако, вѣрно, въ большей части случаевъ несправедливо. Если принимать темпераменты за мѣру для выбора діеты, то растительная пища была бы прилична всего болѣе для холерическихъ и сангвиническихъ и всего меньше для лимфатическихъ, недѣятельныхъ, флегматическихъ (бѣотическихъ).

## 2. Молочная пища.

Сюда относятся различные виды молока, далѣе мучнистыя и крахмальные вещества, какъ саго, оррорутъ, тапиоку, рисъ, ячмень и др., немного картофеля, хлѣбъ, сухари, пудингъ, также яйца (желтокъ); наконецъ различные слизистыя вещества, зе-лень, богатая растительною слизью, сальный корень и др. Для питья вода.

Въ различномъ отношеніи эта діета занимаетъ средину между растительною и питательною животною пищею. Подобно преды-дущей діетѣ, вещества и этой группы не раздражаютъ пищева-рительныхъ путей или другихъ органовъ. Вообще оны удобо-варимы, однако молоко, въ большемъ количествѣ, не въ такой степени, какъ часто полагають, потому что казеинъ свертыва-ется въ желудкѣ, и иногда также по содержанію въ немъ масла. Такъ какъ большая часть составныхъ частей, особенно

молока, всасывается въ желудкѣ и кишечномъ каналѣ и исчезаетъ, то образуется мало фекальныхъ массъ, и такъ какъ эти вещества не возбуждаютъ кишечнаго канала, брюшнаго пресса, то сверхъ того образованная фекальная масса испражняется медленно. Потому при этой діетѣ обыкновенно бываетъ трудное испражненіе, даже запоръ, какъ отъ всѣхъ питательныхъ веществъ, которыя мало или вовсе не содержатъ неудобоваримыхъ составныхъ частей (напр. чистая пшеничная мука, крахмалъ, студень). Во время варенія и уподобленія пищи, образование теплоты мало или вовсе не усиливается; сердце, кровообращеніе и дыханіе не поражаются, вообще не замѣтно ни возбужденія, ни разстройства въ отправленіи органа, и изъ всѣхъ отдѣленій, повидимому, умножается только моча, по крайней мѣрѣ при употребленіи молока, слизистаго питья. Всѣ вещества этой группы имѣютъ слегка питательное дѣйствіе; всего совершеннѣе молоко. Образование жира ускоряется, и тѣмъ болѣе, чѣмъ молоко и другія питательныя вещества богаче плотными составными частями; во всякомъ случаѣ больше, чѣмъ отъ растительной пищи.

Для здороваго или больнаго груднаго младенца потребна только чистая, исключительная молочная діета и — если возможно только — молоко матери. Въ позднѣйшемъ возрастѣ тѣло нуждается еще въ другой пищѣ, по крайней мѣрѣ въ супѣ, хлѣбѣ и другой мучной пищѣ, потому что молоко по себѣ тогда недостаточно питаетъ. Всего приличнѣе она въ послѣдствіи для сангвиническихъ, чувствительныхъ, раздражительныхъ и страстныхъ лицъ, для изнуренныхъ отъ разстройства, между тѣмъ какъ, напротивъ, она недостаточна и неприлична при продолжительной, большой уtratѣ тѣлесной и душевной силы. На горахъ съ свѣжимъ, сухимъ, возбуждающимъ воздухомъ, съ усиленнымъ процессомъ дыханія и окисленія, молочная діета, повидимому, приличнѣе, нежели въ долинахъ, въ плоскихъ, низменныхъ болотныхъ и сырыхъ странахъ.

Въ острыхъ болѣзняхъ молоко вообще менѣе годно, нежели въ хроническихъ; однако съ минеральными водами (зельтерскою), слизистыми отварами оно часто служитъ пріятнымъ, прохладительнымъ питьемъ; напр. при воспалительныхъ страданіяхъ желудка и кишечнаго канала, печени, дыхательныхъ и половыхъ органовъ, при кровавомъ поносѣ, острой сыщи и т. д. — Исключительная молочная діета — такъ назыв. *леченіе молокомъ* — употребляется преимущественно при различныхъ страданіяхъ пищеварительныхъ и дыхательныхъ органовъ, напр. при нѣкоторыхъ разстройствахъ пищеваренія, гастралгіи, также при хроническомъ воспаленіи желудка, изъязвленіи его, при застарѣломъ воспаленіи кишекъ и кровавомъ поносѣ, при поносѣ вообще, далѣе при чахоткѣ гортани, дыхательнаго горла, лег-



кихъ и при наклонности, наслѣдственномъ расположеніи къ такимъ болѣзнямъ, а еще полезнѣе при хроническомъ воспаленіи дыхательныхъ вѣтвей и гортани, при остаткахъ послѣ воспаления легкихъ; при ракъ, особенно желудка. Молочная діета часто полезна также въ тѣхъ состояніяхъ раздражительности со слабостью, которая завязать отъ страданій, причисляемыхъ къ «раздраженію спиннаго мозга», къ истерическимъ болѣзнямъ (особенно органовъ живота), при пляскѣ св. Вита, судорогахъ, невралгіяхъ, эпилепсін, при разстройствѣ отъ рукоблудія и другаго злоупотребленія половыхъ органовъ, при спинной сухоткѣ; также въ первыхъ періодахъ ломоты, при вторичномъ сифилисѣ, меркуріальной болѣзни и воднякѣ. Для такъ назыв. лимфатическихъ, флегматическихъ лицъ молочная діета менѣе прилична, также для золотушныхъ (за исключеніемъ дѣтей) и въ случаяхъ, гдѣ слабый изнуренный организмъ скорѣе и болѣе нуждается въ подкрѣпленіи питательными веществами. Однако нерѣдко бываютъ случаи, что послѣднія не переносятся или непозволительны по существующему раздраженію, напр. пищеварительныхъ органовъ, по раздражительнымъ страданіямъ, и тогда уместна молочная діета.

Для молочнаго леченія всего приличнѣе молоко женщинъ, особенно сначала; затѣмъ слѣдуетъ молоко ослицъ. Часто можно, только съ осторожностью и постепенно, переходить къ видамъ молока, болѣе богатымъ составными частями, особенно масломъ, напр. къ коровьему молоку, и въ случаѣ надобности, предварительно снимаютъ сливки (если не переносятъ масла) или разжижаютъ молоко водою, сывороткою, ячменнымъ отваромъ, минеральными водами, напр. зельтерскою. Въ Англіи часто пьютъ молоко съ пивомъ (такъ назыв. *posset*, *zythogala*). Если желаютъ употребить коровье молоко по себѣ, то всего лучше пить его утромъ тотчасъ послѣ доенія, въ тепломъ состояніи (сначала по  $\frac{1}{2}$  бутылкѣ). Притомъ должно обращать вниманіе на здоровье и возрастъ животнаго, на кормъ и уходъ за ними, какъ и на чистоту ихъ. Должно также принимать въ соображеніе, что первое доенное молоко содержитъ больше воды, сыворотки, а позднѣе больше масла, и что чѣмъ рѣже доятъ, тѣмъ больше уменьшается количество молока, а содержаніе въ немъ масла и т. д., напротивъ, увеличивается. Исключается притомъ всякая кислая и пряная пища, овощъ и большая часть зелени. Иногда молоко не переносится съ самаго начала или же въ послѣдствіи леченія. Тогда должно отыскать причину, напр. не зависитъ ли это отъ самаго молока или отъ другихъ діететическихъ погрѣшностей, разстройства желудка, пищеваренія. Иногда происходитъ давленіе желудка, отрыжка гнилыми яйцами; въ такомъ случаѣ свертываніе молока въ желудкѣ обыкновенно совершается слишкомъ медленно

и несовершенно. Потому стараются способствовать къ свертыванію прибавленіемъ алкоголическихъ жидкостей, даже заливаніемъ лимоннымъ сокомъ и другими кислотами. Въ другихъ случаяхъ является изжога; тутъ можно стараться нейтрализовать до извѣстной степени желудочную кислоту магнезіею, углекислымъ натромъ, известковою водою и т. п. При слабомъ пищевареніи часто даютъ вмѣстѣ горькіе экстракты, хину; при запорѣ — ревенъ, сабуръ; при продолжительномъ поносѣ — желѣзные препараты, немного опія и т. д. Но лучше не прибѣгать къ этимъ лекарствамъ, и, смотря по обстоятельствамъ, прибавляютъ къ молоку, напр. яйца, желтокъ, или вмѣсто молока даютъ отваръ ячменя, овсянку и т. п., съ яичнымъ желткомъ (напр. малолѣтнимъ дѣтямъ).

### 3. Животная пища.

Кромѣ обыкновенной, питательной домашней и госпитальной пищи можно тутъ различать двойной родъ діеты:

*Первый родъ діеты* составляетъ преимущественно, такъ назыв. бѣлое мясо, т. е. телятина, вообще молодые животныя, домашнія птицы, рыбы и другія животныя съ холодною кровью; далѣе пища, содержащая бѣлокъ и животную студень, яйца, мясной отваръ, устрицы и т. п., также картофель, хлѣбъ, шоколадъ; всѣ они питательныя, вообще удобоваримыя вещества, которые мало или вовсе не раздражаютъ и не легко производятъ возбужденія.

*Второй родъ діеты:* говядина, баранина, дичь, заяцъ, окорокъ, болѣе жирное мясо гуся, утки, голубя, овсянки, также вуропатки и дрозда. Наконецъ принадлежатъ сюда грибы, какъ сморчки, трюфели и др.

Принадлежація сюда вещества особенно богаты бѣлковыми и протеинными веществами, азотомъ, и составляютъ нашу питательнѣйшую пищу. Вареніе ихъ въ желудкѣ требуетъ, такъ сказать, болшей силы и присутствія или образованія обильнѣйшихъ и сконцентрированныхъ пищеварительныхъ соковъ. Поэтому легче происходитъ раздраженіе слизистой оболочки желудка и кишекъ, пища остается долѣе въ желудкѣ, въ тонкой кишкѣ, пока питательныя вещества не растворятся, превратятся и всосутся; за то образуется меньше фекальныхъ массъ, которыя однако вонючи въ высокой степени. Во время пищеваренія обыкновенно ускоряется пульсъ, возвышается температура, отдѣляется болше желчи; при продолжительномъ употребленіи усиливается также образованіе сѣмянн, между тѣмъ какъ мочи отдѣляется меньше, но болше сконцентрированную, съ болшею мочевиною, мочевою кислотою и мочекислыми солями, какъ и красильнымъ веществомъ. При обильномъ употребленіи этихъ

веществъ, часто образуется, такъ назыв. плеторическое состояніе; отправление спиннаго и черепнаго мозга, также душевная дѣятельность въ отдѣльныхъ отношеніяхъ (особенно воля, душевное возбужденіе, половое побужденіе, воображеніе) становится сильнѣе, болѣе возбуждается, и мышечная система дѣлается крѣпче; наконецъ можетъ образоваться наклонность къ ломотѣ, каменной болѣзни (такъ назыв. мочекишное расположеніе), лихорадкѣ и воспаленію.

Пластическою діетой можно пользоваться, если слабымъ, малокровнымъ худопитаннымъ больнымъ или выздоравливающимъ нужно доставить питательную пищу, вообще большое количество замѣняющихъ веществъ, умножить бѣлковыя вещества въ крови и органахъ, уменьшить обильное отдѣленіе и выпотѣніе или удалить послѣдствія ихъ, напр. слабость, исхуданіе, водянку. Показанія къ этой діетѣ, такимъ образомъ, соотвѣтствуютъ болѣею частію показаніямъ къ употребленію горькихъ тоническихъ средствъ, напр. хины, желѣза, и нерѣдко ихъ употребляютъ вмѣстѣ. Что касается до употребленія этой діеты въ отдѣльныхъ болѣзняхъ, то она прилична (съ сообразною постепенностью и измѣненіемъ) при такъ назыв. аземическихъ состояніяхъ, при золотухѣ, англійской болѣзни, истерикѣ, изнуреніи и исхуданіи, вслѣдствіе хроническихъ страданій, какъ нагноеніи, нарывовъ, поноса, слизетеченій (напр. легкихъ, половыхъ и мочевыхъ путей, брюшины и наружныхъ частей тѣла), при водянкѣ, также въ теченіе и послѣ перемежающейся лихорадки и т. п., если общее страданіе выражается слабостью и нѣтъ дѣятельныхъ, острыхъ приливныхъ или эксудативныхъ пораженій. Даже при хроническомъ кровавомъ поносѣ часто находили мясную пищу (съ яйцами, молокомъ и т. д.), употребленную съ осторожностью, дѣйствительнѣе всѣхъ лекарствъ. Во многихъ изъ этихъ случаевъ прежде предпочитали голодную и растительную діету, но болѣею частію къ большому вреду болнаго, основываясь болѣе на ученіи анатомическаго пораженія, на теоріи воспаленій, чѣмъ на достаточныхъ опытахъ. Наконецъ употребляли исключительно животную пищу при медовитомъ мочеотдѣленіи, какъ жареное мясо, мясную пищу вообще, съ яйцами, сыромъ, шоколадомъ, молокомъ, мяснымъ отваромъ; жиры обыкновенно также переносятся хорошо при чрезмерномъ отдѣленіи мочи; вмѣсто хлѣба даютъ развѣ только немного сухарей, жаренные ломти хлѣба (въ новѣйшее время также хлѣбъ изъ клейковины, что однако рѣдко переносится надолго). Но обыкновенно больные не переносятъ долго этой пищи; при этомъ, повидному, болѣею частію уменьшается или даже исчезаетъ на время содержаніе сахара въ мочѣ.

Наконецъ эта діета полезна для лимфатическихъ, недѣятельныхъ, флегматическихъ лицъ, также для жителей сырыхъ и бо-

лотныхъ странъ, но не для сангвиническихъ и холерическихъ, полносочныхъ, при наклонности къ дѣятельнымъ приливамъ къ головѣ, груди, къ такъ назыв. активнымъ кровотеченіямъ, удару, при гипертрофiи и расширенiи сердца; столь же мало при ломотѣ, каменной болѣзни (мочекпсломъ расположенiя) и наклонности къ этому. И для малолѣтнихъ дѣтей она никогда не годится. Вообще же нельзя долго и исключительно пользоваться безъ опасности высшими степенями крѣпительно-пластической діеты.

## II.

Иногда, для достиженiя извѣстной цѣлительной цѣли, даютъ больнымъ меньше пищи, чѣмъ они получаютъ для замѣны утратъ при обыкновенныхъ обстоятельствахъ или по крайней мѣрѣ въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ требуетъ обыкновенный аппетитъ. Это ограниченiе количества пищи относится особенно къ питательнымъ яствамъ, значить къ мясу (смотря по обстоятельствамъ, однако, даютъ немного нежирнаго мяса, по нѣскольку унцій въ день). Изъ растительныхъ веществъ позволительны такія, которыя богаче водою, сахаромъ, камедью, крахмаломъ, нежели бѣлковыми веществами, напр. плоды, также сушеные, далѣе удобоваримая зелень, слизистые корни, слабый супъ, мучнистая пища, однако всего этого немного, какъ и блага хлѣба и сухарей, такъ чтобы больной постоянно чувствовалъ слабый голодь. Зелень изъ листьевъ и дѣтвотъ негодна, потому что производитъ вѣтры, также картофель и стручковые плоды. Воду также должно употреблять лишь въ маломъ количествѣ; по обстоятельствамъ, лучше даютъ тизаны, напр. изъ сассапарели, пирейнаго корня, также сыворотку. Такимъ образомъ, напр. въ 24 часа, даютъ утромъ, въ полдень и вечеромъ по 12—15 водотпиковъ блага хлѣба, сухарей и столько же мяса или супъ; противъ голода и жажды немного воды, тизаны (особенно горькія). Курить табакъ можно. Часто предварительно назначаютъ слабительное и рвотное; по обстоятельствамъ, родъ тошнотворнаго леченiя, даже кровоизвлеченіе. Упомянутымъ образомъ поступаютъ цѣлцы недѣли, даже мѣсяцы, однако постоянно наблюдая за больнымъ и его сплюю, также за перемѣнами, которыя являются въ самой болѣзни.

Всасываніе введенныхъ въ желудокъ или клѣтчатку жидкостей, также патологическихъ эксудатовъ весьма увеличивается при продолжительной голодной діетѣ, дыханіе становится все медленнѣе, наконецъ труднымъ-короткимъ, съ стѣсненіемъ груди (когда является такое разстройство дыханiя у больныхъ, то точно такъ должно переходить къ питательной пищѣ). Температура тѣла уменьшается, такъ что, напр., голодные жалуются на

сильный холодъ. Притомъ тѣло постоянно теряетъ вѣсъ, особенно сначала. Когда потеря вѣса достигаетъ извѣстной границы, то смерть неизбежна. Потеря вѣса не бываетъ одинакова во всѣхъ частяхъ тѣла; прежде всего уменьшается жиръ, потомъ кровяная масса, далѣе паренхиматозные органы, какъ печень, селезенка, потомъ мышцы, которыя становятся блѣдными и уменьшаются въ объемѣ. Сердце теряетъ величину и вѣсъ, стѣнки желудочковъ утончаются. Всего менѣе теряютъ кости, сухія жилы, связки и нервное вещество. Такимъ образомъ, продолжительною голодною діетою угнетаются особенно кровообращеніе, дыханіе, образованіе теплоты и питательные процессы, вообще измѣняется значительно превращеніе веществъ и усиливается всасываніе. Мочевая кислота и мочевины, повидимому, исчезаютъ постепенно въ мочѣ; однако, къ несчастію, происходящіе притомъ химико-физическіе процессы намъ почти неизвѣстны. Часто является довольно рано раздраженіе глаза, соединительной оболочки, даже воспаленіе и изъязвленіе ея; тѣло распространяетъ противный запахъ. Подобная наклонность къ образованію гноя, къ изъязвленію и отложенію гноя является часто и въ другихъ мѣстахъ. Постепенно происходитъ настоящее изнуреніе, цынга, водянка, часто съ раздраженіемъ пищеварительныхъ путей, поносомъ, совершеннымъ разстройствомъ пищеваренія, и, при долгой голодной діетѣ, является наконецъ смерть. По *Chossat* умираютъ и многіе больные по той же причинѣ, когда ихъ слишкомъ долго подвергаютъ скудной діетѣ.

Всего чаще пользуются голодною діетою при острыхъ болѣзняхъ и процессахъ выпотѣнія съ лихорадкою; больные при этомъ, такъ сказать, инстинктивно подвергаются сами этой діетѣ, такъ какъ они обыкновенно не имѣютъ аппетита и сильной потребности питанія, а употребленную пищу рѣдко переносятъ и перевариваютъ. То самое относится къ ея употребленію послѣ большихъ хирургическихъ операцій и послѣ родовъ. Въ хроническихъ болѣзняхъ — напротивъ; въ случаяхъ, гдѣ аппетитъ не разстроился, мы только въ случаѣ нужды можемъ прибѣгать къ такому затруднительному, сильному и даже положительно опасному леченію, которое, впрочемъ, при соразмѣрномъ употребленіи, часто приносятъ, говорятъ, неожиданную пользу. Всего чаще пользовались ею, чтобы произвести значительныя перемѣны во всемъ тѣлѣ. Такъ при вторичномъ сифилисѣ, въ случаяхъ, гдѣ ртуť, іодистый потассій и подобныя средства остались безъ успѣха или по крайней мѣрѣ не помогли основательно; далѣе при такъ назыв. аневризмахъ сердца, начальственной артерій; также въ упорныхъ случаяхъ золотухи, глистной болѣзни (тутъ съ солеными яствами, седедками и т. п., особенно какъ предварительное и послѣдовательное леченіе). Далѣе, чтобы произвести всасываніе экссудатовъ, при водянкѣ,

нѣкоторыхъ опухоляхъ, также при ракъ, однако тутъ съ особенною осторожностью; эту діету назначаютъ даже беременнымъ съ узкимъ тазомъ, взамѣнъ искусственныхъ рановременныхъ родовъ. Кроме того, пользуются слабыми степенями голодной діеты, но методически и продолжительно, въ подобныхъ случаяхъ, какъ растительную діету, напр. въ болѣзняхъ желудка, кишечнаго канала и печени, при полнокровіи, ожирѣніи, гипохондрии и меланхолии, при всѣхъ страданіяхъ отъ сидячей, празднои и вмѣстѣ роскошной жизни, при ломотѣ, склонности къ удару мозга. Но такъ какъ тутъ вездѣ положительная польза голодной діеты гораздо сомнительнѣе, нежели возможный вредъ ей, то не слѣдуетъ подвергать ей большого безъ настоятельныхъ причинъ, напр. основываясь только на теоретическихъ мнѣніяхъ.

Лечение жаждою существенно сходствуетъ съ предыдущею, діетою, только съ тѣмъ разлччьемъ, что тутъ ограничиваютъ сколько возможно и питье. Даютъ, напр. въ день только половину, много цѣлую котлету изъ телятины или баранины съ нѣсколькими золотниками сухарей, хлѣба, немногими печеными плодами и только 2 стакана какой-либо тизаны въ день. Другіе позволяютъ немного краснаго вина, а иныя ограничиваютъ въ такой степени только питье, а не плотную пищу. Такимъ образомъ поступаютъ 6—10 недѣль. Дѣйствія бываютъ такія, какъ отъ голодной діеты; только что тутъ соединяются еще дѣйствія жажды, выдѣлительные процессы, напр. кожею, почками, слезистыми оболочками уменьшаются въ болѣе высокой степени, лечение еще тягостнѣе и тѣло скорѣе разстроивается.

Ею пользовались, особенно въ южной Франціи, противъ вторичнаго сифилиса. Рѣдко эта діета употребляется по себѣ; обыкновенно даютъ вмѣстѣ меркуріальныя средства, сулему, сарсапарель и цитмановъ отваръ, сиропъ Лафеттера, іодистый потассій и т. п. Можетъ быть она (съ приличнымъ измѣненіемъ) могла бы принести пользу и при водянкѣ, особенно острой, также въ необыкновенно упорныхъ случаяхъ хронической брюшной водянки, въ нѣкоторыхъ болѣзняхъ почекъ и мочеваго пузыря (напр. какъ палліативное средство при свищахъ мочеваго пузыря и маточнаго рувава).

### III.

Подъ словомъ «климатъ» обыкновенно разумѣютъ совокупность свойствъ и вліяній почвы, поверхности земли и особенно атмосферы, которыми обусловливается свойственность большаго пространства земли и ея вліяніе на человека, на всѣ живые организмы, на здоровье и болѣзни. Всего важнѣе тутъ извѣстныя состоянія и свойства атмосферы; какъ степень ея температуры

(средняя температура года, зимы, лѣта) и перемены ея, степень влажности (число дождевыхъ дней, годовое количество дождя), тяжести (давленіе воздуха), ея чистота и смѣшеніе, ея электрическое зарядженіе, движеніе и вѣтры, ясность, прозрачность (проницаемость для свѣта), и можетъ быть еще другіе моменты, которые донынѣ намъ неизвѣстны относительно образа дѣйствія. Кромѣ этихъ атмосферныхъ обстоятельствъ, климатъ зависитъ еще отъ свойства почвы, воды. У первой входитъ въ расчетъ ея геологическое строеніе (первоначальныя горы, слѣды, песчаністая или глинистая земля и т. д.); зависящая отъ того растительность, земледѣліе; далѣе наружный видъ, какъ горы и долины, направленіе и глубина долинъ. Относительно плоскости воды важно, находится-ли въ части земли морская или прѣсная вода, текущая или стоячая вода, или болото; наконецъ важны химическія составныя части и испареніе этихъ водъ.

Знаніе этихъ обстоятельствъ тѣмъ важнѣе теперь, чѣмъ болѣе въ наше время болыныя всякаго рода переменяютъ мѣсто жительства вслѣдствіе болѣе удобнаго сообщенія помощью желѣзныхъ дорогъ, пароходовъ и т. д. И чтобы не попасть въ важную ошибку, должно знать, что въ чужихъ краяхъ оказываютъ сильное вліяніе на иностранца не только одинъ климатъ, но также (и почти еще больше) перемена мѣста, образа жизни, дѣйствіе на умъ, душевную дѣятельность и т. д.; далѣе, что при такихъ обстоятельствахъ переселившійся долженъ привыкать къ климату, что особенно для слабыхъ, изнуренныхъ или находящихся болыныхъ болшею частью довольно трудно.

Въ средней и сѣверной Европѣ всего чаще совѣтуютъ чахоточнымъ и расположеннымъ къ этому переселиться въ болѣе теплый климатъ, также при другихъ упорныхъ или опасныхъ страданіяхъ дыхательныхъ вѣтвей и гортани, кровотеченія изъ легкихъ, грудной водянкѣ, одышливыхъ страданіяхъ (легочномъ эмфиземѣ) и др. Иногда переселяются въ теплый климатъ, когда послѣ тяжкихъ болѣзней (какъ напр. тифа, кроваваго поноса, перем. лихорадки, потери крови и т. п.) выздоравливающіе не могутъ совсѣмъ оправиться; также при застарѣлой золотухѣ, англійской болѣзни, при растройствахъ пищеваренія, хроническихъ страданіяхъ селезенки, печени, мочевыхъ и половыхъ органовъ, при водянкѣ, бесплодіи и др.; также при хроническомъ ревматизмѣ и различныхъ нервныхъ страданіяхъ, какъ при ипохондріи, унылости, невралгіи и т. п. Потому что и отправление нервной системы обыкновенно совершается лучше и правильнѣе при умѣренной теплотѣ и равновѣрной погодѣ. Особенно же большая часть хроническихъ страданій дыхательныхъ органовъ (конечно за исключеніемъ развитой легочной чахотки) претерпѣваетъ благоприятное измѣненіе переселеніемъ больного въ болѣе теплый климатъ съ спокойною, тихою атмосферою, которая не

слишкомъ суха и не слишкомъ влажна, съ незначительнымъ количествомъ дождя, безъ значительной и особенно безъ скорой переменны температуры. Особенно важно пребываніе въ такихъ странахъ во время нашей зимы. Наконецъ, въ теплыхъ странахъ встрѣчаются рѣдко мочевые камни. вообще страданія почекъ и мочеваго пузыря (напр. въ Вестиндіи); притомъ въ теплыхъ климатахъ эти страданія облегчаются, иногда и исцѣляются, напр. катарръ мочев. пузыря, каменная болѣзнь, также чрезмѣрное отдѣленіе мочи и др.

Какъ всегда, такъ и это средство—климатъ—должно назначать приличнымъ образомъ; потому слѣдуетъ выбирать сообразную отдѣльнымъ обстоятельствамъ страну съ надлежащимъ вниманіемъ на прочую жизнь больного, и эта осторожность тѣмъ болѣе необходима, такъ какъ такое леченіе сопряжено съ большими издержками. Должно обращать вниманіе не только на температуру мѣста, но и особенно на влажность, количество дождя, на родъ и продолжительность существующихъ вѣтровъ и т. д.; на берегахъ слѣдуетъ имѣть въ виду вѣтры съ моря и суши, которые часто особенно вредны, напр. въ Италіи, Левантѣ, Египтѣ (сирокко, либечіо). Должно обращать вниманіе даже на жилище, образъ жизни, воду для питья, мѣсто для гулянья и т. п. При легочной чахоткѣ и другихъ грудныхъ страданіяхъ должно отличать различные періоды и формы. При раздражительности, возбужденіи, лихорадкѣ, недостаточномъ выхаркиваніи, при наклонности къ легочнымъ кровотеченіямъ, къ воспалительнымъ страданіямъ, особенно къ воспаленію дыхательныхъ вѣтвей и легкихъ влажно-теплымъ страны заслуживаютъ преимущества, между тѣмъ какъ при противоположныхъ обстоятельствахъ для слабыхъ, торпидныхъ больныхъ безъ лихорадки, при обильномъ выхаркиваніи, бленноройныхъ страданіяхъ и т. д. лучше выбирать сухія мѣста; также морскіе берега, пребываніе на свѣжемъ, чистомъ горномъ воздухѣ. Хотя и можетъ быть пребываніе въ Италіи и т. п. часто благопріятно при наклонности къ легочной чахоткѣ, однако при развитой болѣзни больше нельзя ожидать положительной пользы. Но безсовѣстно и недѣлю лишать безнадежныхъ больныхъ домашняго удобства и посылать ихъ въ мѣста, гдѣ они навѣрно не поправятся. Также важенъ фактъ, что напр. въ Мадерѣ, Мальтѣ, на Ионическихъ островахъ и т. д. легочная чахотка встрѣчается столь же часто, какъ и въ другихъ странахъ. Если же чахоточные и другіе больные уже находятся тамъ, то, при возможности, имъ слѣдовало бы тамъ оставаться до конца жизни, чтобы можетъ быть провести время тѣгостно короткое время, оставшееся имъ жить, а не подвергаться при возвращеніи домой опасному привыванію къ климату.

Въ средней и сѣверной Европѣ посылаютъ больныхъ преимущественно



шественно въ южныя страны, въ Италію, въ южную Францію и др., потому они тутъ заслуживаютъ особеннаго вниманія. Въ тропическихъ странахъ напротивъ, больныхъ, напр. страдающихъ кровавымъ поносомъ, эндемическими, желчными лихорадками, печенью и всѣми послѣдствіями этихъ болѣзней, нерѣдко посылаютъ въ Европу или сѣверную Америку, и часто съ лучшимъ успѣхомъ. Всегда важенъ выборъ времени для отъѣзда и возвращенія. Изъ Германіи, сѣверной Европы напр., больнымъ слѣдуетъ выѣзжать во время осени, а возвращаться изъ Италіи въ апрѣлѣ, маѣ, и ѣхать, напр. чрезъ Швейцарію, южную Францію, такъ чтобы они прибыли въ Германію въ концѣ мая или іюня. Тоже самое относится къ тѣмъ, которые возвращаются изъ тропическихъ странъ.

*Пиза* и *Римъ* важнѣйшія мѣста для чахоточныхъ, зимою тамъ равномернo тепло и сыро. Въ Римѣ зимою теплѣе, чѣмъ въ Пизѣ, тамъ не такъ дождливо, и потому Римъ почитаютъ за болѣе сухое мѣсто. Пиза всего лучше для тѣхъ, которые должны сидѣть дома и не могутъ выходить на открытый воздухъ. Ницца—защищенная съ трехъ сторонъ горнымъ поясомъ—имѣетъ по своему положенію умѣренный климатъ съ малою перемѣною температуры; но зимою, весною часто бываютъ холодные, суровые восточные и сѣверные вѣтры; вообще климатъ этого города сухъ, часто возбуждѣтеленъ. Потому онъ рѣдко или всегда не годенъ для чахоточныхъ, также при воспалительныхъ, раздражительныхъ болѣзняхъ гортани, дыхательныхъ вѣтвей, особенно если притомъ бываетъ недостаточное изверженіе мокроты или кровохарканіе. Напротивъ того, онъ часто бываетъ полезнымъ при хроническомъ воспаленіи дыхательныхъ вѣтвей (также гортани) съ чрезмѣрнымъ изверженіемъ слизи, при слізетеченіи дыхательныхъ вѣтвей и его послѣдствіяхъ, или сопряженіяхъ, какъ-то при эмфиземѣ легкихъ, расширеніи дыхательныхъ вѣтвей; вообще при катаррѣ и слізетеченіи слизистыхъ оболочекъ, особенно женскихъ половыхъ органовъ; при золотухѣ, хроническомъ ревматизмѣ, ломотѣ, разстройствѣ пищеваренія, ипохондріи, чрезмѣрномъ мочетеченіи, наконецъ для тѣхъ, которые возвращаются больными изъ тропическихъ странъ. Больные грудью теперь посѣщаютъ часто *Сото*, *Венецію* (*Lago maggiore*, Миланъ для этого не годятся).

Въ *Неаполѣ* климатъ тепель, сухъ (однако не такъ какъ въ Ниццѣ), но перемѣчивъ и едва-ли годенъ для больныхъ грудью, всего менѣе для чахоточныхъ (скорѣе для ипохондриковъ, недвѣтельныхъ, унылыхъ, лимфатическихъ и т. п.); то самое относится къ *Вајае* и *Роккиолѣ* близъ Неаполя. Подобно *Луккѣ* и *Сіэни*, Неаполь лѣтомъ одно изъ прохладнѣйшихъ мѣстъ Италіи, и потому лѣтомъ часто предпочитаютъ его, а зимою Римъ, Пизу. Климатъ въ *Сициліи*, напр. въ *Palermo*, теплый, равно-

мѣрный и онъ особенно благоприятенъ зимою для больныхъ грудью; но путешественникъ, больной найдеть тамъ менѣе удобствъ, даже многія неприятности, потому что въ Италіи почитаютъ чахотку очень заразительною. На Мальтѣ умѣренная, равномѣрная температура, но сухо; ее хвалятъ въ тѣхъ же случаяхъ, какъ и Ниццу, но она далеко уступаетъ послѣдней по отдаленію и по чрезмѣрной пыли; вообще менѣе годится для чахоточныхъ. Напротивъ того, такимъ больнымъ, говорятъ, очень полезно быть на *Ионическихъ островахъ*, напр. *Корфу*, особенно въ странахъ, гдѣ эндемически господствуетъ перемѣжающаяся лихорадка.

На берегахъ Прованса, вообще въ юговосточной Франціи нерѣдко посѣщаютъ отдѣльныя мѣста. Вообще тамъ теплый (средняя годовая температура около  $+14^{\circ}$  Ц.), сухой, возбуждающій климатъ; часто внезапно дуютъ холодные вѣтры, особенно сѣверо-западные (такъ назыв. *Mistral*), притомъ много пыли, а зимою довольно холодно. Потому эта страна менѣе прилична въ позднѣйшихъ періодахъ легочной чахотки; она лучше при катарральныхъ, бленноройныхъ страданіяхъ для золотушныхъ, вялыхъ, торпидныхъ лицъ (значить, какъ напр. Ницца). Сюда относится *Nuèves*, съ довольно умѣреннымъ климатомъ, потому что этотъ городъ нѣсколько защищенъ отъ сѣвернаго вѣтра; *Cannes*, также на Средиземномъ морѣ, имѣетъ болѣе защищенное мѣстоположеніе, болѣе умѣренный климатъ и потому посѣщается теперъ чаще; *Montpellier*, *Aix*, *Marseille*, всѣ подвержены сѣвернымъ и сѣверо-западнымъ вѣтрамъ, потому менѣе приличны для чахоточныхъ, нежели *Nuèves*. Въ югозападной Франціи климатъ умѣренъ и сырѣе, чѣмъ въ Провансѣ, потому вообще благоприятѣе для больныхъ грудью, чахоточныхъ, чѣмъ послѣдній, и многія страны Германіи, чѣмъ вообще сѣверная Европа. Ланнес посылалъ чахоточныхъ въ Бретань; часто посѣщаютъ также департаменты верхнихъ и нижнихъ Пиренеевъ, напр. *Rau*, *Bagnères de Bigorre*.

На Пиренейскомъ полуостровѣ кажется немногія мѣста хороши и удобны для чахоточныхъ, вообще больныхъ грудью, но крайней мѣрѣ объ этомъ нѣтъ подробнѣйшихъ указаній. Впрочемъ хвалятъ климатъ *Малаги*, *Кадикса* и другихъ мѣстъ въ южной и юговосточной Испаніи, хотя напр. въ Малагѣ столь же сухо, какъ въ Мальтѣ, и притомъ дуютъ еще холоднѣйшіе вѣтры.

*Епитетъ*, напр. *Каиръ* (средняя годовая температура  $+22^{\circ}$  Ц.) еще менѣе приличенъ для больныхъ; но чахоточные часто отправляются туда.

Хотя климатъ южной Германіи никакъ не можетъ соперничать съ превосходными дѣйствіями италіянскаго и другихъ южныхъ странъ на нѣкоторыхъ больныхъ грудью и др., однако

многимъ больнымъ сѣверныхъ странъ невозможно отправляться надолго въ эти мѣста. Въ такомъ случаѣ ихъ могутъ замѣнить нѣкоторыя южно-германскія мѣста, особенно въ южномъ Тиролѣ, въ Швейцаріи (Meran, Interlaken и др.), также нѣкоторыя мѣста въ долинахъ Рейна, Некара, Майна, югозападнаго Шварцвальда; во многихъ есть притомъ минеральныя воды, водолечебныя, съворотколечебныя заведенія и т. п., при выборѣ которыхъ заслуживаютъ вниманія не только химическій составъ источника и т. д., но и климатъ, особенно его температура и перемѣны, сырость и количество дождя, защита отъ вѣтра и т. д.

Британцы часто посѣщаютъ даже нынѣ *Норвегію* и *Канаду*; первую при растройствахъ пищеваренія, чрезмѣрномъ раздраженіи мозга, душевныхъ болѣзняхъ; послѣднюю при золотухѣ, чахоточныхъ болѣзняхъ и пр.

Въ Германіи—гдѣ нѣтъ почти никакого морскаго сообщенія—рѣдко случается, чтобы больныхъ усылали за море. Тѣмъ чаще бываетъ это въ Британіи, также во Франціи. Гораздо важнѣе восточные острова, которые поближе къ матеріку; всего болѣе *Мадера*, гдѣ самый благопріятный климатъ сѣвернаго полушарія. Тамъ умѣренно, равномерно тепло, также лѣтомъ не жарко, притомъ сыро, такъ что воздухъ большую часть года насыщенъ парами, а все-таки бываетъ мало дождливыхъ дней. Съ другой стороны Мадера, по близости къ Африкѣ, не такъ сыра, какъ напр. Ямайка и другіе Вестъ-Индскіе острова, и не такъ подвержена пассатнымъ вѣтрамъ. Не только по климату, но и по другимъ удобствамъ, Мадера почитается за самое благопріятное мѣсто для больныхъ грудью, особенно чахоточныхъ въ первыхъ періодахъ, или при расположеніи къ ней. Для такихъ больныхъ теперь есть особенная лечебница въ *Funchal*ѣ. Изъ Канарскихъ острововъ можно пользоваться *Тенериффою*, хотя тутъ гораздо жарче, нежели на Мадерѣ, и погода перемѣнчивѣе. *Азорскіе острова*, напр. *St.-Michael*, подходятъ на Мадеру; но атмосфера сырѣе, температура перемѣнчивѣе, вообще холоднѣе, и тѣмъ менѣе удобствъ для больныхъ. Еще менѣе приличны кажутся западные острова, лежащіе ближе къ Америкѣ, тамъ лѣтомъ очень жарко и бываетъ болѣе значительная перемѣна температуры (напр. днемъ и ночью), также сильныя бури и ураганы съ американскаго материка. Сюда относятся *Богамскіе* и *Бермудскіе* острова; изъ западныхъ острововъ особенно *Ямайка*, *Барбадосъ*, *Мартиника*. Иногда тамъ остаются для предохраненія при наклонности къ легочной чахоткѣ (тутъ, говорятъ, всего благопріятнѣе болотистыя страны, гдѣ господствуетъ перемежающаяся лихорадка), также при каменной болѣзни, ломотѣ, золотухѣ, водянкѣ, глубоко укоренившемся сифилисѣ. При болѣе развитой легочной чахоткѣ ихъ климатъ большею частію вреденъ, какъ и вообще при большой слабости и изнеможеніи.

Чтобы произвести *искусственно* родъ теплаго климата для больныхъ грудью, чахоточныхъ, въ англійскихъ госпиталяхъ держать комнаты постоянно теплыми (около  $+ 15^{\circ}$  P.), напр. въ Brompton'ѣ, лондонскомъ предмѣстьи. Но больнымъ это скоро наводитъ скуку, становится тягостнымъ, между тѣмъ, какъ разумѣется, такой способъ не доставляетъ выгоды умѣреннаго климата.

Сюда всего лучше можно отнести нѣкоторые опыты употреблять терапевтически какъ *искусственно сжатый воздухъ*, такъ и *безвоздушное пространство*. Какъ уже прежде Tabarié, такъ нынѣ Pavaзъ хвалитъ первое средство, подъ названіемъ «инематическаго леченія», т. е. больного помѣщаютъ въ жестяной сосудъ девяти куб. метровъ содержанія, въ которотъ насосомъ можно сжимать и возобновлять воздухъ (регулируется клапанами, манометромъ). Отъ того, говорятъ, расширяются грудь и легкія, облегчается воспріятіе кислорода, отдѣленіе углекислоты и т. д., какъ и кровообращеніе, и бываетъ польза при расположеніи къ чахоткѣ, при англійской болѣзни, одышкѣ и многихъ другихъ болѣзняхъ. *Гемоспастическій приборъ* (жестяной плотно закрытый ящикъ (сапогъ), изъ котораго вытягиваютъ насосомъ болѣе или менѣе воздуха), придуманный Junod, дѣйствуетъ какъ огромный кровососный рожокъ; ноги опухаютъ въ немъ въ  $\frac{1}{4}$  до  $\frac{1}{2}$  часа, часто происходятъ кровяные подтеки, у чувствительныхъ общая слабость, упаденіе пульса, даже обморокъ. Junod, Ficius, J. Vogel и др. употребляли его вмѣсто кровопусканія, напр. при приливѣ, воспаленіи мозга, легкѣхъ, при страданіяхъ сердца и т. п. (такъ назыв. *гемоспазія*).

#### IV.

*Дѣйствія* движенія тѣла и мышцъ различны по роду и степени и смотря во большей или меньшей продолжительности. Но вообще ускоряется движеніе крови въ сосудахъ, въ сокращающихся мускулахъ, потомъ во всемъ тѣлѣ ускорится дыханіе, усиливается развитіе теплоты. Вздыхаемый воздухъ содержитъ болѣе углекислоты; также усиливается испареніе кожи, потъ, даже отдѣленія синовиальныхъ перепонокъ, между тѣмъ какъ оно уменьшается въ мочевыхъ органахъ, слизистыхъ оболочкахъ, также слюнныхъ желѣзахъ, и моча становится богаче плотными составными частями, мочекислыми солями, слизь, кажется, дѣлается на слизистыхъ оболочкахъ гуще, вязче. Притомъ является жажда, постепенно усиленный аппетитъ (умѣренное движеніе благоприятствуетъ въ пищеваренію), наконецъ чувство изнеможенія, и сонъ потомъ обыкновенно глубокъ, продолжителенъ и

спокоенъ. По всему этому понятно, отъ чего часто повторяемое напряженіе мышцъ можетъ благоприятствовать не только къ умноженію ихъ вещества и силы, но и къ превращенію веществъ, такъ назыв. процессу окисленія во всемъ тѣлѣ; между тѣмъ какъ тѣло становится сильнѣе, легко окисляющійся, излишній жиръ исчезаетъ. Часто при усиленіи движенія мышцъ высшія душевныя силы становятся менѣ замѣтными, вступаютъ въ состояніе относительнаго покоя, душевныя побужденія, страсти также слабѣютъ (уже въ древности силачи атлеты отличались менѣ разумомъ, нежели извѣстною флегмою и большимъ аппетитомъ). Эти успокоительныя и часто—напр. для нервныхъ, возбужденныхъ, слишкомъ ревностныхъ мыслителей, ипохондриковъ, унылыхъ—благопріятныя дѣйствія на умъ и расположеніе духа являются особенно, когда движеніе тѣла имѣетъ какую-нибудь цѣль, какъ путешествіе пѣшкомъ, охота, садовыя занятія, игры на открытомъ воздухѣ. Если же усиленное движеніе мышцъ продолжается слишкомъ значительное время, напр. въ форсированномъ походѣ, то пульсъ и дыханіе все ускоряются, наконецъ становятся неправильными, происходитъ общее нездоровье съ утомленіемъ, даже лихорадка и расстройство пищеваренія (говорятъ, что желудочный сокъ притомъ теряетъ, отъ продолжительнаго потѣнія тѣла, свои кислотныя свойства); но при надлежащей пищѣ и покоѣ можно оправиться. Если такое чрезмѣрное напряженіе силъ повторяется слишкомъ часто, то происходятъ болѣе дурныя послѣдствія, особенно при недостаткѣ въ пищѣ и пр., какъ у бѣднаго, измученнаго народа, при утомительныхъ работахъ. Тѣло становится тогда все менѣ способнымъ къ напряженію силъ, пищевареніе постоянно расстроено, происходитъ поносъ, угнетеніе дѣятельности нервной системы, понатливость, острота ума уменьшается, все тѣло приходитъ въ расстройство. Наконецъ кровь болѣе или менѣ теряетъ способность створаживаться, происходятъ еще загадочнѣйшія измѣненія состава крови и питанія, превращенія веществъ, особенно при содѣйствіи другихъ моментовъ, при недостаточной или худой пищѣ, нечистотѣ, худомъ жилищѣ, воздухѣ и т. д., и тутъ открывается источникъ тифозныхъ, дизентерическихъ и многихъ другихъ болѣзней и самыхъ пагубныхъ эпидемій.

При недостаткѣ надлежащаго движенія мышцъ—какъ у ученыхъ, ведущихъ сидячій образъ жизни, занимающихся въ конторахъ и др.—постепенно происходитъ атрофія неупражняемыхъ частей, особенно мышцъ; кожа блѣднѣетъ, весь видъ становится вялымъ, нездоровымъ, развитіе теплоты уменьшается. Постепенно является замедленіе и затрудненіе процессовъ питанія, стѣсненіе и боль около желудка, вѣтры, колотье, отрыжка, уменьшеніе аппетита; а отъ несовершеннаго образованія питательнаго сока и уменьшенія силы сокращенія кишекъ и брюшнаго

пресса и т. д., испражненіе низомъ становится рѣже, но часто обильнѣе и плотнѣе. Также слабѣютъ и замедляются сокращенія сердца, кровообращеніе, дыханіе совершается съ меньшею силою, особенно при согбенномъ положеніи, постоянному сидѣнн, выдыхаемый воздухъ содержитъ менѣе углекислоты; всѣ процессы отдѣленія—особенно также кожи, и можетъ быть недостаточный процессъ превращенія или окисленія внутри тѣла способствуетъ къ ожирѣнію. Но такимъ образомъ часто развивается необыкновенная раздражительность нервной и душевной жизни, съ болѣзненной чувствительностью ко всѣмъ внѣшнимъ и внутреннимъ впечатлѣніямъ, а это и бываетъ причиною многихъ нервныхъ страданій, такъ назыв. раздраженія спиннаго мозга, многихъ душевныхъ разстройствъ и т. д., особенно въ болѣе достаточномъ, такъ назыв. высшемъ классѣ и у женскаго пола.

Уже изъ этого слѣдуетъ, какъ важно движеніе тѣла для здоровья и хворыхъ, при однихъ и другихъ болѣзненныхъ расположеніяхъ, какъ *діетическое* и *предохранительное* средство. Къ сожалѣнію, въ древности этой потребности удовлетворяли почти инстинктивно, лучше чѣмъ въ новѣйшее время, и, не смотря на всѣ усилія умныхъ и человѣколюбивыхъ людей въ пользу гимнастики и подобныхъ тѣлесныхъ упражненій, охота къ нимъ вовсе не возбуждена еще въ надлежащей степени. Даже въ нѣкоторыхъ германскихъ странахъ гимнастикой занимаются такъ, что мальчики теряютъ всякую охоту къ ней. Какъ настоящія *лечебныя средства*, тѣлодвиженія употребляются лишь при хроническихъ болѣзняхъ и расположеніи къ нимъ, но движеніе тутъ нѣрѣдко главное средство, напр. при различныхъ страданіяхъ органовъ живота, пищеваенія, испражненія низомъ; при ипохондріи, гемороеѣ, меланхолиі, истерикѣ, эпилепсіи, также при невралгіи (въ промежуточное, свободное отъ боли время), блѣдной немочи и недостаточномъ мѣсячномъ кровотеченіи, хроническомъ ревматизмѣ, ломотѣ и пр.; въ молодости же, особенно при золотухѣ, излишней раздражительности, слабости, вадутости дѣтей, у которыхъ въ слабомъ, наследственно разстроенномъ тѣлосложеніи часто гнѣздятся столь много послѣдствительныхъ болѣзней; при расположеніи къ англійской болѣзни, искривленію хребта, какъ и въ первыхъ періодахъ этихъ болѣзней. Никогда не слѣдуетъ упускать изъ вида, что движеніе на открытомъ, свѣжемъ воздухѣ и гимнастическія упражненія, соотвѣтствующія обстоятельствамъ, при простой, но питательной діетѣ, здоровомъ жилищѣ, купаніи, умываніяхъ, вообще при надлежащемъ порядкѣ всего образа жизни доставляютъ безконечно лучшіе и продолжительнѣйшіе результаты, нежели ремень или сабуръ, желѣзо или хина, ворвань, іодъ, скорямяныя средства и т. п.

Напротивъ того движенія мышцъ, по крайней мѣрѣ болѣе

сильныя, неприличны, даже положительно вредны при органических порывах сердца, расположеніи къ удару, кровотеченіямъ изъ легкихъ и матки и пр. съ такъ назыв. дѣятельнымъ характеромъ. При страданіяхъ ногъ (язвахъ, расширеніи венъ и т. д.), еще болѣе при воспаленіяхъ, лихорадкѣ, движеніе воспрещается само собою. При полносочіи, тучности, расположеніи къ волненію, приливамъ не должно производить по крайней мѣрѣ чрезмѣрныхъ движеній тѣла, и ихъ надобно усиливать лишь постепенно, между тѣмъ какъ чувствительнымъ, нервнымъ, изнѣженнымъ и слабымъ, также при расположеніи къ тучности (безъ наступившаго превращенія вещества сердца въ жиръ) они приносятъ всего болѣе пользы.

*Хожденіе* изъ всѣхъ движеній употребляется всего чаще и съ болѣе общею пользою для здоровыхъ, больныхъ и выздоравливающихъ. Притомъ надобно обращать вниманіе на состояніе дороги (напр. крутизну, твердость, неровность или мягкость, плоскость), продолжительность хожденія, погоду и т. д. Наконецъ, весьма важно надлежащее управленіе первыми попытками дѣтей ходить.

При *бѣганіи* очень усиливается кровообращеніе, дыханіе, собственная теплота, испареніе, потъ, и чѣмъ короче дыханія, тѣмъ они становятся чаще, а наконецъ дыханіе совершается лишь одними верхушками легкихъ. Потому при узкой, худо развитой груди бѣганіе невозможно, или во всякомъ случаѣ требуетъ большой осторожности; напротивъ того, оно при обстоятельствахъ хорошее средство для развитія грудной кѣтки, легкихъ. Зимой самый пріятный и приличный родъ бѣганія—катаніе на конькахъ.

*Танцы* дѣйствуютъ въ сущности подобнымъ же образомъ; ими слѣдовало бы упражняться на открытомъ воздухѣ, днемъ и безъ стѣсненія тѣла узкою одеждою.

*Плаваніе* лѣтомъ одно изъ лучшихъ упражненій и дѣйствуетъ превосходно необходимыми усиленіемъ мышцъ; всѣ мускулы, особенно хребта, плечъ, поясницы находятся притомъ въ дѣятельности, и тутъ дѣйствуетъ также прохладная вода, и притомъ нѣтъ потери отъ пота и испаренія кожи. Плаваніе превосходно для слабыхъ, молодыхъ и старыхъ лицъ обоюдо, при расположеніи къ золотухѣ, англійской болѣзни, искривленію хребта и нервнымъ страданіямъ.

На *охотѣ* дѣлаютъ всякаго рода движенія и положенія, тѣло развиваетъ во всякой погодѣ и ея переѣмамъ, притомъ она не столь утомляетъ и не наводитъ скуки по разнообразію и пѣли, которой съ рвеніемъ стараются достигнуть (эту выгоду представляютъ также минералогическо-геогностическія, ботани-

чекія прогулки, ловленіе настькомыхъ и т. п.). Менѣе благоприятно дѣйствуетъ охота за болотными и водяными птицами, и стояніе охотника на сторожѣ.

*Фехтованіе* рѣдко употребляется больными. Въ древности фехтованіе почитали за средство къ исхуданію, кромѣ того оныя можетъ приносить пользу при недостаточномъ развитіи или слабости половины тѣла или отдѣльныхъ членовъ.

При *гимнастическихъ упражненіяхъ* должно различать, желаютъ ли развиты и укрѣплены преимущественно руки, ноги, грудную кѣтку или все тѣло, чтобы по этому избирать отдѣльныя упражненія. Они заслуживаютъ особеннаго вниманія при параличѣ, для дѣтей и молодыхъ лицъ съ наклонностью къ искривленію, вообще съ ортопедическою цѣлью, напр. при искривленіи хребта, отчасти чтобы уничтожить наклонность тѣла къ искривленіямъ общимъ подрѣпленіемъ мышцъ, отчасти чтобы надлежащими упражненіями и укрѣпленіемъ ослабѣвшихъ, полупарализованныхъ или дѣйствительно атрофическихъ мышцъ устранить уже существующее искривленіе. Въ послѣднемъ отношеніи особенно важно предохранять нижнюю часть тѣла, хребта отъ давленія верхнею, подрѣплять заднія вдоль хребта расположенныя мышцы, напр. висѣніемъ на рукахъ, различными упражненіями на канатѣ, лѣстницѣ, горизонтальной палкѣ, двухъ палкахъ и т. д. Чисто механическія устройства, выпрямительныя доски и т. п. дѣйствительно выпрямляютъ, но рѣдко на долго и ненадежащимъ образомъ. Но если при высшей степени искривленія употребляли такіе снаряды или разрѣзывали мышцы, сухожилія, то для вѣрности леченія нужны приличныя движенія и гимнастика, надлежащая пища и т. д.

Такъ-называемая *шведская лечебная гимнастика* (кинезитипія), которую ввелъ Ling, дѣйствуетъ не только на произвольныя мышцы, но и на непроизвольныя, на кишечный каналъ, мочевой пузырь, сердце и т. д., и именно во всѣхъ уже упомянутыхъ страданіяхъ; она производится особенными положеніями, движеніями, лежаніемъ и т. п., даже давленіемъ на одія или другія части, треніемъ, хлопаньемъ, переминаніемъ, размахиваньемъ и т. д. Такимъ образомъ Ling создалъ совершенную механическую терапевтику, и хотя въ ней и есть иное слишкомъ методически преувеличенное, однако основная мысль весьма важна. Лечебныя заведенія такого рода находятся теперь въ Стокгольмѣ, Берлинѣ, Лондонѣ, Петербургѣ, Гисенѣ и проч. Также Blache и учитель гимнастики Laisné замѣняютъ въ парижскомъ дѣтскомъ госпиталѣ обыкновенное лежаніе и сидѣніе гимнастическими упражненіями, даютъ больнымъ дѣлать простое движеніе, постепенно упражняются на двухъ палкахъ, на канатѣ, борются, бѣгать, скакать и т. д. При золотухѣ, англійской болѣзни, пляскѣ св. Вита, даже при параличѣ, какъ



и при эпилепсiи скоро улучшается видъ, также аппетитъ, пищеваренiе и т. д.

Наконецъ сюда относится *разминанiе*, перемигиванiе болящихъ, негибкихъ, судорожно сокращенныхъ мышцъ (напр. на спинѣ, затылкѣ, это часто дѣйствительно даже при столбнякѣ), которое часто употребляли также при опухоляхъ. На Востоку, въ Остѣ-Индiи и т. д. оно употребительно уже издавна, тамъ напр. невольницы, знахари пожимаютъ ладонью хребетъ, ляжки, конечности, также поталкиваютъ кулаками, или разминаютъ, трутъ теплымъ полотномъ и наконецъ даже даютъ хрустѣть отдѣльнымъ суставамъ.

*Ѣзда на водѣ*, на рѣкѣ, озерѣ и т. д. дѣйствуетъ особенно благопрiятно на того, кто самъ гребетъ. Сильнѣе дѣйствуетъ *морское путешествiе*, причѣмъ благопрiятствуетъ морской воздухъ, особенный родъ движенiя, перемѣна рода пищи и всего образа жизни, невозможность умственного напряженiя и т. д. Морское путешествiе въ теплыхъ климатахъ хвалятъ особенно при легочной чахоткѣ и другихъ грудныхъ болѣзняхъ, напр. при воспаленiи дыхательныхъ вѣтвей, далѣе при нервныхъ страданiяхъ, судорогахъ, невралгiяхъ, ипохондрии, меланхолии и душевныхъ болѣзняхъ вообще, при чрезмѣрномъ напряженiи ума и т. д. Морскiе разѣзды по теплымъ или хоть умѣреннымъ климатамъ, напр. въ Атлантическомъ океанѣ, дѣйствуютъ еще благопрiятнѣе. Морское путешествiе, напротивъ того, неприлично при органическихъ страданiяхъ сердца (по разстройству кровообращенiя, также при расположенiи къ выкидышу (по морской болѣзни).

*Верховая ѣзда* требуетъ довольно сильнаго напряженiя, чтобы при сотрясенiи лошадыю удержать тѣло въ равновѣсiи и въ сѣдлѣ и чтобы управлять лошадыю. При надлежащемъ упражненiи и легко идущихъ лошадахъ верховая ѣзда доставляетъ всѣ выгоды хожденiя, между тѣмъ какъ она не такъ утомляетъ и не подвергаетъ случайнымъ непрiятностямъ дорогъ. Потому ее хвалятъ для выздоравливающихъ, слабыхъ, ведущихъ сидячую жизнь и ученыхъ, которые не хотятъ или не могутъ бѣгать, для тѣхъ, которые не могутъ далеко ходить вслѣдствiе постоянныхъ болѣзней ногъ; далѣе при ипохондрии, гемороѣ, истерикѣ, при хроническихъ (невоспалительныхъ) страданiяхъ органовъ живота, при расстройствахъ пищеваренiя, привычной головной боли, при недостаткѣ и другихъ страданiяхъ мѣсячнаго отдѣленiя и нервовъ, при чахоткѣ въ первыхъ періодахъ болѣзни и т. д. Напротивъ того, верховая ѣзда вредна при болѣзняхъ сердца, большихъ сосудовъ, почекъ и мочевого пузыря, при значительныхъ расстройствахъ печени, селезенки и другихъ органовъ, при грыжахъ, водяныхъ грыжахъ, болѣзняхъ яичекъ, при рублоудiи и сѣмеченiи, при измѣненiи по-

ложенія матки, прямой кишки и т. д. Надобно также обращать вниманіе на ходъ лошадей (всего легче идутъ арабскія, лимузенскія, тяжелѣе несутъ англійскія, мекленбургскія), далѣе на родъ верховой ѣзды, и длинны или коротки стремена.

## V.

Тѣло и душа имѣють тѣснѣйшую связь между собою и находятся во взаимной зависимости. Потому и нельзя разграничить всѣхъ измѣненій вслѣдствіе однихъ или другихъ вліяній извнѣ и изнутри, будетъ-ли это что-либо вредное или лекарство. Мы знаемъ напр., что душа, случайное душевное благосостояніе человѣка, то благопріятствуютъ вліяніямъ вреднымъ, производимымъ болѣзнъ, или цѣлительнымъ обстоятельствамъ и дѣятелямъ (напр. нашимъ лекарствамъ), то затрудняютъ или даже совершенно уничтожаютъ ихъ дѣйствіе. Не менѣе того, напр. страдаетъ у насъ душа и тѣло отъ наркотическихъ веществъ, отъ злоупотребленія крѣпкихъ напитковъ, печали, скудной жизни, заботъ, между тѣмъ, какъ напр. отъ веселаго расположения духа выигрываютъ душа и тѣло, и даже совершаются лучше настоящія тѣлесныя отправленія (пищевареніе, дыханіе, питаніе). И чисто-душевные впечатлѣнія и состоянія могутъ существенно благопріятствовать къ выздоровленію больныхъ, и потому они довольно важны, чтобы пояснить тутъ вратцѣ ихъ образъ дѣйствія и употребленія. Вѣдь каждый врачъ видитъ ежедневно необходимость употреблять ихъ надлежащимъ образомъ и тѣмъ способствовать къ дѣйствию другихъ средствъ.

Но между этими душевными вліяніями и состояніями можно различать двѣ главныя группы. Въ одной главную роль играетъ наша душевная жизнь или дѣятельность въ тѣснѣйшемъ смыслѣ, какъ при размысленіи, внутреннихъ душевныхъ движеніяхъ и чувствахъ, страстяхъ и т. д. Въ другой наша душевная жизнь или дѣятельность возбуждается непосредственно или посредствомъ извнѣ весьма различными впечатлѣніями, которыя мы познаемъ нашими чувствами. Послѣднія-то и соединяютъ нашу душу тѣснѣе съ внѣшнею природою; ихъ терапевтическое употребленіе составляетъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ переходъ къ нашимъ обыкновеннымъ (матеріальнымъ) лекарствамъ. Потому мы и сважемъ напередъ нѣсколько словъ о нихъ.

1. Всѣ *чувственныя впечатлѣнія*, какъ онѣ передаются намъ зрѣніемъ, слухомъ, осязаніемъ и т. д., важны какъ лекарства, потому что ими можно то нѣсколько успокоивать, угнетать, то наоборотъ возбуждать, подкрѣплять, оживлять тѣло и душу. Именно этимъ они представляютъ почти всѣ степени нашихъ способовъ леченія.

*Успокоительно*, даже усыпительно дѣйствуетъ всякое монотонное, равномерное впечатлѣніе на чувства, также и совершенный недостатокъ возбужденія извнѣ (напр. темнота, тишина), особенно отсутствіе всякаго непріятнаго, тягостнаго чувства и ощущенія (боли, громкаго шума). Мы, какъ извѣстно, пользуемся ими почти ежедневно при возбужденіи и нервности, бессонницѣ, боли и т. д. Одно равномерное, нѣжное потирание кожи, отдѣльныхъ частей тѣла, пальцемъ можетъ успокоить, усыпить при болѣзненныхъ недугахъ, какъ напр. покачиваніе младенцевъ. А если продолжительно устремляютъ взоръ на какой-либо предметъ—будетъ-ли то, напр. мѣсто на стѣнѣ, пуговица, или стануть слѣдить глазами за движеніемъ руки магнетизера, — то это можетъ привести инако въ такое состояніе, что онъ болѣе не чувствуетъ боли, даже операции, а при обстоятельствахъ и уснетъ. Съ такою цѣлю мы довольно часто пользуемся темнотою и тишиною для лихорадочныхъ, при волненіи, безпокойствѣ, бессонницѣ. Подобнымъ образомъ дѣйствуютъ однообразные звуки, и ими можно пользоваться при обстоятельствахъ, напр. въ видѣ пѣнія, музыки, скучнаго разговора, однообразнаго чтенія или журчанія ручья и т. п.

Однимъ или другимъ образомъ возбуждительно дѣйствуетъ напротивъ всякое болѣе живое, сильное чувство и впечатлѣніе, особенно если оно доведено до боли, также быстрая переменна его. Сюда относится, напр. сильный, непріятный шумъ (пиленіе, царапаніе ногтями, комканіе шелка и т. п.), также живая музыка, которую часто пользуются, напр. при нервныхъ и душевныхъ страданіяхъ, унынїи и пр., чтобы развлечь, разсѣять мысли. Яркій свѣтъ, свѣтлые пѣтвта, сильный запахъ и вкусъ дѣйствуютъ подобнымъ же образомъ. И потому довольно часто употребляютъ нюхательныя средства (напр. эфирно-маслистыя вещества, нефть, амміакъ, уксусную кислоту, духи), при обморокѣ, слабости, истерическихъ и другихъ нервныхъ припадкахъ. Пряныя, горькія, острыя вещества дѣйствуютъ уже однимъ вкусомъ благоприятно на воображеніе многихъ больныхъ, такъ что они начинаютъ имѣть къ средству гораздо больше довѣрія. Наконецъ, сюда относятся самыя разнообразныя впечатлѣнія на осязаніе. Даже при параличѣ можетъ принести пользу уже одно щекотаніе подошвъ и ладони; несравненно чаще употребляютъ сухое треніе щетками и стеганіе, даже крапивою и т. п. при равнодушіи, сонливости, наркотизаціи и т. д. Сюда можно было бы отнести также разминаніе тѣла и теплоту.

2. *Душевно-нравственныя впечатлѣнія* въ тѣснѣйшемъ смыслѣ слова. Если отъ упомянутыхъ вліяній происходитъ болѣе или менѣе значительное дѣйствіе, уже потому, что отъ того наша душа настраивается однимъ или другимъ образомъ, то это должно происходить еще непосредственнѣе, когда такое вліяніе на мысли,

чувства, склонности и ощущенія, на воображеніе и представленіе проистекаетъ изъ этихъ послѣднихъ, какъ бы изнутри ихъ. Всегда и вездѣ много зависитъ отъ того, будетъ-ли больной предохраненъ отъ всего, что можетъ вредить его здоровью и исцѣленію, хотя бы то были возбуждающія мысли и впечатлѣнія (любовь или ненависть, гордость, высокомеріе, чрезмѣрное самоуваженіе) или болѣе угнетающія чувства (боязнь, заботы, уныніе, мученіе и т. п.). Между тѣмъ, какъ напр. одного надобно успокоить, сдѣлать равнодушнѣе, при обстоятельствахъ даже угнетать; другаго слѣдуетъ сколько возможно ободрить, побудить къ большей силѣ воли, привлекать его вниманіе къ одному или другому предмету. Наконецъ, у многихъ представляется главная задача отклонить вниманіе отъ собственныхъ чувствъ, мыслей, воображенія и возбудить другія полезнѣйшія, также пріятныя, утѣшительныя воспоминанія и т. д.

По этому должно обращаться съ больнымъ сообразно съ его особенностями.

## ТАБЛИЦА

**припадковъ, причиняемыхъ главнѣйшими растительными ядами.**

Я Д Ы.	Припадки отравленія.
<i>Аконитъ.</i>	Жженіе, чувство колотья, оглушеніе и шекотаніе языка, зѣва, чувство задушенія, колотье и онѣмѣніе наружныхъ частей тѣла, колика, душеніе, рвота, круженіе и боль головы, оглушеніе, слабость, обморокъ, спячка, бредъ, дрожь, судороги.
<i>Алкоголь, алкоголическіе напитки.</i>	Опьячѣніе, оглушеніе, глубокой сонъ, даже бредъ, припадки ярости, спячка, совершенная нечувствительность, судороги и т. д.
<i>Атропинъ.</i>	См. сонную одурь. Значительное расширеніе зрачка, трудное глотанье, головокруженіе, бредъ и т. д.
<i>Бѣлена. (Hyoscyamus). Грибы ядовитые.</i>	См. сонную одурь (только что глотательные органы менѣе поражены). Спустя нѣсколько часовъ послѣ употребленія тошнота, рвзъ въ кишкахъ, рвота, жажда, ознобъ, поносъ, судороги, упадокъ силъ, боль и круженіе головы, часто оглушеніе, спячка.
<i>Дурманъ. (Stramonium). Годъ и его препараты.</i>	См. сонную одурь.
<i>Камфора.</i>	Припадки мѣстнаго раздраженія, воспаления желудка (см. острия вещества); душеніе, рвота съ поносомъ, боль въ животѣ, дрожь, боязливость, одышка, потеря силъ, обморокъ. Жженіе въ горлѣ и желудкѣ, душеніе, рвота, задержаніе мочи, боль и круженіе головы, краснота лица, разстройство зрѣнія, сонливость, оглушеніе, бредъ, потеря сознанія, упадокъ силъ, одышка.

Я Д Ы́.	Припадки отравленія.
<i>Конопля.</i>	Возбужденіе, хмѣль, бредъ, сонливость, спячка, упадокъ силъ.
<i>Лавровыя вишни.</i>	См. синильную кислоту.
<i>Лютиковыя растенія.</i> ( <i>Ranunculus aeris, sceleratus и др.</i> ).	См. острыхъ вещества.
<i>Маковыя головки.</i>	См. опій.
<i>Молочай.</i> ( <i>Euphorbium</i> ).	См. острыхъ вещества.
<i>Морской лукъ.</i> ( <i>Scilla</i> ).	См. острыхъ вещества.
<i>Морфій.</i>	См. опій.
<i>Наперстянка.</i> (Также табакъ).	Тошнота, рвота, поносъ, упадокъ силъ, замедленіе, даже совершенное исчезаніе пульса, головокруженіе, слабость зрѣнія, бессонница, головная боль, дрожь, боязливость, потъ, частое мочеиспусканіе, обморокъ, судороги.
<i>Наркотическія вещества.</i>	Боль и круженіе головы, оглушеніе, расширеніе (или суженіе) зрачка, сонливость и оглушеніе, хмѣль, возбужденіе, бредъ (веселый ярострый), разстройство зрѣнія, потеря чувствительности, судороги, мышечный параличъ, спячка. При <i>остронаркотическѣхъ</i> ядахъ является еще душеніе и рвота, поносъ, рѣзь въ кишкахъ и боль въ желудкѣ, вообще припадки мѣстнаго раздраженія, даже настоящее воспаленіе желудка.
<i>Омегъ.</i> ( <i>Conium maculatum; scicuta virosa</i> ).	Тошнота, душеніе, жженіе въ горлѣ и желудкѣ, рвота, боль и круженіе головы, оглушеніе, бредъ, судороги, корча нижней челюсти, боязливость, одышка и т. д. (см. сонную одурь); всѣ эти нервныя припадки часто являются только спустя нѣсколько часовъ послѣ проглоченія.
<i>Опій.</i>	Онемѣніе, мышечная слабость, нечувствительность, оглушеніе, тяжесть и круженіе головы, сонливость, глубокой, спокойный сонъ, часто настоящая спячка, дыханіе слабо, едва замѣтно, пульсъ слабъ, кожа и холодна и влажна, зрачекъ большею

Я Д Ы.	Припадки отравленія.
<p><i>Острыя вещества, острые яды.</i> (Bryonia, chelidonium, euphorbium, gratiola, Jalappa, cantharides, pulsatilla, ranunculi, ricinus, sabina, cortex mezerei, toxicodendron и др.)</p> <p><i>Осенникъ.</i> (Colchicum).</p> <p><i>Сабадилльное съмя.</i> <i>Сабина.</i> <i>Сицильская кислота.</i> (Щавельный потасый, лавровый вишни, горький миндаль).</p> <p><i>Сквила.</i> <i>Сонная одурь.</i> (Также бѣлена, дурманъ и др.).</p>	<p>частью сужены, лицо спокойно, опало, блѣдно, мышцы (sphincteres) расслаблены, бредъ незначителенъ, или его вовсе нѣтъ; наконецъ хрипѣніе, параличъ.</p> <p>Острый, жгучій вкусъ, жженіе, щекотаніе во рту и горлѣ, рѣзь въ кишкахъ, душепіе, рвота, икота, жженіе, поносъ (часто кровавистый), пученіе живота, болѣзненное мочеиспусканіе, боязливость, одышка, дрожь, судороги, корча нижней челюсти, обморокъ. Часто мозговые припадки, какъ головокруженіе, бредъ, оглушеніе, расширеніе или сокращеніе зрачка.</p> <p>Тошнота, боль въ горлѣ, около желудка, рѣзь въ кишкахъ, рвота, поносъ, головокруженіе, дрожь, мышечная слабость, судороги, одышка, упадокъ силъ (см. аконитъ).</p> <p>См. аконитъ. См. острия вещества.</p> <p>Весьма горька; смерть часто является въ нѣсколько минутъ. Впрочемъ слюнотеченіе, головокруженіе, оглушеніе, слабость, расширеніе зрачка, тошнота, головная боль, боязливость, короткое дыханіе, шумное сокращеніе сердца; вскорѣ потомъ высокая степень слабости, исчезаніе пульса, сознанія и чувствительности, подергиваніе, судороги, столбнякъ. Испареніе кожи и дыханіе часто пахнутъ горькимъ миндалемъ.</p> <p>См. острия вещества.</p> <p>Чувство щекотанія, сухости и стягиванія зѣва, трудное глотаніе, рвота, часто и поносъ, возбужденіе, боль и круженіе головы, значительное расширеніе и неподвижность зрачка, слѣпота или неясное, превратное зрѣніе, подергиваніе личныхъ мышцъ, анестезія — даже соединительной оболочки глазъ; бессонница, бредъ, болтливость, бредъ (веселый, яростный); потомъ заиканіе, безмолвіе, оглушеніе, сонливость, упадокъ силъ, даже обморокъ и т. д. Отъ</p>

Я Д Ы.	Припадки отравленія.
<p><i>Спорынья.</i> (<i>Secale cornutum</i>).</p>	<p>отравленія оіемъ эти припадки отличают-ся значительнымъ расширеніемъ зрачка, сильнымъ бредомъ, отсутствіемъ сповойнаго, глубокаго сна.</p> <p>Тошнота, щекотаніе зъва, рѣзь въ кишкахъ, душеніе, рвота, поносъ, боль и круженіе головы, расширеніе зрачка, оглушеніе, упадокъ пульса и силъ, зудъ въ пальцахъ и кожѣ, боязливость, короткое дыха-ніе, спячка.</p>
<p><i>Стрихнинъ.</i> <i>Табакъ.</i> <i>Хуррусъ.</i> <i>Цълибуха</i> (Также стрихнинъ, бруцинъ, ложная ангустира, рыболовныя ягоды, пикротоксинъ, игватъевъ бобъ, японскіе стрѣльные яды).</p>	<p>См. цълибуху. См. наперстянку. См. коноплю.</p> <p>Горькій вкусъ, тошнота, иногда рвота, боязливость, напряженіе затылка, нижней челюсти, потомъ корча ея, судорожное сотрясеніе или болѣзненное дрожаніе конечностей, періодическій столбнякъ и мышечная жесткость, всегда со свободными промежутками; отъ прикосновенія, легкаго сотрясенія и т. д. происходятъ новые судорожныя припадки.</p>
<p><i>Чемерица.</i> (<i>Helleborus, veratrum</i>). <i>Щавелевая кисло-та, щавелекислая соль</i> (щавелекислые соли).</p>	<p>Сознаніе и зрачекъ не поражены (или весьма рѣдко). Потомъ судороги дыхательныхъ мышцъ, одышка; наконецъ продолжительный столбнякъ, задушеніе.</p> <p>См. аконитъ.</p> <p>Жженіе во рту, горлъ и желудкѣ, рвота (часто кровавистыми веществами), поносъ (иногда), слабость, исчезаніе пульса и сокращенія сердца, холодный потъ, сонливость, одышка. иногда совершенное оглушеніе, столбнякъ.</p>
<p><i>Эриотинъ.</i></p>	<p>См. спорынья: Головокруженіе, рвота, слабость и т. д.</p>



**ОПИСАНИЕ**

**ОТЕЧЕСТВЕННЫХЪ ЦѢЛЕБНЫХЪ РАСТЕНІЙ,**

**.РАСПОЛОЖЕННЫХЪ АЛФАВИТНЫМЪ ПОРЯДКОМЪ.**

Описание отечественныхъ цѣлебныхъ растений, расположенныхъ алфавитнымъ порядкомъ \*).

---

А.

\* **Acer pseudo-platanus L.** и **Ac. platanoides** (кленъ; некленъ; наклонъ.—*Weisser. Ahorn.—Erable*). Эта древесная порода встрѣчается въ Россіи въ особомъ изобиліи, по гористымъ берегамъ Волги и Камы, на Уральскомъ хребтѣ и въ большой части южной Россіи. Въ молодыхъ побѣгахъ и листьяхъ клена заключается сладкій сокъ, которому многими врачами приписываются мочегонныя и противу-гнилостныя свойства.

Отваръ молодыхъ побѣговъ, по отзыву Кашинскаго, \*\*) можетъ быть употребляемъ какъ питье съ пользою отъ внутреннихъ завазовъ, противу желтухи, цынготной болѣзни и грудныхъ припадковъ. Для приготовленія изъ нихъ съ этою цѣлью отвара, на фунтъ воды кладутъ двѣ горсти молодыхъ листочковъ или сочныхъ побѣговъ и за тѣмъ парятъ ихъ въ горшечкѣ до тѣхъ поръ, пока въ немъ останется не болѣе 8 унцовъ воды (т. е. испарится одна треть оной). По свидѣтельству того же автора не менѣе благотѣльно дѣйствуетъ противу цынготной болѣзни и ежедневное употребленіе, внутрь по бутылкѣ въ день, кленоваго сока, который истекаетъ весною отъ произведенія надрѣзовъ на корѣ кленовыхъ деревъ. Какъ наружное средство, кленовыя листья и побѣги употребляются, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи, въ слѣдующихъ случаяхъ, а именно: а) при воспаленіи глазъ, сваривъ ихъ въ виноградномъ винѣ, прикладываютъ оныя къ больнымъ глазамъ; б) въ болѣзняхъ печени и селезенки, противъ коихъ указываютъ какъ на испытанное средство на припарки изъ мелко-рубленныхъ кленовыхъ зеленыхъ листьевъ и молодыхъ побѣговъ, сваренныхъ съ водою и уксусомъ. Щелокъ-же пережженой кленовой коры, рекомендуемый Кашинскимъ, какъ средство уничтожающее струщя и язвы на головѣ, судя по опытамъ, оказывается не дѣйствительнымъ.

---

\*) Знакомъ \* означены растенія встрѣчаемыя въ дикорастущемъ состояніи въ губерніяхъ Московской и С. Петербургской.

\*\*) Автора «Русскаго Лечебнаго Травника».

Изъ кленоваго сока можно приготовить здоровый и пріятный напитокъ, полезный для страдающихъ болѣю въ поясницѣ и цынготною болѣзнію. На три или четыре кружки кленоваго сока владуть 1 фунтъ чистаго меду и прибавляютъ къ нему для вкуса нѣсколько лимонной корки и гвоздики, кипятятъ его около часу, не забывая снимать при этомъ съ него пѣну. За тѣмъ, снявъ жидкость съ огня и давъ остыть, ее заквашиваютъ тремя столовыми ложками свѣжихъ дрожжей; послѣ чего остается только дать перебродить ей и сливъ съ поддонковъ чистую жидкость разлить ее по бутылкамъ, которыя засмоливъ слѣдуетъ сохранять въ погребѣ. Въмѣсто меду можно употреблять также сахаръ (въ томъ же количествѣ) и подслащать этотъ напитокъ изюмомъ. *(Кл. кленовый)*

Зеленый листья и стебли, при обработкѣ ихъ квасцами, даютъ очень хорошую желто-лимонную краску, годную для крашенія шерсти и полотень.

**Achillea.** (*гулявица, тысячелистникъ. — Schafgarbe. — La mille-feuille*). Изъ встрѣчаемыхъ въ Россіи видовъ гулявицы имѣютъ значеніе во врачбномъ отношеніи. *Ach. nobilis* L. (*гулявица благовонная; тысячелистникъ красноцвѣтный; пижма; душистая греча*); \* *Ach. millefolium* L. (*гулявица тысячелистная; рябичка; тысячелистникъ; деревей; кровавикъ; кашка; растиральникъ*) и \* *Ach. ptarmica* L. (*гулявица чехотная; чехотная трава; кивекъ*).

Всѣ три названные вида гулявицы, первый изъ коихъ встрѣчается въ южной Россіи, а два послѣднія на всемъ ей протяженіи, отличаются почти тождественными цѣлебными свойствами, зависящими отъ экстрактно-смолистаго начала, заключающагося въ наибольшемъ количествѣ въ листьяхъ и корняхъ и летучаго масла, отзывающагося камфорою, сосредоточеннаго въ цвѣтахъ.

По свидѣтельству Гмелина, въ Сибири употребляютъ отваръ гулявицы противъ кровавой мочи и маточнаго кровоточенія. Итальянскіе крестьяне употребляютъ его противъ перемежающейся лихорадки, также какъ и для способствованія геморроидальныхъ кровоточеньямъ и мѣсячному отдѣленію. Ришаръ рекомендуетъ отваръ гулявицы, какъ превосходное средство противъ скарлатины, а нѣкоторые другіе врачи указываютъ на него, какъ на дѣйствительное лекарство, въ завалахъ желудка, судорожныхъ боляхъ, послѣ родовъ и застарѣлыхъ боляхъ. Выжатый сокъ изъ свѣжаго растенія, по отзыву Шомеля, чрезвычайно полезенъ въ чахоткѣ и внутреннихъ язвахъ. Кашинскій упоминаетъ, кромѣ того, о употребленіи отвара корня гулявицы чехотной (*ach. ptarmica*), для поласканія въ зубной боли и прикладыванія толченой травы гулявицы или выжатаго изъ нея сока для заживленія ранъ и язвъ.

Во всѣхъ упомянутыхъ случаяхъ употребленія отвара гулявицы, гораздо предпочтительнѣе, пользоваться крѣпкимъ настоемъ, для полученія котораго на 16 унцевъ кипятку кладутъ два унца сухой травы гулявицы съ верхушками, и за тѣмъ, давъ постоять ему около  $\frac{1}{2}$  часа въ закрытомъ сосудѣ принимаютъ по чайной чашкѣ въ день.

Въ аптекахъ готовятъ: экстрактъ гулявицы (*extractum millefolia*), противное горькое вещество, употребляемое теперь только для образованія пилюльныхъ массъ, и ахиллеинъ (*achillein*) или вытяжку, приготовленную съ водою и спиртомъ, которую немногіе врачи прописываютъ въ перемежающейся лихорадкѣ.

**\*Aconitum nappeilus и neomontanum.** (*Волкобой; волчій корень; борецъ; преградъ; прострѣль; прикрывш.*—*Wolfs-Eisenstein.*—*The-tour*). Растетъ въ южныхъ краяхъ Россіи, по Волгѣ и въ Сибири; въ средней Россіи разводится въ садахъ.

Изъ всѣхъ породъ лютиковъ, дѣйствуетъ всего сильнѣе волкобой; всѣ части котораго имѣютъ противно-горькій, остро-жгучій вкусъ и при сильныхъ приемахъ производятъ признаки отравленія. Составныя части листьевъ, суть аконитинъ (алколоидъ), особая (аконитовая) кислота, летучее острое вещество, камедь, бѣлокъ, вытяжныя и смолныя вещества; въ корнѣ-же кромѣ аконита содержится жирное масло, крахмалъ и пр.

Мѣстно-свѣжій корень или листья волкобой дѣйствуютъ болѣе или менѣе раздражающимъ образомъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, при жеваніи производятъ особенную нечувствительность, т. е. чувство оглушенія, притупленія и колотья въ пригосновенныхъ частяхъ, наприм. въ языкѣ, губахъ, которое продолжается нѣсколько часовъ.

Подобныя ощущенія, по видимому, могутъ происходить отъ втиранія сока или настойки въ кожу. Введенный въ глазъ, аконитъ, говорятъ, обыкновенно суживаетъ зрачекъ.

Принятый въ *малыхъ приемахъ*, аконитъ раздражаетъ глотательные органы, производитъ щекотаніе, даже жженіе въ зѣвѣ, или чувство опуханія языка, язычка и неба, съ постояннымъ побужденіемъ къ глотанію. Далѣе являются также особенныя чувства колотья и ползанія мурашекъ, теплоты, тупости въ конечностяхъ и кожѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ умножается отдѣленіе мочи, и является, смотря по обстоятельствамъ, также потъ. При нѣсколько высшей степени дѣйствія, раздраженіе пищеварительныхъ путей обнаруживается яснѣе: происходитъ душеніе, рвота, и всѣ мѣстныя и отдаленныя ощущенія достигаютъ болѣе высокой степени; часто отравленные чувствуютъ какъ бы электрическіе удары по всему тѣлу. Кромѣ того являются головокруженіе, видѣнія, искры въ глазахъ, головная боль, даже оглушеніе, дрожаніе конечностей, значительная слабость съ нечув-

ствительностью кожи и наружных частей тѣла. Теплота тѣла уменьшается, пульсъ становится малымъ, неполнымъ, и кожа часто покрывается холоднымъ потомъ. Зрачекъ обыкновенно суживается и дѣлается неподвижнымъ.

Отъ *большихъ приѣмовъ* упомянутые припадки достигаютъ болѣе высокой степени. Кромѣ рвоты, иногда и поноса, рѣзи и жгленія происходитъ скоро и ясно значительное разстройство нервной жизни. Является чувство высшей слабости мышцъ, состояніе, похожее на обморокъ; дѣятельность сердца часто прекращается совершенно, такъ что пульсъ становится едва ощутительнымъ. Иногда являются бредъ, оглушеніе, сонливость, наконецъ судороги, сильная боязливость, стѣсненіе груди, короткое дыханіе; но иногда эти припадки не происходятъ, и столь же непостоянно, по видимому, суженіе зрачка. Если, вообще, наступаетъ смерть, то она обыкновенно является уже спустя нѣсколько часовъ.

Находящійся въ аптекахъ *экстрактъ аконита* болѣею частью мало дѣйствуетъ, что уже нашли Lombard въ Женевѣ, Orfila и др. между тѣмъ какъ экстрактъ, приготовленный предумотрительнымъ выпареніемъ свѣжаго сока, и еще болѣе алкоголическая (смолистая) вытяжка, дѣйствуетъ весьма сильно (см. дальше).

Физиологическія дѣйствія аконита уже указываютъ на случаи употребленія его, и по нимъ уже можно догадаться, что аконитъ играетъ роль только при извѣстныхъ нервныхъ страданіяхъ, и то преимущественно при такихъ, которыя сопровождаются сильною болью. Его такимъ образомъ употребляютъ:

1) При невралгическихъ, вообще болѣзненныхъ состояніяхъ, которыя составляютъ болѣе или менѣе чистыя нервныя страданія, т. е. не обусловливающіяся воспалительнымъ дѣйствіемъ подверженныхъ частей, нервного влагаллица или окружающихъ частей, не механическимъ давленіемъ и т. п. Аконитъ такимъ образомъ употребляли—и то преимущественно только *снаружи*—противъ невралгіи по направленію отдѣльныхъ вѣтвей пятого мозгового нерва (prosoalgia и др.), противъ нервной боли лица (tic douloureux), зубовъ, суставовъ (arthralgia), поясницы (lumbago), бедра (ischias), также при зудѣ и лишаяхъ. Какъ въ этихъ случаяхъ аконитъ нѣрѣдко оказывается полезнымъ, то понятно, что онъ употреблялся также противъ ревматической и артрической боли, при подобныхъ обстоятельствахъ и съ тѣмъ же успѣхомъ, какъ осенникъ (colchicum); также противъ боли и невралгіи, которыя нѣрѣдко являются у сифилитическихъ лицъ (dolors osteocopi) и теперь часто приписываются хроническому воспаленію воловнистыхъ тканей, надкостной плевы и даже костей; наконецъ, противъ истерическихъ и удушливыхъ страданій.

Нѣтъ сомнѣнія, что отъ крѣпкихъ препаратовъ аконита и

надлежащихъ пріемовъ ихъ, боль и т. д. нерѣдко значительно облегчается во всѣхъ этихъ случаяхъ, даже можетъ вовсе исчезать въ теченіе 1—2 часовъ, хотя иногда нельзя рѣшить, произошло-ли улучшеніе именно отъ дѣйствія аконита или можетъ быть отчасти отъ размѣрнаго (ритмическаго) хода боли и другихъ вліяній. Съ прекращеніемъ боли, зуда, жженія и т. д., которыя часто поддерживаютъ и усиливаютъ возбужденіе и лихорадку, могутъ исчезать также эти послѣднія припадки. Нѣкоторые полагаютъ, что аконитъ полезенъ тѣмъ, что какъ бы отвлекающимъ образомъ умножаетъ мочу, испарину и потъ или испраженіе. Lombard и др. однако показали, что боль можетъ прекращаться при употребленіи этого средства, даже и когда упомянутыя дѣйствія не происходятъ; нерѣдко, напротивъ, существующій потъ совершенно прекращается отъ употребленія этого средства.

Подобно всѣмъ средствамъ этого рода, и аконитъ часто полезенъ при упомянутыхъ алгіяхъ и страданіяхъ, гдѣ другія остались безъ успѣха.

2. Какъ мочегонное средство противъ брюшной и другихъ видовъ водянки; также какъ кровогонное средство при угнетенномъ отдѣленіи мѣсячныхъ кровей.

3. При гипертрофіи сердца и расширеніи начальственной артеріи (Fleming, Lombard), потому что аконитъ, по крайней мѣрѣ въ большихъ пріемахъ, производитъ успокоительное, угнетающее дѣйствіе на дѣятельность сердца и кровообращеніе.

Вообще аконитъ, по видимому, довольно обманчивое, невѣрное средство, всѣ его препараты ненадежны, дѣйствія его не постоянны какъ у здоровыхъ, такъ и у больныхъ, и потому въ настоятельныхъ случаяхъ никогда не должно полагаться на него съ увѣренностію.

изъ аконита приготовляются слѣдующія препараты:

1. *Extractum Aconiti*, получается водянымъ вытяженіемъ травы съ прибавленіемъ виннаго спирта; имѣетъ вытяжную консистенцію, протпвный запахъ, почти подобно кошачей мочѣ, и острый вкусъ. Принимаютъ по нѣскольку разъ до 6—12 гр. въ день, всего лучше въ питьюляхъ, напр. съ порошокомъ солодковаго корня, часто въ соединеніи съ бобаятною смолою, желтою сюрмяною сѣрою и опіемъ; также въ порошокъ или растворенный въ настойкахъ.

Снаружи этотъ экстрактъ часто употребляется противъ невралгическихъ, весьма болѣзненныхъ ревматическихъ, ломотныхъ мѣстныхъ страданій, въ видѣ мази, намазанной на пластырь, или растворенной въ водѣ, ароматныхъ наливкахъ. Иногда вти-

раютъ экстрактъ, смѣшанный съ опиѣмъ или морфіемъ и крахмаломъ, помощью слюны, напр. при личной или зубной боли.

2. *Tinctura Aconiti* получается настаиваніемъ травы съ виннымъ спиртомъ; имѣетъ остро-противный вкусъ и представляется одинъ изъ дѣйствительнѣйшихъ препаратовъ. Употребляется снаружи для втиранія. Turbull пользовался настойкою, приготовленною изъ свѣжаго корня, которая можетъ дѣйствовать несравненно сильнѣе. Fleming вымачиваетъ корень равными частями по вѣсу виннаго спирта четыре дня, потомъ выжимаетъ и прибавляетъ столько виннаго спирта, чтобы все имѣло вѣсъ въ 24 унціи.

При употребленіи этого средства первыя пути должны быть чисты, и хорошимъ признакомъ служить, ежели въ скорости оказывается равномерный по всему тѣлу потъ, или только въ страдающихъ частяхъ тѣла, за этимъ скоро и боли утихаютъ; однако, для отвращенія отрыжекъ, совѣтуемъ продолжать еще нѣсколько времени; но ежели, при первыхъ приѣмахъ, появится головокруженіе, тоска и изнурительный потъ, то въ такихъ обстоятельствахъ слѣдуетъ тотчасъ прекратить употребленіе онаго, и, спустя нѣсколько времени, давать отъ  $\frac{1}{2}$ —1 гр. ежедневно въ ночи, исподоволь умножая приѣмы; или въ видѣ эфирныхъ капель. Если же въ теченіе 14-ти дней не послѣдуетъ желаемое дѣйствіе, то это приписать должно или худому приготовленію, или долговременному храненію экстракта, который болѣе года не можетъ быть дѣйствителенъ; ибо по отдѣленіи своей фосфорно-известковой соли лишается и всего дѣйствія. Въ хроническихъ ломотахъ, костныхъ, ночныхъ боляхъ, и разнородныхъ застарѣлыхъ сыпяхъ, средство это гораздо съ большею пользою можно употреблять, нежели въ тѣхъ болѣзненныхъ припадкахъ, которые еще не такъ застарѣлы. Нужно также наблюдать, чтобы не было при томъ полнокровія, или стеническаго состоянія, сопровождаемаго воспаленіемъ; а потому и въ летучей или непостоянной ломотѣ не годится. Слишкомъ долгое употребленіе ослабляетъ желудокъ и приводитъ чувства въ онемѣніе.

Прострѣльный лютикъ, или борець, врачевными своими силами, можетъ замѣнять не только бакаутъ—*guaiac. offic.*, но и ядовитое дерево сѣверной Америки, назыв. *rhus radicans, et g. toxicodendron. l.*, которое наши врачи одобряютъ въ нервныхъ параличахъ, расслабленіяхъ и весьма упорныхъ ломотахъ.

† \**Acorus Calamus L.* (*Ирѣ или аиръ*; *кочетикъ*; *сабельникъ*; *лепешникъ татарскій*.— *Gemeiner Calmus*.— *Jonc odorant*). Ростетъ въ стоячихъ и медленно текучихъ водахъ. Корень этого растенія обладаетъ возбуждающими и потогонными свойствами, зависящими отъ заключающагося въ немъ экстрактивно-горь-

ваго начала, соединеннаго съ острымъ летучимъ масломъ и фосфорною или содекиислою щелочью. Запахъ его ароматическій, а вкусъ—пряно-острый и горьковатый. Ирный корень употребляется съ пользою въ слѣдующихъ болѣзняхъ, а именно: въ цинготной расслабленности, разстройствѣ пищеваренія, застарѣлой комотѣ суставовъ, гнилости десенъ и шатаніи зубовъ, застойной водянкѣ и запорѣ мочи, блѣдной немощи, бѣляхъ и слнзотеченіи изъ дѣтородныхъ частей; въ дѣтской сухоткѣ, золотухѣ и англійской болѣзни. Кромѣ того, нѣкоторые врачи одобряютъ его употребленіе въ перемежающихся лихорадкахъ и гнилой горячкѣ, соединенныхъ съ большою слабостію нервной системы и пятнами, причеиъ совѣтуютъ употреблять его вмѣстѣ съ корнемъ валерьяны. Сверхъ того, ирный корень долженъ быть названъ однимъ изъ вѣрнѣйшихъ средствъ противъ глистовъ у дѣтей, а присыпка изъ онаго, съ примѣсью порошка казацкаго можжевельника (*jupiregus sabina*), лучшею для присыпанія костобдныхъ язвъ. Крѣпкимъ отваромъ чернаго корня полезно промывать цинготныя гнилыя язвы, рытаки и венерическія язвы. Наконецъ, по отзыву Пленка, ежедневное растираніе груди, спины и живота золотушныхъ и страдающихъ рахтизмомъ дѣтей отваромъ ирнаго корня, смѣшаннаго съ равною частію слабаго виннаго спирта, имѣетъ на нихъ самое благотѣльное вліяніе.

Внутри ирный корень употребляется: 1) въ порошокъ отъ 20-ти гранъ и болѣе, до полудрагмы, три раза и болѣе; 2) въ видѣ каши, для приготовления которой одну или двѣ драгмы ирнаго корешка смѣшиваютъ съ медомъ. Въ этой формѣ ирный корень даютъ дѣтямъ по чайной ложкѣ нѣсколько разъ въ день; въ лихорадкахъ и горячкахъ его лучше всего употреблять въ видѣ отвара или наливки, приготовляемой слѣдующимъ образомъ: полтора унца толченаго корня завариваютъ 16-ю унцами горячей воды и, прокипѣтивъ ее затѣиъ одинъ разъ въ закрытомъ сосудѣ, фильтруютъ и, давъ охладиться ей, прибавляютъ на 12 унцій этой жидкости 4 драгмы гошманскихъ капель. Принимаютъ по двѣ столовыхъ ложки черезъ каждыя два часа. Снаружи ирный корень употребляется для присыпаннаго и зубнаго порошка (съ хинною коркою, дубовою корою, миррою и опиемъ) или для примочекъ; изрѣдка также для ваннъ (по нѣсколькку унцій на ванну), при золотухѣ и проч.

Въ аптекахъ изъ ирнаго корня приготовляются: а) *ирныя конфекты* (*confecio calami*), исправляющіе пищевареніе и уничтожающіе дурной запахъ изъ рта; б) *ирное масло* (*oleum calami* (*acthericum*)) зеленовато-желтаго цвѣта, употребляемое каплями (съ сахаромъ, эспромъ, нефтью), впрочемъ весьма рѣдко, такъ же какъ и с) *ирная настойка* (*tinctura calami*), имѣющая всѣ свойства желудочнаго средства.



Ирный корень, по своей пряности и дѣйствию, можетъ замѣнять собою всѣ такого же свойства иноземныя ароматныя средства, а именно: имбирь, калганъ, перецъ, гвоздику, корицу, мушкатный орѣхъ и т. п. Татары, при недостаткѣ чистой воды, пьютъ болотную воду, примѣшивая въ нее порошокъ ирнаго корня, который, въ особенности съ примѣсю къ нему угольнаго порошка, очищаетъ вонючую воду и дѣлаетъ ее годною и безвредною для питья.

\* *Actaea Spicata* (воронецъ; христоворова трава. — *Christophs craut.* — *Actée*). Корень этого растенія употреблялся прежде какъ аконитъ, и дѣйствіе его, повидимому, сходно съ дѣйствіемъ этого послѣдняго. Растетъ воронецъ въ тѣни лѣсовъ всей средней Россіи. Дѣйствуетъ хотя слабѣ аконита, но тѣмъ не менѣе ядовито.

*Adiantum-capillus-veneris* L. (Женеволосная трава. — *Fraen-haar.* — *Capillaire de Montpellier*). Слабый ароматъ, издаваемый листьями этой породы папоротника, въ особенности при отварѣ ихъ кипяткомъ, сообщаетъ этому послѣднему пріятный вкусъ, что, по всей вѣроятности, и заставило приписать женеволосной травѣ цѣлый рядъ цѣлебныхъ свойствъ, изъ числа которыхъ, какъ на дѣйствительно принадлежащія ей, можно упомянуть только о томъ, что водная наливка женеволосной травы можетъ быть употребляема съ пользою внутрь для ослабленія сильнаго сухаго кашля.

*Aesculus hypocastanum* L. (Каштанъ дикій или конскій. — *Gemeine Roskastanie.* — *Marronnier d'Inde*). Встрѣчается въ Россіи въ аклиматизированномъ состояніи въ садахъ, въ особенности часто въ прибалтійскихъ губерніяхъ.

Кора этого дерева (отъ экземпляровъ среднихъ лѣтъ) содержитъ въ себѣ вяжущее и горькое начало, соединенное съ малымъ количествомъ слизи и смолы; запаху не имѣетъ, вкусъ пріятно-горькій, вяжущій. Свойства ея укрѣпляющія и противулихорадочныя.

По мнѣнію многихъ врачей, какъ-то: Губеланда, Горна, Муррая и др., ее можно употреблять съ успѣхомъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда употребляется привозная хинная кора, которую она, по ихъ отзыву, можетъ замѣнить безъ всякаго ущерба.

Плоды дикихъ каштановъ, обжариваемые и вмѣсто кофе употребляемые. *Губеландъ* одобряетъ въ астеническихъ кровотеченіяхъ, особенно маточныхъ и почечуйныхъ, въ долговременныхъ поносахъ, теченіи бѣлей, мокротномъ почечуѣ, застарѣломъ стеноловомъ теченіи (*gonorrhœa habitualis*), въ мокротномъ кашлѣ и чахоткѣ того же рода (*phthisis pituitosa*).

Внутрь корка дикаго каштана дается въ порошокѣ, до полторы

драхмы, каждые 4 часа. *Бурдаж* совѣтуетъ чаще давать, только въ малыхъ приемахъ, и съ примѣсью какой-нибудь пряности, наприм. каждый часъ по 10 грановъ, прибавляя равноеколичество касатика, или горечавки (*rad. ascori calami*, *v. gentiana l.*). Въ упорныхъ трясучкахъ, во время перемежки, давать большому въ раздѣленныхъ приемахъ: отъ  $\frac{1}{2}$ —1 унціи съ бѣлымъ виномъ; гдѣ же корка эта производитъ рвоту, или слабитъ, прибавлять ароматную настойбу, или гофмановы капли, *Цейрилъ* давалъ ее въ видѣ противулихорадочной кашки: смѣшивая 1 унцію порошка каштановой корки съ 1 драхмою травы дикаго аврана (*gratiola offic.*), столько же поташа (*sub-carbonas potassa*) и меда, на приемъ въ бытности лихорадки (*arurexia*) по 1 драхмѣ, каждые 3 часа. Снаружи крѣпкій отваръ каштановой коры служить наилучшею укрѣпляющею и противугниlostною примочкою, для которой полагается 3 унціи на 2 фунта воды, отвариваемой, пока останется половина жидкости; къ этому отвару можно прибавлять винный спиртъ, мирровую настойку (*inctura myrrha*), и пр. Для внутренняго же употребленія, полагается отъ 1— $\frac{1}{2}$  унціи коры, на 12 или 16 унцій воды, отвариваемой до половины. Отваръ этотъ гораздо дѣйствительнѣе съ прибавленіемъ ароматной настойки (*inctura aromatica*). На приемъ дается по малой чайной чашкѣ. Обжаренные и крупно истолченные плоды, даются въ наливкѣ вмѣсто кофе, полагая полторы унціи этого порошка на 6 чайныхъ чашекъ горячей воды, которую, вскипятивъ нѣсколько разъ и процѣдивъ, принимать по утру и въ вечеру по 2 чашки.

Кору снимать должно съ вѣтвей ни слишкомъ старыхъ, ни слишкомъ молодыхъ деревьевъ, и рачительно отдѣлять ножемъ внутри пристающее бѣловатое лыко или заболонь — которая уменьшаетъ дѣйствіе ея. Корка древесная и плодовъ, вареніемъ въ водѣ съ малымъ примѣсомъ поташа, даетъ темно-цвѣтную краску; съ желѣзнымъ купоросомъ темно-желтую, съ квасцами красноватую. Вареными плодами, въ недостатокѣ корма, можно кормить домашній скотъ; оныя же употребляютъ вмѣсто мыла, для бѣленія полотна; дѣлали также опыты къ полученію воска и крахмала, годнаго для переплетчиковъ. Мука каштановая годится и для выдѣлыванія водки. Плоды дикаго каштана служатъ овцамъ и козамъ наилучшимъ предохранительнымъ и цѣлительнымъ средствомъ отъ водяной болѣзни, также отъ кашлю. Каштановою мукою, смѣшанною съ отрубями, отвармливаютъ домашнихъ птицъ.

\* *Aethusa cynapium L.* (*Собачья петрушка; собачница петрушечная; омегъ малый. — Garten-gleisse. — La petite ethuse*). Растетъ по садамъ и огородамъ всей средней полосы Россіи. По своей наружности она представляетъ чрезвычайное сходство съ

петрушкою, употребляемую для приправы кушанья, впрочемъ ее уже легко отличить по одному тому, что ея листья, сравнительно съ листьями петрушки, болѣе темнаго цвѣта и при растираніи ихъ между пальцами издають характеристическій непріятный, тошнотворный запахъ. По своимъ свойствамъ она причисляется къ веществамъ разрѣшающимъ. Собачья петрушка чрезвычайно ядовита и при томъ, по замѣчанію нѣкоторыхъ натуралистовъ, корневые листы ея отличаются напядовитостію весною. Лучшими противудіями противъ отравленія ею служатъ рвотныя и растительныя кислоты, какъ-то, уксусъ и лимонный сокъ, разбавленный водою.

По ядовитости этого растенія внутреннее его употребленіе не должно быть допускаемо. Снаружи свѣжую толченую собачью петрушку или въ видѣ припарокъ прикладываютъ на твердые паховыя и золотушныя опухоли железъ. Кромѣ того, иногда, какъ хорошее разбивающее затвердѣлыя опухоли и утоляющее боль могутъ служить припарки изъ собачьей петрушки, сваренной съ молокомъ и мыломъ.

\* *Agaricus L.* Къ этому роду грибовъ принадлежитъ весьма большое количество видовъ, изъ числа которыхъ нѣкоторые чрезвычайно ядовиты. Изъ этихъ послѣднихъ мы упомянемъ только пмѣющихся въ медицинскія значенія, а именно: \* *Agaricus albus L. Boletus purgans, Pers.* (бѣлая губка), растущій на листовницѣхъ и *Agaricus Muscarius L.* или \* *Amanita muscaria* (мухоморъ). Ядовитыя свойства грибовъ зависятъ отъ остраго, летучаго вещества, улетучивающагося при высушиваніи и вареніи; кромѣ сего, впрочемъ, въ нѣкоторыхъ видахъ ихъ заключаются другое постоянное ядовитое начало—аманитинъ, дѣйствующее подобно остро-наркотическимъ и производящее боль въ животѣ, рвоту, жажду, головокруженіе, судороги, оглушеніе, бредъ и въ крайнихъ случаяхъ смерть, наступающую черезъ два или три дня по отравленіи. Лучшее противудіе противъ отравленія пми—рвотное или сильныя слабительныя, а также внутреннее употребленіе оливковаго масла и уксуса. Мухоморъ одобрается для употребленія внутрь въ судорогахъ, падучей болѣзни и параличныхъ припадкахъ, а также въ затверденіи гортанныхъ железъ и зобахъ (*Strumac*). Снаружи, нѣкоторые врачи совѣтуютъ присыпать порошокомъ мухомора упорныя злокачественныя язвы, антоновъ огонь и гноеватыя, глазныя прыщи.

Для употребленія мухоморовъ съ лечебною цѣлію простолюдины, собравъ ихъ въ достаточномъ количествѣ, крошатъ и наполняютъ ими бутылку, которую закупоривъ затѣмъ зарываютъ въ навозъ. По прошествіи нѣкотораго времени они выпускаются въ слизистую жидкость, служащую для натиранія

ошмельхъ и пораженныхъ параличемъ членовъ. Иногда въ этой слизи, по словамъ Кашинскаго, прибавляется равное количество виннаго спирта. Внутрь дается истертый корень мухомора, въ видѣ порошка отъ 10—20 гранъ съ уксусомъ, 2 или 3 раза въ день. Снаружи этотъ же порошокъ употребляется для присыпки. Для приготовления упомянутаго порошка, собравъ осенью часть корня находящуюся въ землѣ, очистивъ и высушивъ, ее растераютъ въ порошокъ и сохраняютъ въ сухомъ мѣстѣ въ плотнозакупоренномъ стеклянномъ сосудѣ. Кашинскій утверждаетъ, что ему удалось исцѣлить паучую болѣзнь смѣсью изъ  $\frac{1}{2}$  золотника высушеннаго корня мухомора, 2 золотниковъ вишневаго клея и 2 лотовъ медоваго уксуса (oximel), разведенныхъ 12 лотами чистой воды. Это лекарство давалось имъ больному въ теченіе мѣсяца, по столовой ложкѣ черезъ каждые три часа. Другой названный нами видъ: *Ag. albus*, дается въ большихъ приемахъ для слабительнаго и какъ палліативное средство противъ пота чахоточныхъ и ломотныхъ. Его употребляютъ въ видѣ порошка отъ 5—30 грановъ въ нѣсколько приемовъ въ теченіе дня, или только вечеромъ въ большомъ приемѣ, съ сахаромъ.

\* *Agrimonia Eupatorium L.* или *Agrimonia officinalis* (*руника обыкновенный*.—*Gemeiner Odelmennig*). Растетъ во всей средней Россіи по окраннымъ лѣсовъ и дорогъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ нашего отечества ея отваръ употребляется для полосканія въ горловыхъ болѣзняхъ и при томъ съ большою пользою.

\* *Ajuga pyramidalis L.* (*Дубровка пирамидная; вололodka; живучая трава; синяя горлянка; одногубка*.—*Pyramidalischer Günsel*.—*Bugle*). Растетъ по тѣнистымъ лугамъ, гористымъ лѣсамъ и въ садахъ у подножія деревъ. Трава запаху почти не имѣетъ, вкусъ ея горькій и вяжущій, свойства дубровки укрѣпляющія и ранозлительныя.

По своему горько-вяжущему свойству, употребляется въ простомъ и кровавомъ поносѣ, излишнемъ теченіи мѣсячныхъ кровей, отъ женскихъ бѣлей, кровохарканія и въ грудныхъ чахотныхъ припадкахъ: въ завалахъ печени, въ язвахъ легкаго, наружныхъ ранахъ, ожогахъ, цынготныхъ поврежденіяхъ десенъ, молочноицѣ во рту и гортанной жабѣ.

Внутрь дается въ отварѣ, полагая 1 унцію сухой травы на фунтъ воды, которую, кипятятъ до 8 унцій, процѣдивъ и подсластивъ медомъ, пьютъ холодной по чайной чашкѣ; снаружи служитъ полосканьемъ и впрыскиваньемъ. Свѣжая толченая трава прикладывается, въ видѣ каталазмы. Въ видѣ полосканья, служитъ отъ гортанной жабы — *angina*, или воспаленія миндалевидныхъ железъ.

Сельскіе врачи употребляют дубровку снаружн въ венерическихъ паховникахъ (бобонахъ), гнилыхъ язвахъ и отъ рака.

\* **Alisma Plantago L.** (*Частуха обыкновенная*; *баранья трава*; *шмльникъ водяной*.—*Schwimmender Froschlöffel*.—*Alisma aquatique*). Корень этого водянаго растенія, содержитъ крахмалъ, смолу и эфирное масло. Въ свѣжемъ состояніи дѣйствуетъ какъ тошнотворное острое вещество. Полезенъ какъ потогонное и мочегонное въ приѣмѣ въ видѣ порошка отъ 15 до 30 грановъ.

\* **Allium Cera L.** (*Лукъ огородный*; *саженецъ*.—*Gemeine Zwiebel*.—*Oignon*). Растетъ во всей Россіи въ садахъ или огородахъ.

Луковичный свѣжій корень и сокъ онаго запахъ имѣютъ собственный, тяжеловатый, летучій; *вкусъ* сладковато-острый. Свѣжая разрѣзанная луковца, острымъ своимъ началомъ, столь сильно раздражаетъ глаза, что даже слезы пзылекаетъ. Свойство это зависитъ отъ летучаго остраго масла, соединеннаго съ малымъ количествомъ сѣры. По разложенію другихъ химиковъ, лукъ содержитъ: сахарное вещество, клейкое, подобное животному клею, фосфорную кислоту и лимонно-кислую известь.

Лукъ, обыкновенно употребляемый въ кушаньяхъ, полезенъ для страдающихъ водяною болѣзью и каменною. Побуждая желудокъ, онъ помогаетъ варенію, разведенію густыхъ мокротъ, отдѣленію питательныхъ соковъ и, умножая отдѣленіе сѣмени, возбуждаетъ похоть; однако у многихъ производитъ вѣтры, волненіе крови и вздрагиванія во время сна. Лукъ, употребляемый съ кислото капустою, служитъ хорошимъ противуцынготнымъ средствомъ. Многократными опытами подтверждается, что всѣ тѣ, которые при появленіи цынги, въ первой ея степени, какъ на морѣ, такъ и на сухомъ пути, ежедневнымъ употребленіемъ упомянутаго салата, предохраняютъ себя отъ оной. Во многихъ странахъ Россіи, особливо въ сѣверной и азіатской, сырой лукъ ѣдятъ съ хлѣбомъ, солью и квасомъ, отъ чего бываютъ здоровы, и имѣютъ свѣжій цвѣтъ въ лицѣ. Зеленый лукъ мѣшаютъ также въ салатахъ, а лукъ, указываютъ также какъ мочегонительное и грудное лекарство; въ первомъ случаѣ даютъ выжатый сокъ по нѣскольку унцій въ день, подсластивъ сахаромъ или медомъ; во второмъ, употребляютъ печеный или жареный лукъ съ свѣжимъ масломъ—отъ кашлю, мокротной одышки и другихъ грудныхъ припадковъ, *Ланзонъ* однимъ лукомъ, употребляемымъ въ пищу, вылечилъ больнаго, одержимаго брюшною водяною болѣзью (*acetisum sanavit*). Особы коимъ противенъ лукъ сырой, могутъ приготовить его въ укусе; также вареныя 2 или 3 луковицы съ укропомъ и петрушкою въ супахъ, многимъ помогаютъ въ начинающей водяницѣ. Печеный въ золѣ лукъ, растертый съ масломъ, прикладывается въ видѣ тепловатой катаплазмы къ лобку и про-

межности (регинаем) отъ запора мочи. Равнымъ образомъ и отваренный въ молоко лукъ составляетъ катаплазму, столько же полезную. Съ прибавленіемъ 1 золотника толченаго перца, и ползолотника шафрана, прикладываютъ къ боковому колотью (pleuritis), перемѣняя тепловатую припарку каждыя 4 часа, пока утихнетъ боль. Одна молочная луковая катаплазма употребляется также для умягченія вередовъ, нарывовъ, паховиковъ (бобоновъ), мозолей и почечуйныхъ болящихъ шишекъ. Печеный лукъ прикладывается также съ хорошимъ успѣхомъ: къ затвердѣлымъ скуловымъ опухолямъ (ragotides), бобонамъ и къ мозолеватымъ венерическимъ шишкамъ (condylocata callosa). Лукъ, настоящий въ блѣдомъ виноградномъ винѣ, тоже хорошо гонитъ мочу, песокъ, отвращаетъ запоры оной, боль поясицы, и истребляетъ мелкія задне-проходные глисты (ascarides); принимаютъ эту настойку на тощакъ, по рюмкѣ. Снаружи выжатый сокъ, закладываемый въ ухо посредствомъ напитанной хлопчатой бумаги, пользуется ушную простудную боль (otalgia rheumatica) и звонъ или шумъ въ ухахъ (sonitus aurium). Смѣшавъ лукъ съ медомъ, мажутъ глаза при тусклости зрѣнія, или начальной слѣпотѣ (suffusio). Другіе совѣтуютъ: вынуть сердце или средину изъ луковицы, наполнить пустое мѣсто тминомъ, и закрывъ оное тѣмъ же кускомъ луковицы, испечь оную подъ горячею золою; потомъ, когда поспѣетъ, выжать изъ нея сокъ, который удивительно помогаетъ отъ простудной глухоты (dyscœca), шуму, и другихъ ушныхъ припадковъ, выпуская въ слуховой проходъ ежедневно по нѣсколько капель. Сырая истолченная луковица, съ малымъ количествомъ соли, къ свѣжей ожогъ приложенная, препятствуетъ сдѣлаться пузырямъ и укрощаетъ сильное раздраженіе; по святіи же сыраго, печеный лукъ въ послѣднемъ случаѣ тоже хорошо полезенъ. Другіе совѣтуютъ къ обожженному мѣсту, пока не вздулся пузырь, немедленно приложить истолченную луковицу съ большою щепотью соли и малымъ кусочкомъ мыла. Истолченная съ медомъ и солью, служитъ хорошимъ средствомъ отъ укушенія бѣшеныхъ собакъ и другихъ ядовитыхъ животныхъ. Печеный лукъ, съ кислымъ тѣстомъ и медомъ прикладываемый, ускоряетъ медленное нагноеніе вередовъ или нарывовъ.

Сырой лукъ можно ежедневно кушать въ салатахъ, или по 3 небольшихъ луковицы варить въ фунтѣ телячей похлебки; выжатый сокъ, подслащенный сахаромъ или медомъ, принимаютъ по 2 унціи, или въ видѣ винной настойки, какъ выше сказано. Снаружи въ видѣ *мягчительной* и *созрѣвающей катаплазмы* прикладывается съ медовою лепешкою, или съ какою-нибудь смолистою мазью.

Огородный лукъ, по мочегонительному своему свойству, подходитъ къ морскому луку (scilla maritima), который въ недо-

статѣ, равно какъ и безвременный цвѣтъ (*colchicum autumnale*) можетъ удобно замѣнять. Опытные экононы въ ссыпанную рожь, пшеницу и другія хлѣбныя зерна кладутъ луковицы, отъ которыхъ червь въ хлѣбъ никогда не заведется. Увѣряютъ многіе, что во время мороваго повѣтрія, или иныхъ прилипчивыхъ болѣзней, ежели развѣшать въ комнатахъ связки луковиць, то этимъ способомъ уничтожается зараза, и воздухъ въ покояхъ очищается. Для этого же намѣренія, во время скотскаго падежа, продѣвъ на нитку побольше луковиць и чесноковинъ, привязываютъ оныя на шею коровамъ, лошадямъ, и другимъ домашнимъ животнымъ, чтобы не заразились. Луковый сокъ, по увѣренію, способствуетъ ращенію волосъ, если онымъ мазать ежедневно тѣ мѣста, гдѣ хочется отрастить волосы. Для этого нѣкоторые, разрѣзавъ пополамъ свѣжую луковицу и намазавъ сотовымъ медомъ, трутъ плѣшивую голову, или другія безволосыя мѣста. Другіе обжариваютъ лукъ съ травою песьяго языка (*synoglossum offic.*) въ свиномъ салтѣ и, выжавъ сквозь полотенецъ 12 золотниковъ сока, смѣшиваютъ съ 3 золотниками чистой медовой патоки. Этою мазью натираютъ вылинявшее мѣсто, на которомъ волосы въ 2 недѣли вырастаютъ.

\* *Alnus* Tournef. (*Ольха*. — *Erle*. — *Aune*). Эта древесная порода растетъ преимущественно на болотистомъ грунтѣ. У насъ встрѣчаются два вида ея: *Aln. glutinosa* D. C. (*Betula glutinosa* L.) *Ольха клейкая или обыкновенная* — и *Aln. incana* D. C. (*Betula incana* L. *Ольха сприватая*). Ольховая кора употребляется для крашенія кожи въ черной цвѣтъ. Въ отношеніи цѣлебномъ она должна быть причислена къ противулихорадочнымъ средствамъ, потому что во многихъ мѣстностяхъ ее употребляютъ съ успехомъ противъ лихорадки и судя по всему этому прежде чѣмъ отвергать ее значеніе, какъ суррогата-хины, нашимъ медикамъ необходимо провѣрить свои заключенія рядомъ опытовъ. По свидѣтельству Мюррая, прикладываніе ольховыхъ листьевъ къ сосцамъ женщинъ содѣйствуетъ усиленію отдѣленія молока.

*Althaea officinalis* L. (*Проксурнякъ*. — *Gemeiner Eibisch*. — *Gwitauve*). Растетъ во влажныхъ лѣсахъ. Корень содержитъ кромѣ слизи, камеди (арабина) и крахмала еще такъ назыв. алтеинъ или аспарагинъ и немного сахара. Въ листьяхъ несравненно меньше слизи.

Употребляютъ особенно корень какъ другія слизистыя вещества, но рѣдко по себѣ, а болѣею частью въ чайныхъ сборахъ съ солодко-корнемъ и т. п., или отваръ его для воспріянія лекарствъ, напр. среднихъ солей: такимъ образомъ особенно при катаррѣ и воспалительныхъ страданіяхъ различныхъ органовъ, при поносѣ. Принятый въ значительномъ количествѣ, онъ часто производитъ тошноту.

*Снаружи* употребляютъ корень и траву для припарокъ, полосканій, впрыскиваній, клистировъ, глазныхъ примочекъ и т. п.

Даютъ въ видѣ отвара, а такъ какъ эта слизь отъ продолжительнаго варенія получаетъ нѣкоторую остроту, то ее надобно варить не долго, и такимъ образомъ ее должно, напр., прибавлять только подъ конецъ варенія другихъ веществъ. Скопцентрированные отвары намазываютъ кисточкою, напр. при молочницахъ (arhthae), иногда обмакнувъ ее въ буру или примѣшавъ къ слизи растворъ цинковаго купороса или хлористаго натрія.



*Angelica. Archangelica* (Дягиль аптечный).  
(Къ стр. 21).

*Amygdalus nana* L. (Бобовникъ; калмыцкіе орѣхи; дикій миндаль.—*Steinmandelbaum*.—*Amandier nain*). Растетъ въ южныхъ странахъ Россіи и Сибири по полямъ, въ Астраханскихъ степяхъ, при Волгѣ, Донѣ и около Азова.



Орѣхи бобовника содержатъ въ себѣ тучное постоянное масло, запаха не имѣютъ, вкусъ горьковатый. Свойства ихъ питательныя, притупляющія остроты и смягчающія. Употребляется въ видѣ эмульсій при ранахъ, сопровождаемыхъ лихорадкою, въ воспалительныхъ болѣзняхъ, мочерѣзѣ, припадкахъ мочевого пузыря и кровотеченіи отъ сильнаго волненія крови. Выжатое изъ орѣховъ бобовника масло даютъ въ сухомъ кашлѣ, перхотѣ, почечныхъ болѣзняхъ, мочерѣзѣ, боляхъ послѣ родовъ, спазмахъ и коликахъ, дѣтскомъ родимчикѣ и отъ глистовъ. Свѣжее масло можно принимать по нѣскольгу столовыхъ ложекъ. Эмульсія и масло приготовляются тѣмъ-же путемъ, какъ и при употребленіи для этой цѣли сладкаго и горькаго миндаля, которыя могутъ быть замѣнены бобовникомъ. Крѣмъ того слѣдуетъ замѣтить, что выжатое тучное масло бобовника можетъ служить очень хорошимъ противудіемъ, при отравленіи острыми минеральными ядами.

**Anagallis arvensis L.** (*Курослѣпъ малый; очной цвѣтъ; умъ да-разумъ—Gauchheil—Mouron des champs*). Этотъ видъ новѣйшими естествоиспытателями подраздѣленъ на два вида и именно: на *An. phoenicea Lam.* съ красными цвѣтами и *An. coerulea Scheb.* съ синими. Встрѣчается въ умѣренной Россіи по сухимъ полямъ, между камней по дорогамъ и въ садахъ.

Трава до распусканія цвѣтовъ запахи не имѣетъ, вкусъ сначала травяной, послѣ горьковато-острый, тошнотворный. Свойства курослѣпа разводящія и противудѣйствующія яду бѣшеныхъ животныхъ при употребленіи внутрь; при наружномъ же ранозѣлительныя.

Выжатый сокъ этого растенія и наливка изъ него рекомендуются многими, заслужающими довѣрія врачами, какъ дѣйствительное средство противъ одышки мокротнаго свойства (*asthma pituitosa*) и чахотки, послѣдовавшей отъ воспаленія легкихъ. Кромѣ того, нѣкоторыми медикими курослѣпъ совѣтуется употреблять въ желтухѣ, остановкѣ мѣсячныхъ очищеній, падучей болѣзни, застарѣлой дототѣ и водянкѣ. Снаружи порошкомъ его травы полезно присыпать нечистыя язвы и ядовитыя уязвленія бешеныхъ собакъ. Внутрь дается въ видѣ порошка (по 20 гранъ, 4 раза въ день) или наливки, для приготовленія которой на фунтъ горячей воды берутъ 2 драхмы курослѣпа. Присыпка употребляется ежедневно, до тѣхъ поръ пока заживетъ рана.

\* **Anchusa L.** (*Воловикъ.—Ochsenzunge.—Orcanette; Buglosse; Langue de boeuf*). Въ Россіи встрѣчаются два вида: \* *Anch. officinalis L.* (*Воловикъ аптечный; воловий языкъ; цареградскій красный корень*), растущій по необработаннымъ каменистымъ мѣстамъ, и *Anch. tinctoria L.* (*Воловикъ красный; червяница*

трава; образки; ословия уста), встрѣчаемый по песчанистымъ лугамъ и сухимъ мѣстамъ южной Россіи. Корень *Anch. officinalis* имѣетъ вкусъ клейкій, свойства же его прохладительныя и смягчающія. Корень другаго вида на вкусъ затхлый, въ отварѣ горьковатый и отличается присутствіемъ въ немъ пунцоваго красильнаго начала. *Anch. officinalis* можетъ быть употребляема съ пользою въ удущья и всѣхъ грудныхъ мокротныхъ болѣзняхъ. Выжатый изъ этого растенія сокъ дѣйствуетъ благотворно при воспаленіи мочевыхъ путей, что надо приписать содержащейся въ немъ селитрѣ. Для приготовленія изъ этого вида воловика отвара его корня, на 8 унц. воды вкладется  $\frac{1}{2}$  унц. корня; для наливки, на 12 унцій горячей воды берется по горсти его цвѣтовъ и травы. Эта послѣдняя употребляется обыкновенно какъ чай. Сокъ употребляютъ въ размѣрѣ отъ 3—4 унц. въ день.

*Anch. tinctoria* точно такъ-же имѣетъ врачебное значеніе, а именно: корень ея, отваренный въ красномъ винѣ (1 унц. сухаго корня на фунтъ воды, пива или вина) и съ прибавленіемъ свѣжаго сливочнаго масла пьютъ противъ кровяныхъ застоевъ, происходящихъ отъ сильныхъ ушибовъ; а порошокъ ея употребляется какъ присыпка для мокнущихъ язвъ.

\* *Anémone L.* (*Вѣтреница*. — *Windröschen*. — *Anémone*). Во всѣхъ видахъ этого рода заключается особое острое вещество—анемонинъ. При большихъ приѣмахъ они производятъ не только воспаленіе желудка, но и припадки отравленія: оглушеніе, нечувствительность и параличъ мышцъ. Листья почти всѣхъ видовъ, будучи приложены къ тѣлу, приподнимаютъ кожу, т. е. дѣйствуютъ какъ нарывное, съ тѣмъ только отличіемъ, что однимъ изъ нихъ свойство это присуще въ значительно большей степени, чѣмъ другимъ. Изъ числа ихъ, по своему значенію во врачеваніи, наиболѣе замѣчательны: \* *An. nemorosa* (*Вѣтреница лѣсная; лѣсной однолѣтничекъ*. — *Busch-Windröschen*); \* *An. hepatica* (*Вѣтреница печоночная; завитки, трилистникъ чистый*. — *Dreilappiges-Windr.*); \* *An. pratensis L.* или *Pulsatilla pratensis* (*Вѣтреница прострѣльная; сонъ-трава*. — *Wiesen-Windr.*).

1) *An. nemorosa* растетъ, по краямъ лѣсовъ и между кустарниковъ, почти во всей Россіи. Свойства его ядовитыя, зависящія отъ остраго летучаго начала, упомянутаго выше. Запахъ цвѣтовъ и травы слабый; вкусъ острый, жгущій. Употребляется только какъ наружное средство; такъ свѣжіе толченныя листья—въ весеннихъ лихорадкахъ во время знобленія прикладываются къ плечу, или къ пясти руки; въ шелудяхъ и полуголовной долго продолжительной боли (мигрень) ихъ совѣтуютъ прикладывать въ страждущей части; въ спинной ломотной боли (*rheumatismus dorsalis*) они полагаются между плечъ; въ бедренной и членов-

ной домотахъ—тоже къ страдающимъ частямъ прикладывается вмѣсто шпанскихъ мухъ. По замѣчанію Менха и Соболевскаго: не надобно долго держать на тѣлѣ этого средства, а только пока кожа нѣсколько возвысится и покраснѣетъ; ибо натянутые пузыри весьма долго не заживаютъ и превращаются не рѣдко въ язвы. По наблюденіямъ Крапфа, жабникъ огненный и остроочный (*ganuncululus flammula et g. acris*) имѣютъ такія же лечебныя свойства, и при томъ гораздо надежнѣе могутъ быть прикладываемы во время лихорадочныхъ приступовъ къ рукамъ и ногамъ, вмѣсто горчичника. Въ Сибирскихъ степяхъ сѣменной пухъ этого растенія можно собирать пудами и обрабатывать оный какъ хлопчатую бумагу; г. Фалькъ видѣлъ тамъ же шапки и перчатки, изъ этого пуха сдѣланныя. Голодные коровы и другой скоть, наѣвшись этого растенія, получаютъ кровавое мочетеченіе, воспаленіе внутренностей, и не рѣдко кровавый поносъ, отъ чего и умираютъ. Надлежитъ въ такомъ случаѣ давать имъ по стакану свѣжаго постнаго масла, смѣшаннаго пополамъ съ уксуомъ, 2 или 3 раза въ день, и поить отваромъ пшеничныхъ отрубей.

2) *Anemone hepatica L.* Встрѣчается въ тѣнистыхъ мѣстахъ и на горахъ, какъ-то: на Пулковской горѣ, на Волгѣ, Камѣ и въ другихъ каменныхъ мѣстахъ. Дѣйствуетъ слабо, трава и цвѣты *запаху* и *вкусу* не имѣютъ. Свойства слегка вяжущія, ранозѣлительныя. Траву съ цвѣтами пьютъ вмѣсто чая: полагаая 1 унцію на фунтъ горячей воды, отъ внутреннихъ заваловъ, желтилицы, капельнаго мочетеченія, теченія гною изъ мочеваго пузыря, въ кровохарканіи и поносахъ; *снаружи*: употребляютъ въ видѣ полосканья въ гортанной жабѣ, промываніи и примачиваніи старыхъ смрадныхъ язвъ. Свѣжіе толченые листы прикладываются на раны вмѣсто катаплазмы. Овцы и козы ѣдятъ охотно это растеніе; коровы, лошади и свиньи не трогаютъ. Пчелы первое весеннее питаніе получаютъ изъ цвѣтовъ этого растенія.

3) *Anemone pratensis L.* Растетъ въ умѣренной Россіи и Сибири въ необработанныхъ поляхъ, по засѣкамъ близъ С.-Петербурга, и во многихъ другихъ мѣстахъ. Свойства ядовитыя, зависящія отъ острого и экстрактнаго начала, соединеннаго съ камфарнымъ масломъ: *запаху*, свѣжая трава и цвѣты не имѣютъ; *вкусъ* острый, жгущій и долго остающійся.

Употребляется въ начинающейся слѣпотѣ, или глазномъ подтекѣ, пятнахъ роговидной ободочки и въ другихъ глазныхъ болязняхъ; одобряется также: въ бездѣйствіи членовъ или параличѣ и въ венерическихъ припадкахъ, какъ-то: въ ночныхъ члено-составныхъ боляхъ, опухляхъ костей, нечистыхъ язвахъ,

затвердѣніи ядеръ, шишкахъ около прохода (condylomata) и въ востокѣдѣ.

Для наливки берутъ сухой травы съ цвѣтами отъ 1—3 драхмъ и на нее наливаютъ 12 унц. горячей воды, которую, настоявъ чрезъ четверть часа въ покрытомъ сосудѣ, слѣдуетъ процѣдить, и принимать ежедневно три раза отъ 2—4-хъ унцій; снаружи прикладывается вмѣсто примочки.

\* *Angelica L.* (*Дяиль* — *Angelica*. — *Angélique*). Растетъ по влажнымъ мѣстамъ и берегамъ стоячихъ водъ. Въ Россіи встрѣчаются два вида ея: \* *Ang. Archangellica L.* (*Дяиль аптечный; коровникъ*) и \* *Ang. sylvestris L.* (*Дяиль лѣсной; мѣдвежьи пучки*).

1) *Angelica archangellica* растетъ по разнымъ мѣстамъ, болѣе на горахъ, изрѣдка около Москвы, на Волгѣ и Исетѣ, также около береговъ Невы рѣки, по лѣсамъ и гористымъ лугамъ.

Свойства корня, листовъ и сѣменъ зависятъ отъ летучаго масла и экстракто-сахарнаго начала; *запахъ* этого растенія благовонный и пріятный; *вкусъ* пряный, острый, горячительный.

Дѣйствіе укрѣпляющее желудочное, вѣтрогонное, потъ и мѣсячныя врови гонящее; травы — противугниlostное. Употребляется въ астеническихъ болѣзняхъ требующихъ возбужденія, какъ-то: въ слабости желудка, вѣтряной коликѣ, мокротной жабѣ, расслабленіи язычка въ горлѣ, параличѣ, повальныхъ заразныхъ болѣзняхъ и нервныхъ гнилыхъ горячкахъ (*typhus nervosus, putris*), сопряженныхъ съ необычайною слабостію жизненныхъ силъ; также въ простудныхъ лихорадкахъ и ревматизмахъ, гдѣ на кожные органы дѣйствовать должно возстановленіемъ испаринны, посредствомъ летучихъ побуждающихъ средствъ; въ мокротныхъ припадкахъ легкаго, застарѣломъ кашлѣ и одышкѣ. Сѣмена тоже одобряются, какъ грудное, вѣтрогонное, мочу и мѣсячныя врови гонящее средство.

Дается въ порошокъ сухой корень отъ 20 гранъ до полудрагмы; но чаще предписывается въ наливкѣ: полагая по 2 драгмы дягильнаго корня и мауноваго (*valeriana offic.*) или касатика (*a. salinus*) на 8 унц. вишней воды, которую, подсластивъ медомъ, принимать по 2 столовыхъ ложки; въ хроническихъ болѣзняхъ дается въ видѣ кашки по 1 драгмѣ, нѣсколько разъ въ день. Такъ какъ дягиль имѣетъ составныя начала, сходныя съ виргинскимъ змѣевникомъ (*a. serpentaria*) и въ дѣйствиіи оказываетъ одинаковую пользу, то оный совершенно можетъ замѣнить какъ упомянутый змѣевникъ виргинскій, такъ гвоздику (*d. caryophyllus*) и китайскій жинсенгъ (*rad. ginseng, s. radix quinquefolium*). Лапландцы молодые облупленные стволы этого растенія ѣдятъ съ удовольствіемъ, и почитаютъ главнымъ лекарствомъ въ слабости желудка, ворчаньи и боли живота; сушеный же корень жуютъ отъ зубной

боли, и цынга у нихъ не бываетъ никогда, не смотря на холодный климатъ ихъ страны. Въ Норвегii тоже употребляютъ молодые стволы вмѣсто спаржи. Изъ сѣменъ и корня дѣлають прiятную настойку, и перегоняють съ водкою. Настойка эта (tinctura angelicæ), прикладываемая на хлопчатой бумагѣ, укрощаетъ зубную боль, отъ гнилой порчи происходящую. Однолѣтние корни даютъ закваску ароматную водку, отзываются мускусомъ; варенные съ сахаромъ они составляютъ прiятныя конфекты, поправляющiя пищеваренiе желудка и противный запахъ рта.

2) *Angelica sylvestris*, L. Растетъ по влажнымъ лугамъ и лѣсамъ, особливо по краямъ оныхъ, и по каналамъ на тучной почвѣ.

Свойства подобныя свойствамъ вышеописаннаго вида, но только слабѣе онаго; впрочемъ *Линней* замѣтилъ, что лѣсной дягиль даетъ смолистаго экстракта вдвое больше, нежели садовый (a. sativa), притомъ запахъ и вкусъ его много острѣе, а потому и его можно употреблять, какъ дѣйствительное побуждающее средство, особенно, въ мокротныхъ болѣзняхъ и слабости нервовъ.

**Anisum Vulgare G. или Pimpinella Anisum L. (*Анисъ обыкновенный; анисъ.*—*Viebernell—Anis*).** Это растенiе выдѣляется въ изобилiи въ Украинѣ. Сѣмена содержатъ въ себѣ летучее, но не острое масло; вкусъ ихъ сладковатый; запахъ ароматный. Дѣйствiе анисовыхъ сѣменъ возбуждающее, мочегонное и способствующее отдѣленiю молока, слизи дыхательныхъ вѣтвей и мѣсячныхъ кровей. Анисъ полезенъ въ особенности при разстройствѣ пищеваренiя, судорогахъ желудка и живота, при коликѣ отъ вѣтровъ; въ этихъ случаяхъ его въ особенности хорошо употреблять для дѣтей, грудныхъ младенцевъ, матерей, кормящихъ новорожденныхъ, и кормилицъ.

Анисъ дается въ видѣ порошка, въ приемѣ отъ 10—20 грановъ; рѣдко въ видѣ каши. Всего лучше употреблять его наливкою. Эфирное анисовое масло (oleum anisi) употребляется въ тѣхъ-же случаяхъ, какъ и анисъ, въ размѣрѣ отъ 2—10 капель (на сахаръ) за разъ. Кроме обыкновеннаго аниса, въ торговлѣ аптекарскими припасами, существуетъ, такъ называемый, *анисъ звездчатый* (*Anisum stellatum*) получаемый, отъ японскаго растенiя *Illicium anisatum*. Дѣйствуетъ такъ же какъ и обыкновенный анисъ; только нѣсколько сильнѣе.

\* **Apium graveolens L. (*Сельдерей.*—*Gewöhnlicher Sellerie.*—*Célerie*), и *Apium petroselinum L. (*Петрушка.*—*Petersilge.*—*Persil*).*** Оба эти растенiя извѣстны у насъ какъ воздѣлываемыя въ огородахъ. Изъ корней сельдерея готовится здоровый и прiятный на вкусъ салатъ, употребленiе котораго въ особенности

полезно особамъ лимфатическаго сложенія и страдающимъ болѣзнями мочевыхъ путей. Корень обѣихъ видовъ содержитъ, кромѣ сахара и крахмала, еще смолистое вещество и эфирное масло. Они могутъ быть употребляемы какъ противуглистыя средства и какъ разрѣшающія, въ произвольномъ количествѣ.

\* *Aquilegia vulgaris* L. (*Голубки или павинныя очки; водосборъ; орлики; колокольчики; оксамитъ.*—*Gemeine Akeley.*—*Ancolie*). Растетъ въ садахъ и по краямъ лѣсовъ во всей почти Россіи. Свойства водосбора мочегонныя, потогонныя и антискорбутныя. По свидѣтельству Гёзера, корень этого растенія, принимаемый въ порошокъ съ виномъ (1 драхму на стаканъ вина), составляетъ превосходное средство для утоленія страданій почекъ. Взятый въ томъ-же количествѣ съ небольшою примѣсю шафрана и принимаемый также съ виномъ, онъ излечиваетъ желтуху. Отваръ и винная настойка травы водосбора, помогаютъ въ грудныхъ мокротныхъ припадкахъ, остановленіи мѣсячныхъ кровей и вѣтряномъ кашлѣ. Выжатый сокъ изъ свѣжаго растенія содѣйствуетъ къ исправленію цинготной порчи соковъ (*sachetia cogbutica*); а такъ же способствуетъ въ болѣзняхъ кожи, какovy оспа и корь—ихъ высыпанію.

Сельскіе лекаря даютъ сѣмя этого растенія новорожденнымъ дѣтямъ отъ родимца; въ порошокъ его принимаютъ, по 1 золотнику на стаканъ винограднаго вина, женщины въ тяжелыхъ родахъ.

\* *Arbutus-uva-ursi* L. или *Arctostaphylos officinalis*. *Wim. et Gr.* (*Толокнянка медвѣжья; медвѣжий виноградъ; медвѣжья ягоды; толокнянка стелющаяся; амриксъ.*—*Gemeine Bärentraube; Arbousier.*—*Fräisier en arbre*). Растетъ въ хвойныхъ лѣсахъ и на песчаныхъ дугахъ.

Составныя части этого растенія суть: дубильная и галловая кислоты, немного вытяжнаго вещества, смола, соли.

Медвѣжьи ягоды, по видимому, дѣйствуютъ точно такъ, какъ другія вяжущія средства, и потому могутъ быть употребляемы подобно имъ. Особенную же пользу приписывали имъ во всѣхъ хроническихъ страданіяхъ мочевого пузыря, почекъ и мочевыхъ органовъ, вообще какъ при бленноройныхъ и катарральныхъ состояніяхъ, хроническомъ воспаленіи почекъ (*nephritis-Pyelitis*), геморрояхъ, кровотеченіи, параличѣ мочевого пузыря, недержаніи мочи, даже при невралгическихъ страданіяхъ мочевого пузыря и при каменной болѣзни, чтобы растворить песчинки или камни.

Въ нѣкоторыхъ изъ упомянутыхъ случаевъ продолжительное употребленіе медвѣжьихъ ягодъ можетъ быть полезнымъ; но по большей части они рѣшительно ничего не дѣйствуютъ, или же

не больше других легких вяжущихъ средствъ. И какъ мочегонное при водянкѣ онѣ не заслуживаютъ уваженія.

Даются въ отварѣ и въ видѣ болюса или порошка, въ приемѣ отъ 10—20 грановъ.

Можно давать ихъ съ зазубреннымъ благовонникомъ (*Cissampelos pareira*, *diosma stenata*), или съ копаевымъ, перувианскимъ бальзамомъ, терпентиномъ, щелочами и др.



*Aquilegia vulgaris* L. Водосборъ дикій.  
(Къ стр. 23).

*Arbutus Unedo et Arb. Comarum*, вареные съ виномъ, даютъ на востокъ противъ поноса.

\* **Arctium Lappa.** (*Лапушникъ малый.*—*Kleine Klette.*—*Glouteron*). Растетъ по краямъ дорогъ. Корень этого растенія содержитъ, кромѣ слизи и крахмала (инулина), нѣсколько смолистаго, горькаго, вытяжнаго вещества. Свойства всѣхъ частей растенія слабо потогонныя, мочегонныя, и укрѣпляющія. Настой изъ корня лапушника употребляютъ въ болѣзняхъ кожи, сиѣлисъ и скорбутъ, по 1 унціи въ день.

**Aristolochia L.** *Кирказонъ или кокорникъ; шиковникъ; пхиновникъ; смольникъ.*—*Osterluzey.*—*Aristolochie*). Изъ ея видовъ въ южной Россіи, по берегамъ рѣкъ, а также въ нѣкоторыхъ частяхъ средней полосы нашего отечества встрѣчается:

*Aristolochia Clematitis* (*въющійся кирказонъ*). Корни его имѣютъ остро-раздражающее дѣйствіе, и вмѣстѣ съ тѣмъ по видимому могутъ произвести большими приемами наркотизацію (прежде они употреблялись противъ ломоты, одышки, коклюша и т. д., также въ видѣ эстректа, подобно прострѣльній и вѣтреницѣ и др.). Напротивъ корни отъ *Aristolochia, longa* и *A. rotunda* (растущей въ южной Европѣ) содержатъ очень мало острыхъ веществъ, и употреблялись прежде какъ мѣсячногонныя, и особенно противъ ломоты (напр. въ портлендовомъ порошокѣ, Duke of Portland's Powder, съ горчанкою дубровою (*gentiana chamaedris*) и т. п.).

Поселяне приволжскихъ губерній употребляютъ отваръ кирказона отъ всякаго лому и боли въ костяхъ, а плоды онаго подобныя смоквѣ, служатъ имъ слабительнымъ лекарствомъ. Сушеные, отваривъ въ водѣ, употребляютъ въ желчныхъ лихорадахъ и горячкахъ, полагая 3—4 золотниковъ на бутылку сусла или пива; въ порошокъ принимаютъ по 1 золотнику истертаго корня или зеленыхъ высушенныхъ плодовъ.

\* **Arnica montana L.** (*Баранья трава.*—*Berg-Wohlverley.*—*Tabac des Vosges* \*). Растетъ въ южныхъ губерніяхъ Россіи. Запахъ свѣжихъ цвѣтовъ этого растенія возбуждаетъ чиханіе. Вслѣдствіе сушенія этотъ специфическій запахъ становится слабѣе, а вмѣстѣ съ тѣмъ ослабляется и упомянутое выше его свойство. Вкусъ бараньей травы острый и горькій; свойства этого растенія возбуждающія и противулихорадочныя. Весьма многіе врачи рекомендуютъ цвѣточныя головки бараньей травы, какъ средство противъ перемежающихся лихорадокъ, поносовъ и па-

---

\*) Въ Московской губерніи, имъ лично находили Баранникъ въ дикорастущемъ состояніи. Въ Петербургской же губерніи намъ не удавалось найти его, не смотря на увѣренія Кашинскаго, что онъ здѣсь встрѣчается, и потому мы вмѣстѣ съ другими авторами исключаемъ его изъ списка растеній Петербургской флоры. *Авт.*



ралича; но судя потому, что въ большихъ приѣмахъ корень и цвѣты бараньей травы дѣйствуютъ наркотически, производя рвоту, поносъ, воспаленіе желудка и кишекъ, боль и круженіе головы, сопровождаемые дрожаніемъ и сильною слабостію, ихъ едва-ли можно рекомендовать, какъ внутреннее средство; зато роль ихъ какъ наружнаго несомнѣнна: въ ушибахъ съ подкожнымъ кровоизліяніемъ, застарѣлыхъ гнилыхъ язвахъ и помертвѣлости—они составляютъ дѣйствительное средство, заслуживающее полного одобренія. Съ этою цѣлью ихъ употребляютъ въ видѣ примочекъ. Цвѣты этого растенія входятъ въ составъ изготовляемыхъ въ аптекахъ грудныхъ наборовъ (*species pectorales*). По словамъ Кашинскаго корнемъ и травой баранника можетъ быть съ успѣхомъ замѣненъ, употребляемый въ медицину, противъ хроническихъ ревматизмовъ и вообще какъ возбуждающее и потогонное средство—привозный корень Калагвалы \*).

\* *Artemisia absinthium* L. (*Полюнь*.—*Bitterer-Beifusz*.—*L'aluyne*). Растетъ въ средней Россіи по невоздѣланнымъ мѣстамъ и пустырямъ. Содержитъ очень горькое азотистое вещество и вещество смолистое, также горькаго вкуса. Кромѣ того въ ней заключается: летучее зеленое масло, альбунинъ и крахмаль; дѣйствуетъ какъ весьма горькое вещество. Употребляется при слабомъ пищевареніи и сродныхъ страданіяхъ, при гастралгіи, изжогѣ, кишечныхъ глистахъ (особенно для слабыхъ и лимфатическихъ лицъ и для послѣдовательнаго леченія), даже въ перемежающейся лихорадкѣ. Но по противной горькости употребленіе ея весьма непріятно.

Для изгнанія круглыхъ глистовъ рекомендуютъ полынь и чеснокъ, по пучку того и другаго изъ нихъ на бутылку бѣлаго вина. Процѣдивъ, приготовленную такимъ образомъ настойку, ее принимаютъ по утрамъ по столовой или дѣсертной ложкѣ.

Полынную вытяжку (*extractum Absinthii*), приготовляемую въ аптекахъ можно употреблять по чайной ложкѣ въ день.

**Art. abrotanum** L. (*Божье дерево*.—*Beifusz*.—*Garde-robe*; *L'aurone*). Въ дикорастущемъ состояніи встрѣчается въ Сибири и въ южной Россіи по гористымъ мѣстамъ; въ средней и сѣверной полосѣ воздѣлывается въ садахъ, по причинѣ ароматическаго запаха листьевъ.

Свойства его тоническія, разбивающія, противуглистные. Употребляется противъ слабости желудка, худосочія, прекращенія у женщинъ регуловъ и бѣлей. Даютъ божье дерево по большей части въ видѣ отвара или наливки, для приготовленія

---

\*) Некоторые, въ томъ числѣ и Кашинскій, полагаютъ ошибочно, что корень Калагвалы, привозимый изъ Америки, получается отъ *Polypodium crassifolium* L.; между тѣмъ какъ онъ доставляется совершенно особымъ видомъ, а именно *Polyp. calaguana*. Rus.

коихъ на 1 унцію травы наливается 4 унціи горячей воды или вина. Киргизы разминаютъ свѣжіе листья этого растенія и смѣшавъ ихъ съ растопленнымъ бараньимъ саломъ, получаютъ мазь, которая употребляется ими съ пользою противъ ранъ.

\* **Art. Vulgaris L.** (*Чернобыльникъ*.—*Gemeiner Beifuss*.—*L'Herbe de St-Jean*). Растетъ по невоздѣланнымъ мѣстамъ повсемѣстно. Чернобыльникъ содержитъ въ себѣ азотистое вещество и летучее масло. *Корень*, кромѣ особеннаго масла съ опіе-подобнымъ запахомъ, содержитъ еще вытяжныя вещества, смолу, камедь и т. п. Въ народѣ онъ уже давно употребляется противъ эпилепсїи, пляски св. Вита, для лунатиковъ, въ истерическихъ и сродныхъ страданїяхъ, особенно женскаго пола и дѣтей, многіе врачї также прописывали его въ такихъ случаяхъ, и если вѣрить сообщенїямъ, не всегда безъ успѣха. Корень всего лучше давать въ порошокъ чайными ложками, по себѣ или съ сахаромъ, часто съ бобровою струею, вонючею асою, также съ хининомъ и т. п. Burdach велѣлъ эпилептическимъ запивать пивомъ и большимъ потѣть.

*Спиртная вытяжка (Extr. Artemisiae)* по нѣкоторымъ превышаетъ корень въ дѣйствительности (Kölreuter). Ее принимаютъ по десертной ложкѣ и больше въ день, въ эмульсїи, растворѣ или напр. съ порошкомъ корня въ пикюляхъ. Галлеръ успѣлъ изъ растертыхъ листьевъ и сердцевины стволонъ этого вида чернобыльника извлечь *Моксу* \*) нисколько не уступающую японской по своему дѣйствию противъ кашля и ревматизма. Нѣкоторые народные лекаря, высушивъ въ тѣни корень чернобыльника, выжимаютъ изъ него сокъ, даваемый ими противъ падучей болѣзни. Въ Тульской губерніи, Каширскомъ уездѣ, гдѣ это средство довольно распространено, о немъ отзываются съ большою похвалою. Порошокъ корня даютъ прїемами отъ 25 до 45 грановъ.

**Agum maculatum L.** (*Клещеница; змѣй трава; образки горные; сухотный корень; ааронова борода*.—*Gemeiner-Aaron*.—*Pied-de-vau; douet comtin*). Растетъ въ южной Россїи, по тѣнистымъ мѣстамъ и рощамъ.

Листья этого растенія содержатъ ѣдкій и жгучій сокъ, который ядовитъ до такой степени, что одно только прикосновенїя ихъ къ полости рта производитъ уже сильный, болѣзненный жаръ въ небѣ и гортани. Надо думать, что даже небольшой прїемъ оныхъ можетъ повести къ весьма печальнымъ послѣдствїямъ; въ подобнаго рода случаяхъ, единственнымъ дѣйстви-

---

\*) Подъ именемъ «Моксы» извѣстно ватообразное вещество, собираемое съ *Artemisia моха* D. С., употребляемое какъ нарывное средство.

тельными противудіемъ могутъ служить только маслянистыя напитки; всѣ же прочія жидкости оказываются не имѣющими никакого значенія. Но, пытливый умъ человѣка открываетъ питательныя вещества, даже среди самыхъ сильныхъ ядовъ и отдѣляя ихъ, превращаетъ въ здоровую для себя пищу: такъ наприм. корень маньока, въ сыромъ видѣ, составляетъ смертельный ядъ; между тѣмъ какъ посредствомъ известнаго рода приготовленія его, онъ становится почти единственнымъ источникомъ питанія цѣлаго ряда индѣйскихъ племенъ. Подобнымъ же образомъ и корень клещеницы можетъ служить въ голодные годы здоровою пищею для человѣка. Острота его уменьшается отчасти уже простымъ сушеніемъ; но если прокипятить его послѣдовательно нѣсколько разъ въ водѣ, то она исчезаетъ совершенно. При помощи этого-то послѣдняго процесса изъ корня клещеницы получается бѣлая, сладкая, весьма питательная мука, изъ которой могутъ быть приготовляемы: клейстеръ, крахмалъ и очень вкусныя похлебки и хлѣбъ. Пармантіе давно уже указывалъ на громадныя запасы пищи, хранящіяся въ корняхъ этой породы. «Я питался корнями клещеницы, говоритъ Боскъ, когда во время волненій революціи, я былъ принужденъ скрываться въ лѣсу Монмаренси. Это растеніе до такой степени обильно въ упомянутомъ лѣсу и нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ, что оно могло бы въ этотъ періодъ обезпечить существованіе нѣсколькихъ тысячъ людей, если бы только они знали его питательныя свойства.»

Корень клещеницы рекомендуется весьма многими врачами, какъ вѣрное средство противъ грудныхъ и брюшныхъ мокротныхъ болѣзней, сопряженныхъ съ завалами внутренностей; мокротной одышки, сочувственной головной боли, глистныхъ припадковъ, худосочія, долговременной хрипоты, перемежной лихорадки \*), застарѣлаго ревматизма и бездѣйствія нервной системы. Жириберъ и Бодартъ испытали его въ астеническомъ блѣдноцвѣтнѣи худосочіи, сопряженномъ съ слабостію пищеварительныхъ органовъ. Геснеръ и Константинъ давая порошокъ, смѣшанный съ медомъ до 30 гранъ, вылечили трехъ человѣкъ, страдавшихъ сухоткою, которые имѣли уже всѣ признаки чахотки. Изъ 8 золотниковъ порошка ааронова корня и двойнаго количества свѣжей жерухи, или кислицы, растертыхъ съ медомъ на подобіе густаго тѣста, составляется кашка, поправляющая цинготное и всякое худосочіе, которую принимаютъ 3

---

\*) По совѣту Баркмана, Кашияскій составлялъ противулихорадочный порошокъ: изъ 10 гранъ этого корня, столько-же нашатыря и 5 гр. ревеня; на приемъ давалъ въ велихорадочный день таковой порошокъ, повторяя каждыя 2 часа, весьма удачно. Средство это весьма хорошо разводитъ мокротные застои и завалы внутренностей.

раза въ день по чайной ложкѣ, запивая стаканомъ молочной сыворотки смѣшанной съ 2 ложками хрѣнноваго сока. Этимъ способомъ онъ возстановилъ нѣкоторыхъ астеническихъ паралитиковъ.

Снаружи, свѣжій корень, приложенный къ параличнымъ частямъ, возстановляетъ ихъ чувствительность; въ видѣ припарки, все растеніе одобряется въ членовныхъ ломотныхъ боляхъ; выжатымъ сокомъ напѣтанные кноты, совѣтуютъ закладывать для очищенія свищей; сухимъ корнемъ, истертымъ въ порошокъ, присыпаются худосочныя язвы. Въ видѣ катаплазмы, клещенца разводитъ бубоны и чумные опухоли железъ, или язвенныя шишки.

Внутрь корень дается сушеной, въ порошокъ: отъ 10—15 и 20 гранъ, съ магнезіею, виннымъ камнемъ, нашатыремъ и пр. Полю-унціи его полагаются для наливки на 6 унц. благаго вина, которую принимаютъ по столовой ложкѣ. Въ видѣ кашки, поправляющей худосочіе, дается какъ сказано выше.

Сухой корень должно сохранять въ стеклянныхъ хорошо закупоренныхъ сосудахъ. Слишкомъ старый корень бываетъ вовсе недѣйствителенъ; свѣжій или сырой очень остръ; а потому дѣйствіе онаго трудно опредѣлить. Корень этого растенія выкапываютъ въ мартѣ мѣсяцѣ, или осенью, когда уже смена его созрѣла.

Въ Англіи и Неаполѣ, изъ этого корня дѣлаютъ родъ мыла, способнаго для бѣленія полотна; въ другихъ мѣстахъ примѣшиваютъ крахмальное вещество этого корня къ косметическому мылу.

Корень этого растенія въ медицину можетъ замѣнить: синегу—*polygala senega*, корку симарубы—*quassia simaruba* и ангустуры—*brucea ferruginea*.

\* **Asarum europaeum L.** (*Копытень* или *подлѣшникъ*; *сухой водолемъ*; *подорышникъ*; *облапа*; *обхватка*; *скипидарникъ*.—*Europäische Haselwurz*.—*Cabaret oreille d'homme*; *Rondelle*). Растетъ въ умѣренной полосѣ Россіи въ тѣнистыхъ мѣстахъ, у подножія деревъ. Всѣ части этого растенія, особенно корень и листья, имѣютъ остро-раздражительное дѣйствіе; корень содержитъ крахмалъ, смолу, дубильное вещество, летучее острое масло и особое вещество (азаринъ). Въ Англіи листья копытеня употребляютъ еще до сихъ поръ какъ рвотное, слабительное, мочегонное, кровогонное и чихательное средство; наконецъ, противъ ломоты и перемежающейся лихорадки. До открытія ипеакауанны или рвотнаго корня (*Psychotria emetica* L) нашъ копытень служилъ обыкновеннымъ рвотнымъ лекарствомъ; въ Голландіи, по свидѣтельству Бургава, коренья онаго продавали за настоящую мексиканскую ипеакауанну. Корень копытеня, по

отзыву весьма многих народных лекарей, а также и Кашинскаго, въ особенности полезенъ въ водяной болѣзни, въ брюшныхъ завалахъ, запорѣ кровей, желчныхъ припадкахъ и въ меланхоліи. Въ этихъ случаяхъ употребляютъ съ успѣхомъ также и листья этого растенія, отваривая въ водѣ, отъ 5—8 листовъ и наливая ихъ виномъ. Порошокъ сухихъ листьевъ отъ 4—5 гранъ, употребляемый на ночь какъ нюхательное, производитъ на слѣдующее утро обильное истеченіе мокротъ, и такимъ образомъ издѣляетъ насморкъ и головную боль. Тотъ же самый нюхательный порошокъ, изъ листьевъ и корня копытеня, совѣтуютъ употреблять противъ темной воды, долговременной боли головы, глухоты, паралича язычныхъ нервовъ, и язвы мокротныхъ носовыхъ пазухъ. Англійскіе врачи употребляютъ въ тѣхъ же болѣзняхъ особый порошокъ изъ 3 частей листовъ копытеня, маюрана и столько же лавандныхъ цвѣтовъ, вьюхиваніе коего въ небольшомъ количествѣ весьма полезно. Въ малыхъ приемахъ корень оказываетъ разводящее и противусудорожное дѣйствіе; въ приемѣ отъ 20—30 гранъ въ порошокъ, или смѣшавъ полдрахмы съ медомъ, въ видѣ болюса, служить рвотнымъ и слабительнымъ средствомъ; для отвара берутъ 2 драхмы корня, или 4 драхмы травы на фунтъ воды; его принимаютъ по 2 столовыхъ ложки каждые два или три часа. Этотъ отваръ служитъ также промывательнымъ. Винная наливка, приготовляемая подобнымъ же образомъ, полезна въ брюшныхъ завалахъ и параличѣ.

Корень копытеня, можетъ замѣнять рвотный корень ипекакуаны. Кромѣ того его отваръ въ водѣ превосходно гонитъ мочу и совершенно замѣняетъ морской лукъ. По словамъ Фернеля, это средство до того благонадежно и безвредно, что его можно употреблять смѣло во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда употребляется ипекакуанна. Онъ же особенно рекомендуетъ отъ весеннихъ лихорадокъ и брюшныхъ заваловъ сывороточную наливку, для приготовленія коей берется отъ 5—8 листочковъ на 1 бутылку горячей жидкости, настоявъ и процѣдивъ, которую принимаютъ чрезъ 2 часа по чайной чашкѣ.

Коренья и листья копытеня, по ихъ сборѣ весною, должно держать нѣсколько мѣсяцевъ въ сушильнѣ на открытомъ воздухѣ, что необходимо для удаленія изъ нихъ излишней остроты. При этомъ надо замѣтить, что чѣмъ мельче будутъ они истерты въ порошокъ, тѣмъ дѣйствіе ихъ сильнѣе. Тереть должно передъ самымъ употребленіемъ, ибо въ противномъ случаѣ онъ утрачиваетъ свою силу. Изъ свѣжаго копытеня, крестьяне нѣкоторыхъ изъ великорусскихъ губерній приготовляютъ мазь отъ ломоты въ ногахъ; для ея изготовленія все растеніе вмѣстѣ съ корнемъ толчется и затѣмъ, настоявъ имъ звѣробойное масло, выжимаютъ эту смѣсь и послѣ этого прибавляютъ къ получен-

ной жидкости 3-ю часть терпентиннаго масла. На югѣ Россіи втираніемъ порошка копытена въ темянную часть головы пользуют головныя боли.

**Asclepias vincetoxicum L.** (*Ластовичный корень; стручечникъ; чертова борода; чертова зелье.*—*Gemeiner Hundswürger.*—*Le dompte venin*). Растетъ въ умеренной полосѣ нашего отечества, преимущественно по лѣсамъ. Корень испускаетъ молочный, слабоядовитый сокъ. Запахъ корня острый, тошнотворный.

Свойства этого растенія мочегонныя, а свѣжаго корня-рвотныя. Весьма многіе медики употребляли ластовичникъ съ успѣхомъ противъ заваловъ, водяной болѣзни и скрытой золотухи. Толченый корень и листья могутъ быть прикладываемы, также съ пользою, какъ наружное средство въ затверденіи железъ, грудныхъ опухоляхъ и нечистыхъ язвахъ.

Для приготовления отвара берутъ отъ 4—8 драхмъ листьевъ на фунтъ воды. Сушеный порошокъ ихъ дается въ размѣрѣ отъ 20 гр. до полдрахмы.

\* **Asparagus officinalis L.** (*Спаржа.*—*Gewöhnlicher Spargel.*—*L'asperge*). Растетъ по песчанымъ мѣстамъ; у насъ встрѣчается преимущественно какъ воздѣлываемое растеніе. Свойства спаржи мочегонныя и разбивающія; отъ ея употребленія моча получаетъ непріятный, специфическій запахъ. Въ дикорастущемъ состояніи спаржа имѣетъ горькій вкусъ и дѣйствуетъ сильнѣе, чѣмъ воздѣлываемая. Сокъ этого растенія содержитъ въ себѣ: зеленое смолистое вещество, альбуминъ, фосфорную соль потассія, фосфорно-кислую известь, растворенную въ уксусной кислотѣ, уксусно-кислый потассій и два кристаллизующіяся начала: маннитъ и аспарагинъ, послѣднее изъ которыхъ имѣетъ вкусъ слабо тошнотворный и усиливаетъ отдѣленіе слюны. Побѣги, употребляемые въ видѣ сиропа и экстракта полезны противъ біенія сердца. Между поселянами нѣкоторыхъ изъ нашихъ губерній существуетъ мнѣніе, что натирание кожи сокомъ спаржи, предохраняетъ отъ уязвленія пчелъ. Личинки жуковъ (*Scarabaeus melolontha L.*) составляютъ одно изъ самыхъ опасныхъ для спаржи насѣкомыхъ, потому они должны быть убиваемы тотчасъ же, какъ только замѣчены на ней, а самое растеніе, на которомъ они найдены, вырывается вонъ съ корнемъ и уничтожается.

\* **Asperuba odorata L.** (*Смолка; шерошница душистая; ясменникъ.*—*Gemeiner Waldmeister.*—*Petit muguet; reine des Bois.*) Растетъ на тучной почвѣ по лѣсамъ. Ея корни доставляютъ алую краску, годную для крашенія тканей, но низшаго достоинства сравнительно съ крапомъ. Свойства этого растенія слаботоническія. Въ Германіи смолкою настаиваютъ водку, которая

получаетъ черезъ это чрезвычайно прятый аромать. Вкусъ всѣхъ частей ясенника слабо-горьковатый. Употребляется какъ потогонное, въ формѣ чая.

**Aspidium filix mas. Schwarz (Polypodium filix mas L.).**  
(Папоротникъ мужской; разрывъ трава. — *Gebräulicher Wurmfarrn.* — *Fougère mâle.*) Растетъ по влажнымъ равнинамъ и лѣсамъ. Запахъ этого растенія слабо-тошнотворный, вкусъ горьковатый. Содержитъ въ себѣ: летучее масло, галлусовую и укусную кислоты, сахаръ, жирное вещество, танинъ, крахмаль, филицинъ и папоротниковую кислоту.

Дѣйствителенъ только свѣжій и тщательно сохраняемый корень, собранный подѣ конецъ лѣта и осенью. Въ большихъ приѣмахъ онъ производитъ тошноту, душеиe, рвоту, иногда поносъ и рѣзь. Съ давнихъ временъ пользуются имъ для изгнанія ленточнаго глиста; онъ повидимому, дѣйствуетъ въ этомъ отношеніи вѣрнѣе всѣхъ употребляемыхъ съ этою цѣлью веществъ. Потому, по крайней мѣрѣ, слѣдовало бы испытывать папоротниковый корень прежде, нежели прибѣгать къ сильнѣйшимъ, болѣе опаснымъ средствамъ, къ проноснымъ и др.

Почти всѣ точные наблюдатели согласны, что время употребленія этого корня (какъ и всѣхъ противоглистныхъ средствъ) весьма важно для успѣха. Одно и то же средство можетъ у того же больнаго дѣйствовать въ одно время, а въ другое нѣтъ. Такъ нѣкоторые врачи признаютъ новолуніе и уменьшеніе луны за самое лучшее время, и въ многочисленныхъ случаяхъ дѣйствительно въ это время ожесточались, усиливались такъ называемые глистные припадки, и испражнялись части ленточнаго глиста, который, можетъ быть, опускался ниже въ толстую кишку. Такого времени должно дожидаться, чтобы давать папоротниковый корень и т. д., съ приблизительно-вѣрнымъ успѣхомъ. Пешье считаетъ почки папоротника дѣйствительнѣе корня его. Принимаютъ его въ видѣ порошка, отъ 1—3 чайныхъ ложекъ, по нѣскольку разъ въ день, утромъ натощакъ, съ водою, бульономъ, мелиссовою и мятною водою и т. п.; также въ видѣ каши. Отваръ дѣйствуетъ менѣе вѣрно. Послѣ нѣкоторыхъ приѣмовъ хорошо давать слабительное: какъ клещевинное масло, ялашу и проч. Вмѣстѣ съ тѣмъ велѣть кушать чеснокъ, сельди, ветчину и т. п., всего лучше уже нѣсколько дней до принятія корня, опредѣляютъ вообще діету, назначаютъ напр. умѣренную голодную діету, запрещаютъ, по возможности, мучную пищу, молоко и др., а наканунѣ дня употребленія корня даютъ слабительное, напр. глауберову или горькую соль. Потомъ между прочими можно назначать также горькія вещества: полынь, квасцовы и т. п., или кино и др.

Часто назначаютъ сперва слабительныя, чтобы болѣе очистить кишечный каналъ и, такимъ образомъ, способствовать

къ дѣйствию корня и т. д. на самыхъ глистовъ; однако, этимъ, при обстоятельствахъ, желудокъ и кишечный каналъ могутъ сдѣлаться еще чувствительнѣе и разстроиваться отъ корня и т. д. въ болѣе высокой степени. Другіе даютъ сперва горькія вещества, особенно хининъ, отчего ленточный глистъ, говорятъ, слабѣетъ и потомъ легко выводится.



*Arum maculatum.*  
Клещенца.  
(Къ стр. 27).

образомъ. Выжатый изъ нихъ и очищенный сокъ полезенъ противъ воспаления горла и кишекъ. Растетъ въ садахъ, огородахъ и на поляхъ, повсемѣстно. Сѣмена лебеды имѣютъ свойства рвотно-слабительныя.

Трава безвкусна и запаха не имѣетъ.

Нѣкоторые врачи совѣтуютъ употреблять лебеду въ пищу страдающимъ брюшными завалами, желтухою и частыми запорами. Снаружи лебеда служитъ смягчительною припаркою,

Экстрактъ папоротникова корня, приготовленный посредствомъ сѣрнаго эѳира, представляетъ густую жидкость, зеленоватаго цвѣта, имѣетъ остро-горькій вкусъ и не растворяется въ водѣ. Считается вообще за одно изъ вѣрнѣйшихъ средствъ противъ ленточнаго глиста (особенно *taenia lata* s. *botriosephalus latus*); но онъ долженъ быть приготовленъ изъ свѣжаго корня и не слишкомъ старъ. Предъ корнемъ этотъ экстрактъ имѣетъ то преимущество, что его не нужно давать въ большихъ приемахъ, и что онъ дѣйствуетъ пріятнѣе и вѣрнѣе. Только въ большихъ приемахъ онъ часто производитъ тошноту. Предъ нѣкоторыми другими средствами, противъ ленточнаго глиста, онъ имѣетъ ту выгоду, что менѣе разстроиваетъ желудокъ и т. д. Даютъ отъ 20 — 30-ти гран., раздѣленныхъ на нѣсколько приемовъ, напр. чрезъ 1—2 часа, или утромъ и вечеромъ; между приемами или послѣ нихъ слабительное, сенну съ солями, клещевинное масло. Можно смѣшивать этотъ экстрактъ съ сиропомъ, медомъ; еще чаще даютъ его въ видѣ пилюль, съ порошкомъ корня.

\* *Atriplex hortensis* L. (*Лебеда садовая*. — *Garten Melde*. — *Arroche des jardins*). Листья лебеды, по причинѣ содержащихся въ нихъ въ обиліи воды и слизи, дѣйствуютъ успокоивающимъ и освѣжающимъ



облегчающею подагрическія боли, почечуиный шишки и цидру болящія опухоли; въ клистирахъ вареная, съ прибавленіемъ льнянаго масла и меда, разводитъ сгущенныя мокроты, и слабить. Листья и цвѣтъ разновидности этого вида Красной лебеды рекомендуютъ пить вмѣсто чаю, для разведенія вязкихъ мокротъ и отъ хрипоты. Сѣмена садовой лебеды, принятыя внутрь до 1 драхмы, возбуждаютъ рвоту и слабятъ; въ меньшемъ количествѣ, они почитаются хорошимъ средствомъ для страждущихъ англійскою болѣзною.

Въ неурожайные годы, изъ сѣменъ лебеды дѣлаютъ муку, изъ которой, мѣшая ее съ ржаной, пекутъ хлѣбъ. Свѣжая молодая трава вмѣстѣ со шавелемъ, вареная съ рыбою или мясомъ, заступаетъ у крестьянъ мѣсто свѣжей и кислой капусты. Нижегородскіе поселяне готовятъ изъ зрѣлыхъ сѣменъ лебеды крупу, годную для каши. Свѣжіе листья ея прикладываютъ въ большому мѣсту въ ноготѣдѣ и при занозахъ.

**Atropa Belladonna L.** (*Красавица; сонная одурь; пещи вишни; черная псинки; вѣтряная ягода.*—*Gemeine Tollkirsche.*—*La Belladone*). Растетъ по дѣсамъ и тѣнистымъ мѣстамъ въ умѣренной полосѣ Россіи. Содержитъ въ себѣ: атропинъ (кристаллизующійся, летучій алкалоидъ), такъ назыв. псевдотоксинъ (горькое, наркотическое вытяжное вещество), камедь, бѣлокъ и т. п. съ особенною летучею кислотою (атроповою кислотою). Корень имѣетъ еще больше атропина, нежели листья, дѣйствуетъ сильнѣе и ядовитѣе; и сѣмя, какъ и всѣ части сонной одури, содержатъ атропинъ. Однако зрѣлыя ягоды дѣйствуютъ только въ большихъ приемахъ и то не въ высокой степени.

Корень должно собирать весною, листья въ началѣ цвѣтенія.

Листья и корень имѣютъ горьковатый и немного острый вкусъ. Мѣстно сонная одурь (корень и листья) раздражаютъ мало, хотя она производитъ чувство шекотанія и жжения въ зѣвѣ, и въ большихъ приемахъ можетъ раздражать пищеварительные пути и ихъ слизистую оболочку въ такой степени, что происходятъ кровавыя испраженія. Въ гораздо высшей степени эти дѣйствія свойственны атропину.

Сонная одурь, даже въ малѣйшихъ приемахъ, производитъ расширеніе зрачка, вводится ли она въ желудокъ, въ глазъ или въ другія мѣста, благопріятствующія къ ея всыпанію. Говорятъ, что для этого достаточно даже  $\frac{1}{1000}$  гр. экстракта, введеннаго въ глазъ, также  $\frac{1}{10000}$  гр. атропина или испаренія водянаго раствора атропина и его солей.

Когда принимаютъ малые приемы, то первое дѣйствіе обыкновенно состоитъ въ упомянутомъ чувствѣ шекотанія и большой сухости въ зѣвѣ и глоткѣ, съ жаждою, особенно же съ расширеніемъ зрачка и часто съ особенною, нерѣдко болѣзненною сла-

бостью и потемнѣніемъ зрѣнія. Часто эти припадки выражаются въ болѣе высокой степени: боль въ шеѣ становится сильнѣе, является совершенная слѣпота, искры въ глазахъ, шумъ въ ушахъ и другія неправильности въ отправленіи слуховыхъ нервовъ, вмѣстѣ съ головою болью, оглушеніемъ, тошнотою, душеніемъ и часто съ настоящею рвотою. Зрачекъ теряетъ свою подвижность, а раекъ часто едва виденъ на краѣ роговой оболочки. Соединительная оболочка глазаго яблока, даже кожа всего лица, проникнуты кровью, красны, пульсъ частъ, полонъ, температура тѣла возвышена; происходитъ потъ и нерѣдко скарлатиноподобная сыпь; притомъ часто сильное отдѣленіе мочи и болѣею частью безсонница. Иногда наблюдали также боль при мочеиспусканіи, судороги мочеваго пузыря и т. п. Эти припадки отравленія могутъ продолжаться нѣсколько дней. Иногда они происходятъ довольно поздно, нѣсколько часовъ послѣ употребленія сонной одури.

Отъ *болышихъ* *пріемовъ* эти припадки достигаютъ гораздо высшей степени. Является рвота и отравленный едва въ состояніи глотать, и часто вовсе не можетъ этого безъ сильнѣйшей одышки. Скоро происходитъ разительная слабость мышщъ и нечувствительность, замѣшательство, даже совершенное оглушеніе, спячка, съ молчаніемъ или яростнымъ, часто весьма веселымъ бредомъ. Отравленный смѣется, реветъ или говоритъ скоро и несвязно, какъ въосторженный пьяный или помѣшанный; онъ едва держится на ногахъ, лицо надутъ, темнокрасно, часто фиолетово и сонныя артеріи бьются. Часто происходитъ постепенно параличъ говорныхъ мышщъ и вмѣстѣ съ тѣмъ заиканіе; наконецъ голосъ совершенно прекращается. Дыханіе затруднено въ высокой степени, отравленный весьма беспокоенъ, и только при высшей степени отравленія и оглушенія совершенно неподвиженъ и нечувствителенъ; пульсъ чрезвычайно частый, полный, скорый, наконецъ неравномѣрный и перемежающійся. Мышцы конечностей, также лица, губъ и т. д. постоянно безпокойны, подергиваются, и наконецъ парализуются; особенно ноги слабѣютъ и болѣе или менѣе нѣмвуютъ. При такихъ припадахъ часто является смерть, обыкновенно безъ предшествовавшихъ судорогъ.

Атропинъ дѣйствуетъ подобнымъ образомъ, только съ несравненно болѣею силою, такъ что уже  $\frac{1}{10}$  гр. можетъ произвести у человѣка опасные припадки отравленія.

У *болышихъ* можно ожидать отъ сонной одури только такихъ дѣйствій, которыя вообще можетъ произвести успокоительное, оглушающее средство.

Ее употребляютъ противъ нервныхъ страданій въ тѣсномъ смыслѣ, особенно противъ невралгій и нервного раздраженія, противъ мигрени, свинцовой колики, судорожныхъ страданій,

\*

эпилепси, столбняка, пляски св. Вита, водобоязни, нервных страданій дыхательныхъ органовъ,—противъ одышки, грудной жабы, коклюша, чахотки, хроническаго катарра и т. п. съ сильнымъ кашлемъ; наконецъ противъ душевныхъ болѣзней, сумашествія, помѣшательства родильницъ и меланхоли.

Всего благоприятѣе сонная одурь дѣйствуетъ противъ невралгій, напр. бедренной боли (ischias) и другихъ болѣзненныхъ состояній, противъ которыхъ она составляетъ лучшее паллятивное средство, менѣе однако противъ гастралгій и рѣзи въ кишкахъ. Въ другихъ случаяхъ, напр. при укушеніи собаками, она можетъ быть нѣсколько полезна тѣмъ, что лишаетъ больного возможности сознавать опасность болѣзни; далѣе при легочной чахоткѣ, хроническомъ воспаленіи гортани и болѣзняхъ дыхательныхъ органовъ вообще, такъ какъ она вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшаетъ кашель.

Труссо считалъ сонную одурь за лучшее средство противъ коклюша, давая приемами по  $\frac{1}{6}$  гр. корня ея, назначая сперва рвотное. Делайе давалъ противъ этой болѣзни сонную одурь въ видѣ сиропа (кофейную наливку съ вытяжкой сонной одури и и рвотнымъ корнемъ), чайными ложками. Противъ свицовой колики (назначали порошокъ изъ корня и экстракта сонной одури; послѣдній также въ клистирѣ, для втиранія въ животъ, часто съ экстрактомъ опія) сонная одурь дѣйствуетъ гораздо менѣе, нежели опій. Противъ *ипохондри* (какъ и астматическихъ страданій), сонную одурь даютъ какъ предохранительное средство противъ эпилептическихъ припадковъ, чтобы отсрочивать и и ослаблять ихъ, напр. 3 гр. экстракта на чашку воды, по 3 стол. лож. въ день.

Кромѣ того по успокоивающему, болеутоляющему и противосудорожному дѣйствию, сонная одурь часто весьма полезна въ различныхъ болѣзняхъ, сопряженныхъ съ возвышенною раздражительностью, сильною болью или судорожными сокращеніями мышечныхъ контрактильных частей. Такъ при раздраженіи и воспаленіи особенно наружныхъ частей, периферическихъ нервовъ и ихъ влагалищъ, глазныхъ оболочекъ, при жабѣ (angina), зретицескомъ глазномъ тускѣ съ свѣтобоязнью, расширеніемъ зрачка, потемнѣніемъ зрѣнія и т. д., при судорогахъ кругловидныхъ мышцъ вѣкъ, различныхъ запирающихъ мышцъ, какъ маточнаго отверстія, матки, мочеиспускательнаго канала и мочеваго пузыря; при вщемленныхъ грыжахъ и незадуѣ, при задержаніи мочи, особенно дѣтей, вслѣдствіе слишкомъ сильнаго раздраженія мочеваго пузыря; при болѣзненныхъ геморoidalныхъ шишкахъ, зудѣ и трещинахъ задняго прохода и при свищахъ; при напряженіи дѣтороднаго ствола и сменетеченіи при подобныхъ обстоятельствахъ; также при подвздошной коликѣ (icus), привычной рвотѣ, кровавомъ мочеотдѣленіи, слюнотече-

ннн и болъзненныхъ (ревматическихъ и артритическихъ) страданннхъ суставовъ, при раздраженнн къ кашлю и т. д. И при болъзненныхъ язвахъ, желъзистыхъ опухоляхъ и ракъ сонная одурь облегчаетъ боль, оглушаетъ больныхъ, и по видимому часто можетъ замедлить ходъ болъзни (подобно омегу).

Во многихъ изъ этихъ случаевъ сонная одурь можетъ быть полезною, по крайней мъръ противъ отдълныхъ припадковъ и сопряженнй, при надлежащемъ употребленнн другихъ, можетъ быть, болъе нужныхъ средствъ.

Въ акушерствъ она играетъ значительную роль, особенно противъ судорогъ и сокращеннн маточнаго рыльца во время и послъ родовъ, въ этомъ случаъ мазъ изъ сонной одури намазываютъ въ самое маточное рыльце, но впрыскиваннне воднаго раствора экстракта удобнне, потому что при употребленнн мази большая часть ея намазывается въ маточное влагалище, а скорому истеченну впрыснутаго раствора препятствуютъ приличнымъ положеннемъ роженицы. При этомъ, впрочемъ, должно опасаться не только раздраженн дътородныхъ органовъ, но и отравленн; между тъмъ какъ теплыя ванны, немного рвотнаго камня и т. п. болъе невннныя средства, не менне могли бы дйтствовать.

Вообще сонная одурь по видимому всего полезнне при мстномъ ея употребленнн противъ боли и судороги наружныхъ и доступныхъ снаружн частей, по крайней мъръ какъ паллятивное средство, между тъмъ какъ при подобныхъ внутреннхъ страданнхъ всегда можно ожидать лучшаго успха отъ опнн, морфия и др.

Чаще и върнее сонная одурь употребляется, особенно снаружн, для расширенн зрачка; такъ передъ ннкоторыми глазными операциями, напр. бълма (гдъ ее однако ннкоторые отвергаютъ), или чтобы лучше изслдовать болне глубокня части глазъ; далне при эксудативномъ воспаленн райка, угрожающемъ сращеннн и свищевыхъ язвахъ роговой оболочки, съ начинающимъ выпаденнемъ ея (однако еще перелъ слнпленнемъ или вцемленнемъ радужной оболочки), при пораженн райка.

Съ этою цъллю обыкновенно пользуются экстрактомъ, который втирается въ видъ мази въ окружности глазъ и т. д., или употребляютъ его въ растворъ, и обыкновенно соединяютъ съ нимъ бълну, чтобы дйтствие было върнее.

Гравъ совтъуетъ употреблять сонную одурь даже во всъхъ болъзняхъ (какъ въ тифъ, воспаленн мозга), гдъ зрачекъ часто представляется необыкновенно сжуженымъ; однако это средство у такихъ больныхъ почти неприлично противъ такого припадка, который можетъ быть самъ по себъ весьма неваженъ.

Наконецъ должно еще упомянуть о *предохранительномъ* употребленн сонной одури противъ *эпидемической скарлатины*. Га-

неманъ (который первый продавалъ во Франціи сиропъ изъ сонной одури, какъ предохранительное средство противъ скарлатины), наблюдая, что сонная одурь часто производитъ боль въ зѣвѣ, трудное глотаніе, иногда подобно нѣкоторымъ другимъ веществамъ даже разныя сыпи, заключилъ по своему обыкновенному правилу «*similia similibus*», что она должна быть полезною и противъ скарлатины, которая, какъ извѣстно, постоянно сопровождается жабою, затрудненнымъ глотаніемъ и краснотою кожи. Гуселандъ, обязанный за столь многое отвѣчать фармакологіи, своими постоянно готовыми рекомендаціями, ввелъ во всеобщее употребленіе это «предохранительное средство», которымъ уже прежде пользовались по старой привычкѣ. Въ медицинской литературѣ исчислены многіе случаи успѣха и неудачи, изъ которыхъ явствуетъ, что дѣти и другія лица, принявшія сонную одурь, часто избавлялись отъ заболѣванія скарлатиною, между тѣмъ какъ многіе другія поражались ею. Но понятно, что послѣдніе случаи болѣе доказываютъ, нежели первые, такъ какъ при эпидемической скарлатинѣ многіе остаются здоровыми, хотя и не употребляли сонной одури какъ предохранительное средство.

Внутрь даютъ белладону съ большою осторожнію въ видѣ порошка (изъ листьевъ или корня): по 1 грану, до 3 въ день, и мало по малу возвышаютъ приемъ до 6 и 8 гранъ взрослымъ людямъ; младенцамъ отъ  $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$  грана; но болѣе 2—3 гранъ никогда не даютъ. По методу Менха: для предохраненія и врачеванія бѣшенства, корень этого растенія (*rad. a. belladonnæ*) черезъ день даютъ въ теплой водѣ или пивѣ, взрослымъ отъ 10—15 гранъ, младенцамъ 6-ти-лѣтнимъ до 5 гранъ, 4-хъ-лѣтнимъ 3 грана. Листовъ сушеныхъ (которые дѣйствуютъ слабѣе корня), взрослымъ отъ 12—16 гранъ, и по прошествіи 48 часовъ повторяютъ приемъ отъ 10—13 гранъ; нѣкоторые для лучшаго дѣйствія прибавляютъ ревенъ и сладкую ртуть. Въ видѣ наливки: 20 гранъ сухихъ листовъ наливаютъ 10 унціями выпячей воды, которую взрослымъ даютъ по 2 унц. нѣсколько разъ въ первые дни; потомъ ежедневно умножаются приемы, пока окажется сухость въ рту, напряженіе гортани, или круженіе головы. Снаружи, въ видѣ присыпки и припарки какъ упомянуто выше.

Въ аптекахъ готовятъ:

Экстрактъ, или сгущенный сокъ травы красавицы (*succus spissat. a. belladonnæ*), употребляемый противъ упомянутыхъ выше болѣзней, въ которыхъ его даютъ на приемъ: отъ 1—3 гранъ. 1 часть этого экстракта, растворивъ въ 3 частяхъ чистой воды, впускаютъ по нѣсколько капелъ въ хроническихъ воспаленіяхъ глазъ и помраченіи зрѣнія.

Ягоды этого растенія, называемыя бѣшенными вишнями, весьма ядовиты, и по невѣдѣнію съѣденныя, причиняютъ

тягость, сонливость, безуміе, бѣшенство, судороги и смерть. Впрочемъ свиньи, овцы и другая скотина ѣдятъ оныя безвредно.

Лучшія противудѣйствующія этому яду средства суть: уксусъ, клюквенный сокъ, рвотное, теплое молоко, постное масло и мягчительные клистиры изъ ромашки и проч.

Атропинъ получается обработываніемъ спиртной настойки сонной одури гидратомъ извести, раствореніемъ (осажденнаго атропина) въ сѣрной кислотѣ, очищеніемъ посредствомъ углек. кали или животнаго угля и повтореннымъ раствореніемъ въ винномъ спиртѣ; также осажденіемъ экстракта сонной одури іодистымъ кали, содержащимъ іодъ, и разложеніемъ осажденной соли атропина помощью цинка и воды. Кристаллизуется (не чистый, окрашенный не кристаллизуется) подобно многимъ изъ его солей, растворяется легко въ винномъ спиртѣ, труднѣе въ эфирѣ, весьма мало въ водѣ; легко измѣняется на воздухѣ (превращаясь въ такъ назыв. тропинъ). Не имѣетъ запаха, вкусъ его сильно горькій и немного острый.

Атропинъ по видимому дѣйствуетъ какъ сонная одурь. Введенный въ глазъ, онъ уже приѣмомъ въ  $\frac{1}{10000}$  гр. расширяетъ зрачекъ; отъ  $\frac{1}{2}$ —1 гр., введеннаго въ язву кожи собаки становятся слабыми на ногахъ, а при введеніи его въ вену, онъ падаетъ мнимоумершими, однако оправляются большею частью скоро. При эндерматическомъ употребленіи онъ производитъ сильную боль (которая однако скоро исчезаетъ), и отъ проглатыванія  $\frac{1}{20}$ — $\frac{1}{5}$  гр. можетъ происходить сухость въ гортани, затруднительное дыханіе, расширение зрачка, головокруженіе, бредъ и т. д. Однако эти припадки обыкновенно продолжаются не больше 12—24 часовъ.


Атропинъ употребляютъ особенно часто снаружи, для расширения зрачка, при невралгіяхъ, судорогахъ (тутъ для втиранія), и въ этихъ случаяхъ онъ по видимому, большею частью, заслуживаетъ преимущества передъ сонною одурью и другими препаратами ея. Внутри его давали противъ эпилепсіи, пляски св. Вита и т. п., какъ сонную одурь, также въ перемеж. лихорадкѣ. Приемъ, какъ снаружи такъ и внутрь, сначала  $\frac{1}{20}$  гр., постепенно больше. Внутри приличнѣе давать его въ жидкомъ видѣ: въ настойкѣ, въ спиртномъ растворѣ. Одна капля его раствора, введенная въ глазъ, можетъ расширять зрачекъ. Этотъ растворъ можно давать также внутрь, нѣсколько капель на приемъ по нѣсколькы разъ въ день. Эндерматически сначала не больше  $\frac{1}{30}$  гр. р. д., постепенно до  $\frac{1}{6}$  гр. Въ видѣ мази 1—2 гр. на драхму жира, напр. при личной боли, втирать кусокъ величиною съ горошину.

Другой видъ того же рода: *Atropa mandragora* L. (Мужской корень; пскрижъ; Адамова голова; мандрагоръ; сонное зѣльце). Растетъ въ южной и умѣренной Россіи, по тѣнистымъ мѣс-

тамъ. Свойства его корня ядовитыя, зависящія отъ усыпительнаго остраго начала; *запахъ* свѣжаго корня непріятный, снотворный. *Вкусъ* горьковатый, тошнотворный; коренной корки: острый. При сушеніи острота значительно ослабляется.

Корень этого растенія даютъ въ малыхъ приемахъ: для утolenія боли и доставленія сна, особенно въ судорожныхъ припадкахъ, истерикъ, ломотъ и меланхоліи. Снаружи часто употребляется корень истолченный мелко и смѣшанный съ медомъ; а также распаривъ въ молокъ, корень прикладываютъ въ видѣ катаплазмы, для разведенія скуловыхъ опухолей (parotides), шейныхъ золотушныхъ скірныхъ затвердѣній, тугихъ паховиковъ и венерической окръпlosti ядеръ. Свѣжіе растертые листья тоже служатъ болеутоительною и разводящею катаплазмой.

Внутри корень мандрагоры дается въ наливкахъ, весьма небольшими приемами, полагая 20 гранъ сухаго толченаго корня на 10 унцій кипячей воды, и настоявъ  $\frac{1}{2}$  часа, процеженную наливку даютъ по столовой ложкѣ, нѣсколько разъ въ день. Въ порошокъ принятый отъ 2—3 гранъ, производитъ усыпительное дѣйствіе. Для укрощенія жестокой ломоты и подагрической боли его даютъ отъ 1—4 гранъ въ день, растерши съ медомъ.



*Asparagus officinalis.*  
Скоржа.  
(Къ стр. 31).

\* *Avena Sativa* L. (*Овесъ*.—*Hafer*.—*Avoine*). Воздѣлывается во всей Россіи. Овесъ содержитъ въ себѣ весьма много крахмалу и большое количество сахарныхъ частей.

Свойства его притупляющія, смягчительныя, питательныя, противуглиостныя. Отваръ овсяной крупы служитъ прохладительнымъ питьемъ, въ воспалительныхъ лихорадкахъ и горячкахъ; съ прибавленіемъ небольшого количества селитры, этотъ отваръ полезенъ въ лихорадкахъ, при большихъ ранахъ, ушибахъ, переломахъ костей, нарывахъ и т. п. воспалительныхъ опухоляхъ. Овсяная каша, вареная съ изюмомъ, или съ молокомъ, дается съ пользою кашляющимъ, сухотнымъ и склоннымъ къ чахоткѣ. Овсяный кисель, тоже служитъ здоровою пищею въ лихорадочныхъ болѣзняхъ. Изъ овсяной крупы, наливаемой холодною водою, и потомъ подвергаемой броженію, процеженная жидкость и сгущенная умѣреннымъ вареніемъ на огнѣ, наподобіе желе, съ прибавленіемъ сахара и бѣлаго вина, составляетъ

очень полезное питье, укрощающее цингу. Снаружи цѣльный овесъ, подогрѣтый, или поджаренный на сковородѣ, прикладывается въ мѣшечкахъ, для утоленія простуднаго колотья, брюшныхъ спазмовъ, маточныхъ болей и въ началѣ ущемленія грыжи. Овсяную подогрѣтую муку одну, или смѣшавъ съ ромашечными, либо бузиными цвѣтами, прикладываютъ къ рожѣ, сваренная съ молокомъ наподобіе розмазни, служитъ мягчительною катаплазмой: въ воспалительной грудницѣ, абсцессахъ, паховикахъ и т. п. опухоляхъ. Овсяная мука, смѣшанная съ коровьимъ масломъ, очищаетъ головныя шолуды.

Для отвара, берутъ 3 унціи крупы, на 4 фунта воды (или 2 бутылки). Его употребляютъ какъ питье и промывательное. Въ первомъ случаѣ прибавляютъ простой медовой уксусъ, или клюквенный медъ. Къ обыкновеннымъ клистирамъ примѣшиваютъ постное масло и небольшое количество простой соли. Ловерово, поправляющее соки, питье (*ptisana Loweri*), состоитъ изъ овсянаго отвара, съ прибавленіемъ цикорнаго корня и селитры; его пьютъ большею частію для разведенія густыхъ мокротъ и унятоженія брюшныхъ завадовъ.

Въ аптекахъ изъ овса готовятъ: *Порошокъ всасывающій* (*pulvis absorbens*), который прикладывается снаружи къ рожѣ и другимъ подобнымъ внѣшнимъ воспаленіямъ, которыя не терпятъ мокрыхъ припаровъ.

*Катаплазма углистая*, или *бродящая* (*cataplasma fermentans*), прикладываемая къ гнилымъ язвамъ, антонову огню, и для отдѣленія помертвѣлости (*sphacelus*) и пр., оказываетъ очень хорошее дѣйствіе, особенно въ соединеніи съ угольнымъ порошкомъ.

*Катаплазма созрѣвающая*, или *въ нагноеніе приводящая* (*cataplasma pus maturans*) паховики, нарывы, чирьи и проч.

Толокно и саламату, приготовляемую въ деревняхъ изъ овсяной муки, даютъ въ кровохарканіи, сухоткѣ, чахоткѣ, простыхъ и кровавыхъ поносахъ. Она же можетъ замѣнять для бѣдныхъ аравійскую камедь и салець.

Хлѣбъ, приготовляемый изъ овсяной муки, бываетъ черный, горькій и тяжелый для желудка. Овсяное пиво тоже горько, и скоро окисаетъ; но для цинготныхъ больныхъ почитается полезнымъ средствомъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи изъ овса дѣлаютъ простое вино, которое двоеніемъ даетъ превосходную водку.

Въ деревняхъ, подогрѣтымъ овсомъ припариваютъ животъ отъ колики или рза въ кишкахъ, также отъ простуднаго колотья, какъ бы насквозь прострѣливающаго отъ груди до спинной кости; нагрѣтымъ овсомъ въ этихъ случаяхъ припариваютъ спину и грудь, давая притомъ пить чай изъ цвѣтовъ бузины или ромашки и другихъ травъ, производящихъ испарину.



В.

**Ballota lanata.** (*Leonurus lanatus* L.) (Собачья мята; чернокну дремикъ волосистый. — *Ballote*. — *Ballote*.). Растетъ по каменистымъ и невоздѣланнымъ мѣстамъ Сибири. Трава и листья этого растенія содержатъ смолу, вытяжное и дубильное вещество, воскъ и соли. Пользуются ими для умноженія мочи. Они употребляются, хотя довольно рѣдко, противъ водянки, ломоты и ревматизма, въ отварѣ, по унціи и болѣе въ день.

\* **Bellis perennis** L. (*Маттаритка; бѣлая скоростѣлка; бѣлцы; стоццать.* — *Ausdauernde Masliebe.* — *Paquerette*). Растетъ по лугамъ, почти во всей Россіи. Вкусъ цвѣтовъ и травы слабо-соленый, травянистый. Свойства ихъ раноцѣлительныя и разводящія. Впрочемъ, по отзыву нѣкоторыхъ врачей, маргаритка лишена всякой цѣлебной силы; тѣмъ не менѣе многіе медики, а равно и народные лекари употребляютъ ея траву въ чахоткѣ, брюшныхъ завалахъ и запорахъ мочи. Кромѣ того Миндереръ совѣтуетъ употреблять противъ колотьевъ и другихъ простудныхъ припадковъ салатъ изъ весеннихъ листьевъ маргаритки. Наконецъ, толченая трава этого растенія прикладывается для очищенія и заживленія старыхъ ранъ, а отваромъ всѣхъ частей его примачиваются затвердѣлыя шейныя желваки для разогнанія оныхъ. Отваръ готовится изъ горсти травы на 8 унцій кипятку; его принимаютъ два или три раза въ день. Въ деревняхъ траву маргаритокъ пьютъ отъ надсады, происходящей отъ поднятія большихъ тягостей. Для этой цѣли поселяне готовятъ отваръ изъ двухъ горстей цвѣтущихъ маргаритокъ на бутылку воды, которая уваривается за тѣмъ на половину. Продолженный отваръ пьютъ въ теченіе 2-хъ недѣль, ежедневно на тощакъ по рюмкѣ, прибавляя въ него по чайной ложкѣ печной хорошо растертой сажы.

\* **Berberis vulgaris** L. (*Барбарисъ; кислица; гаклунъ; дикий тернъ.* — *Gemenier Sauerdorn.* — *Erpne-vinette*). Кустарникъ, растущій въ изобиліи въ южныхъ частяхъ Россіи и Сибири, по сухимъ и песчанымъ лѣсамъ и встрѣчаемый въ аклиматированномъ состояніи въ садахъ прочей полосы. Всѣ части барбариса имѣютъ горькій вкусъ. Листья и древесина вымачиваніемъ ихъ въ поташномъ щелокѣ, доставляютъ желтую краску,

удобную въ особенности для крашенія дерева. Ягоды отличаются кислымъ, освѣжающимъ, нѣсколько вяжущимъ вкусомъ. Ягоды совѣтуютъ употреблять въ воспалительныхъ, желчныхъ, гнилыхъ лихорадкахъ, желтыхъ горячкахъ соединенныхъ съ гнилымъ поносомъ. Свѣжіе и сухіе плоды, отваренные въ водѣ, употребляютъ вмѣсто питья. Корка имѣетъ полезное дѣйствіе въ желтухѣ, теченіи бѣлей; сокъ выжатый изъ ягодъ принимаютъ разбавляя его водою (4 или 6 унцій сока кладутъ на кружку воды). Корку барбариса употребляютъ или въ водяной наливкѣ, или въ водѣ винной настойки. Для приготовления первой 1 унція коры кладется на бутылку воды, а послѣдняя изготовляется изъ 12 унцій водки или спирта и 2 унцій коры.

Въ аптекахъ готовятъ изъ барбариса:

*Варенье и сиропъ барбарисовый*, которые одобряются въ горячкахъ, поносѣ и цингѣ, для утоленія жажды и жара. Ихъ примѣшиваютъ также къ питью, или къ другимъ лекарствамъ отъ 1—2 унцій.

Барбарисный сокъ въ медицинѣ и экономіи можетъ совершенно замѣнить лимонный, и потому многіе употребляютъ его для приправы кушанья, въ желе и въ пушшѣ. 1 часть этого сока, 2 части сахара, 3 араку и 6 частей горячей воды составляютъ пріятный пушшъ. Изъ ягодъ готовятъ хороший укусъ и водку.

\* *Beta vulgaris L.* и *Beta cicla L.* (*Свекла. — Gemeiner Mangold. — Bette commun.*). Суть двѣ разновидности одного и того же вида. Та и другая изъ нихъ разводится у насъ повсемѣстно въ огородахъ. Имѣетъ значеніе во врачевномъ искусствѣ по сахару, добываемому изъ ея разновидности, такъ называемой свекловицы. Самый же сахаръ употребляется какъ примѣсъ къ другимъ лекарственнымъ веществамъ.

\* *Betonica officinalis L.* (*Буковица черная; гасникъ. — Gerbräuliche Betonie. — Bétoine officinale.*). Растетъ въ средней полосѣ Россіи по дугамъ и свѣтлымъ лѣсамъ. Запахъ травы и цвѣтовъ непріятный, производящій при продолжительномъ его вдыханіи родъ опьяненія. Вкусъ, горькій зависящій отъ содержащагося въ ней экстрактнаго вещества и небольшого количества летучаго масла. Свойства цвѣтовъ и травы буковицы укрѣпляющія; корни рвотныя. Трава и цвѣты употребляются многими съ пользою въ слабости нервовъ, головныхъ припадкахъ, судорожныхъ болѣзняхъ, простудной ломотѣ, поврежденіи легкаго и почки. Буковица, употребляемая вмѣсто чая съ медомъ, оказываетъ ранозѣлительное дѣйствіе. Кромѣ того ее рекомендуютъ противъ маточныхъ припадковъ, обмороковъ, головной боли, подагры, онѣмѣлости членовъ, тягры или боли въ вертлугахъ, чревныхъ заваловъ, желтухи, мокротной чахотки,

цинготныхъ и другихъ изнурительныхъ поносахъ. Сушеные листы, истертые въ порошокъ, нюхаютъ, для возбужденія и отдѣленія мокротъ, въ долговременномъ насморкѣ и головной боли. Буковичный корень и мѣть слабительное и рвотное дѣйствіе; а потому нѣкоторые употребляютъ его въ отварѣ, подсластивъ медомъ, какъ проносное; а въ наливкѣ и въ большомъ количествѣ, какъ рвотное, очищающее желудокъ и кишки отъ мокротъ.

Наливка готовится изъ 1 унціи или горсти сухой травы и 12 унц. горячей воды. Снаружи отваренная въ водѣ, служитъ разбивающею припаркою и примочкою для ранъ; корень, въ порошокъ отъ 20 гранъ до полдрахмы дается съ медомъ, какъ рвотно-слабительное средство.

Траву буквицы должно собирать во время ея разцвѣтанія, и высушивъ на солнцѣ, беречь въ сухомъ и закрытомъ мѣстѣ.

Деревенскіе лекаря буквичный корень употребляютъ вмѣсто ипекакуаны и ревеня, т. е. какъ рвотно-слабительное средство.

Простой народъ припариваетъ болящія ядра буквицею, вареною съ виномъ. Мокшанцы парятъ буквицею чахлаыхъ дѣтей. Дѣвушки, страдающія блѣдною немощію, пьютъ буквицу въ винной настойкѣ, для полученія въ лицѣ румянца. Буквицу, отваренную въ молокѣ, даютъ рогатому скоту отъ воспаления кишекъ, ежели оно послѣдовало отъ ядовитой или острой съѣденной травы.

Листы съ цвѣтными верхушками, шерсть, приготовленную съ висмутомъ, окрашиваютъ темнооливковымъ постояннымъ цвѣтомъ.

\* *Betula alba* L. (*Бѣлая береза*. — *Weisse Birke*. — *Boulean blanc*). Растетъ почти всюду, даже тамъ, гдѣ уже исчезаетъ всякая растительность; такъ ее встрѣчаютъ даже въ нашемъ крайнемъ сѣверѣ, почти подъ самымъ полюсомъ (наприм. въ Гренландіи, гдѣ она является уже не высокимъ деревомъ, а низкорослымъ кустарникомъ). Обитатели Камчатки, по словамъ одного путешественника, употребляютъ рубленную бѣрезовую кору, смѣшанную съ икрою, въ пищу.

Въ Швеціи изъ бѣрезоваго сока готовятъ сиропъ, который во многихъ случаяхъ можетъ замѣнить сахаръ; кромѣ того, изъ него же здѣсь дѣлаютъ чрезвычайно пріятнаго вкуса спиртоватый напитокъ. Сережки бѣрезы, по отзыву Галлера, доставляютъ воскъ подобный пчелиному. Кромѣ бѣлой бѣрезы у насъ встрѣчаются еще нѣсколькихъ другихъ видовъ ея, которые могли бы быть приличнѣе названы разновидностями, а именно: \* *Бѣреза пушистая* (*B. pubescens Ehrh*), растущая по влажнымъ мѣстамъ. \* *Бѣреза низкая* (*B. Humilis. Schrk*), кустарникъ вышиною до 6 футовъ, и \* *Бѣреза-ерникъ* (*B. nana L.*),

встрѣаемый по торфянымъ болотамъ кустарникъ 4-хъ футовъ вышины, съ ползучимъ корнемъ и пушистыми молодыми вѣтвями.

Кора бѣрезы содержитъ въ себѣ: смолистое и экстрактивное вещества; особое вещество бетулинъ, танинъ, алюминій, окиси желѣза, кремнеземъ и углекислую известь.

Эта кора доставляетъ очень хорошую, но не прочную желто-коричневую краску, которую въ Сибири употребляютъ для крашенія шерстяныхъ тканей. Изъ нее можетъ быть также выжимаемо масло, годное для горѣнья и приготавливается порошокъ для дубленія кожъ.

Свойства бѣрезы мочегонныя, потогонныя и противулихорадочныя.

Употребляютъ наливку изъ листьевъ въ простудныхъ przypadкахъ, цинготной ломотѣ, въ чесоткѣ и другихъ сыпяхъ, зависящихъ отъ нечистоты крови. Крѣпкимъ отваромъ бѣрезовыхъ листьевъ омывають нечистыя сыпи, припариваютъ водяныя и ломотныя опухоли; отваръ средней горьковатой корки полезенъ въ перемежныхъ лихорадкахъ и худосочныхъ язвахъ. Смолистыя почки, собранныя весною и настоянныя въ винномъ спиртѣ или водкѣ, составляютъ домашній ранозѣлительный бальзамъ. Для приготовления наливки, 2 унціи листовъ или корки наливаются 3 фунтами воды, которую кипятить должно до тѣхъ поръ, пока останется 2 фунта отвара. Принимать по чайной чашкѣ, нѣсколько разъ въ день. Въ видѣ сухой припарки нагрѣтые листы привлаживаются къ рожѣ.

Если весною просверлить стволъ бѣрезы, то изъ него истекаетъ сокъ, имѣющій сладковатый *вкусъ*, и дѣйствующій какъ противуцинготное. Употребляется онъ въ чесоткѣ и при мелкихъ глистахъ.

Пьютъ этотъ сокъ по ставану натошакъ, продолжая нѣсколько недѣль и наблюдая приличную діету, какъ обыкновенно совершается весеннее леченіе, служащее къ поправленію соковъ. Ежедневное умываніе лица этимъ сокомъ, не вытирая онаго, очищаетъ пятна.

Бѣрезовое масло (*oleum betulinum*), иначе называемое чистымъ дегтемъ, ~~запахъ имѣеть непротивный~~, *вкусъ* масляно-островатый. Дѣйствіе его разбивающее, противуглистное, ранозѣлительное.

Употребляется противъ глистовъ, въ мочевыхъ припадахъ, слѣпотѣ, раздутомъ почечуѣ, раковыхъ, червивыхъ и другихъ злокачественныхъ язвахъ.

Внутрь употребляется слѣдующимъ образомъ: взявъ свѣжаго бѣрезоваго сока и дегтярной воды по 1 фунту, смѣшиваютъ ихъ и принимаютъ въ нѣсколько разъ въ теченіи дня для очищенія накожныхъ сыпей, золотухи, шолудей и проказы.

Чистый деготь, смѣшавъ съ бараньимъ или свинымъ саломъ по равной части, составляетъ *мазь*, которая истребляетъ дурныя кожныя сыпи и нечистыя пятна.

Молодые бѣрезовыя почки даютъ перегонкою пріятное и здоровое масло, подобное кошайскому бальзаму, того свойства упомянуты выше; изъ бѣрезовыхъ сережекъ можно вываривать родъ смолы, подходящей къ воску, изъ которой съ малою прибавкою сала можно дѣлать свѣчи.

\* **Bidens tripartita L.** (*Череда; двузубецъ; козы рожки; собачки; коноплянка.*—*Dreitheiliger Zweisahn.*—*Bidenstrifolié*). Растетъ по болотамъ и берегамъ водъ. Свойства ея мочегонныя и потогонныя. Ея съ особымъ успѣхомъ употребляютъ противъ золотухи. Въ особенности рекомендуютъ для этой цѣли наборъ изъ цвѣтовъ и травы череды, цвѣтовъ анютиныхъ глазокъ, листьевъ черной смородины и калииныхъ побѣговъ, смѣшанныхъ по равной части.

\* **Blitum L.** (*Жминда.*—*Erdbeerspinat.*—*La blette*). Къ этому роду принадлежатъ два вида: \* *Bl. capitatum* (*Жм. головчатая.*—*Traubenähriger*—*Erdbeerspinat.*—*La blette en tette*) и \* *Bl. virgatum L.* (*Жм. лозоподобная; красная бросовая трава.*—*Seitenblüthiger Erbeerspinat.*—*La blette effilée*), растущая по воздѣланнымъ мѣстамъ. Листья обихъ этихъ породъ почтиются мягчительными; употребляемая въ видѣ салата они полезны при разлитіи желчи.

\* **Boletus L.** (*Губка древесная; трутеникъ*). Во врачевномъ отношеніи имѣютъ значеніе слѣдующіе виды этого рода:

а) *Boletus ignarius L.* (*Губка древесная*). Растущая на гніющихъ пняхъ дубовыхъ, бѣрезовыхъ, вязовыхъ и липовыхъ деревьевъ.

Запаху и вкусу они не имѣютъ. Своимъ механическимъ дѣйствіемъ останавливаютъ кровь, почему и употребляются для остановленія кровотеченій изъ разсѣченныхъ артерій, или небольшихъ венъ. Во время прикладыванія должно стараться, чтобы пластинки мягкой губки непосредственно соприкасались къ разсѣченному сосуду. Положивъ одна на другую нѣсколько пластинокъ губки и покрывъ сложеннымъ полотенцемъ, ихъ укрѣпляютъ круговою повязкою. При сильномъ кровотеченіи должно предварительно посредствомъ жома — остановить кровотеченіе, и очистивъ рану до суха, потомъ уже прикладывать упомянутый шампонъ изъ трута, который, прижавъ повязкою, не отнимать до тѣхъ поръ, пока самъ не отпадетъ. Впрочемъ, при поврежденіи большой артеріи, какъ видно изъ опытовъ, одинъ трутъ ненадеженъ; но лучше всегда перевязать его посредствомъ нитки, и иглы, нарочю для этого употребляемой въ хирургіи.

Трутъ бѣрезовый, дубовый и проч. употребляется обыкновенно для высканія огня; для этого и хирургическаго употребленія отдѣляютъ внѣшнюю твердую корку и трубчатое вещество, потомъ разрѣзанную губку молотомъ разбиваютъ до тѣхъ поръ,

пока сдѣляется мягкой и удобно раздѣляющаея на меньшія пластинки. Если губку эту, помочивъ сутки въ селитряномъ растворѣ, потомъ высушить, то она весьма скоро загорается.

b) *Boletus suaveolens*, L. (*Губка вербная или пахучая*), растеть на вербѣ, или ивѣ.

Запахъ имѣеть благовонный, пріятный. Вкусъ ея горьковатый, а свойства противу-судорожныя. Употребляется въ чахоткѣ, сопряженной съ изнурительнымъ потомъ, судорожномъ удущь и въ ипохондріи.

Принимается въ порошокъ отъ  $\frac{1}{2}$ —2 драхмъ, по утру и въ вечеру, съ сахаромъ, медомъ, или съ молочной кашею.

Губку эту, собираемую съ ивовыхъ деревъ, истерши въ порошокъ, даютъ скотинѣ въ поилѣ, для предохраненія отъ падежа.

c) *Boletus Laricis* (*Бѣлая губка*). Растеть во множествѣ въ Сибири и Астраханской губерніи, на пняхъ листовицны.

Запаху не имѣеть; *вкусъ* сначала сладкій, послѣ тошновато-горькой, оставляющій нѣкоторую остроту на языкѣ. Свойство это зависитъ отъ смолисто-остраго начала.

Въ большомъ количествѣ дѣйствуетъ какъ слабительное, а иногда какъ рвотное; въ меньшемъ, останавливаетъ потъ.

Рекомендуютъ въ изнурительномъ потѣ больныхъ чахоткою, и для испражненія поглощенныхъ постороннихъ тѣлъ; нѣкоторые врачи одобряютъ ее противъ заваловъ внутренностей. Дается на ночь въ порошокъ по 2 грана съ водою; для слабительнаго отъ  $\frac{1}{2}$  — 1 драхмы; или въ наливкѣ, полагая 2 драхмы на 4 унціи горячей воды, подслащенной медомъ. Снаружи употребляется въ видѣ присыпки, противъ кровотеченія.

Коновалы въ Сибири, порошкомъ листовичной губки засыпаютъ у лошадей и коровъ червивыя язвы, для очищенія и заживленія ихъ.

Губка эта служитъ вмѣсто мыла, для чищенія платья; ибо съ водою пѣнится и вымываетъ грязь.

Бѣлую листовичную губку должно собирать зимою, и давая внутрь, прибавлять къ ней вишневый клей или другія слизистыя вещества для избѣжанія рѣзи въ кишкахъ.

\* *Borrago officinalis* L. (*Огуречная трава; сердечный цвѣтъ. — Gebräulicher Borretsch. — La Bourrache officinal*). Растеть въ дикомъ состояніи и разводится въ садахъ во всей умѣренной Россіи. Огуречная трава содержитъ въ себѣ: слизистое вещество, вещество азотистое, растворимое въ водѣ и нерастворимое въ винномъ спиртѣ, уксусовислыя и другія растительныя соли, соли извести и пр.

Свойства ея мягчительныя, мочегонныя и потогонныя. Употребляется съ особою пользою въ воспалительныхъ болѣзняхъ.

Трава и цвѣты *запаху* не имѣютъ; *вкусъ* травяной, нѣсколь-

но огуречный и слегка солоноватый, зависящий от заключающейся в ней селитры.

Употребляется в видѣ наливки и выжатого изъ свѣжаго растенія сока, въ воспалительныхъ лихорадкахъ или такъ называемыхъ огневицахъ; особливо при обнаруженіи въ нихъ внутренняго жара, непомѣрной жажды, сухаго кашля и запора. Въ краснухѣ, оспѣ, скарлатинѣ, въ брюшныхъ завалахъ, меланхолии и ипохондрическихъ припадкахъ, принимаютъ все растеніе, отвариваемое въ молочной сывороткѣ, или выжатый изъ него сокъ, съ сывороткою, довольно значительными приѣмами. Одинъ свѣжій сокъ одобряется въ каменной болѣзни. Для приготовления наливки, горсть свѣжей травы наливаютъ 6 унціями кипячей воды или сыворотки, которую пьютъ по чайной чашкѣ, нѣсколько разъ въ день; выжатый сокъ принимаютъ отъ 2 — 3 и 6 унцій, смѣшивая съ овсянымъ или ячменнымъ отваромъ. Весною молодую траву кушаютъ вмѣсто салата, и варятъ въ похлебкахъ. Въ прокъ заготавливается въ видѣ консервы.

• Это растеніе, будучи высушено, на огнѣ вспыхиваетъ и даетъ селитру. По замѣчанію Шмидмана, оно и подобныя ему растенія указываютъ селитроватую почву земли.

Сѣмя, принимаемое съ винограднымъ виномъ, умножаетъ молоко у кормилицъ; трава и цвѣты, настоянные въ той же жидкости, служатъ какъ возбуждающая эссенція.

\* *Brassica L.* (*Капуста.*—*Kohl.*—*Chou*). Принадлежитъ къ числу полезнѣйшихъ воздѣлываемыхъ растеній. Изъ ея видовъ заслуживаютъ особаго вниманія:

\* а) *Br. campestris L.* (*Кольза.*—*Kolza.*—*Colza*). Воздѣлываемая преимущественно для добываемаго изъ нея масла.

\* б) *Br. eruca L.* (*Бѣлая горчица; горумица.*—*Roquette*). Растетъ дико въ поляхъ южной Россіи. Употребляется противъ цинги, мокротной одышки и водяной болѣзни. Сѣмя принимается въ порошокъ отъ 10—15 гранъ и болѣе. Для наливки берется 1 унція на фунтъ бѣлаго вина. Эту послѣднюю пьютъ ежедневно по 6 унцій.

\* в) *Br. oleracea L.* (*Капуста огородная, или кочанная*). Растетъ во всей Россіи въ огородахъ. Любитъ почву тучную и низменную.

Листья бѣлой и красной свѣжей капусты *запаху* не имѣютъ; *скусъ* сладковато-водяной. При согниваніи испускаютъ много азота. Свойства ихъ прохлаждающія, питательныя, смягчительныя, противуцинготныя.

Вообще всякаго рода капуста производитъ вѣтры въ животѣ; а потому кислая или квашеная капуста (*brassica acidulata s. fermentata*), какъ для обыкновенной пищи, такъ и для предохраненія отъ цинги, имѣетъ преимущество. Для отвращенія пу-

ченія многіе, при заквашиваніи, прибавляютъ укропныя верхушки, или тминное сѣмя (*sem. carvi*). Свѣжая капуста, сваренная съ изюмомъ въ похлебку, одобряется: въ мокротномъ кашлѣ, хрипотѣ, начальной чахоткѣ и каменной болѣзни. Капустные листы, вареные въ бѣломъ винѣ, весьма полезны въ застарѣлыхъ язвахъ и проказѣ; толченые свѣжіе листы прикладываются къ шолудивымъ струнамъ у дѣтей (*tinia capitis*). Согретые, или смягченные листы горячею водою, прикладываются для утоленія волотья въ бокахъ; также покрываютъ оными разѣденныя мѣста послѣ шпанскихъ мухъ, для поддержанія нагноенія. Муррай совѣтуетъ родильницамъ покрывать груди распаренными листьями капусты, при излишнемъ теченіи молока, или сгущеніи онаго въ творогѣ. Отваромъ примачиваются ожоги, ознобленія, а въ запорахъ оныя служатъ, съ прибавленіемъ мыла лучшимъ промывательнымъ, испытаннымъ даже въ ущемленной грыжѣ (*hernia saccolata*). Вареные листы, съ прибавленіемъ свѣжаго масла или сала, служатъ хорошею смягчительною и нагрѣвающею катаплазмой, для многоверхушечныхъ вередовъ, или огневиговъ, паховиковъ, нарывовъ и другихъ воспалительныхъ опухолей. Выжатый сокъ изъ красной капусты (*b. rubra*), и сваренный съ медомъ до густоты сиропа, служитъ наилучшимъ груднымъ средствомъ, для кашляющихъ и чахоточныхъ.

Сваривъ 1 или 2 горсти свѣжей изрѣзанной капусты въ 1



*Avena. Sativa.* (Овесъ воздѣлываемый).  
(Къ стр. 40).



фунтъ мясной похлебки; кислой: горсти по 2 съ лукомъ, или хрѣномъ, даютъ вмѣсто салата цинготнымъ. Прингле и Линней совѣтуютъ для предохраненія отъ цинги морскихъ служителей, давать имъ по фунту квашенной капусты 2 раза, или чаще, въ недѣлю, которая, съ квасомъ и хрѣномъ, составляетъ лучшую противоцинготную пищу. Капустный рассоль полезенъ въ водяной болѣзни, и для примочки гнилыхъ язвъ. Рассоль кислой капусты препятствуетъ распространенію антонова огня, пользуетъ отъ ожоги и внутренняго воспаления. Капустное сѣмя употребляютъ нѣкоторые, какъ противуглистное средство, и въ катаплазмахъ, разводящихъ холодныя опухоли. Крѣпкую наливку этихъ сѣменъ, нѣкоторые совѣтуютъ употреблять для спрыскиванія молодой капусты, когда ее портитъ гусеница; но гораздо надежнѣе истребляютъ оную, посредствомъ водяной наливки ольховыхъ листьевъ: для этого наполняютъ оными половинную часть бочки, а другую доливаютъ холодною водою, и настоявъ нѣсколько дней, помощію шприцовъ или сифоновъ, ежедневно орошаютъ молодую зелень, пока насѣкомыя исчезнутъ. Другіе совѣтуютъ между капустою сѣять коноплю изрѣдка, которой запахъ для гусеницы губителенъ.

Чтобы капуста не производила пученія живота или вѣтровъ, при квашеніи оной, надобно прибавлять вышеупомянутыя пряныя сѣмена или можжевельовыя ягоды.

Изъ кочанной капусты, рубленой и приведенной въ винное броженіе, можно гнать водку.

По замѣчаніямъ Гмелина, капуста бѣлая, въ слишкомъ сѣверныхъ краяхъ, особенно въ Архангельскѣ и Якутскѣ, никогда не свертывается въ головки. Освежъ замѣтилъ, что и въ Китаѣ капуста эта не образуетъ головокъ.

Квашеную капусту, для дороги и сохраненія въ прокъ, можно сушить такимъ же образомъ, какъ обыкновенно заготавлиютъ на зиму: зеленые бобы, фасоль, петрушку, шпинатъ и проч.

Зола, изъ пережженныхъ кочерыгъ капусты, умерщвляетъ насѣкомыхъ и червей.

\* д) *Br. napus L.* (Капуста *рыччатая*, или *дикая рыччатая*; *полесая брюква*; *нѣмецкая рыччатая*). Растетъ въ огородахъ по пашнямъ, подъ заборами и на поляхъ.

*Вкусъ* корня сладковато-острый, пріятный; сѣмень: остро-ватомасляный. Свойства мочегонныя и разводящія.

Сочный корень составляетъ здоровую пищу, его можно варить въ похлебкахъ, весьма полезныхъ въ грудныхъ мокротныхъ припадахъ и остановахъ мочи; истертый корень, въ видѣ катаплазмы, прикладываютъ съ успѣхомъ для уничтоженія ломотной боли; однако черная рѣдка, въ этомъ случаѣ, гораздо дѣйствительнѣе. Изъ ея сѣменъ можно выжимать тучное масло,

которое будучи очищено, может служить вмѣсто деревяннаго масла; неочищенное, при горѣннн, издаетъ много копоти, отяг-щающей грудь и марающей платье. Оно имѣетъ сходныя каче-ства съ кунжутнымъ масломъ (*oleum sesami orientalis*). Сѣмя, растираемое съ водою, дается, въ видѣ эмульсіи, страдающимъ осною или корью. Сѣмена дикой рѣпы, также употребляютъ какъ укрѣпляющее и предохраняющее средство отъ прилипчи-выхъ, или заразительныхъ болѣзней.

Изъ сухихъ очищенныхъ кореньевъ, истолченныхъ въ муку, съ прибавленіемъ малаго количества кваснаго тѣста, можно печь вкусный и здоровый хлѣбъ, особенно въ холодное годовое время. Для этого кореня выкапывать должно въ глубокую осень, или весною, пока еще листы не появились.

Выжатое масло можетъ служить для составленія простаго мыла, и для суконнымъ фабрикъ. Очищенное годится для лампъ или ночниковъ, составленія мазей и пластырей.

Збойна, или выжимки, послѣ масла остающіяся, полезны для зимняго корма овцамъ и коровамъ, которыя, питаясь этою пищею, даютъ много молока и становятся жирными.

***Bryonia alba* L.** (*Переступень*. — *Weisse Zahnrübe*. — *Cou-levrée*. — *Vigne blanche*). Растетъ въ лѣсахъ умѣренной Россіи. Запахъ ягодъ слабо-тошнотворный. Корень на вкусъ горекъ. Свойства его сильно слабительныя. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Фин-ляндіи, сдѣлавъ углубленія въ корнѣ, наполняютъ послѣдніе пи-вомъ, которое по прошествіи ночи приобретаетъ все свойства энергичекаго слабительнаго и рвотнаго. Корень, разрѣзанный на кусочки и приложенный къ тѣлу, нарываетъ. Переступень содержитъ въ себѣ: некристаллизующееся вытяжное вещество (бріонинъ), смолу, камедь, бѣлокъ, крахмалъ и др.

По дѣйствию этотъ корень въ большихъ приемахъ можетъ произвести поносъ, рвоту, даже воспаленіе желудка и кишекъ, и смерть. Прежде употребляли его въ большихъ приемахъ, при водянкѣ, ломотѣ, эпилепсіи и т. д., а снаружи употребляли его какъ раздражающее и красноту производящее средство. Теперь онъ неупотребителенъ.

***Bupleurum rotundifolium* L.** (*Заячьи ушки*. — *Rundblättriges Hasenohr*. — *Bupleure a feuilles arrondies*; *Perce-feuille*). и ***Bupl. falcatum* L.** (*Остроухи*. — *Sichelblättriges Hasenohr*. — *Bupleure en faucille*). Оба эти вида встрѣчаются по сухимъ и каменистымъ полямъ умѣренной и сѣверной полосы Россіи. Имъ приписы-ваютъ во многихъ мѣстностяхъ Россіи ранозѣлительныя свой-ства. Народные лекаря употребляютъ для заживленія ранъ мѣлко рубленные ихъ листья, которые прикладываются на раны тотчасъ-же по сборѣ ихъ. Въ сухомъ видѣ это растение въ ме-дицинѣ вовсе не употребляется.

**Buxus Sempervirens L.** (*Самшитъ. — Buchsbaum. — Bois*). Встрѣчается въ южной Россіи, въ гористыхъ мѣстахъ, и въ особенности на Кавказѣ. Свойства самшита потогонныя. Порошокъ листьевъ этого растенія, по свидѣтельству Фогеля, въ приемѣ уже одного грана, производитъ кровавое испражнение, тѣмъ не менѣе, Жильбертъ рекомендуетъ отваръ листьевъ самшита какъ хорошее слабительное.

**Calendula officinalis L.** (*Ноготки; новой воинскій благовонный. — Gemeiner Ringelblume. — Le souci des jardins*). Растетъ по полямъ южной Россіи. Ноготки содержатъ въ себѣ: особое вещество календулинъ, камедь, бѣлокъ и т. п., въ цвѣтахъ сверхъ того заключается небольшое количество эфирнаго масла. Ноготки дѣйствуютъ мѣстно, по свидѣтельству Эстерлена, слабо раздражающимъ образомъ.

Листья и цвѣты, *запахъ* имѣютъ благовонный, *вкусъ*: горьковато-пряный, зависящій отъ тонкаго летучаго начала и камедно-смолистаго вещества. Свѣжія цвѣты и трава дѣйствуютъ какъ потогонное.

Ноготки, оставленные въ настоящее время въ медицинѣ, пользуются въ народной медицинѣ извѣстностію, какъ одно изъ лучшихъ средствъ: противъ запора, мѣсячныхъ кровей, маточныхъ спазмовъ и головной боли. Укусъ, настоянный ихъ цвѣтами, составляетъ, по словамъ Кашинскаго, хорошее предохранительное средство отъ повальныхъ болѣзней. Снаружи: въ видѣ припарки, они, по свидѣтельству того-же автора, разводятъ золотушныя опухоли; толченые листья и цвѣты уничтожаютъ бородавки, ножны мозоли и язвы. Выжатый сокъ рекомендуется нѣкоторыми врачами отъ зубной боли, происходящей отъ гнилости зубовъ.

При внутреннемъ употребленіи на горсть цвѣтовъ наливаютъ 8 унцій кипячей воды, и настоявъ, пьютъ вмѣсто чаю съ медомъ; иногда съ прибавленіемъ 2 унцій настояннаго цвѣтами укуса. Эта послѣдняя смѣсь составляетъ хорошее и испытанное потогонное, полезное въ простудныхъ лихорадкахъ злокачественнаго свойства. Выжатый изъ всего растенія сокъ принимаютъ отъ 1—4 унцій, для изгнанія глистовъ. Сокъ изъ свѣжаго растенія, дается также во всѣхъ упомянутыхъ болѣзняхъ, приемами отъ 3—4 унцій.

Изъ цвѣтовъ ноготковъ извлекаютъ желтую краску. Въ свѣтлую погоду цвѣтки ноготковъ развертываются почти регулярно въ 9 часовъ утра, а свертываются въ три часа по полудни.

Нѣкоторые употребляютъ отваръ травы или листьевъ ноготковъ для излеченія пошудей. Для этого 1 фунтъ свѣжаго истолченнаго съ цвѣтами растенія, варятъ съ 2 фунтами свѣжаго коровьяго масла, до тѣхъ поръ, пока жидкость улетучится и получится густоватая масса, прожавъ которую сквозь рѣдкое полотен-

до, и употребляютъ какъ мазь, натирая на золотушные струпы, головные парши и животъ: при завалѣ внутренностей и желтухѣ.

\* **Calla palustris** L. (*Бѣлокрыльникъ болотный; злыя; альбумица болотная.*—*Sumpf-Schlangenkraut.*—*Calla des marais*). Растетъ въ болотахъ и стоячихъ водахъ средней и сѣверной полосы Россіи. Вкусъ этого растенія горькій, жгучій. Бѣлокрыльникъ въ экономіи природы играетъ весьма важную роль: распложаясь чрезвычайно быстро и запруживая болота своими корнями, онъ, въ весьма непродолжительное время, при благоприятныхъ условіяхъ превращаетъ ихъ въ почву, удобную для воздѣлыванія. Свойства бѣлокрыльника сходны съ свойствами *Agum maculatum* и отличаются отъ этихъ послѣднихъ только значительно-слабѣйшимъ дѣйствіемъ. Въ нѣкоторыхъ сѣверныхъ странахъ, по свидѣтельству Линнея, порошокъ корня этого растенія подмѣшиваютъ въ голодные годы въ хлѣбъ.

\* **Calluna vulgaris** Salisb. См. *Erica vulgaris* L.

**Caltha palustris** L. (*Куроплънъ болотный; калуужница.*—*Dotterblume.*—*Populage*). Растетъ по болотамъ и въ стоячихъ водахъ сѣверной полосы Россіи. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ нашего отечества этому растенію приписываютъ различные врачебныя свойства, но по сильной остротѣ и ядовитому дѣйствію онаго гораздо рациональнѣе разъ на всегда отказаться отъ его медицинскаго употребленія.

**Camphorosma mouspeliaca** L. (*Камфарница.*—*Campher Kraut.*—*La camphrée de Montpellier*). Растетъ между Волгою и Ураломъ, въ Сибирскихъ и Киргизскихъ соляныхъ степяхъ. При растираніи листьевъ между пальцами издаетъ камфарный запахъ. Свойства камфарницы ранознѣвательныя, мочегонныя и потогонныя. Это растеніе между прочимъ содержитъ въ себѣ летучее масло, отъ котораго и зависитъ его характеристическій запахъ. Ее совѣтуютъ весьма многие врачи употреблять въ слабости нервовъ, истерикѣ, судорожномъ удущѣ, коклюшѣ, простудной ломотѣ, долговременномъ насморкѣ, запорѣ мѣсячныхъ кровей и въ брюшныхъ завалахъ, а также при бѣляхъ и въ первомъ періодѣ водяной болѣзни. Снаружи, толченые листья ея прикладываются для очищенія и заживленія старыхъ ранъ. Для внутренняго употребленія, на 1 драхму листьевъ берется 4 унціи горячей воды, или на 2 драхмы ея 6 унц. бѣлаго вина. Снаружи, употребляется, какъ упомянуто выше, въ видѣ парни, разбивающей опухоли.

Въ Сибири съ успѣхомъ пользуются этимъ растеніемъ для излеченія грудной и чрѣвной водяницы, для чего ее принимаютъ въ отварѣ и порошкахъ, отъ  $\frac{1}{2}$ —1 золотника.

Свѣжая трава и извлекаемое изъ нее летучее масло, могутъ замѣнить камфару.

\* *Cannabis Sativa* L. (*Конопля*.—*Hanf.*—*Chanvre*). Воздѣлывается во всѣхъ почти полосахъ Россіи. Трава нашей конопли содержитъ въ себѣ: горькое вытяжное вещество, смолу, камедь, бѣлокъ, хлорофилъ и др., со слѣдами эфирнаго масла. Дѣйствительнѣйшая составная часть ея, по видимому, смола (такъ назыв. каннабинъ), растворяющійся въ винномъ спиртѣ и эфирѣ; имѣетъ острый, горькій вкусъ, пахнетъ сильно при разгоряченіи, отзываясь немного запахомъ пряностей.

Трава нашей конопли можетъ дѣйствовать наркотически и произвести, уже однимъ испареніемъ, круженіе и боль головы и т. д. Въ несравненно высшей степени это относится къ растенію, растущему въ Индіи, Арабіи и на всемъ Востокѣ (*cannabis indica*), которое тамошніе народы употребляютъ вездѣ для куренія, какъ одуряющее средство, и какъ лекарство для возбужденія половыхъ органовъ. Въ Индіи употребляютъ отцвѣтшую и высушенную траву (такъ назыв. гунья, бангъ, зидге), для куренія, и пьютъ ее въ видѣ чая; также ея смолнистый сокъ (выпотѣвающій-самъ собою, а въ Персіи и др. онъ готовится также вареніемъ въ теплой водѣ) подѣ названіемъ *хурруса* (лучшій сортъ *томеа*). Кромѣ того, на Востокѣ готовятъ изъ конопля и ея экстракта различныя кашки, пироженныя, конфеты и т. п.; напр. такъ назыв. *гашишъ*, родъ пирожного, изъ индѣйской конопля съ слизью камеди, или съ опиумъ, чемерицею и эоіопскимъ перцемъ.

Дѣйствія хурруса, гашиша и т. д., по видимому, существенно одинаковы и отчасти приближаются къ тѣмъ, которыя производятъ опій, сонная одурь и дурманъ. Такимъ образомъ, *хуррусъ* уже приемами въ  $\frac{1}{2}$ —1 гр., можетъ произвести возбужденіе, веселый хмѣль, смѣшеніе чувствъ съ особенными видѣніями, потомъ тупость чувствъ и сонъ. Зрачекъ часто расширенъ, однако непостоянно, а при употребленіи хурруса на самомъ глазу, зрачекъ, говорятъ, никогда не расширяется. Отъ 2—6 гр. происходятъ оглушеніе, бредъ, спячка, часто судороги и наконецъ глубокой сонъ; припадки отравленія иногда продолжаются 30—48 часовъ. Сосудистая система и испраженіе не рстроивается имъ, какъ отъ опія, и онъ не такъ легко производитъ тошноту, рвоту, сухость языка, дыхательныхъ путей и т. д. Дѣйствія *гашиша* точнѣ изслѣдовали сперва во Франціи, и его употребляли противъ душевныхъ болѣзней; отъ большихъ приемовъ наблюдаютъ кромѣ тошноты и т. д. судорожный смѣхъ, потрясеніе всего тѣла, какъ отъ электричества, слабость, параличъ членовъ, особенно ногъ; далѣе смущеніе душевной дѣятельности, быстрое размышленіе, возбужденное воображеніе; отравленные не могутъ мыслить и говорить съ настоящею связью, однако сознаніе не прекращается совершенно. Въ Европѣ, особенно въ Англіи и Франціи, испытывали теперь хуррусъ и гашишъ (подобно опію,

дурману и т. п.) какъ успокоительное, болеутоляющее, противо-судорожное средство противъ нервныхъ страданій и т. д., противъ столбняка, водобоязни, пляски св. Вита, элампси, бѣлой горячки, злокачественныхъ случаевъ холеры, невралгій, ревматическихъ и ломотныхъ страданій, бедренной боли, большой чувствительности и ревматическаго воспаления глазъ, геморроидальныхъ страданій, поноса и грудныхъ болѣзней.

Упомянуть о дѣйствіяхъ и свойствахъ препаратовъ изъ индійской конопли, мы считали не излишнимъ, съ одной стороны потому, что онѣ встрѣчаются въ торговлѣ аптекарскими товарами и иногда приобрѣтаются, несмотря на запрещеніе закона, легковѣрными, приписывающими имъ различныя чудесныя свойства, а съ другой стороны—мы остановились на нихъ также и потому, что свойства ихъ, какъ мы уже замѣтили выше, сходны съ свойствами нашей конопли.

Эмульсія коноплянаго сѣмени составляетъ хорошее побочное средство при бѣляхъ и венерическомъ истеченіи сѣмени, простудномъ кашлѣ и желтухѣ. Конопляное сѣмя, сваренное на молокѣ, въ видѣ розмазни, можетъ служить хорошею смягчительною припаркою. Толченныя незрѣлыя сѣмена, съ зелеными цвѣтными листочками, составляютъ болеутолятельную и разбивающую катлазму. Конопляное масло, выжатое изъ сѣменъ, имѣетъ тѣже свойства, какъ и льняное, и употребляется снаружи въ обжобахъ и для смягчительныхъ клистировъ. Теплое конопляное масло, при втираніи его въ поясницу, помогаетъ въ почечныхъ боляхъ, поясничныхъ и крестцовой ломотѣ. Пенька или конопляная пакля, провареная въ зольномъ щелокѣ, или просто съ золою, при прикладываніи къ нижней части живота, можетъ служить припаркою, сильно гонящею мѣсячныя крови. Молоко конопляныхъ сѣменъ даютъ пить роженицамъ для ускоренія родового очищенія, усиленія отдѣленія груднаго молока, и въ желтухѣ. Для ускоренія высыпанія оспы, наружу, нѣкоторые даютъ пить больному молочную сыворотку, вареную съ коноплянымъ толченымъ сѣменемъ, полагая послѣдняго по пригоршнѣ на кувшинъ жидкости.

Для приготовления конопляной наливки берутъ на полунціи толченыхъ сѣменъ 6 унцій горячей воды, а для эмульсіи растираютъ тоже количество сѣмени съ 4 унціями холодной воды.

Конопляное сѣмя имѣетъ свойства, подобныя сладкому миндалю; а потому приготовляемое изъ него сѣменное молоко, можетъ замѣнить *миндальную эмульсію* и можетъ быть употребляемо во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ употребляется эта послѣдняя.

Свѣжее конопляное масло, кромѣ извѣстнаго домашняго употребленія, годится также для составленія многихъ пластырей и мазей, вмѣсто деревяннаго масла. Такъ мазь отъ грудницы составляется слѣдующимъ образомъ: взявъ рюмечу свѣжаго ко-



*Cannabis. Sativa.* Конопля. (Женская посевь).

(Къ стр. 54)



*Cannabis. Sativa.* Конопля. (Мужская посевь).

ноплинаго масла и кусокъ желтаго воску, величиною въ грѣцкій орѣхъ, нагрѣваютъ ихъ вмѣстѣ на огнѣ до тѣхъ поръ, пока воскъ распустится; послѣ чего къ нимъ прибавляютъ одинъ свѣжій яичный желтокъ, и затѣмъ смѣшавъ, какъ можно лучше и намазавъ эту мазь на ветошку, прикладываютъ ее къ больному мѣсту, пока она еще тепла, что и повторяютъ ежедневно до совершеннаго окончанія болѣзни. Выгоды, доставляемыя челоуѣку пенькою, заставили его забыть ея ядовитыя свойства, которыя тѣмъ не менѣе проявляютъ ежедневно почти свое дѣйствіе самымъ разрушительнымъ образомъ. Въ самомъ дѣлѣ вода, въ которой мочатъ пеньку, издаетъ до того сильныя міазмы, что даже рыбы мало-по-малу гибнутъ въ ней и наконецъ совершенно исчезаютъ. Обработка пеньки оказываетъ, въ свою очередь, на занимающихся ею самое пагубное влияние. По истеченіи пяти, шести лѣтъ этого рода рабочіе подвергаются сильнымъ груднымъ припадкамъ и вслѣдствіе ихъ умираютъ, по большей части преждевременно. Причина этого прискорбнаго явленія заключается въ отдѣляющейся, при выдѣлкѣ пеньки, отъ нея мелкой пыли, поднимающейся въ окружающую рабочаго атмосферу и вдыхаемой имъ вмѣстѣ съ воздухомъ.

*Capparis spinosa* L. (*Каперсы*; *каперсовый кустъ*. — *Sapernstrauch*. — *Câprier*). Растетъ въ южной Россіи, по берегамъ Терека и въ Бухаріи, по сухимъ мѣстамъ. Корка и цвѣтныя почки, извѣстныя въ гастрономіи подъ именемъ каперсовъ, имѣютъ вкусъ горьковатый и вяжущій. Свойства ихъ вяжущія, мочегонныя, разбивающія; послѣднее свойство принадлежитъ преимущественно коркѣ.

Употребляется отваръ корки при завалахъ внутренностей, а особливо селезенки, въ ипохондрическихъ припадкахъ и параличѣ. Каперсы, употребляемыя вмѣстѣ съ желѣзными минеральными водами, помогаютъ противъ сильной ипохондріи, соединенной съ завалами селезенки. Корка полезна также въ запорѣ мѣсячныхъ кровей, въ бедренной ломотѣ, нечистыхъ язвахъ и истерическихъ или маточныхъ припадкахъ.

Въ порошокъ коренная корка дается приѣмами отъ подражы до дражмы черезъ два часа. Для отвара берется 1 унція ея на фунтъ воды; при приготовленіи же его изъ почекъ или собственно каперсовъ, тоже количество ихъ наливается бѣлымъ виномъ. Снаружи прикладываются толченныя почки, цвѣтки и плоды вмѣстѣ; иногда съ этою же цѣлю употребляется крѣпкій отваръ, вмѣсто примочки. Свѣжую корневую корку жуютъ отъ зубной боли; толченая, прикладываемая къ язвамъ, очищаетъ оныя и уничтожаетъ мозолистую закрубѣлость.

Почви или каперсы собираютъ отъ іюня до сентября мѣсяца и солятъ ихъ или заготавливаютъ въ уксусѣ. Въ первомъ слу-



чаѣ усыпають дно кадки солью и кладутъ слоями каперсовыя почки, потомъ сверху посыпають солью, покрываютъ досками, и накладывають для гнѣтна камень. Во второмъ случаѣ обливають ихъ виннымъ уксусомъ (рѣнскимъ), и чрезъ недѣлю, когда почки достаточно напитаются имъ, сливають его, и наливають опять свѣжимъ уксусомъ, что повторяется до четырехъ разъ.

\* *Cardamine pratensis* L. (*Крессъ луговой; полевой сердечникъ; полевая горчица; смолянка*.— *Wiesen-Schäumkraut*.— *La cardamine des prés*). Растетъ почти во всѣхъ полосахъ Россіи по влажнымъ лугамъ и низменнымъ мѣстамъ. Травя и цвѣтныя верхушки содержатъ островатое начало; *вкусъ* и *запахъ* островато-горькій. Свойства этого растенія противосудорожныя и противуцинготныя. Употребляется въ судорогахъ, судорожныхъ корчахъ, истерикѣ, одышкѣ сопряженной съ брюшными спазмами, желудочныхъ спазмахъ и противъ глистовъ. Выжатый сокъ рекомендуется нѣкоторыми врачами въ цингѣ, завалахъ внутренностей, желтухѣ и водяной болѣзни. Цвѣты, употребляемые въ порошокъ, приносятъ пользу въ болѣзняхъ нервной системы судорожнаго свойства. Молодую траву съ уксусомъ, солью и масломъ, употребляютъ вмѣсто салата; выжатый сокъ можно принимать по столовой ложкѣ съ сывороткою, нѣсколько разъ въ день; цвѣтныя сухія верхушки даютъ въ порошокъ, отъ 20 гранъ до полдрахмы, по утру и вечеромъ. Цвѣты совѣтуютъ принимать по утру и вечеромъ отъ одного до полутора золотника, при рѣзѣ въ животѣ и коликахъ. (*Кешишески*)

\* *Carex arenaria* L. (*Осока песчаная; песчанница*.— *Sand-Seege*.— *Laiche*). Растетъ по песчанымъ мѣстамъ средней полосы Россіи. Говоря вообще, родъ осоки по своему значенію въ экономіи природы и своимъ свойствамъ, заслуживаетъ чрезвычайнаго вниманія. Одни изъ видовъ осоки прозябають по трясинамъ и бокотистымъ мѣстамъ и содѣйствуютъ своими останками ихъ преобразованію въ удобную для воздѣльванія почву, другіе виды ея, наоборотъ, покрываютъ пески и связуя ихъ своими корнями, мало по мало удобряють ихъ и превращають въ болѣе или менѣе плодоносныя равнины. Послѣ сдѣланныхъ нами замѣчаній становится ясна важная роль осоки въ экономіи природы и понятна ошибочность мнѣнія, причисляющаго ее къ числу сорныхъ или по крайней мѣрѣ бесполезныхъ травъ.

Корень осоки песчаной имѣетъ запахъ отзывающійся сосновою смолою; вкусъ сладковатый, бальзамическій, а въ сухомъ состояніи мучной, клейковатый.

Эта порода содержитъ въ себѣ: слизь съ вытяжнымъ, нѣсколько ѣдкимъ веществомъ, крахмалъ, смолу. Употребляется при вторичномъ снѣлиси, ревматизмѣ, золотухѣ—словомъ вездѣ,

гдѣ сарсапариль, и потому справедливо называется *германскою сарсапарилью*, и дѣйствуетъ по видимому не слабѣ сарсапарили. Кромѣ того ее употребляютъ въ кожныхъ нечистыхъ сыпяхъ и чирьяхъ, простудной ломотѣ, членовныхъ боляхъ и грудныхъ припадкахъ. Осоку песчаную многіе врачи рекомендуютъ также противъ заваловъ внутренностей и глистовъ

Для внутренняго употребленія: 2 унціи изрѣзаннаго свѣжаго или сухаго корня варятъ съ 2 фунт. воды, до тѣхъ поръ, пока останется 1 фунтъ жидкости; процѣдивъ ее, пьютъ по чайной чашкѣ. Отваръ этотъ гораздо дѣйствительнѣе, если его приготавливаютъ вмѣстѣ съ пырейнымъ корнемъ, стебельками сладкогорькаго и сосновыми верхушками.

Въ аптекахъ изъ осоки приготавливаютъ: *Кровочистительная сборы* (species lignorum), употребляемые обыкновенно въ отварахъ, для коихъ 1 унцію сбора кладутъ на фунтъ воды; эти отвары пьютъ обыкновенно послѣ долговременнаго леченія сифилиса ртутными препаратами.

Коренья песочной осоки собираютъ весной, выбирая тѣ изъ нихъ, которые глубже простираются въ землю.

\* *Carum carvi* L. (*Тминъ обыкновенный*. — *Gemeiner Kümmel*. — *Carvi ordinaire*). Растетъ въ средней и сѣверной полосѣ Россіи по лугамъ. Въ воздѣлываемомъ состояніи тминъ утрачиваетъ свойственную ему остроту; корень становится болѣе объемистымъ и сочнымъ; сѣмена крупнѣе, маслянистѣе и приобрѣтаютъ особый ароматъ и болѣе пріятный вкусъ. Погайцы и черкесы приготавливаютъ изъ сѣменъ тмина муку, изъ которой дѣлаютъ чрезвычайно любимые ими пирожки. Въ Швеціи и Германіи это сѣмя употребляется какъ приправа для кушаньевъ и настоя водки. Свойства тмина тѣже самыя какъ и свойства аниса, почему онъ и употребляется въ тѣхъ же болѣзняхъ. Изъ него приготавливаютъ въ аптекахъ тминную воду и настойку или эссенцію. При расстройствѣ пищеварительныхъ органовъ можетъ быть употребляемо съ пользою эфирное тминное масло, принимаемое въ этого рода случаяхъ на сахарѣ, въ пріемѣ отъ 4 до 6 капель. При употребленіи тминнаго сѣмени въ видѣ наливки, одну унцію оной кладутъ на фунтъ воды. Приготавливаемое изъ тмина вышеупомянутое эфирное масло состоитъ изъ корвина, масла не содержащаго кислорода, карвола и мыла, содержащаго въ себѣ кислородъ. Вообще тминъ, также какъ и анисъ (какъ мы замѣтили уже выше) почитается за хорошее вѣтрогонное средство и употребляется какъ этотъ послѣдній и въ тѣхъ же болѣзняхъ.

\* *Centaurea* L. (*Василекъ; лоскутница*. — *Flockenblume*. — *Centaurée*). Изъ видовъ этого рода въ врачебномъ отношеніи имѣютъ болѣе или менѣе значенія:

а) *Centaurea benedicta* L. (Волчецъ кудрявый; стоголовникъ; осотъ; чертополохъ.—*Kratz Kraut*.—*Chardon beni*). Растетъ въ умѣренной Россіи, въ садахъ. Вкусъ этого растенія чрезвычайно горькій, запаху почти не имѣетъ; оно содержитъ въ себѣ чрезвычайно много селитры. Свойства его противуглистные, потогонныя и мочегонныя. Употребляется нерѣдко при растроенномъ пищевареніи, при хроническомъ катаррѣ, ревматизмѣ и ломотѣ, перемежающихся лихорадкахъ, брюшныхъ завалахъ, желтухѣ, застойной водянкѣ, простудномъ колотье, мокротномъ кашлѣ и удушьи. Кромѣ того свѣжіе толченые листы стоголовника, употребляются, какъ наружное средство, въ видѣ припарки для прикладыванія въ ушибахъ и подкожныхъ кровоизліяніяхъ; порошокъ-же тѣхъ-же сухихъ листьевъ присыпаются худосочныя и раковыя язвы, а отваромъ ихъ примачиваются съ пользою ознобленныя части. Для приготовления наливки или отвара владуть на 4 унціи воды 2 драхмы сухой травы.

Изъ стоголовника въ аптекахъ готовится экстрактъ кудряваго волчеца (*extractum cardui benedicti*), который дается приемами отъ 10—20 гранъ и до полудрахмы.

Виноградная настойка листьевъ этого растенія, въ приемахъ по одной или по двѣ столовыхъ ложки, по утру и вечеру, по свидѣтельству Кашинскаго, излечиваетъ застарѣлыя ревматизмы.

б) \* *Centraurca Cyanus* L. (Василекъ; лоскутница ржаная; синюха; волошка.—*Kori-Flockenblume*.—*Bluet*). Растетъ въ сѣверной и умѣренной полосахъ Россіи, между рожью, овсомъ и вообще воздѣлываемыми растеніями. Вода, перегнанная изъ васильковыхъ цвѣтовъ, употребляемая какъ примочка, укрѣпляетъ слабое зрѣніе.

в) \* *Centaurea jacea* L. (Лоскутница шелушистая.—*Geteime Flockenblume*.—*Jacée*). Растетъ въ сѣверной и умѣренной Россіи по сухимъ лугамъ и необработаннымъ мѣстамъ. Вкусъ этого растенія горькій. Корни содержатъ въ себѣ много танину. Употребляется какъ вяжущее средство.

**Cerasus I. (Prunus L).** (Вишня.—*Kirsche*.—*Cerisier*). Къ этому роду изъ числа нашихъ отечественныхъ растеній принадлежатъ:

а) *Cerasus laurocerasus* J. (*Prunus laurocerasus* L). (Лавровишня.—*Kirschlorbeer*.—*Laurier-cerise*). Растетъ на Кавказѣ. Лавровишня ядовита до такой степени, что одно уже продолжительное вдыханіе аромата ея цвѣтовъ, производитъ сильную головную боль и позывъ къ рвотѣ. Эта ядовитость зависитъ отъ содержащейся въ ея листьяхъ и цвѣтахъ синильной кислоты, почему употребленіе листьевъ лавровишни для настоя водки не должно быть допускаемо и вообще даже при врачебномъ употребленіи этого растенія должна быть соблюдаема величайшая осторожность.

Изъ нея готовится перегонкою листьевъ съ водою и виннымъ спиртымъ *лавровишневая вода*; но содержаніе въ ней синильной кислоты довольно различно; кромѣ того эта вода содержитъ эфирное масло листьевъ. Изъ этой воды получаютъ 5 гр. берлинской лазури, если прибавить къ первой желѣзныя соли и т. д. Мнѣніе, что лавров. вода можетъ замѣнить вѣрный преаратъ син. кислоты—ошибочно, и она въ этомъ отношеніи уступаетъ даже водѣ горькаго миндаля уже потому, что лавров. воды нельзя всегда готовить свѣжей, подобно водѣ горьк. миндаля.

Растертые лавровишненные листья сильно пахнутъ горькимъ миндалемъ и имѣютъ горькій, немного пряный вкусъ. Дѣйствія свѣжихъ листьевъ и свѣжеприготовленной лавров. воды существенно сходны съ дѣйствіями синильной кислоты, только, понятно, что требуется гораздо большихъ приѣмовъ для произведенія ядовитыхъ дѣйствій. Но эфирное масло листьевъ, содержащее синильную кислоту (лавровишненное масло), говорятъ, можетъ убивать млекопитающихъ животныхъ уже нѣсколькими каплями. Терапевтически можно употреблять лавров. воду точно такъ-же какъ син. кислоту, и она имѣетъ по крайней мѣрѣ то преимущество передъ послѣднею, что ея приѣмы можно опредѣлять съ меньшею точностью.

Принимаютъ ее по нѣскольку разъ въ день, постепенно увеличивая приѣмъ, даже до 60 капель. Даютъ ее всего лучше по себѣ, или какъ син. кислоту, также съ настойками. Должно избѣгать прибавленія къ ней щелочныхъ веществъ и металлическихъ солей (особенно серебра, ртути).

*Снаружи* ее можно употреблять какъ синильную кислоту, только въ около 10—20 разъ большихъ приѣмахъ, для глазныхъ и другихъ примочекъ, какъ и для вырыскиванія.

Лавров. воду назначали также для вдыханія въ видѣ *паровъ*, напр. противъ *коклюша*, при этомъ ее льютъ на горячій песокъ и т. п., и больной вдыхаетъ пары 6—12 минутъ изъ подъ платка, положеннаго на голову, такъ поступаютъ нѣсколько разъ въ день. Другіе льютъ 2 стол. ложки лавров. воды въ разгоряченный сосудъ, выпаряютъ надъ слабымъ пламенемъ, и больной ребенокъ съ головою, поднятою нѣсколько футовъ надъ сосудомъ, вдыхаетъ пары открытымъ ртомъ, каждые 2 часа. Впрочемъ это средство довольно опасно.

*Эфирное масло лавров. листьевъ* (*Oleum laurocerasi aethericum*) слѣдовало бы употреблять развѣ только снаружи, какъ болеутолятельное и противосудорожное средство, съ жирами, жирными маслами.

Лавровишня можетъ быть, по свидѣтельству Кашинскаго, употребляема съ пользою въ хроническихъ завадахъ печени,

селезенки, затвердѣніяхъ легкаго, брижеечныхъ железеъ и въ брюшномъ полнокровіи, происходящемъ отъ астеническаго запора почечуныхъ или мѣсячныхъ кровей; въ ипохондрическихъ припадахъ, меланхоліи и сумасшествіи, при внутреннихъ аневризмахъ, или тѣхъ астеническихъ опухоляхъ кровоносныхъ сосудовъ, кои, производя большой приливъ крови къ сердцу, причиняютъ сильное біеніе онаго и стѣсненіе въ грудяхъ. Лавровишню рекомендуютъ также въ перемежающихся лихорадкахъ, кровохарканіи и для уничтоженія золотушныхъ опухолей железеъ; также въ брюшныхъ желчныхъ застояхъ, соединенныхъ съ спазмами, бывающими у ипохондриковъ и меланхоликовъ. Въ чаоткѣ совѣтуютъ употреблять молоко, варенное съ листьями лавровишни, полагая 1 или 2 листа на фунтъ жидкости, что придаетъ молоку весьма пріятный миндальный вкусъ; впрочемъ, полезѣе горячая молочная наливка. Снаружи свѣжіе толченые листья прикладываются къ скиррнымъ опухолямъ, раковымъ язвамъ и застарѣлымъ венерическимъ ранамъ.

Сухіе лавровишневые листья теряютъ свое дѣйствіе; равнымъ образомъ и при вареніи ихъ улетучиваются существенныя начала, которыя наилучшимъ образомъ соединяются съ водою, посредствомъ перегонки.

По наблюденіямъ многихъ опытныхъ врачей, это средство, столько же дѣйствительно, сколько и опасно, а особенно при неумѣренномъ количествѣ. Простолюдины, свѣжіе лавровишневые листочки по 3—4 кладутъ въ парное молоко на одинъ кувшинъ, и, настоявъ, пьютъ по стакану отъ чаотки. Гартманнъ тоже рекомендуетъ это средство. По его словамъ слѣдуетъ 3 свѣжихъ листочка положить на 1 фунтъ, или полбутылку вскипиченаго молока, и настоявъ его въ закрытомъ сосудѣ полчаса, давать его пить чаотнымъ по чайной чашкѣ, все количество ежедневно.

Противудіемъ же при отравленія лавровишнею могутъ служить: молоко, мыльная вода, поташный растворъ, летучая щелочная соль, или нашатырный спиртъ, разведенный водою и крѣпкая кофейная наливка.

Подобное же дѣйствіе имѣютъ: миндаля горькій, ядра вишневая и персиковая, и листья послѣдняго, которые въ недостаткѣ могутъ замѣнить лавровишневые.

b) *Cerasus Capromiana* Dc. (*Prunus Cerasus* L.). (Вишня.—*Kirsche*.—*Cerisier*). Растетъ въ умѣренной и сѣверной Россіи въ садахъ. Плоды этого вида нерѣдко употребляютъ отчасти свѣжія, отчасти сушенныя, отчасти по себѣ, отчасти въ слѣдующихъ препаратахъ:

Вишневая вода (*Aqua Cerasorum*) готовится перегонкою кислыхъ вишенъ съ косточками; содержитъ слѣды синильной кислоты.

Вишнево-миндальная вода (*Aqua Cerasorum amygdalata*), получается перегонкою вишней (съ косточками) и горькаго миндаля съ водою; содержит не много масла горькаго миндаля, впрочемъ, употребляется какъ *Aq. cerasorum*.

Вишневый сиропъ (*Syrupus Cerasorum*) готовится изъ кислыхъ вишенъ.

Употребляется въ воспалительныхъ лихорадкахъ, желчной горячкѣ, цингѣ, завадахъ и сумасшествіи.

с) \* *Cerasus Padus J. (Prunus padus L.)*. (Черемуха. — *Ahlkir-sche. — Cerisier à Grappes*). Растетъ во влажныхъ лѣсахъ сѣверной и умѣренной полосы Россіи. Цвѣты ея (*Flores Pruni Padi*), кора молодыхъ вѣтвей (*Cortex Pruni Padi*), также листья и вода черемухи (*Aq. Pruni Padi*) употреблялись прежде какъ лавровишневый и т. п.; но дѣйствія ихъ повидимому весьма незначительны. По содержанію эфирнаго масла, цвѣты этого растенія могутъ скорѣе слегка возбуждать, нежели дѣйствовать успокоительно и наркотически, особенно когда ихъ пьютъ въ видѣ теплой наливки.

Водка или винный спиртъ, перегнанные надъ ягодами черемухи и т. п., доставляютъ ливеры, съ миндальнымъ запахомъ, но довольно опасные для употребленія, по значительному въ нихъ содержанію масла горькаго миндаля.

\* *Cetraria islandica Ach. (Lichen islandicus L.)* (*Мохъ исландскій или грудной. — Islandische Moos. — Lichen d'Islande*). Растетъ по сухимъ и гористымъ мѣстамъ, въ видѣ туфа. Въ Исландіи высушенный и вымытый хорошо исландскій мохъ трутъ въ порошокъ и перемѣшиваютъ пополамъ съ мукою для приготовления хлѣба. Горькій вкусъ исландскаго мха можетъ быть уничтоженъ при помощи углекислой соды или поташа. Съ молокомъ и сахаромъ, изъ него готовятъ довольно вкусное желе. Суррогатами исландскаго мха, по отзыву Мокенъ-Тандона, могутъ служить слѣдующія породы лишаяевъ, а именно: лишай печеночный (*Lichen pulmonarius L.*), лишай вишневый (*Lichen arthosus L.*), собачій мохъ (*Lichen caninus L.*), мохъ олений (*Lichen rangiferinus L.*), а также, вромѣ того, нѣкоторые виды Уснеи (*Usnea barbata D. C.* и *Usnea plicata Hofm.*).

Исландскій мохъ и его суррогаты содержатъ въ себѣ: горькое кристаллизующееся вытяжное вещество (цетраринъ, пикролихенинъ), крахмаль, инулинъ (лихенинъ или исландскій крахмаль, около 40°). камедь, соли и др. Лишайная горечь (цетраринъ) состоитъ изъ цетрариновой и одной жирной кислоты и т. д.; отъ первой зависитъ горькій вкусъ.

Исландскій мохъ даютъ особенно при хроническихъ катаррахъ и бленноройныхъ состояніяхъ слизистой оболочки дыхательныхъ вѣтвей, при легочной чахоткѣ, недостаточномъ пищевареніи, хроническомъ поносѣ, перемежающейся лихорадкѣ и коклюшѣ.

Такимъ же образомъ всегда можно употреблять исландскій мохъ, когда отъ долговременныхъ разрушительныхъ процессовъ отдѣльныхъ органовъ разстроилось кровотовореніе, общее питаніе, и тѣло истощилось, вообще какъ слага «крѣпительное» болѣе дѣятельное средство.

Наливка содержитъ почти только лишайную горечь, а отваръ вмѣстѣ и крахмалъ, особенно если долго кипятятъ. Большею частью прописываютъ исландскій мохъ для чайныхъ сборовъ, съ проскурничнымъ, солодковымъ и пирейнымъ корнемъ, или съ хиною и т. п.; также отваръ, смѣшанный съ сывороткою, молокомъ, известковою водою.

Противно горькій вкусъ исландскаго мха часто несносенъ больнымъ, или иногда имѣется въ виду не столько горько-крѣпительнаго дѣйствія его, какъ скорѣе питательное свойство крахмала; въ такихъ случаяхъ горькое вытяжное вещество большею частью удаляется, вымачиваніемъ мха растворомъ углекислаго кали или поташа, въ продолженіи 24 часовъ, или кипяченіемъ его въ томъ же растворѣ короткое время. Въ обоихъ случаяхъ должно потомъ вымывать массу и тогда отваривать ее съ водою. Если въ этому отвару прибавить еще сахару и выпаривать до того, что онъ по охлажденіи застываетъ въ студенистую массу, то получаютъ *лишайную студень* (*Gelatina Lichenis islandici*), а по высушиваніи и превращеніи въ порошокъ *сухую сахарную студень* (*Gelat. Lich. isl. saccharata sicca*).

Исландскій мохъ употребляется между прочимъ въ народной медицинѣ, какъ средство противъ долговременнаго простуднаго кашля, кровохарванія, чахотки и въ болѣзняхъ легкаго, соединенныхъ съ отдѣленіемъ большого количества кровавыхъ или гноевыхъ мокротъ, а также въ золотушной, нервной сухоткѣ, изнурительной лихорадкѣ, въ простыхъ и кровавыхъ поносахъ, которые производя сильное истощеніе непосредственно влекутъ за собою сухотку, въ сухоткѣ, происходящей отъ сильнаго нагноенія большихъ ранъ и язвъ, и въ нагноеніи почекъ и дѣтородныхъ частей, отъ язвъ находящихся въ этихъ органахъ. При большой потерѣ крови, сѣмени; и для притупленія острыхъ ядовъ, причиняющихъ разрушеніе органическихъ частей, или при сухотномъ истощеніи всего организма, нѣкоторые врачи совѣтуютъ употреблять крѣпкій отваръ исландскаго мха съ яичными желтками приготовленный. Въ подобныхъ случаяхъ, дѣйствуетъ очень хорошо молочная жидкая кашлица и студень исландскаго мха, приготовленный съ прибавленіемъ бѣлаго или краснаго винограднаго вина, принимаемый по нѣскольку разъ въ день по столовой ложкѣ. Для большихъ, имѣющихъ грудную постоянную боль, ощущаемую при глубокомъ вдыханіи, исландскій мохъ не годится. Нѣкоторые совѣтуютъ при сильной сла-

бости кишечнаго канала давать мохъ въ отварѣ, съ прибавленіемъ пряныхъ, спиртныхъ и другихъ летучихъ возбуждающихъ веществъ. Для выздоравливающихъ послѣ долговременныхъ болѣзней, равно и во всѣхъ хроническихъ недугахъ, для поддержанія силъ, особливо питанія, средства эти могутъ служить пищею и лекарствомъ. Для промыванія гнилыхъ язвъ, и въ клистирахъ, полезенъ крѣпкій отваръ этого мха, съ прибавленіемъ равнаго количества известковой воды.

Въ порошокъ исландскій мохъ дается рѣдко; обыкновенно же употребляютъ его въ отварѣ, полагая унцію сухаго, крупно истертаго мха на 16 унц. воды, которую увариваютъ до тѣхъ поръ, пока останется 12 унцій жидкости. Отваръ этотъ, процѣдивъ, пьютъ съ медомъ или молокомъ по чайной чашкѣ, каждые два часа. Чтобы извлечь экстрактно-горькое начало, отъ котораго зависитъ слабительное дѣйствіе, предварительно наливаютъ мохъ холодною водою, и по прошествіи 24 часовъ, сливъ оную, варятъ его въ свѣжей водѣ, или въ молокѣ, какъ сказано выше; но для людей, подверженныхъ запорамъ, гораздо лучше употреблять не вымоченный мохъ, ибо горечь его дѣйствуетъ хорошо на пищевареніе. Въ аптекахъ готовятъ изъ исландскаго мха:



*Cerasus caproniana*. (Вишня).  
(Къ стр. 62).

*Отваръ исландскаго мха* (decoctura lichenis islandici), который съ пользою употребляется въ болѣзняхъ легкаго, какъ-то: въ упорномъ кашлѣ, мокротной чахоткѣ, сухоткѣ, женскихъ бѣляхъ и пр. Принимаютъ по 4 унціи, 3 или 4 раза въ день.

Исландцы собираютъ этотъ мохъ осенью въ сырую погоду, чтобы сухимъ не поволотъ рукъ, и не прежде какъ чрезъ 3 года повторяютъ сбораніе, потому что онъ требуетъ этого времени для своего созрѣванія. Мохъ этотъ составляетъ не менѣе драгоценное растеніе, какъ и прочія хлѣбныя зерна. Исландскіе жители, съ давнихъ временъ пользуются этимъ мохомъ, какъ пріятнымъ лекарствомъ и здоровою пищею.

Исландскій мохъ и *стенной* (lichen esculentus, pallas) служатъ въ голодное время лучшими питательными средствами, замѣняющими насущный хлѣбъ. Первый, по содержанію въ большемъ количествѣ студенистаго вещества, можетъ также замѣнить аравійскую камедь, азіатскій салець и саговую крупу.



Изъ исландскаго мха готовятъ также пастилу исландскаго мха (*Pasta Lichenis isl.*). Для этого къ лишайной студени примѣшиваютъ аравійскую камедь и сахаръ въ большихъ пропорціяхъ.

*Цетраринъ или лишайная горечь (Cetrarinum)*. Порошокъ бѣлаго цвѣта, растворяется весьма трудно въ винномъ спиртѣ и почти вовсе нерастворимъ въ водѣ.

Цетраринъ употребляютъ въ тѣхъ-же болѣзняхъ какъ и исландскій мохъ, приемами отъ 2—4 грановъ, по нѣсколько разъ въ день, въ видѣ порошка или раствора въ кислотахъ (сильно разведенныхъ).

\* *Chaerophyllum sylvestre L.* (*Бутень млсной. — Kälberkröpf. — Persil d'âne; cerfeuil sauvage*). Растетъ по лѣсныхъ прогалинамъ и лѣсамъ. Запахъ бутеня неприятный, вкусъ горькій. Корни его ядовиты. Свойства этого растенія тоническія и мочегонныя. Употребляется бутень только снаружи въ видѣ припарокъ и примочекъ; такъ отваренная трава прикладывается къ твердымъ паховикамъ и другимъ опухолямъ. Въ случаяхъ отравленія этимъ растеніемъ, противуядіями могутъ служить теплая вода съ примѣскою достаточнаго количества деревяннаго, коноплянаго, льнянаго или другаго какого масла, подслащенная медомъ и употребляемая какъ питье, до тѣхъ поръ пока не подымется рвота.

\* *Chelidonium majus L.* (*Чистотѣль большой; Gemeines Schöllkraut. — Eclairé*). Растетъ по пустырямъ и невоздѣланнымъ мѣстамъ.

Части этого растенія дѣйствуютъ раздражительно по млечному соку, содержащему довольно много острыхъ и горькихъ веществъ, такъ и хелидонина и хелеритрина. Свѣжій сокъ ихъ можетъ произвести на кожѣ воспаленіе и пузыри; при жеваніи свѣжая трава имѣетъ жгучій острый вкусъ, и принятая въ большихъ приемахъ (даже высушенная) можетъ вызвать припадки отравленія. Прежде употребляли *свѣжій сокъ* и *экстрактъ* чистотѣла, подобно одуванчику, противъ расстройства пищеваренія, страданій печени (по желтому цвѣту сока), какъ мнимое «разрѣшающее средство» даже противъ затверденія брюшныхъ внутренностей и т. д., при такъ назыв. застояхъ въ системѣ воротной вены, при брюшномъ полнокровіи. Разрѣзанную въ свѣжемъ состояніи траву совѣтуютъ класть въ чулки, противъ недостатка мѣсячныхъ отдѣленій и при потѣ ногъ; ее также рекомендуютъ противъ чесотки.

Сокомъ чистотѣла довольно успѣшно сводятъ бородавки.

\* *Chenopodium L.* (*Марь. — Gänsefuss. — Anserine*). Во врачебномъ отношеніи имѣютъ значеніе слѣдующіе виды этого рода, а именно: а) *Chenop. ambrosioides L.* (*Марь благовонная. — Aroma-*

*tische Gänsefuss*. — *Ambroisie*; *Fhé du Mexique*). Растетъ въ южной Россіи, по берегамъ рѣкъ и садамъ. *Запахъ* этого растенія благовоный; *вкусъ*: островато-пряный.

Свойства его травы противусудорожныя; сѣмень: противу-глистыя.

Марь считается полезнымъ средствомъ въ слабости нервной системы, въ грудныхъ спазмахъ, судорожной одышкѣ, мокротномъ и гнойномъ кашлѣ. Водяная или молочная наливка мари полезна въ истерикѣ, параличѣ ногъ и особенно въ пляскѣ св. Витта; кромѣ того она излечиваетъ параличныя разслабленія, случающіяся послѣ апоплексическаго удара. Сѣмя этого растенія одобрятъ въ трудномъ пищевареніи, вѣтряной коликѣ и отъ глисть. — Все растеніе, употребленное въ видѣ водяной и вишней наливки, помогаетъ каменной болѣзни. Толченое сѣмя, въ видѣ свѣжей катаплазмы, прикладываютъ для очищенія ножныхъ язвъ.

При употребленіи мари въ видѣ отвара на полъ унціи травы наливають 10 унц. кипятку и подсластивъ медомъ, пьютъ съ молокомъ вмѣсто чаю. Порошокъ травы даютъ съ медомъ въ видѣ кашки: отъ 2 гранъ до полудрагмы, 2 или 3 раза въ день. Сѣмя также даютъ въ порошокъ или съ медомъ; приемами — дѣтямъ по 20 гранъ, взрослымъ по драгмѣ. Въ параличныхъ припадкахъ употребляютъ спиртную настойку этого растенія, для приготовленія которой кладутъ 1 унцію травы на 2 унціи алкоголя; ее принимаютъ по 20—40 капель. Для наружнаго употребленія, можно готовить *ароматный бальзамъ*, получаемый двоеніемъ слабого спирта съ лавандою, розмариномъ и благовоною марью.

Сушеную траву держать въ шкафахъ и сундукахъ, для сохранения платья отъ моли.

b) \* *Chenop. rubrum L.* (*Марь красная; русская ланка; лебеда дикая*. — *Rother Gänsefuss*. — *Ansérine rouge*). Растетъ въ лѣсахъ около заборовъ, и въ огородахъ.

Употребляется какъ лебеда (*Atriplex*). Ее весной можно варить въ кушанья вмѣсто другой зелени. Въ деревняхъ прикладываютъ толченую траву къ ранамъ, ушибамъ и занозамъ для уничтоженія воспаления.

c) *Chenop. botrys teucricum L.* (*Марь кудрявецъ; турецкій чернополь; лебеда душистая; Божій бытъ*. — *Traubiger Gänsefuss*. — *Ansérine botride*). Растетъ въ южныхъ губерніяхъ Россіи, на открытыхъ буграхъ и пашняхъ.

*Запахъ* свѣжей травы этого растенія бальзмническій; *вкусъ*: пряный. Высушенная сохраняетъ тѣже свойства.

Употребляется въ тѣхъ-же случаяхъ и такъ-же какъ марь бзаговоная, но нѣсколько слабѣе ея. Впрочемъ и она приноситъ пользу въ истерикѣ, запорѣ кровей, судорожномъ кашлѣ, оды-

\*

шеѣ и при глистахъ. Снаружи, въ видѣ тепловатыхъ припарокъ, употребляется съ успѣхомъ роженницами при опухоли и боли въ нижней части живота.

Для наливки берутъ отъ 2—4 драхмъ сушеной травы на 6 унц. кипячей воды. Эту наливку даютъ вмѣсто чаю.

Сѣмя душистой лебедеи нѣкоторые употребляютъ, противъ глистовъ вмѣсто пытварнаго.

d) \* *Chenopodium Bonus Henricus L.* (*Марь трехугольная; русская лапа; корольки; собачья лебеда; дикій шпинатъ. — Ausdauernder Gänsefuss. — Anserine bon Henri.*)

Растетъ въ умѣренной Россіи на необработанной почвѣ.

Трава дикаго шпината *запаху* не имѣетъ, *вкусъ* ея травяной, клейковатый.

Свѣжіе цѣльные листы, или толченые, прикладываютъ къ отекающимъ опухолямъ и нечистымъ язвамъ, изъ которыхъ они извлекаютъ весьма много матеріи. Въ глазныхъ сухихъ воспаленияхъ полезна толченая трава этого растенія, смѣшанная съ свѣжимъ саломъ, или коровьимъ масломъ; эта мазь можетъ быть употребляема также съ успѣхомъ въ часоткѣ, лишаехъ, головныхъ шолудяхъ, ногтоѣдѣ и болящихъ геморойныхъ шишкахъ.

Для приготовления промывательнаго изъ дикаго шпината, употребляемаго противъ запоровъ, берется 1 или 2 горсти травы на фунтъ воды, которую, вскипятивъ и прожавъ чрезъ полотенцо, ставятъ каждый разъ по 6 унцій въ клистирахъ. Выжатый сокъ изъ свѣжей травы, принимаемый по унціи, слабить подобно маннѣ и полезенъ въ геморойныхъ припадкахъ.

\* *Chrysanthemum Leucanthemum L.* (*Златоцвѣтъ; ивановъ цвѣтъ; стоцвѣтъ; воловье око; бѣлица; водоглазъ. — Weisse Wucherblume. — Grande pâquerette; Grande marguerite.*) Растетъ по полямъ, лугамъ и лѣсамъ средней и умѣренной Россіи.

Запахъ травы и цвѣтовъ слабо-ароматическій; вкусъ острый, въ отварѣ жгучій. Свойства этого растенія кровоочистительныя, мочегонныя. Его употребляютъ внутрь съ пользою въ удущѣ, грудныхъ, мокротныхъ болѣзняхъ и чахоткѣ, а также въ чесоткѣ и вообще въ кожныхъ нечистыхъ сыпяхъ. Толченую траву кладутъ на зубы во время зубной боли, при чемъ она производитъ сильное отдѣленіе слюны.

Для приготовления наливки златоцвѣта горсть свѣжей травы кладутъ на 10 унцій воды и увариваютъ до тѣхъ поръ, пока останется не болѣе полуфунта жидкости. Выжатый сокъ подслащается медомъ и дается по столовой ложкѣ. Толченая трава стертая съ свѣжимъ коровьимъ масломъ или свинымъ саломъ даетъ мазь, употребляемую во многихъ мѣстностяхъ нашими крестьянами съ успѣхомъ противъ лишаевъ, паршей и т. п.

\* *Cichorium intybus* L. (*Цикорій дикій; сонцеза трава; петровы батомы.*—*Gemeine Cichorie.*—*Chicorée sauvage*). Растеть по краямъ дорогъ, въ садахъ и на лугахъ. Вкусъ корня и всѣхъ частей цикорія горьковатый. Это растение содержитъ въ себѣ азотно и сѣрнистый поташъ и экстрактивное горькое вещество.

Свойства листьевъ кровочистительныя, корня тоническія. Первые употребляютъ въ видѣ салата, а изъ втораго приготавливаютъ здоровый цикорный кофе, употребленіе котораго полезно при запорахъ и вообще разстройствѣ пищеваренія.

\* *Cicuta virosa* L. (*Cicutaria aquatica, Lamark*). (*Бѣшенница водяная; мутникъ; омегъ.*—*Giftiger Wasserschierling.*—*Ciguë des marais*). Растеть въ канадахъ, ручьяхъ и болотахъ. Бѣшенница водяная принадлежитъ къ чрезвычайно ядовитымъ растеніямъ. Ея корень и стебель содержатъ желтоватый сокъ, составляющій чрезвычайно сильный ядъ. Весьма многія врачи приписываютъ бѣшенницѣ могущественныя цѣлебныя силы, такъ напр. Шторхъ разсказываетъ почти о невѣроятныхъ случаяхъ изцѣленія ею. Но, заслуживающіе самаго полнаго довѣрія и извѣстные по точности своихъ наблюдений, медики совершенно напротивъ признаютъ, что употребленіе этого растенія внутрь можетъ скорѣе принести вредъ, чѣмъ пользу, почему, соглашаясь съ этими послѣдними, мы и не перечисляемъ тѣхъ болѣзней, противъ которыхъ совѣтуютъ употреблять его. Ядовитыя свойства бѣшенницы зависятъ отъ присутствія въ ней особаго вещества, извѣстнаго въ химіи, подъ именемъ *цикутина* или *коніина*.

*Clematis* L. (*Домоносъ.*—*Waldrebe.*—*Clématite*). Въ южной и умѣренной Россіи встрѣчаются два вида этого рода, а именно: а) *Clem. vitalba* L. (*Ниццая трыста; бородавочникъ.*—*Gemeine Waldrebe.*—*Herbe au yeux; Consolation; Clématite des haies*) растущій на югѣ Россіи и Кавказѣ, по невоздѣланнымъ мѣстамъ и около заборовъ.

б) *Clem. erecta* L. (*Домоносъ; жигунецъ стелющійся; бородавочница.*—*Steife-Waldrebe.*—*Viorne*), встрѣчаемый по лѣснымъ прогалинамъ умѣренной полосы Россіи.

Всѣ части обѣихъ этихъ видовъ имѣютъ вкусъ острый и жгучій. Цвѣты перваго вида запахъ имѣютъ весьма пріятный, листья же и корни не имѣютъ его вовсе. Запахъ травы втораго вида слабо-ароматическій. Растретые зеленые листья обѣихъ породъ, будучи приложены къ тѣлу, производятъ красноту и воспаленіе кожи, затѣмъ натягиваютъ пузырь, послѣ котораго образуются поверхностныя ранки. Этимъ свойствомъ ломоноса нерѣдко пользуются нище для растравленія на различныхъ частяхъ тѣла ранъ, ради возбужденія ими обществен-

наго состраданія. Подобныя раны, производимыя листьями до-  
моноса легко излечиваются прикладываніемъ къ нимъ грушевыхъ  
листьевъ. Изъ сѣменнаго пуха можно выдѣлывать очень хоро-  
шую бумагу.

Свойства перваго изъ названныхъ нами растений этого ро-  
да, т. е. *Clematis vitalba*, мочегонныя и противугнидостныя. Его  
совѣтуютъ употреблять внутрь въ слѣдующихъ болѣзняхъ, а  
именно: въ застарѣлой венерической болѣзни, соединенной съ  
грудными припадками, сухоткою или истощеніемъ тѣла, въ во-  
дяной болѣзни, чесоткѣ и худосочныхъ язвахъ. Снаружи толче-  
ные свѣжіе листья и корка, служатъ вмѣсто нарывнаго пла-  
стыря. По свидѣтельству Кашинскаго, эти послѣдніе должно  
прикладывать къ пульсу передъ наступленіемъ лихорадочныхъ  
припадковъ. Среднюю корку можно употреблять для открытія  
фонтанелей.

Для отвара берутъ 2 драхмы листьевъ и ихъ наливаютъ 2  
унц. кипятку, затѣмъ, давъ настояться и подсластивъ, пьютъ  
этотъ отваръ съ молокомъ или одинъ по чайной чашкѣ; для  
корневаго отвара на полъ-унціи корня кладутъ фунтъ воды и  
кипятятъ до тѣхъ поръ, пока останется 8 унцій. Его употреб-  
ляютъ какъ питье, полосканье и впрыскиванье; въ порошокъ да-  
ютъ отъ 10—12 гранъ, какъ сильное мочегонное средство. Свѣ-  
жіе толченые листья прикладываются для очищенія застарѣ-  
лыхъ грибвидныхъ язвъ, которыя можно, также съ пользою  
мазать выжатымъ сокомъ, смѣшаннымъ съ масломъ.

Другой видъ этого рода: *Clematis erecta*, имѣетъ свойства  
потогонныя и мочегонныя. Его употребляютъ въ слѣдующихъ  
болѣзняхъ, а именно: въ застарѣлой венерической болѣзни, но-  
чныхъ боляхъ костей и костяныхъ опухоляхъ, въ мокротной дол-  
говременной чесоткѣ, жесткой головной боли, меланхоліи и твер-  
дыхъ членовыхъ опухоляхъ. Снаружи толченая свѣжая трава  
его прикладывается для очищенія грибвидныхъ венерическихъ,  
костобдныхъ и раковыхъ язвъ. Траву съ цвѣтами, вымоченную  
въ уксусѣ, даютъ вмѣсто салата мокротнымъ астеникамъ.

Для наливки берется цвѣтной травы отъ 2—3 драхмъ на  
фунтъ горячей воды, которую, вскипятивъ разъ въ покрытомъ  
сосудѣ и процѣдивъ, принимаютъ по 4 унціи: 2, 3, или 4 раза  
въ день. Сухую траву и цвѣты: въ порошокъ даютъ по 3 грана  
смѣшанными съ двойнымъ количествомъ сахара или истертаго  
солодковаго корня, 3 раза въ день и постепенно увеличивая  
пріемы до 5 и 10 гранъ 4 грана этого порошка, смѣшанные  
съ 20 гран. корня горечавки, даютъ по 3 раза въ день, при  
перемежающихся лихорадкахъ. Снаружи употребляется въ видѣ  
примочки, катаплазмы и присыпки, очищающей худосочныя  
язвы. Наливка цвѣтной травы, состоящая изъ полунціи оной,  
1 фунта кипятку, употребляется какъ средство противъ упор-

ной чесотки. Съ этою цѣлію ею омываютъ ежедневно пораженныя части тѣла.

**Cochlearia officinalis L.** (*Ложечная трава; варуха; цинготная трава; морской салатъ. — Gebräuliches Löffelkraut. — Cranson officinal; Herbe aux cuillers*). Растетъ въ сѣверной полудѣ Россіи, по морскимъ берегамъ и вообще на влажной почвѣ. Вкусъ ложечной травы слабо-горькій, острый, жгучій; запахъ благовонный. Свойства ея антискорбутныя и возбуждающія, употребляется въ цинготной болѣзни и различныхъ ея видахъ.

Въ Гренландіи, ложечная трава и щавель составляютъ единственное средство отъ распространеннаго здѣсь скорбута. Кромѣ того она полезна въ мокротной одышкѣ, брюшныхъ завалахъ, водяной болѣзни; въ худосочи и кожныхъ болѣзняхъ, каковы: чесотка, лишай, сінія пятна на ногахъ и хроническія язвы, являющіяся послѣдствіемъ цинготной порчи соковъ. Далѣе ее употребляютъ: въ цинготной ломотѣ, ослабленности, неподвижности суставовъ и параличѣ. Снаружи, свѣжая толченая трава прикладывается съ пользою въ цинготнымъ и другимъ гнилымъ язвамъ; выжатый сокъ ея, смѣшанный съ небольшимъ количествомъ квасцовъ служитъ хорошимъ средствомъ отъ цинготной порчи десенъ и язвъ во рту; при чемъ его употребляютъ въ видѣ подосканья, иногда съ примѣсю равной части водки, подслащенной медомъ. Оно дѣйствуетъ также хорошо въ мокротной жабѣ съ язвами. Примочкою этого сова разгоняются багровыя пятна, бывающія на ногахъ у цинготныхъ больныхъ.

Свѣжую ложечную траву съ щавелемъ, полезно употреблять страдающимъ цинготною болѣзнію вмѣсто салата \*). Въ той-же болѣзни, горсть травы наливъ 12 унціями кипячей сыворотки и за тѣмъ, выжавъ и процѣдивъ, ее пьютъ по чайной чашкѣ, 2 или 3 раза въ день. Выжатый изъ свѣжей травы сокъ дается по 1, 2 и 3 унціи съ сывороткою; можно также 1 унцію толченой травы смѣшать съ медомъ и принимать въ видѣ каши ежедневно, раздѣливъ все количество на 2 или 3 приема. Свѣжее сѣмя дается по 1 драхмѣ въ видѣ каши, какъ превосходное мочегонное и очищающее средство. Прибавляя къ ней дымянку (*fumaria offic.*) и веронику (*v. baccabunga*), и растерши съ сахаромъ или медомъ, получаютъ консервы, полезныя въ упомя-

---

\*) Ляншоттенъ, Мартонсъ, Эгедъ, Ансонъ и другіе врачи и мореплаватели этимъ способомъ не только предохраняли себя отъ цыпки, но и излечивали сильно свирѣпствующій на морѣ скорбутъ.—Форстеръ, въ своемъ путешествіи вокругъ свѣта, тоже подтверждаетъ спасительное дѣйствіе ложечной травы.

нутых болѣзняхъ, въ особенности-же въ цинготной ломотѣ, зависящей отъ худосочія. Растворивъ въ 6 унц. бѣлаго вина,  $\frac{1}{2}$  унціи этой послѣдней, принимаютъ каждый часъ по столовой ложкѣ отъ запора мочи и мѣсячныхъ кровей.

Въ аптекахъ изъ ложечной травы приготавливаются слѣдующія препараты:

1) *Сокъ ложечной травы* съ примѣсью другихъ противуцинготныхъ растений (*Succus cochlearia offic. compositus*), который пьютъ обыкновенно весною, какъ сказано выше, въ цинготной болѣзни и другихъ худосочіяхъ. При недостаткѣ ложечной травы, можно употреблять вмѣсто ея жеруху, калугины и щавель, выжатый изъ копѣ сокъ должно давать по полчайной чашкѣ съ сывороткою, нѣсколько разъ въ день.

2) *Консервы* (*conserva cochlearia*), которые особенно полезны для мореплавателей, ихъ даютъ въ приемахъ отъ 1—4 драхмъ. Тѣ-же консервы, смѣшанныя съ угольнымъ порошкомъ по равной части того и другаго изъ нихъ, могутъ служить для чищенія зубовъ и предохраняютъ десны и зубы отъ цинготной порчи. Эту-же смѣсь даютъ внутрь по полунціи 2—3 раза въ день: въ кровавомъ поносѣ и астеническихъ кровотеченияхъ цинготнаго свойства, а также золотушнымъ и страдающимъ англійскою болѣзнію дѣтямъ въ приемахъ: по 3 раза въ день, по десертной ложкѣ.

3) *Спиртъ ложечницы* (*spiritus cochlearia*) дается внутрь, какъ вѣтрогонное и мочегонное средство, отъ 30—60 капель. Этотъ спиртъ въ количествѣ 1 или 2 унцій прибавляется къ противуцинготнымъ полосканьямъ, и содѣйствуетъ уничтоженію цинготныхъ пятенъ на ногахъ.



*Spergularia sibirica*. (Бутень лѣсной).  
(Къ стр. 66).

Въ цинготномъ параличѣ, совѣтуютъ этимъ спиртомъ тереть расслабленные члены и давать его

внутрь, смѣшавъ съ пряною ароматною кислотою (acid. sulphuric. aromatis.) по 30 капель, 2—3 раза въ день.

По опытамъ Крелля, ложечная трава содержитъ летучую щелочную соль, ощущаемую даже при треніи свѣжихъ листьевъ, которые перегонкою даютъ бѣлое, весьма душистое летучее масло, до того сильное, что 1 валя его сообщаетъ запахъ и вкусъ ложечницы 16 унц. воды, или виннаго спирта. Масло это можно давать цинготнымъ при слабости желудка, по 1 капль на сахаръ. Оно до такой степени тяжело, что погружается въ водѣ на дно сосуда.

Исландцы приготавливаютъ листья ложечной травы съ кислымъ молокомъ, и употребляютъ ихъ въ пищу.

Выжатый изъ ложечной травы сокъ замѣняетъ всё противуцинготныя средства. Наша жеруха, съ водянымъ трилистникомъ и щавелемъ, доставляютъ также превосходный противуцинготный сокъ. Смѣшавъ полбутылки его съ равнымъ количествомъ молочной сыворотки, можно пить по 2—3 чайныя чашки въ день, отъ цинготной болѣзни, запивая рюмкою бѣлаго или краснаго винограднаго вина.

Отъ цинготной болѣзни можно употреблять слѣдующее питье изъ горсти ложечной травы и равнаго количества ключеваго кресса и листьевъ съ кореньями консаго или водянаго щавеля (*rumex acutus*, v. г. *hydrilapathum*), которые, изрѣзавъ, должно варить въ 6 бутылкахъ воды  $\frac{1}{4}$  часа, или полчаса; потомъ, процѣдивъ, прибавить 1 бутылку винограднаго вина, и пить ежедневно этотъ отваръ по 3 стакана.

***Colchicum autumnale* L.** (*Безвременный цыптъ; осенникъ; луговой шафранъ.* — *Herbst-Zeitlose.* — *Tue-chien; safran batard; veilleuse; veillot*). Растетъ по берегамъ Терека, на сырой и глинистой почвѣ. Луковицы осенника, если ихъ предварительно растереть и промывать водою нѣсколько разъ, доставляютъ питательную муку, сходную съ картофельной. Луковицы или корневыя клубни осенника содержатъ въ себѣ: крахмалъ, камедь, летучую кислоту, жирное вещество и особое начало, сходное съ растительными щелочами и извѣстное подъ именемъ колыхицина. Вкусъ луковиць острый, жгучій. Кольхицинъ запаху не имѣетъ, вкусъ его острый и горькій, дѣйствіе его возбуждающее, чрезвычайно ядовитое.

Свойства луковиць мочегонныя и слабительныя.

Физиологическія дѣйствія сѣмени и корня осенника существенно сходны между собою; но какъ корни въ извѣстное время ода почти не содержатъ колыхицина и во всякомъ случаѣ теряютъ дѣйствительность отъ высушивания и еще болѣе отъ долгаго лежанія (особенно старыя луковицы), то понятно почему наблюденія врачей различны, и нѣкоторые изъ нихъ признаютъ совершенно неядовитыми ихъ.



Мѣстно осенникъ не раздражаетъ сильно, однако свѣжій корень можетъ произвести даже воспаленіе въ прикосновенныхъ частяхъ.

Когда принимаютъ малые приемы, то происходитъ, хотя непостоянно, чувство теплоты, даже жженіе около желудка, тошнота, щекотаніе и сухость въ горлѣ, и часто является обильный поносъ. При особенныхъ обстоятельствахъ умножается испареніе кожи, и моча обыкновенно содержитъ больше мочевоы кислоты.

При сильнѣйшихъ приемахъ происходитъ не только значительное раздраженіе кишечнаго канала, боль въ животѣ, колика, рвота, поносъ, но поражаются значительно и другіе органы и процессы. Такъ пульсъ значительно уменьшается (иногда напротивъ учащается), онъ становится слабымъ, малымъ, и больной чувствуетъ чрезвычайную слабость во всѣхъ мышцахъ, особенно въ ногахъ; вмѣстѣ съ тѣмъ часто является боль и круженіе головы и боязливость. У беременныхъ можетъ происходить выкидышъ.

При весьма большихъ приемахъ, всѣ эти симптомы достигаютъ столь высокой степени, что происходитъ даже желудочно-кишечное воспаленіе со всѣми его явленіями, болью въ мочевомъ пузырьѣ при мочеиспусканіи, а нерѣдко испраженіями и мочою смѣшанными съ кровью. Кроме того часто наблюдали головокруженіе, упадокъ силъ, дрожаніе мышцъ, которое можетъ переходить въ подергиванія, судороги и столбнякъ; отравленный боязливъ въ высокой степени, дыханіе его затруднено, пульсъ неправиленъ, рѣдокъ, едва ощущается, и при такихъ приступахъ наконецъ можетъ являться смерть.

Подобныя дѣйствія бывають слѣдствіемъ впрыскиванія вина осенника или настойки къ вену. Часто настоящіе приступы отравленія являются только спустя нѣсколько часовъ послѣ употребленія осенника.

Леченіе отравленныхъ осенникомъ и трупныя явленія не представляютъ ничего особеннаго. Растворъ іода (іодистаго потассія и іода въ водѣ) не оказываетъ никакой пользы.

Сперва одобряли употребленіе осенника противъ подкожной водянки, какъ мочегонное и слабительное средство, такъ какъ онъ не только умножаетъ отдѣленіе мочи, но и слабитъ, если принимать его въ большихъ приемахъ. Онъ подходитъ къ луку и другимъ острымъ веществамъ, и какъ впрочемъ водяныя изліянія могутъ происходить вслѣдствіе различныхъ измѣненій и состояній, то понятно, что осенникъ не дѣйствуетъ во многихъ случаяхъ, когда умноженное мочеотдѣленіе и поносъ не въ состояніи прекратить болѣзни. Сѣменные зерна въ новѣйшее время начали признавать за хорошее слабительное противъ привычнаго запора.

Англичане ввели его въ употребленіе противъ ломоты; тутъ

онъ дѣйствительно можетъ облегчать и укорачивать отдѣльные приступы болѣзни. Часто особенно уменьшается скоро сильная боль сустава, и обыкновенно этому предшествуетъ поносъ, усиленное мочеотдѣленіе или потъ. Но если происходитъ душевное, тошнота и рвота съ поносомъ, то должно прекратить употребленіе осенника.

Уже Sydenham считалъ вреднымъ всѣ сильныя испраженія при ломотѣ, между тѣмъ какъ другіе давали такимъ больнымъ слабительныя и рвотныя средства; но и осенникъ по видимому полезенъ въ этой болѣзни какъ слабительное или рвотное и при обстоятельствахъ, какъ успокоительное средство. Далѣе по многочисленнымъ наблюденіямъ можно заключить съ вѣроятностью, что осенникъ во всякомъ случаѣ не предотвращаетъ появленія новыхъ приступовъ, а часто скорѣе способствуетъ къ ихъ возвращенію, и тогда болѣзь часто становится тѣмъ опаснѣе. Самое расположеніе больного къ этой болѣзни, существующая «дискрязія», особенное разстройство питательныхъ и выдѣлительныхъ процессовъ, какъ и нервной жизни, словомъ, самая болѣзь, ломота, не прекращается отъ употребленія осенника. Онъ вовсе не представляетъ «специческаго средства» противъ ломоты, а скорѣе принадлежитъ къ многочисленнымъ лекарствомъ, которыя хвалили одно за другимъ противъ ломоты.

Вообще осенникъ, по видимому, приноситъ мало положительной пользы; имъ облегчаются или прекращаются часто только болѣзненные припадки, что достигается также другими наркотическими, болеутолятельными средствами. Во всякомъ случаѣ употребленіе его опасно, когда страданіе суставовъ приняло настоящій воспалительный ходъ и еще болѣе когда внутренніе органы раздражены въ высокой степени или даже воспалены, такъ особенно брюшныя и грудныя органы, мозгъ и др. Такія сопряженія и состоянія должно по крайней мѣрѣ предварительно удалить или смягчить по возможности другими средствами. Осенника нельзя назначать также при «астеническихъ» или «атоническихъ» видахъ ломоты, т. е. для весьма слабыхъ, истощенныхъ артритическихъ больныхъ, и если уже произошло ощутительное измѣненіе почекъ, печени, суставовъ и другихъ частей, то во всякомъ случаѣ часто дурныя дѣйствія осенника не вознаграждаются палліативною его пользою.

Въ новѣйшее время старались объяснить дѣйствіе осенника и другихъ слабительныхъ противъ ломоты (и каменной болѣзни) тѣмъ, что при этомъ выводится изъ кишечнаго канала, печени, кожи и т. д. большое количество углеродныхъ веществъ, что отъ этого въ крови уменьшается содержаніе углерода, и потому введенный кислородъ можетъ дѣйствовать съ большою силою на превращеніе другихъ азотистыхъ составныхъ частей крови и тканей, такъ что при этомъ образуется меньше мочевоы кислоты.

Но прежде всего слѣдовало бы точнѣе изслѣдовать характеръ ломоты, успѣхъ и вообще дѣйствіе осенника и подобныхъ веществъ противъ этой болѣзни.

Хвалили осенникъ противъ остраго и хроническаго ревматизма суставовъ, мышцъ, волокнистыхъ тканей, при которомъ разстройство развѣтвляющихся въ нихъ нервовъ и вообще нервной жизни по видимому играетъ главную роль; также противъ ревматической невралгіи, бедренной боли и др. Далѣе, при настоящихъ нервныхъ страданіяхъ, противъ коклюша, одышки (*asthma humidum*), пляски св. Вита и др. Но кажется, что осенникъ и тутъ не приноситъ много пользы, напр. при ревматизмѣ,—еще меньше при ломотѣ. Онъ большею частью опасенъ или по крайней мѣрѣ не приноситъ существенной пользы, особенно при скоротечномъ ходѣ болѣзни, при воспалительныхъ припадкахъ въ пораженныхъ частяхъ, при сопряженіи съ воспаленіемъ околосердечной сумочки и т. д.; но и въ застарѣлыхъ, хроническихъ случаяхъ онъ по крайней мѣрѣ дѣйствуетъ весьма надежно.

Осенникъ, по видимому, полезенъ при упомянутыхъ болѣзняхъ нервной системы, при удушливыхъ припадкахъ и т. д., онъ уменьшаетъ или даже прекращаетъ скоро боль при ревматизмѣ, особенно когда происходитъ поносъ и изрѣдка также рвота или потъ; потому возможно, что онъ тутъ дѣйствуетъ не иначе и не благопріятнѣе другихъ испражняющихъ, рвотныхъ и слабительныхъ веществъ. Съ другой стороны возможно, что онъ какъ «успокоительное средство» и по дѣйствию на нервную систему можетъ уменьшать возбужденіе, чувствительность, боль, судороги, даже лихорадку болѣе прямымъ путемъ. Но во всякомъ случаѣ должно поступать съ большою осторожностью, напр. при ревматизмѣ, особенно у слабыхъ больныхъ: въ новѣйшее время замѣтили, что онъ способствуетъ къ ослабленію силъ, даже со смертельнымъ исходомъ, вслѣдствіе сильнаго поноса и угнетающаго дѣйствія вообще. Съ другой стороны польза отъ вина осенника при остромъ ревматизмѣ съ лихорадкой, не подлежитъ никакому сомнѣнію, и такіа средства по крайней мѣрѣ менѣе вредятъ, нежели, напр., обильное кровопизвлечение.

Далѣе давали осенникъ также противъ настоящаго воспаленія другихъ органовъ, напр. бѣлочной и соединительной оболочки глазаго яблока, грудной плевры и другихъ сывороточныхъ оболочекъ, когда оно было «ревматическаго свойства», т. е. когда при этомъ поражались необыкновенно сильно и болѣе чувствительные нервы; когда припадки и боль являлись перемежками и особенно вечеромъ возвращались и усиливались съ нѣкоторою правильностію; или когда показывалась наклонность къ переносамъ (*metastasis*), когда подобныя боли и страданія являлись то въ одной, то въ другой отдаленной части; или же,

наконецъ, когда предшествовала «простуда». Послѣ этого стали хвалить осенникъ и противъ простаго воспаления, какъ противъ (хроническаго) воспаления дыхательныхъ вѣтвей, легкихъ и миндалевидныхъ железъ, противъ эритематознаго воспаления кожи, зуда, даже скарлатины и т. д.; также противъ бѣлей.

Осенникъ дѣйствительно можетъ быть полезнымъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ раздраженія, прилива и даже воспалительнаго страданія, какъ это наблюдается и при употребленіи другихъ острыхъ (особенно слабительныхъ, рвотныхъ) и возбуждающихъ средствъ; и какъ наркотическое, успокоительное вещество онъ можетъ превратить возбужденіе, зудъ, боль, судороги и др. Но не слѣдуетъ прибѣгать къ средству, котораго дѣйствіе и успѣхи еще недостаточно извѣстны. Вонпей, увлекаясь слишкомъ далеко, назначаетъ вино осенника (съ селитрянымъ эфиромъ и укусо-кислымъ кали) даже противъ бреда и сонливости больныхъ скарлатиною, потому что эти припадки, говорятъ, бывають вслѣдствіе уменьшеннаго отдѣленія мочи и всасыванія мочевины.

Корень осенника никогда не даютъ сушеннымъ въ плотномъ состояніи, ибо при этомъ никогда нельзя рассчитывать на вѣрное дѣйствіе, такъ какъ отъ высушиванія луковица теряетъ болѣе или менѣе дѣйствительности; даже свѣжая луковица почти не дѣйствуетъ въ означенныхъ приемахъ, хотя она вообще дѣйствуетъ, говорятъ, втрое сильнѣе высушенной. Приличнѣе давать зрѣлыя сѣмена въ плотномъ состояніи, подобно бѣлой горчицѣ; употребляли ихъ также въ видѣ наливки, чайными ложками. Дѣйствительнѣе еще настой сѣменъ съ виномъ, водкою и другими спиртными жидкостями. Но обыкновенно пользуются препаратами, приготовленными изъ сѣменъ и сухой луковицы, лучше только изъ свѣжей. Кромѣ того, нерѣдко даютъ осенникъ, то вмѣстѣ съ опіятами, аконитомъ, гваякомъ, то съ солями, скорьмиными препаратами, сладкою ртутью и т. п., смотря по отдѣльному случаю.

Изъ осенника приготовляются слѣдующіе препараты:

1) *Вино осенника (Vinum Seminis, Radicis Colchici)*, получается настаиваніемъ сѣменъ или луковицы (высушенной или свѣжей) съ испанскими винами: мадерою, малагою, хересомъ. Приготавливается вино осенника изъ его сѣмянъ и изъ свѣжей луковицы (1 ч. на 2 ч. мадеры), или только изъ сѣменъ около 1 ч. на 6—8 ч. вина. Эти препараты даютъ по себѣ, напр. съ ароматнымъ чаемъ, виномъ, или съ вытяжкою аконита, лавданомъ, и принимаютъ чайными ложками по нѣскольку разъ въ день.

2) *Настойка осенника (Tinctura Colchici)*. Къ этому препарату и его видоизмѣненіямъ относится все, что было сказано у предыдущаго; обыкновенно же эта настойка готовится изъ 1 ч. сѣменъ на 6—12 ч. винаго спирта. Не можно принимать

чайными ложками. Настойку, приготовленную изъ корня, можно давать въ гораздо большихъ приемахъ. Иногда втирають ее снаружи при болѣзненныхъ, ревматическихъ страданіяхъ, напр. съ камфорою.

3) *Уксусъ осенника* (*Acetum Colchici*) получается по большей части вымачиваніемъ свѣжей луковичы въ уксусъ и прибавленіемъ виннаго спирта къ процѣженной жидкости. Этотъ уксусъ содержитъ колхицинъ въ видѣ уксуснокислой соли; онъ приличенъ, въ случаяхъ, гдѣ опасаются возбуждающаго дѣйствія предыдущихъ препаратовъ. Обыкновенно даютъ его вмѣстѣ съ углек. натромъ и магнезію; образуется такимъ образомъ уксусокислый натръ или горькоземъ, которые также немного слабятъ и умножаютъ отдѣленіе мочи.

4) *Уксомедъ осенника* (*Oximel Colchici*): 1 ч. предыдущаго препарата, смѣшанная съ 2 ч. меда. По большей части употребляется для прибавленія къ микстурамъ, или по себѣ чайными и столовыми ложками.

\* *Conium maculatum* L. (*Cicuta virosa* Lamarc.). (*Омегъ пестрый*; *болыголовъ большой*; *головоломъ*; *мутникъ*; *вяха*; *волючка*; *дехтярка*. — *Geflechter-Sichierling*. — *La grande Ciguë*). Растетъ по мусорнымъ мѣстамъ и около дорогъ, въ сѣверной и средней полосѣ Россіи. Запахъ этого растенія тяжелый, неприятный и тошнотворный; вкусъ острый.

Листья этого растенія содержатъ въ себѣ особое вещество коніинъ (или концинъ, цукутинъ, летучій алкалоидъ), эфирное острое масло (вѣроятно неядовитое), смолу, бѣлокъ и др.

*Коніинъ*: дѣйствительнѣйшая составная часть находится въ 20 разъ больше въ плодахъ и сѣмени, нежели въ травѣ, въ листьяхъ, и кромѣ того онъ по видимому лучше сохраняется въ первыхъ; въ сухой травѣ едва ли находятся даже слѣды коніина.

Дѣйствія высушенной травы непостоянны, такъ какъ коніинъ улетучивается или отчасти превращается въ аммиакъ (и смолу) и во всякомъ случаѣ содержится въ травѣ (и ея препаратахъ) въ весьма различномъ количествѣ. Весною и свѣжій сокъ не оказываетъ замѣтнаго ядовитаго дѣйствія, такъ какъ въ это время еще не образовалось коніина. Лѣтомъ, напротивъ, сокъ дѣйствуетъ какъ сильный ядъ.

Мѣстно омегъ раздражаетъ довольно слабо, такъ что принятый даже въ большихъ приемахъ онъ не производитъ воспаления желудка.

Въ малыхъ приемахъ, принятыхъ внутрь, омегъ производитъ тошноту, удушье, шекотаніе, жженіе и сухость въ зѣвѣ, соединенное съ чувствомъ стягиванія его. Отдѣленію кожи онъ умножаетъ мало.

Диоскоридъ и Плиній упоминаютъ о дѣйствіи омега на яички и грудь, и именно: что отдѣленіе молока прекращается, упомянутые органы атрофируются, и что тоже самое можетъ происходить даже съ опухолями.

Въ большихъ приемахъ омега не только производитъ боль и жжение въ шеѣ раздраженіемъ глотательныхъ органовъ, дажде душевное, рвоту и поносъ, но и сильно поражаетъ мозгъ, нервы чувствъ, и такимъ образомъ является кружение и боль головы съ расширеніемъ зрачка и нестрѣніемъ въ глазахъ. Лице краснѣетъ и надувается, а языкъ становится жесткимъ и нечувствительнымъ; къ этому присоединяются оглушеніе и все явленія хмѣля, между тѣмъ какъ пульсъ по большей части полонъ и медленъ. Кроме того могутъ происходить яростный бредъ, спячка, дрожаніе и судороги, боязливость, стѣсненіе груди и одышка, часто оканчивающіеся смертію.

Эти припадки отравленія отличаются отъ тѣхъ, которые производятъ табакъ и наперстянка, особенно тѣмъ, что кровообращеніе и дѣятельность сердца представляются менѣе пораженными, а напротивъ оглушеніе и бредъ являются постояннѣе и сильнѣе отъ омега, нежели отъ упомянутыхъ веществъ. Бредъ нерѣдко показываетъ особенный характеръ наподобіе сумасшествія.

Омега употребляется преимущественно снаружи, рѣже внутрь, и именно: какъ успокоительное средство противъ нервныхъ страданій, особенно движенія нервовъ какъ-то: при столбнякѣ, пляскѣ св. Вита, судорогахъ отдѣльныхъ частей мышцъ, судорожномъ сокращеніи маточнаго рыльца и шейки мочевого пузыря; при сильномъ кашлѣ, одышкѣ, и особенно же при коклюшѣ. Омега по видимому менѣе дѣйствуетъ противъ нервныхъ страданій чувствительныхъ нервовъ, какъ-то: при невралгическихъ, ревматическихъ и другихъ болѣзненныхъ страданіяхъ, при свѣтобоязни и т. д., хотя и тутъ омега употребляется часто. Прежде ему приписывали особенныя успокоительныя дѣйствія на половое побужденіе, противъ бѣшенства матки ( nymphomania ), похотливаго напряженія дѣтороднаго ствола ( satyriasis ) и подобныхъ болѣзней. Омега, говорятъ, часто приноситъ также палліативную пользу противъ болѣзненныхъ страданій всякаго рода, противъ рака, воспаления глазъ, нарывовъ, язвъ и страданій кожи, сопряженныхъ съ зудомъ и жженіемъ.

Нѣкоторые врачи даютъ настойку омега противъ изліянія въ грудную плеву, воспаления дыхательныхъ вѣтвей, острой туберкулезной чахотки и т. п.

Въ большихъ (но большею частью опасныхъ) приемахъ омега производитъ поносъ, и потому оная — подобно чемерицѣ — иногда можетъ изгонять круглыхъ глистовъ и даже плоскихъ.

Съ давнихъ временъ до сихъ поръ нѣкоторые врачи полагаютъ, что отъ омега исчезаютъ нѣкоторые опухоли, затвердѣнія, гипертрофіи и даже скирръ. Хотя и омегъ въ большей части подобныхъ случаевъ вовсе не дѣйствуетъ, или же производитъ противъ отдѣльныхъ припадковъ, какъ противъ боли, раздраженія, прилива окружающихъ частей; однако не слѣдуетъ вовсе отрицать факта, что въ отдѣльныхъ случаяхъ болѣзней, принятыхъ за ракъ, омегъ производилъ коренное исцѣленіе или способствовалъ къ этому. Это особенно относится къ туберкулезнымъ, хронически-воспалительнымъ страданіямъ лимфатическихъ, брыжеечныхъ железъ, и опухолямъ, къ подозрительнымъ язвамъ кожи, губъ, грудныхъ желѣзъ, печени, селезенки и щитовидной железы; также къ опухолямъ и т. д. матки и грудныхъ железъ.

Смѣшавъ порошокъ травы съ медомъ, получаютъ мазь, которая хорошо очищаетъ и заживляетъ золотушные венерическія и раковыя язвы. Поселяне вылечиваютъ открытый ракъ (*carcer exulceratus*), прикладывая на язву болголовные свѣжіе листья, смазанные медомъ,

Омегъ хвалятъ также противъ сифилитическихъ страданій, особенно костей и волокнистыхъ тканей, противъ хроническихъ болѣзней кожи, въ которыхъ онъ по видимому дѣйствуетъ почти только какъ успокоительное, болеутолятельное средство.

Высушенные листья въ плотномъ состояніи принимаютъ по 3—6 грановъ нѣсколько разъ въ день, осторожно увеличивая пріемъ, въ порошокъ или пилюляхъ.

Если листья (или ихъ препараты), при стираниі съ ѣдкимъ кали, не издають запаха табаку и свѣжаго омега, т. е. не пахнутъ улетучивающимся кониномъ, то они недѣйствительны. Лучше употреблять сѣмя или наливку свѣжихъ листьевъ, или выжатый свѣжій сокъ. Нѣкоторые врачи, напр., даютъ порошокъ сѣмьями въ пилюляхъ, покрытыхъ сахаромъ (одна пилюля содержитъ около  $\frac{1}{2}$  гр. конина), принимаютъ по 3 — постепенно до 10 пилюль въ день. Сокъ омега (*succus conii*), приготавлиють выжиманіемъ свѣжихъ листьевъ безъ стебельковъ, собранныхъ во время цвѣтенія; спустя 48 часовъ его процѣживаютъ и прибавляютъ  $\frac{1}{6}$  виннаго спирта; его даютъ нѣсколько разъ въ день по 1 стол. ложкѣ.

Для внутренняго употребленія обыкновенно пользуются препаратами омега, а травую только снаружи, какъ при нарывахъ, воспаленіяхъ глазъ и другихъ болѣзненныхъ страданіяхъ наружныхъ частей, при ракѣ, такъ называемомъ молочномъ струѣ грудныхъ железъ, при коликѣ, вщемленныхъ грыжахъ, судорогахъ матки, мочевыхъ путей, при паршивости и др. Такимъ образомъ употребляютъ наливку для впрыскиванія, примочекъ, и полосканія (напр. при зубной боли, жабѣ (*angina*), цинготныхъ,

весьма болѣзненныхъ деснахъ); для общихъ ваннъ берутъ нѣсколько горстей на 2—4 мѣрки кипячей воды. Еще чаще пользуются омегомъ для припарокъ, вмѣстѣ съ бѣленой, мальвою, льнянымъ сѣменемъ, картофельною мукою и т. п., съ морковною кашкою. Изрѣдка варятъ равныя части свѣжихъ листьевъ со свинымъ жиромъ и такимъ образомъ приготавливаютъ мазь.

Изъ омега приготавливаются слѣдующіе препараты:

а) *Экстрактъ болыголовный* (*Extractum Conii maculati*) приготавливается обыкновенно выжиманіемъ свѣжаго сока, выпареніемъ въ слабомъ жару, прибавленіемъ виннаго спирта и выпареніемъ до вытяжной консистенціи. Этотъ экстрактъ дѣйствительнѣе вытяжки, приготавливаемой виннымъ спиртомъ. Однако и экстрактъ, приготовленный упомянутымъ способомъ, со временемъ теряетъ дѣйствительность и болѣе старые препараты обыкновенно содержатъ немного коніина. Принимаютъ по 1—4 грановъ по нѣсколькку разъ въ день, въ пилюляхъ, кашкахъ, растворѣ (напр. въ коричной водѣ) или микстурахъ. Обыкновенно смѣшиваютъ его съ сурьмяными и іодистыми препаратами, гваякомъ и опиѣмъ. Снаружи его употребляютъ въ растворѣ, для глазныхъ примочекъ, впрыскиванія и промывательныхъ.

Ежели въ 12 унціяхъ известковой воды (*aqua calcis*) растворить 1 или 2 драхмы болыголовнаго экстракта, то она служитъ хорошимъ ранозлѣчительнымъ средствомъ для промыванія и примочки злокачественныхъ язвъ.

б) *Сухой экстрактъ* (*Extractum Conii maculati siccum s. pulveratum*) (получаемый смѣшеніемъ предыдущаго съ  $\frac{1}{4}$  молочнаго сахара и осторожно высушивая); принимаютъ отъ 4 до 10 грановъ и болѣе.

в) *Настойка болыголовы* (*Tinctura Conii maculati*) приготавливается холоднымъ настаиваніемъ травы съ алкоголемъ. Она представляетъ болѣе вѣрный и дѣйствительный препаратъ, нежели экстрактъ, такъ какъ коніинъ легко растворяется въ винномъ спиртѣ и не улетучивается во время приготавливанія. Принимаютъ по 10—20 капель.

*Снята* можно было бы употреблять весьма прилично для такихъ настоекъ (съ виннымъ спиртомъ или эфиромъ).



*Cichorium Intybus.* Цикорій дикій.  
(Къ стр. 69).



d) *Болшоловный пластырь* (*Emplastrum Conii* (s. *Cicutae*). Такъ какъ онъ состоитъ изъ расплавленной пластырной массы (изъ воска, канифоли и прованскаго масла), къ которой прибавляютъ порошокъ омеговой травы, то онъ дѣйствуетъ менѣе наркотически, а скорѣе какъ обыкновенный пластырь. Но онъ употребляется съ большимъ довѣріемъ, какъ «разрѣшающій болеутолительный» пластырь при разныхъ страданіяхъ, отъ мозолей до груднаго рака; такъ имъ покрываютъ всю грудь чахоточныхъ и даютъ пластырю лежать нѣсколько дней. Обыкновенно примѣшиваютъ къ нему другіе пластыри, чтобы дѣлать его болѣе прилипчивымъ.

Коніинъ (цикутинъ) есть маслообразная жидкость, растворяется легко въ винномъ спиртѣ, эфирѣ и эфирныхъ маслахъ, трудно въ водѣ (въ 100 ч.); разлагается легко жирными кислотами и т. д., образуя аммиакъ, и становится бурнымъ и вязкимъ. Образуетъ съ кислотами среднія, легко растворимыя соли. Онъ имѣетъ острый противный вкусъ и отвратительный оглушающій запахъ; испареніе его раздражаетъ глаза, носъ и легко производитъ оглушеніе, боль и круженіе головы.

Коніинъ и его соли принадлежатъ къ сильнѣйшимъ ядамъ, такъ что они (подобно никотину) довольно близко подходятъ къ синильной кислотѣ; нѣсколько капель, введенныхъ въ глаза собаки, можетъ убить ее въ теченіе нѣсколькихъ минутъ, а для кроликовъ часто достаточно  $\frac{1}{2}$  капли. Мѣстно онъ дѣйствуетъ остро-раздражительно, также при проглатываніи его; уже въ малыхъ приемахъ ( $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{3}$  гр.) онъ производитъ разительный упадокъ нервной жизни и силъ, тошноту, оглушеніе, головокруженіе и иногда бредъ. Всякое движеніе становится почти невозможнымъ и наконецъ совершенно прекращается, кровообращеніе и пульсъ становятся слабыми, медленными, также дыханіе совершенно останавливается, такъ что наконецъ происходитъ смерть при явленіяхъ общаго паралича и задушенія, иногда при судорогахъ. Когда вводятъ его непосредственно въ вену, то эти дѣйствія и даже смерть являються внезапно. Въ мочѣ и другихъ отдѣленіяхъ не находятъ ничего особеннаго. Дубильное вещество и жидкости, содержащія его, составляютъ, говорятъ, самыя лучшія противоядія.

\* *Conferva rivularis et fluviatilis*. Pallas. (*Нитчатка ручейная; тина ручейная; водяной мохъ; лягушечный песокъ.*—*Conferve.*—*Conferve des ruisseaux*). Прозябаетъ въ ручьяхъ и рѣкахъ и образуетъ собою такъ-называемую тину. Вкусъ нитчатки нѣсколько вязущій, остро-солонатоватый.

Свѣжая мокрая тина, прикладываемая къ ушибамъ, уничтожаетъ багровыя пятна и утоляетъ боль; высушенная, по дѣйствию, имѣетъ сходство съ бодягою. Простолудины сухую или свѣжую

нитчатку, размочивъ въ уксуcъ или водкѣ, прикладываютъ къ снявямъ подъ глазами происходящимъ отъ ушибовъ. Кашинскій имѣлъ случай испытать дѣйствіе нитчатки, въ золотушномъ затвердѣніи шейныхъ железъ, и того-же рода извахъ. Ее хвалятъ кроме того противъ долговременнаго кашля и дѣтской сухотки. Надо полагать, что нитчатка, при внутренномъ и наружномъ употребленіи, можетъ также разводить зобы, — въ особенности если давать ее вмѣстѣ съ пережженною яичною скорлупою. По словамъ Плинія конфервою или водяною тиною древніе врачи связывали и соединяли переломанныя или раздробленныя кости.

Внутрь нитчатка дается малолѣтнимъ въ порошокъ, съ молокомъ или медомъ: отъ 20 — 40 гранъ. Ее совѣтуютъ давать вмѣстѣ съ ревенемъ по 10 гранъ, по утру и вечеромъ, отъ дѣтской золотухи; снаружи ее употребляютъ въ видѣ примочки, какъ выше сказано или смѣшавъ съ медомъ истертую въ порошокъ прикладываютъ въ видѣ мази, заживляющей золотушныя язвы. Кашинскій настаивалъ 2 лота нитчатки съ такимъ же количествомъ корня зубнаго жигунца (*anthesis rugelrum* L.) въ 2 фунтахъ или 1 бутылкѣ виннаго спирта въ продолженіе 4 дней, потомъ этою выжатою настойкою натиралъ параличные члены и по его словамъ это средство дѣйствовало съ такимъ-же успѣхомъ, какъ и различныя бальзамы.

Донскіе казаки, по свидѣтельству Гмелина и Палласа, употребляютъ нитчатку какъ противуглистное средство. Съ этою цѣлю ее даютъ въ порошокъ съ медомъ, дѣтямъ отъ  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  золотника, взрослымъ людямъ отъ  $\frac{1}{2}$  — 2 золотниковъ; или въ отварѣ полагая 1 унц. на фунтъ воды, подсластивъ морковнымъ сиропомъ.

Противъ золотухи совѣтуютъ давать дѣтямъ внутрь: отъ 5 — 10 гранъ нитчатки по два раза въ день; взрослымъ: отъ 20 гранъ до  $\frac{1}{2}$  драхмы и больше 2—3 раза въ день, увеличивая приемы постепенно; равнымъ образомъ и снаружи ее прикладываютъ какъ выше упомянуто, къ золотушнымъ и застарѣлымъ астеническимъ язвамъ, при чемъ она производитъ сильное нагноеніе и содѣйствуетъ излеченію.

Для внутренняго употребленія нитчатку лучше всего сушить предварительно въ тестѣ изъ ржаной муки, и потомъ истереть ее въ порошокъ, которой и давать дѣтямъ по 2 — 3 раза въ день, отъ 10—15 гранъ, съ водою или съ молокомъ. Полезно также примѣшивать къ нему и нѣсколько ревеня.

*Порошокъ отъ дѣтской сухотки* составляется: изъ 10 гранъ нитчатки, такого-же количества ревеня, 20 гранъ корня клещеницы и равнаго количества раковыхъ жернововъ. Истерши все это мелко, даютъ по 24 грана ежедневно натощая, продолжая, пока опухоль живота, брюшныхъ железъ и лихорадка исчезнутъ. Если въ 1 золотнику этого порошка прибавить:

\*

1½ золотн. цытварнаго сѣмени и ¼ золотника желѣзнаго купороса, мелко истертыхъ, и смѣшать съ 2 лотами морковнаго сиропа или меда и давать дѣтямъ по чайной ложкѣ по утру и на ночь, то этимъ средствомъ избавляются отъ глистовъ, гнѣздящихся въ кишкахъ. Кашиинскому удавалось этимъ средствомъ нѣсколько разъ изгонять тесемочную глисту даже у взрослыхъ; съ этою цѣлю онъ давалъ больнымъ болюсъ, состоявшій изъ ¼ золотника нитчатки развилистой (*conferva dichotoma*), такого-же количества оловянныхъ опилковъ и 2 скрупуловъ горькаго экстракта (*extract. ataginis*); сдѣлавъ изъ него 3 равныхъ катышка, онъ давалъ по 1, три раза въ день. Если глисть выходитъ трудно или перервется, то надо каждый часъ пить по чайной чашкѣ наливку папоротниковаго корня съ мауномъ (*lysorodium*) и горькою слабительною солюю.

Кашка отъ зобовъ составляется изъ 1 лота нитчатки, 1 лота пережженой яичной скорлупы, 2 золотниковъ анисовыхъ сѣмянъ и 2 лотовъ чистаго меда, растерши которые мелко и смѣшавъ, принимаютъ по чайной ложкѣ нѣсколько разъ въ день. (Кашка)

\* **Convallaria** L. (*Ландышъ. — Maillie. — Muguet*). Два вида этого рода, обладающіе цѣлебными свойствами, растутъ въ сѣверной и средней полосѣ Россіи. Первый изъ нихъ: *Convallaria majalis* L. (*Ландышъ майскій. — Wohlriechende Maillie; Maiblume. — Muguet de Mai*) прозябаетъ преимущественно въ тѣнистыхъ мѣстахъ.

Свѣжіе цвѣты ландыша имѣютъ запахъ благовонный, исчезающій отъ сушенія; вкусъ ягодъ и листьевъ горьковато-острый и тошнотворный, сухіе цвѣты менѣе горьки.

Цвѣты дѣйствуютъ усыпляющимъ противусудорожнымъ и слабительнымъ образомъ. Ягоды, созрѣвающіе въ сентябрѣ мѣсяцѣ, имѣютъ свойства противулихорадочныя и полезны въ падучей болѣзни. Экстрактъ изъ свѣжихъ цвѣтовъ имѣетъ слабительное свойство, подобное свойству сабура.

Употребляется ландышъ въ головныхъ припадкахъ, истерическихъ мокротныхъ обморокахъ, застарѣломъ насморкѣ, простудныхъ ушныхъ, глазныхъ и личныхъ боляхъ. При апоплексическомъ ударѣ даютъ нюхать свѣжіе высушенные цвѣты, истертые въ порошокъ, однѣ или въ видѣ сложнаго порошка. Въ падучей болѣзни и перемежныхъ лихорадкахъ, рекомендуютъ ландышевый экстрактъ вѣстѣ съ экстрактомъ вахты (*extr. menyanth. trifol.*).

Для отвара берутъ 1 драхму цвѣтовъ на 4 унц. кипячей воды; его пьютъ вмѣсто чаю въ упомянутыхъ болѣзняхъ, въ которыхъ также весьма полезна ландышевая винная настойка. Сушенныя ягоды, истертые въ порошокъ, даютъ предъ лихорадочными припадками отъ 10 — 20 гранъ, 2 или 3 раза въ день. Экстрактъ

дается одинъ, или въ соединеніи съ горькимъ экстрактомъ, отъ 20 гранъ до полдрахмы.

Коренные листья, смѣшанныя съ известью, даютъ прочную зеленую или желтую краску, годную для живописи.

Ландышевый экстрактъ, по слабительному свойству, можетъ замѣнять камедьсмолистый сокъ scammonii (scammonium) и сабуръ (aloe).

*Противусудорожный элексиръ Розье*, готовится слѣдующимъ образомъ: наполнивъ свѣжими цвѣтами бутылку, пли какой другой побольше сосудъ, его наполняютъ хорошею водою; потомъ, закупоривъ плотно, выставляютъ на солнце для настаиванія въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Наконецъ, процѣдивъ чрезъ чистое полотенце и выжавъ остатокъ, сохраняютъ въ закупоренномъ хорошо; стеклянномъ сосудѣ, принявъ этотъ элексиръ по столовой ложкѣ, поправляютъ дурное ищевареніе и укрѣпляютъ желудокъ. Кромѣ того онъ помогаетъ въ коликахъ, запорѣ кровей, обморокахъ и гемороевъ. Внюхиваніемъ его ежедневно понемногу облегчается головная боль, и укрѣпляется слабое зрѣніе.

*Другой видъ \* Convallaria polygonatum L. (Ландышъ многоколычатый; соломонова печать; купена. — weisse wurzelige Maillie. — Sceau de Salomon).* Растетъ по тѣнистымъ и влажнымъ мѣстамъ.

Свѣжій корень купены имѣетъ вкусъ сладковато-горькій, слизистый. Дѣйствіе этого растенія мягчительное притупляющее и очищающее.

Отваръ корня можетъ быть употребляемъ противъ кашля и теченія бѣлей: молочный отваръ его полезенъ въ геморроидальныхъ и другихъ не сидныхъ кровотеченіяхъ. Снаружи употребляется въ видѣ катаплазмы въ воспаленіяхъ матки и другихъ внутреннихъ частей, толченые корни прикладываются для заживленія ранъ. — Отваръ листьевъ нѣкоторые врачи рекомендуютъ для омыванія чесотки и примачиванія пятенъ, оставшихся послѣ оспы и кори; употребленіе того-же отвара внутри и въ клистирахъ полезно въ запорахъ. Все растеніе, отваренное въ молокѣ, прикладываютъ для утоленія болящихъ почечуйныхъ шишекъ, и припариваютъ онымъ грыжи и вертлужную ломоту.

Для отвара на полунциіи корня берется фунтъ воды или молока. Его пьютъ по чайной чашкѣ; снаружи, въ видѣ мягчительной припарки употребляется въ сухихъ воспаленіяхъ, ранахъ и проч.

Кореня этого растенія, содержація крахмальное вещество, во время голода могутъ служить для приготовленія хлѣба съ примѣсью небольшого количества ржаной муки; а молодые стебли и побѣги его могутъ быть употребляемы вмѣсто спаржи. Зрѣлыя ягоды бываютъ красныя и черныя; при погдошеніи

отъ 12 — 15 ягодъ они возбуждаютъ рвоту. Крестьяне пьютъ отваръ этого растенія отъ ломоты, и припариваютъ имъ червныя болящія опухоли. Выжатымъ сокомъ изъ корней купены поселянки притираютъ себѣ лицо, для очищенія отъ угрей и приобрѣтенія румянца.

\* **Convolvulus Sepium L.** (*Вьюнокъ заборный; повилочный колокольчикъ; обвивальня заборная. — Zaun-Winde. — Liseron des Haies*). Растетъ около заборовъ и подъ кустарниками, почти по всей Россіи. Содержитъ въ себѣ смолистое и крахмальное вещества, альбуминъ, сахаръ, камедистое вещество, различные соли и желѣзо. Свойства вьюнка слабительныя, сходныя съ свойствами привозной принадлежащей къ одному съ ними роду ялапы, хотя нѣсколько слабѣйшія. Порошокъ вьюнковаго корня въ приемѣ отъ 15 до 24 гранъ, можетъ быть употребленъ какъ слабительное, замѣняющее корень ялапы, также какъ сушеный сокъ этого растенія можетъ служить суррогатомъ ялаповой смолы.

**Coriandrum Sativum L.** (*Кишеницъ; колындра. — Gemeiner Coriander. — Coriandre cultivée*). Растетъ по садамъ умѣренной полосы Россіи. Нѣкоторые естествоиспытатели почитаютъ это растеніе ядовитымъ; но едва ли это справедливо, если судить по тому, что его во многихъ странахъ употребляютъ какъ пряное растеніе для приправы кушаньевъ и напитковъ. Изъ его сѣменъ приготовляются вкусныя ароматическія конфеты (драже), полезныя для пользующихся минеральными водами, по своему укрѣпляющему желудокъ дѣйствию.

*Запахъ* свѣжихъ сѣменъ противный, тяжеловатый, сухихъ пріятный, ароматный; *вкусъ* ихъ тоже пріятный и пріятный. Они содержатъ въ себѣ летучее и постоянное ароматное масло.

Дѣйствіе свѣжаго сѣмени нѣсколько усыпляющее, сухаго вѣтрогонное, противудорожное, уничтожающее у женщинъ отдѣленіе молока.

Кишеницъ употребляется въ слабости желудка, кислыхъ отрыскахъ, лученіи живота отъ вѣтровъ, истерикъ и въ другихъ нервныхъ болѣзняхъ. Употребленіе его въ винной наливкѣ, полезно предъ лихорадочными припадками и нерѣдко ею излечивается совершенно и самая лихорадка. Кроме того, она помогаетъ при разстройствѣ мѣсячныхъ кровей у женщинъ. Это средство совѣтуютъ прибавлять ко всякимъ слабительнымъ для отвращенія рвзы въ кишкахъ. Вину сѣмя кишеница сообщаетъ мушкатный ароматъ, особливо въ соединеніи съ бузинымъ цвѣтомъ; снаружи употребляется въ видѣ катаплазмы, или припарки, разбавляющей холодныя опухоли и затвердѣніе желѣзъ.

Въ порошокъ кишеницъ дается отъ  $\frac{1}{2}$ —1 драхмы; для наливки 2 или 4 драхмы сѣмени наливаются 6 унціями горячей

воды или блага вина; водяная наливка служить также вѣтрогоннымъ клистиромъ.

Упомянутыя выше конфеты изъ сѣменъ его, исправляютъ дурной запахъ рта.

\* *Corylus avellana* L. (*Оршникъ*.—*Gemeine Haselstaude*.—*Coudrier*). Растетъ въ сѣверной и средней Россіи по лѣсамъ.

Свойства лѣсныхъ орѣховъ сходны съ свойствами грецкихъ; орѣховое ядро имѣетъ *вкусъ* сладковатый, масляный.

Свойства ихъ питательныя, мочегонныя.

Орѣховыя ядра могутъ быть употребляемы вмѣсто сладкаго миндаля; изъ растертыхъ съ водою ядеръ дѣлаютъ молоко, полезное въ кровохарканіи, сухоткѣ и мочерѣзѣ. Изъ нихъ-же выжимаютъ тучное масло, которое не скоро горитъ, не имѣетъ противнаго запаха, и во всемъ подобно миндальному. Оно полезно въ грудныхъ припадкахъ, кашлѣ, перхотѣ и свинцовой колѣкѣ. Снаружи имъ намазываютъ кожныя трещины и ожоги; въ послѣднемъ случаѣ, смѣшанное съ яичнымъ бѣлкомъ, оно служитъ лучшею мазью отъ ожогъ. Орѣховое масло хвалятъ также для рошенія волосъ, особенно послѣ головныхъ паршей.

Масло это дается внутрь и служитъ для приправы постныхъ кушаньевъ. Для приготовления орѣховаго молока растираютъ 1 унцію очищенныхъ ядеръ въ 12 унц. холодной воды, и подсластивъ сахаромъ, даютъ его въ грудныхъ и мочевыхъ болѣзняхъ, по двѣ столовыхъ ложки и болѣе, всякій часъ или рѣже. Сырые и каленые орѣхи вѣдятъ обыкновенно вмѣсто десерта; но кожа оныхъ въ желудкѣ не скоро варится, и по своему вяжущему свойству, причиняетъ иногда кашель и стѣсненіе въ груди; почему надобно отдѣлять ее отъ ядеръ посредствомъ горячей воды. Впрочемъ страдающіе слабостью желудка, не должны употреблять много орѣховъ. Незрѣлые орѣхи причиняютъ нерѣдко кровавый поносъ.

Изъ лѣсныхъ орѣховъ выжатое тучное масло можетъ совершенно замѣнить миндальное, деревянное и даже лучшее прованское масло.

Если 1 чайную чашку орѣховаго масла и столько же уксуса, развести двойнымъ количествомъ вечиннаго разсола и подогрѣвъ на сковородѣ, дать коровѣ выпить тепловатую жидкость, то это растеніе весьма много помогаетъ отъ заразы во время падежа, хотя бы скотина уже и заразилась.

Перегоняемое изъ дерева орѣшника вонючее масло (*oleum emarginatum*) полезно въ судорожныхъ болѣзняхъ, дѣтскомъ родимцѣ, или падучей болѣзни, зависящей отъ глистовъ; снаружи имъ мажутъ у дѣтей пупокъ, у взрослыхъ—члены, одержимые ломотою и расслабленные; его также прикладываютъ къ сильно болящимъ язвамъ. Внутри даютъ отъ 3—10 капель.

**Crocus Sativus L.** (*Шафранъ. — Safran. — Safran cultivé*). Растетъ въ южной Россіи по дугамъ. Употребляются только цвѣточные пестики шафрана. Эти пестики, высушенные и известные потъ именовъ шафрана употребляются между прочимъ какъ приправа для кушаньевъ. Въ красильномъ искусствѣ шафранъ употребляется какъ желтая краска.

Луковицы шафрана содержатъ въ обилии здоровую и питательную муку.



*Convolvulus Serpium L.* (Вьюнокъ дикій).  
(Къ стр. 86).

Шафранъ содержитъ кромѣ летучаго масла еще воскъ, камедь, и преимущественно желтое красильное вещество (полихромитъ, кроцинъ).

Дѣйствія шафрана сходствуютъ съ тѣми, которыя производятъ слабыя пріяныя вещества; его красильное вещество показывается въ мочѣ, потѣ, даже въ кожѣ зародыша въ утробѣ матери. Въ большихъ приемахъ шафранъ можетъ причинить маточное кровотеченіе, бредъ, нечувствительность и сильную слабость, даже смерть. Новѣйшіе наблюдатели однако принимали весьма большіе приемы его, даже по нѣсколькимъ драхмамъ, и не замѣчали подобныхъ дѣйствій. Но когда летучія вещества шафрана выхажются продолжительное время, то они дѣйствительно производятъ боль и круженіе головы, оглушеніе, у особенно расположенныхъ, даже апоплексическіе припадки, какъ это можетъ случиться также отъ другихъ летучихъ веществъ и цвѣтовъ.

Шафранъ употребляется какъ успокоительное средство противъ нервныхъ страданій всякаго рода, особенно дѣтей и женщинъ, при судорогахъ, истерикѣ; также при недостаточномъ отдѣленіи мѣсячныхъ кровей, при неправильномъ пищевареніи и судорогахъ желудка.

Даютъ его въ ялотномъ состояніи, по 10—30 гранъ и больше на приемъ, въ порошкѣ, пилюляхъ, также въ видѣ наливки.

*Шафранал настойка (Tinctura Croci)* дѣйствуетъ возбуждительно.

*Шафранный сиропъ (Syrupus Croci)*, дается часто дѣтямъ по себѣ или въ микстурахъ.

*Шафранный пластырь (Emplastrum oxycroceum)*: шафранъ, смѣшанный съ воскомъ, многими смолами, мастикою, миррою, ладаномъ и т. д. (по нѣкоторымъ фармак. также съ терпентиномъ). Раздражающій пластырь.

**Симіумъ симіумъ L.** (*Кминъ.—Kümmel. — Kumin*). Растетъ въ южной Россіи.

Дѣйствіе кмина возбуждающее, вѣтрогонное и мочегонное. Употребляется въ раздутости живота отъ вѣтровъ, колики и маточныхъ припадкахъ, происходящихъ отъ запора кровей. Какъ наружное средство разбиваетъ грудныя молочныя опухоли.

Въ порошокъ кминное сѣмя даютъ по драхмѣ; для клистировъ берутъ его 2 драхмы на 6 унцій горячей воды. Снаружи употребляется въ видѣ мокрой и сухой припарки; а также въ видѣ куренья, полезнаго въ удушья и маточныхъ припадкахъ. Растерши сѣмена съ хлѣбомъ прикладываютъ ко лбу, при сильной головной боли. Англійскіе врачи одобряютъ *кминный пластырь*, составляемый изъ толченыхъ сѣменъ кминныхъ, кишнецовыхъ и лавровыхъ или можжевеловыхъ ягодъ съ бѣлою смолою и желтымъ воскомъ, распущеннымъ на огнѣ. Этотъ пластырь прикладываютъ къ животу для разогнанія вѣтровъ и укрѣпленія кишекъ; а также для уничтоженія колики и кроваваго поноса. Перегрнанное кминное масло даютъ съ этою же цѣлію отъ 3 до 6 капель и втираютъ по немногу въ животъ.

**Cucumis colocynthis L.** (*Горькая тыква; чортовы яблоки. — Coloquinte. — Coloquinte*). Растетъ въ южной Россіи. Запахъ тошнотворный, вкусъ горькій.

Свойства колоквинтовъ мочегонныя и противуглистныя; при большихъ пріемахъ они производятъ сильную боль и рѣзь въ кишкахъ, и нерѣдко выгоняютъ изъ матки зародыши.

Употребляются: въ брюшныхъ завалахъ, водяной болѣзни, запорѣ мѣсячныхъ кровей, бѣдной немочи, слизистомъ долговременномъ поносѣ, мокротномъ пострѣлѣ, падучей болѣзни, помѣшательствѣ ума и бездѣйствіи членовъ послѣ паралича. Снаружи, натираютъ животъ мякотью ихъ, смѣшанною въ количествѣ 20 гранъ съ свинымъ саломъ отъ глистовъ.

Въ порошокъ принимаютъ отъ 1—2 и 5 гранъ: съ вишневымъ клеємъ, аравійскою камедью, или растерши съ яичнымъ желткомъ. Для клистира полагается 1 или 2 драхмы на фунтъ жидкости. Эти клистиры полезны тамъ, гдѣ требуется сильнѣйшее побужденіе, какъ-то: при апоплексическомъ ударѣ, параличѣ, ущемленной грыжѣ и проч. Въ глистныхъ завалахъ и запорахъ



употребляютъ отваръ изъ 30 гранъ мякоти на 6 унц. воды. Водяной экстрактъ колоцинтовъ (*extract. aquos. colocynthidis*), даютъ въ упомянутыхъ болѣзняхъ: отъ 3—4 и 8 гранъ. Гуселандъ рекомендуетъ колоцинтную настойку изъ полунціи очищенной мякоти на 6 унцій французской воды или виннаго разведеннаго спирта съ 2 драхмами анису. Ее принимаютъ отъ 10—15 и 20 капель, по 3 или 4 раза въ день съ водою, противъ апоплексическихъ и ломотныхъ припадковъ.

Порошокъ колоцинтовъ, насыпаемый между листовъ и переплета книгъ, предохраняетъ ихъ отъ моли и червей. Смѣшанный съ бычачьею желчью и приложенный къ пупку, слабитъ, умерщвляетъ глистовъ и изгоняетъ ихъ. Изъ этихъ плодовъ дѣлаютъ черную краску для шелковыхъ матерій.

Высушенная мякоть колоцинтовъ, истертая въ порошокъ, дается лошадямъ для изгнанія червей, и при отнятіи или бездѣйствіи ногъ: отъ 1—2 лотовъ, сдѣлавъ большіе катышки съ хлѣбною мякотью.

**Cucumis melo L.** (*Дыня. — Melonc. — Melon*). Извѣстно у насъ исключительно, какъ воздѣлываемое растеніе. Вкусъ мякоти дыни сладко-кислый, сѣмень сладко-масляный. Свойства ихъ прохладительныя.

Плоды дыни при умѣренномъ ихъ употребленіи составляютъ весьма полезное лакомство для людей ожержимыхъ грудными и цинготными болѣзнями. Изъ сѣмень приготовляютъ эмульсію, которая имѣетъ весьма хорошее дѣйствіе въ лихорадкахъ и при раздраженіи мочевыхъ путей.

**Cucumis sativus L.** (*Огурецъ. — Gurke. — Concombre*). Также, какъ и предыдущее воздѣлываемое растеніе. Мясо огурца мало питательно. Свойства его прохладительныя, слабительныя; но при этомъ надо замѣтить, что людямъ слабой и нѣжной комплекціи употребленіе огурцовъ, въ особенности въ холодныхъ и сырыхъ странахъ, можетъ принести не пользу, а только вредъ. Мякоть ихъ входитъ въ составъ такъ называемой огуречной мады для умягченія кожи и уничтоженія накожныхъ сыпей. Изъ огуречныхъ сѣмень, также какъ изъ дынныхъ, готовится эмульсія, полезная въ лихорадкахъ, почечныхъ припадкахъ и чахоткѣ. Свѣжіе огурцы, вареные въ подеблахъ, составляютъ полезную пищу въ лихорадкахъ и кровохарканіи. Огуречный сокъ, въ приѣмъ по 2 унціи два раза въ день, полезно давать страдающимъ сухоткою и чахоточнымъ больнымъ. Тотъ-же свѣжій огуречный сокъ, подслащенный сахаромъ или медомъ, можетъ быть принимаемъ въ тѣхъ-же болѣзняхъ ежедневно по 2 столовыхъ ложки натощакъ и въ вечеру. Огуречный розсолъ, одобряютъ какъ легкое слабительное лекарство. Слишкомъ мокротные люди могутъ на стаканъ этого розсола прибавлять отъ  $\frac{1}{2}$ —

1 чайной ложки толченого нашатыря. Снаружи, свѣжіе толченые огурцы прикладываютъ къ головнымъ шолудямъ. Кашинскій свидѣтельствуетъ, что одна старуха вылечила, заожную водяную болѣзнь, обкладывая больного солеными, пополамъ разрѣзанными, огурцами. Это дѣлалось ею въ истопленной банѣ на полкѣ и покрывъ пациента простынею, при чемъ она подавала паръ обыкновеннымъ образомъ; повторяя это два или три раза въ недѣлю, она пользовалась весьма успѣшно эту болѣзнь.

Выжатый свѣжій огуречный сокъ можно пить по чайной чашкѣ 3 и 4 раза въ день. Для эмульсии на 1 унцію сѣмьнь берутъ 1 фунтъ холодной воды и растираютъ ихъ вмѣстѣ. Толченые огурцы прикладываютъ къ почечуйнымъ воспаленнымъ шишкамъ, для смягченія оныхъ и утоленія боли; выжатый сокъ, съ прибавленіемъ квасцовъ, съ пользою прикладывается на корпн къ сырымъ и болящимъ шишкамъ.

**Cucurbita citrullus L.** (*Арбузъ*. — *Wassermelone*. — *Melon d'eau*). Принадлежитъ къ числу воздѣлываемыхъ, преимущественно въ южной полосѣ Россіи, растений.

Арбузные сѣмена имѣютъ вкусъ масляно-сладковатый. Свойства ихъ прохладительныя, смягчающія и питательныя.

Сѣменное молоко или оршадъ даютъ въ воспалительныхъ лихорадкахъ, сопровождающихъ значительныя раны, а также въ мочервзѣ, вмѣсто питья.

Для эмульсии, 1 унцію арбузныхъ сѣмьнь истоловши, растираютъ съ 12 унціями холодной воды, и даютъ пить больнымъ черезъ 2 часа по чайной чашкѣ. Это простое сѣменное молоко можетъ замѣнять миндальную эмульсію.

Умѣренное употребленіе арбузовъ въ лѣтнее знойное время прохладждаетъ пріятнымъ образомъ, разводитъ густоту влаги, притупляетъ острогу желчи и гонитъ мочу; но излишество въ употребленіи производитъ пученіе живота, рвѣ въ кишкахъ, желчный поносъ съ рвотою, а иногда даже кровавый, опасный поносъ.

**Cydonia vulgaris. Pers.** (*Pyrus Cydonia L.*) (*Армудъ или китъ; айва; айва; айва*. — *Gemeiner Quittenbaum*. — *Cognassier cultivé*). Растетъ по берегахъ Дуная, Терека и въ Украинѣ въ садахъ.

Плоды айвы имѣютъ пріятный ароматическій запахъ.

Вкусъ сѣмьнь кисло-вяжущій, клейкій. Квиты содержатъ въ себѣ яблочную кислоту. Сѣмена же изобилуютъ слизью.

Свойства плодовъ вяжущія, прохладяющія, противугниlostныя; сѣмьнь — смягчающія.

Свѣжіе плоды полезны въ желчно-гнилыхъ болѣзняхъ и цингѣ; сѣмена, налитыя кипяткомъ даютъ большое количество слизи, которую прикладываютъ къ ожогамъ, трещинамъ на сос-

цахъ, сухому воспаленію глазъ, къ болящимъ почечуйнымъ шишкамъ, въ молочницъ и гортанной боли вмѣсто полосканья; въ потугахъ на низъ и кровавомъ поносѣ, вмѣсто промывательнаго.

Выжатый сокъ изъ плодовъ дается по столовой ложкѣ; печеные плоды излегка слабятъ, ихъ можно давать больнымъ одержимымъ запорами.

При недостаткѣ аравійской камеди клейкую жидкость, получаемую при отварѣ 1 драхмы сѣменъ айвы съ 6 унціями випята, можно употреблять вмѣсто первой изъ нихъ. Съ этою цѣлю можно получать также слизь, наливая 1 часть сѣменъ 8 частями холодной воды.

**Cynara scolymus L.** (*Артишокъ*. — *Artischocke*. — *Artichaut*). Растеніе воздѣлываемое почти во всей Россіи.

Свойства артишокъ питательныя и мочегонныя.

Употребленіе артишокъ въ пищу полезно особенно для одержимыхъ частыми запорами мочи, мочерѣзомъ и водяною болѣзью. Въ цингѣ и въ упомянутыхъ болѣзняхъ, нѣкоторые врачи совѣтуютъ принимать выжатый сокъ изъ всего растенія, смѣшанный по равной части съ хорошимъ винограднымъ виномъ. Его принимаютъ въ этихъ случаяхъ по 2 или 3 унціи нѣсколько разъ въ день; или отъ 3—5 столовыхъ ложекъ по утру и въ вечеру. При воспалительныхъ припадкахъ дается водяной отваръ артишоковыхъ головокъ или ихъ варятъ въ супѣ вмѣстѣ съ зеленымъ горохомъ.

Пивной отваръ или супъ изъ артишоковъ, съ прибавленіемъ свѣжихъ растертыхъ яичныхъ желтковъ, служитъ превосходнымъ домашнимъ лекарствомъ отъ желудочныхъ заваловъ и желтухи.

\* **Cynoglossum officinale L.** (*Собачникъ аптечный; собачій языкъ; чернокорень*. — *Gebräuliche Hundszunge*. — *Cynoglosse officinale*). Растетъ въ сѣверной полосѣ Россіи по необработаннымъ мѣстамъ и пустырямъ. Вкусъ корня сладковатый, тошнотворный, неприятный. Свойства его слабо-наркотическія, успокоивающія; употребляется въ грудныхъ болѣзняхъ въ видѣ сиропа и шлюлю, впрочемъ весьма рѣдко.

**Cyperus longus L.** (*Тросникъ*. — *Langes—Cypergrass*. — *Souchet long*). Растетъ по болотамъ и берегамъ рѣкъ. Корень этого растенія, въ особенности сушеный, отличается ароматическимъ запахомъ; вкусъ его вазушій, горьковатый. Свойства тросниковаго корня мочегонныя, укрѣпляющія желудокъ, возбуждающія. Его употребляютъ въ видѣ полосканья при ранахъ въ въ полости рта. По увѣренію нѣкоторыхъ естествоиспытателей болѣзнъ этого вида производитъ опьяненіе.

D.

**Дарфне L.** (*Лавруша; волчникъ. — Kellerhals. — Lauréole*). Изъ видовъ этого рода, встрѣчаемыхъ въ Россіи, имѣютъ врачебное употребленіе:

1) *Daphne Gnidium L. (Daphne Paniculata Lam.)*. (*Волчникъ жмѣлчатый. — Seidelbast. — Daphne-Garon. Coquenaudier*). Растетъ по открытымъ, сухимъ, гористымъ мѣстамъ южной Россіи. Всѣ части этого растенія отличаются горькимъ, ѣдкимъ вкусомъ. Кора, будучи приложена къ кожѣ, производитъ чрезвычайно быстро сильное воспаленіе, сопровождаемое краснотою, вздутіемъ пузыря и обильнымъ источеніемъ серозной жидкости. Вымоченная въ уксусъ эта кора употребляется какъ нарывное, дѣйствующее впрочемъ слабѣе шпанскихъ мушекъ, почему употребленіе ее въ тѣхъ случаяхъ, когда нужно вызвать быстрое воспаленіе, можетъ быть рекомендовано только при недостаткѣ другихъ, болѣе соответствующихъ этой цѣли средствъ; кромѣ того, надо замѣтить, что послѣдствіями ея продолжительнаго употребленія нерѣдко являются: обильная сыпь и до того значительное отдѣленіе серозной жидкости, что люди слабой комплекціи подвергаются черезъ это сильному истощенію.

Кора этого вида дажны содержать въ себѣ: воскъ, острую смолу, красящее желтое вещество, сахаръ, камедь и особое вещество—дафининъ, малорастворимый въ холодной водѣ, но растворяющійся очень хорошо въ кипящей водѣ, алкогольѣ и эфирѣ. Смола, добываемая изъ этой коры, имѣетъ темно-зеленый цвѣтъ, маслянистую консистенцію и очень острый, ѣдкій вкусъ. Растворяется въ эфирѣ и постоянныхъ маслахъ.

По свидѣтельству Гесфера и Мокенъ-Тандона кора *Daphne Gnidium* можетъ быть употребляема съ успѣхомъ противъ болѣзней кожи, хроническихъ ревматизмовъ, глухоты, золотухи, наследственнаго сиоилуса и болѣзней костной системы. Съ этою цѣлю ее принимаютъ въ видѣ порошка, наливки, сиропа и помады. Сѣмяна этого растенія могутъ служить легкимъ слабительнымъ.

2) *Daphne laureola L.* (*Вѣчно-зеленая лавруша. — Immergrüner Kellerhals. — Daphné laureole*). Растетъ на югѣ Россіи въ тѣни гористыхъ лѣсовъ. Этотъ видъ имѣетъ всѣ свой-

ства предъидущаго, хотя нѣсколько слабѣйшія. Изъ его ягодъ выжимаютъ масло, которое при приемѣ внутрь производитъ воспаленіе горла, сопровождаемое невыносимою болью. Кора этого растенія употребляется въ тѣхъ-же случаяхъ и также, какъ и кора предъидущаго растенія.

3) *Daphne mezereum* L. (Волчій перецъ; дикій перецъ; лаврикъ волчій; шелковое лыко; волчья ягода; мушлякъ-плохо-вецъ; волчье лыко.—*Gemeiner Seidebast*.—*Le bois gentil*). Растетъ въ Сѣверной Россіи, во влажныхъ и тѣнистыхъ лѣсахъ. Свойства его ягодъ чрезвычайно ядовитыя, приемъ ихъ внутрь, даже въ относительно небольшомъ количествѣ (отъ 10—12 ягодъ), можетъ уже причинить смерть. Составные части коры этого вида тѣже, какъ и коры *Daphne Guidium*.

Волчье лыко употребляютъ внутрь, въ тѣхъ же случаяхъ, какъ и траву трицвѣтной фіялки, сарсапарилли и т. п., напр. противъ золотухи, особенно же противъ сифилитическихъ страданій костей и надкостной плены, противъ боли костей, невралгій и сродныхъ нервныхъ страданій сифилитическихъ лицъ; далѣе, при хроническихъ, ревматическихъ и накожныхъ болѣзняхъ.

Волчье лыко даютъ только въ отварѣ, отъ 2—4 драхмъ въ день, большею частью въ соединеніи съ сарсапариллю, песочною осокою (*saxeg agapagia*) и т. п.

*Снаружи* его употребляютъ иногда какъ производящее воспаленіе средство (напр. при зубной боли) или какъ слабое нарывное и отвлекающее средство и именно въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ желаютъ долго поддерживать нагноеніе (истеченіе олюса) въ частяхъ кожи, какъ при хроническомъ воспаленіи глазъ, чихоткѣ и страданіяхъ железъ. Вообще же и тутъ дѣйствія волчьяго лыка такъ мало постоянны или такъ медленны и слабы, что другія острия вещества вообще заслуживаютъ преимущества, если нужно прибѣгать къ подобному отвлекающему способу.

Волчье лыко употребляется такимъ образомъ, что куски его размягчаются въ водѣ и потомъ привязываются плотно наружною своею поверхностью, лишенною предварительно кожицы, къ избранному мѣсту на кожѣ, напр. на верхнемъ плечѣ.

Въ новѣйшее время французскіе врачи ввели въ употребленіе водяные, эфирные и алкоголическіе экстракты волчьяго лыка, подъ назв. *Resina Mezerei*, а также *Extr. Mezerei aethereum* (приготовл. настаиваніемъ спиртнаго экстракта съ эфиромъ и выпареніемъ раствора). Ихъ употребляютъ, особенно эфирный экстрактъ, какъ красноту наводящаго средства.

*Unguentum Mezerei* есть подобная же смѣсь эфирнаго экстракта съ 8 ч. восковой мази. Для этой мази можно употреблять также порошокъ самаго лыка, 1 ч. на 3—6 ч. жира, съ при-

бавленіемъ ѣдкаго амміака; или настаиваютъ лыко съ жирнымъ масломъ 1—2 ведра.

**Datura Stramonium.** L. (*Дурманъ; дурнишникъ большой.* — *Gemeiner Stechapfel.* — *Stramoine; Pomme épineuse; herbe aux sorciers; trompette du jugement*). Растетъ въ южныхъ губерніяхъ Россіи по пустырямъ. Листья этого растенія содержатъ въ себѣ растительную щелочь, извѣстную подъ именемъ датурина, камедистое экстрактивное вещество, альбуминъ, крахмалъ, смолу и различныя соли. Датуринъ растворяется въ кипящемъ алкоголѣ и 270 частяхъ холодной и 72 горячей воды.

Свойство этого растенія одуряющія, сѣмена его составляютъ сильный наркотическій ядъ. Листья дурмана имѣютъ непріятный, тошнотворный запахъ, ощущаемый въ особенности только при растираніи ихъ между пальцами. Вкусъ ихъ остро-горькой. При сушеніи они совершенно утрачиваютъ этотъ послѣдній, сохраняя въ тоже время свойственный свѣжимъ листьямъ запахъ въ весьма незначительной степени.

При приѣмѣ внутрь въ значительномъ количествѣ, дурманъ производитъ опьяненіе, потерю памяти, сильную жажду, конвульсіи и параличъ оконечностей. Винная настойка сѣмянъ дурмана, при приѣмѣ, ея внутрь повергаетъ въ летаргическій сонъ.

Свѣжіе толченныя листы дурмана прикладываются въ грудицѣ, для разведенія сгустившагося молока въ грудяхъ, и смягченія твердыхъ воспалительныхъ опухолей, железъ.

Толченныя или растертыя со сметаною, или съ свѣжимъ коровьимъ масломъ сѣмена прикладываются съ пользою къ болящимъ почечуйнымъ шишкамъ, и къ распухшимъ или затвердылымъ железамъ. Траву даютъ въ видѣ сгущеннаго сока или экстракта (*extractum d. stramonii*), приготовляемаго въ аптекахъ, который въ малыхъ приемахъ употребляется: въ судорогахъ, падучей болѣзни и сумасшествіи, разведенный въ извѣстковой водѣ, тотъ-же экстрактъ прикладывается къ раковиднымъ язвамъ, твердымъ между-проходнымъ шишкамъ и глубокимъ ожогамъ. Въ Стокгольмѣ были произведены опыты леченія экстрактомъ дурмана и изъ 14 больныхъ, страдавшихъ падучею болѣзнію и сумасшествіемъ 8 совершенно выздоровѣли, 5 получили облегченіе и 1 остался неизлечимъ. Это средство одобряютъ также въ конвульсіяхъ судорожныхъ корчахъ, судорожномъ кашлѣ; глубокой меланхоліи и въ другихъ нервическихъ болѣзняхъ, сопряженныхъ съ чрезвычайнымъ раздраженіемъ.

Экстракта дурмана на приѣмъ дается: отъ  $\frac{1}{2}$ —1 грана по 2, 3 и 6 разъ въ день. Онъ принимается въ порошокъ съ мауномъ (*valeriana offic.*) или въ пилюляхъ съ горькимъ экстрактомъ (*extract. amarum*), постепенно возвышая до 12 гранъ въ сутки.

Приемы начинают уменьшать снова, как скоро будет замечено расширение зрачка.

Лучшія противудѣйствующія средства въ отравленіи дурманомъ суть: укусовая или другая кислота, рвотное, молоко и смягчительные клистиры.


**Daucus carota. L. (Daucus Sylvestris)** Морковь *одиодная; морковь лѣсная.* — *Gewöhnliche Mohrrübe.* — *Carotte*). Растетъ во всей Россіи въ воздѣлываемомъ состояніи въ огородахъ и дико въ лѣсахъ, по сухимъ полямъ и лугамъ.

Морковный корень содержитъ въ себѣ клейкое сахарное начало и имѣетъ большую склонность къ броженію, при которомъ отдѣляется значительное количество углекислаго газа. *Запахъ* корня и сѣмьня ароматный, пріятный; *вкусъ* корня, сладковато-клейкій и слегка пряный; сѣмьня—горьковато-пряный.

Морковь служитъ здоровою пищею въ худосочныхъ болѣзняхъ. Употребленіе ее приноситъ пользу также въ долговременною хрипотѣ, кашлѣ, чахоткѣ и брюшныхъ мокротныхъ или геморроидальныхъ завалахъ. Морковный отваръ употребляютъ противъ запора мочи и мочерѣза. Морковный сокъ и сѣмена дѣйствуютъ хорошо въ каменной болѣзни почекъ. Сгущенный на подобіе сиропа сокъ хвалить въ молошницѣ; а вываренный сокъ моркови или печеной рѣпы, смѣшанные по равной части съ медомъ, даютъ дѣтямъ, страдающимъ каменною болѣзнію по чайной ложкѣ, а взрослымъ по столовой, какъ успокоительное средство. Въ кровавомъ поносѣ и отъ глиствъ, его принимаютъ поутру и вечеру или чаще, по столовой ложкѣ. Дѣтямъ, страдающимъ мелкими глистами, совѣтуютъ давать сырую морковь ѣсть на тощакъ. Морковное сѣмя, также имѣетъ противуглистное дѣйствіе, и притомъ гоня вѣтры, уничтожаетъ колику въ кишкахъ; оно помогаетъ кромѣ того истерическимъ женщинамъ при остановкѣ у нихъ мѣсячныхъ и родовыхъ кровей. Снаружи, свѣжая сочная морковь толченая, или истертая на теркѣ, прикладывается въ видѣ холодной катаплазмы къ раковымъ язвамъ, венерическимъ, золотушнымъ и гнилымъ цинготнымъ ранамъ. Эта катаплазма утоляетъ боль, уменьшаетъ отдѣленіе гноя, смягчаетъ мозолеватые края подобныхъ язвъ, и наконецъ мало по малу заживляетъ ихъ. Морковная катаплазма, смѣшанная съ травою пестраго омега—въ грудныхъ, личныхъ и губныхъ равахъ — дѣйствуетъ съ большимъ успѣхомъ, чѣмъ безъ примѣси этой послѣдней.

Морковный сокъ даютъ цинготнымъ больнымъ по столовой ложкѣ нѣсколько разъ въ день. Морковнымъ отваромъ и сокомъ, смѣшаннымъ съ медомъ, полощутъ ротъ отъ жабы, и помазываютъ его кисточкою въ дѣтской молошницѣ и оспенномъ слю-

потеченіи. Для приготовленія упомянутой выше катаплазмы, берется на 2 унціи тертой или толченой моркови 1 унція омеговой травы и за тѣмъ катаплазма перемѣняется 2 или 3 раза въ день. Сѣмя дается въ порошокъ отъ  $\frac{1}{2}$ —1 драхмы, 2 или 3 раза въ день; для наливки владется  $\frac{1}{2}$  унціи моркови на 6 унц. кипячей воды, или тоже количество ее настаиваютъ въ бѣломъ виноградномъ винѣ.



*Diocasa muscipula.* (Мухоловка).  
(Въ стр. 107).

Вываренный изъ моркови сиропъ можетъ служить вмѣсто сахарной патоки и меда, для приправы кушанья и пр.

Изъ 1 фунта истертой на теркѣ свѣжей моркови, травы пестраго болиголова и зеленыхъ маковыхъ головокъ съ листьями истолченныхъ въ мякоть, каждого по 4 лота, готовятъ катаплазму полезную противъ золотушнаго рака. Перемѣняя



ее 2 раза въ день, получаютъ хорошее нагноеніе, и язва приходитъ въ заживленіе.

\* **Delphinium Concolida** L. (*Живокость*.—*Feld-Rittersporn*.—*Pied d'alouette*). Растетъ по полямъ и между пашнями. Составныя части этого растенія суть дельфининъ (алкалоидъ), острая смола (стафизаинъ), бѣлокъ, камедь, эфирное и жирное масло. Дельфининъ дѣйствительнѣйшая составная часть его.

Сѣмя живокости имѣетъ весьма острый и горькій вкусъ. Дѣйствіе его въ большихъ приемахъ производитъ рвоту въ кишкахъ, рвоту съ поносомъ, головокруженіе и параличное состояніе двигательныхъ аппаратовъ.

Иначе дѣйствуетъ его алкалоидъ, *дельфининъ*. Мѣстно онъ производитъ довольно сильное раздраженіе, и какъ въ этомъ, такъ и въ его дѣйствіяхъ на нервную жизнь и т. д. онъ показываетъ неоспоримое сходство съ вератриномъ. Такъ уже въ малыхъ приемахъ (по  $\frac{1}{2}$  гр.) онъ причиняетъ подобныя ощущенія теплоты въ надбрюшной сторонѣ, чувство колотья и ползанія мурашекъ въ кожѣ, что также происходитъ отъ втиранія въ кожу; наконецъ дельфининъ по видимому умножаетъ иногда отдѣленіе мочи. Въ большихъ приемахъ (по 5—6 гр.) онъ производитъ душеніе, рвоту, поносъ, потомъ головокруженіе, нечувствительность кожи, судороги и смерть.

Въ трупѣ находятъ воспаленіе желудка и кишекъ. Сѣмя можетъ быть употребляемо снаружи противъ застарѣлой чесотки. Употребляютъ его въ видѣ присыпнаго порошка или смѣшанное съ япромъ, въ видѣ мази. Эта мазь полезна противъ чесотки, зуда, лишаевъ и т. п.

*Дельфининъ*: смолистый, плавкій порошокъ желтоватоблаго цвѣта, остраго жгучаго вкуса; растворяется легко въ винномъ спиртѣ и эфирѣ, и почти вовсе нерастворимъ въ водѣ. Его можно на приемъ давать внутрь по  $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{5}$  гр., по нѣскольку разъ въ день, въ алгоголическомъ растворѣ или въ пилюляхъ, подобно вератрину. Снаружи употребляютъ его такимъ же образомъ для втиранія, въ видѣ настойки или мази. Для приготовления первой изъ нихъ, на 1 унцію алкоголя берутъ отъ 15—30 грановъ дельфинина; а для второй на унцію жира кладутъ 10—40 грановъ этого послѣдняго.

\* **Bianthus plumarius** L. (*Гвоздичка полевая; гвоздичка кустистая*.—*Federnelke*.—*Oeillet*). Растетъ по песчанымъ полямъ. Запахъ этого растенія ароматическій. Свойства его возбуждающія: употребляется въ видѣ консервы въ обморокахъ, дѣтскомъ родимчикѣ и другихъ припадкахъ, происходящихъ отъ слабости нервовъ. Дѣтямъ даютъ эти консервы приемами по чайной ложкѣ, по нѣскольку разъ въ день. Для взрослыхъ доза ихъ можетъ достигать отъ 1—2 унцій.

**Dictamnus fraxinella** Var. (**Dict. albus** L.). (*Яснецъ; дикій вадьямъ. — Weisser Diptam. — Fraxinelle*). Встрѣчается на Кавказѣ и въ южной Россіи. Всѣ части этого растенія покрыты железками, заключающими летучее масло, которое во время сильныхъ жаровъ испаряется и окружаетъ растеніе эфирными парами, которыя при приближеніи огня воспламеняются и горять не причиняя ему никакого вреда. Корень вадьяма имѣетъ горькой вкусъ. Свойства какъ его корня, такъ и коры, мочегонныя и потогонныя. Цвѣты при перегонкѣ съ водою доставляютъ ароматическую воду, употребляемую въ косметическомъ производствѣ.

Употребляется противъ запора мѣсячныхъ кровей и глистовъ, преимущественно въ соединеніи съ пеоніею.

**Digitalis purpurea** L. (*Насесточная трава. — Rother Fingerhut. — Gants de Notre-Dames; Gantelée; Doigtier*). Растетъ въ южной полосѣ Россіи, а въ прочихъ частяхъ ея разводится какъ красивое садовое и комнатное цвѣтущее растеніе.

Всѣ части этого растенія, по видимому, могутъ дѣйствовать ядовито, особенно же листья, корень и сѣмя.

Составныя части его суть: дигиталинъ (химически indifferentное, весьма горькое вещество, весьма сильнаго дѣйствія, особенно на сердце, на пульсъ; вытяжныя вещества (пикрринъ, скаптинъ), можетъ быть и летучая кислота; далѣе эфирное масло, смола, хлорофилъ, дубильное вещество, соли и др.

Листья, а также препараты ихъ, не всегда дѣйствуютъ одинаково, напр. часто уже въ малыхъ приѣмахъ они производятъ сильные припадки, и наоборотъ въ весьма большихъ приѣмахъ иногда почти не дѣйствуютъ вовсе.

Мѣтно свѣжіе или тщательно высушенные листья дѣйствуютъ слегка раздражительно, что уже показываетъ вкусъ и острое ощущеніе въ зѣвъ при проглатываніи ихъ. Однако едва-ли они въ состояніи привести кожу въ воспалительное состояніе, хотя они въ большихъ приѣмахъ производятъ воспаленіе желудка—и прикладываемыя къ обнаженной кожѣ или введенныя въ подкожную соединительную ткань могутъ причинить сильную боль, выпотѣніе и воспаленіе.

Когда принимаютъ наперстянку въ малыхъ и частыхъ приѣмахъ, то она, по видимому, не оказываетъ замѣтнаго вліянія на пищеварительныя органы, между тѣмъ какъ самыя важныя дѣйствія ея обнаруживаются въ мозгѣ, вообще въ нервной жизни и кровообращеніи. Такъ происходитъ легко тошнота, головокруженіе, помраченіе и пестрѣніе въ глазахъ и значительная слабость мышцъ; сила сокращеній сердца уменьшается, пульсъ становится рѣже (однако, обыкновенно только спустя 24—48 часовъ), слабѣе, иногда даже неправильнымъ и перемежающимся. Пульсъ такимъ образомъ можетъ упасть до 50—40 ударовъ въ

\*

минутой, и большею частью остается въ этомъ состояніи долгое время, даже 5—8 дней, какъ и вообще всѣ болѣе сильныя (ядовитыя) дѣйствія наперстянки обыкновенно не проходятъ скоро. Подобно тому можетъ уменьшаться число дыханій и даже теплота тѣла. Однако дѣйствіе ея на сердце и кровообращеніе не совсѣмъ постоянно, скорѣе пульсъ часто не становится рѣже, даже сначала онъ можетъ учащаться и только потомъ упадать; это, по видимому, особенно происходитъ при прямомъ и даже сидячемъ положеніи тѣла. Притомъ, исключительнымъ образомъ, пульсъ, вмѣсто того чтобы сдѣлаться слабѣе, напротивъ, усиливается и становится полнѣе. Говорятъ также, что весьма большіе приемы наперстянки могутъ учащать пульсъ въ высокой степени и умножать удары его, напр. у лошадей, въ два или три раза, а только въ послѣдствіи онъ упадаетъ ниже физиологическаго уровня.

Относительно различныхъ выдѣлительныхъ процессовъ, наперстянка оказываетъ немного болѣе постоянное вліяніе на мочу (и при обстоятельствахъ можетъ быть также на слюну), умножая отдѣленіе ея. Однако часто и мочеотдѣленіе остается въ обыкновенномъ состояніи, а слюнотеченіе, по крайней мѣрѣ отчасти, по видимому, можно считать за простое послѣдствіе отвращенія, которое она производитъ.

Когда принимаютъ малые приемы продолжительное время или немного большіе приемы за одинъ разъ, то всѣ вышеприведенныя припадки могутъ достигать болѣе высокой степени, и такимъ образомъ происходитъ рвота, даже поносъ, между тѣмъ какъ пульсъ становится все медленнѣе (иногда чаще), неравномернымъ и перемежающимся. Вмѣстѣ съ тѣмъ является боязливость, возбужденіе, бессонница и высшая степень слабости мышцъ, неправильное отравленіе зрительныхъ и слухательныхъ нервовъ (пестрѣніе въ глазахъ, шумъ въ ушахъ), даже совершенная потеря зрѣнія; пульсъ становится чрезвычайно рѣдкимъ, едва ощутительнымъ, а кожа холодною. Могутъ даже происходить совершенный обморокъ или бредъ, оглушеніе и судороги, иногда со смертельнымъ исходомъ.

Но должно принимать въ уваженіе, что такія высшія степени отравленія иногда могутъ происходить уже отъ малыхъ приемовъ, принятыхъ продолжительное время (такъ назыв. скопляющіяся дѣйствія). Какъ подобныя, сильныя дѣйствія часто происходятъ уже отъ немногихъ малыхъ приемовъ, то (не считая большей дѣйствительности наперстянки и ея препаратовъ) за существенное условіе ихъ происхожденія можно принимать особенную чувствительность больного, напр. слабость, значительную раздражительность, особенно же неправильность кровообращенія и органовъ его, слабую или недостаточную силу сокращенія сердца (напр. у лицъ съ длинною шеєю, большаго

роста). Потому у такихъ лицъ употребленіе наперстянки требуетъ особенной предосторожности.

При весьма большихъ приемахъ упомянутыя дѣйствія скоро усиливаются до высокой степени. Является сильная и продолжительная рвота, также поносъ, колика, слабость, боязливость и слѣпота; зрачекъ расширяется, становится неподвижнымъ, и отравленный можетъ умереть спустя нѣсколько часовъ при обморокѣ, оглушеніи, сонливости, бредѣ и судорогахъ.

О величинѣ приемовъ, требуемыхъ для этихъ высшихъ степеней дѣйствія, нельзя сказать ничего положительнаго, но во всякомъ случаѣ только весьма большіе приемы могутъ быть опасными для самой жизни.

Наперстянку даютъ: при ненормально возвышенной силѣ и скорости сокращенія сердца, зависитъ-ли это отъ нервнаго сердцебіенія по себѣ или вмѣстѣ отъ порока въ строеніи сердца, начальственной артеріи и другихъ большихъ сосудовъ, при аневризмахъ (съ гипертрофіею стѣнокъ или безъ этого). При расширеніи начальственной артеріи она иногда способствуетъ къ исцѣленію. Но когда измѣненія сердца и заслоночекъ такого рода, что отъ этого значительно затрудняется—по крайней мѣрѣ въ позднѣйшихъ періодахъ—обращеніе соковъ, что уже съ самаго начала происходитъ застой въ венахъ, даже водяное изліяніе, холодъ въ периферическихъ частяхъ, членахъ и т. д., то наперстянка вообще скорѣе вредна, нежели полезна.

Хотя нѣтъ сомнѣнія, что наперстянка принадлежитъ къ лучшимъ средствамъ, которыя умѣряютъ сокращеніе сердца и пульсъ, однако прежде дѣлали объ немъ слишкомъ общее употребленіе противъ болѣзней сердца съ дрожаніемъ его и т. д. безъ разбора отдѣльныхъ случаевъ. Всего полезнѣе она еще при гипертрофіи лѣваго желудка (съ расширеніемъ его или безъ этого), но и въ этомъ случаѣ дѣйствія ея непостоянны, и не всегда благопріятны, по крайней мѣрѣ на долго. При расширеніи праваго сердца, при атрофіи или утонченіи его стѣнокъ, наперстянка часто опасна, потому что она можетъ слишкомъ уменьшить скорость сокращеній сердца, которая замѣняетъ недостаточную силу послѣднихъ. Почти тоже самое можно сказать объ употребленіи ея въ позднѣйшихъ періодахъ недостатка трехзубчатыхъ и митральныхъ заслоночекъ и т. д.; также у престарѣлыхъ лицъ съ атрофическимъ сердцемъ.

Однако мы не должны исключительно руководствоваться анатомическимъ измѣненіями сердца, но также и особенно его отвлеченіемъ и общимъ состояніемъ больного, т. е. когда сила и скорость сокращеній сердца замѣтно возвышены, и еще болѣе когда они весьма шумны и сопровождаются боязливостью и сильною одышкою, то вообще можно давать наперстянку съ вѣрностью, и большею частью съ благопріятнымъ палліативнымъ

успѣхомъ. Но всегда должно точно наблюдать за больнымъ и спустя 8—10 дней прекратить ее употребленіе на нѣкоторое время, чтобы прееотвратить такъ назыв. скопляющіяся дѣйствія наперстянки, хотя они рѣдко встрѣчаются. У полнокровныхъ лицъ, при твердомъ, полномъ пульсѣ, часто должно предварительно прибѣгать къ успокоительнымъ, отвлекающимъ, ослабляющимъ средствамъ, даже къ кровозвлеченіямъ и т. д.

Ея употребляютъ также противъ кровотеченія (напр. изъ легкихъ) съ полнымъ скорымъ пульсомъ, также противъ одышки, сильнаго раздраженія въ кашлѣ и противъ легочной чахотки.

Наперстянку нѣкоторые врачи рекомендуютъ противъ легочной чахотки; но она можетъ быть полезнаю развѣ только противъ нѣкоторыхъ припадковъ ея, а именно: когда нужно замедлить пульсъ и кровообращеніе, какъ при раздраженіи къ кашлю, кровотеченіи, дрожаніи сердца, стѣсненіи груди и одышкѣ.

Кромѣ того ее употребляютъ при приливѣ, раздраженіи и воспаленіи, чтобы успокоить дѣятельность сердца и скорый пульсъ, чтобы уменьшить жаръ или возбужденіе нервной и душевной жизни. Такія состоянія являются особенно при воспаленіи внутренней поверхности сердца и околосердечной сумки, при воспаленіи сердца, сывороточныхъ и другихъ оболочекъ, брюшины, мозга и его оболочекъ, особенно же при мозговыхъ страданіяхъ пьяницъ, такъ называемой бѣлой горячкѣ; также при ревматизмѣ суставовъ, воспаленіи легкихъ и др.

Вообще же значеніе ея наперстянки въ послѣднихъ поименованныхъ случаяхъ незначительно. Наперстянку тутъ можно употреблять развѣ только противъ отдѣльныхъ припадковъ (напр. такъ назыв. эретизма, и обыкновенно только когда сперва пользовались другими вѣрнѣе дѣйствующими средствами противовоспалительнаго или успокоительнаго способа леченія, и еще остались отдѣльные припадки и расстройства упомянутого рода, напр. у раздражительныхъ, нервныхъ лицъ, у дѣтей). Впрочемъ если уже произошла высшая степень слабости и общаго изнуренія, то наперстянка, повидимому, скорѣе вредна, нежели полезна.

Какъ наркотическое (успокоительное) средство ее испытывали иногда противъ нервныхъ страданій и душевныхъ болѣзней съ характеромъ возбужденія, противъ головной боли и т. п., какъ и противъ помѣшательства, невралгіи и эпилепсіи.

Хотя мы не имѣемъ удовлетворительныхъ указаній о ея успѣхахъ въ этихъ случаяхъ, однако можно принимать съ вѣроятностью, что наперстянка полезна, на подобіе опія, особенно при возбужденныхъ, эретическихъ состояніяхъ, напр. мозга. Такія состоянія, какъ извѣстно, являются нерѣдко при различныхъ видахъ помѣшательства, при бѣшенствѣ матки, у привычныхъ пьяницъ и др.; и тутъ наперстянка доставляетъ то преимуще-

ство предъ опиѣмъ, дурманомъ (stramonium) и подобными наркотическими веществами, что при ея употребленіи менѣе должно опасаться вреднаго возбужденія дѣятельности сердца и кровообращенія. Противъ душевныхъ болѣзней англичане часто даютъ ее огромными приемами. При *эпилепсiи* наперстянка употребляется давно въ Ирландiи какъ народное средство, часто въ огромныхъ, опасныхъ приемахъ, которые, при ея болѣею частью незначительной и скоропроходящей пользѣ, едва позволительны.

Наперстянка славилась также какъ мочегонное средство противъ водянки, хотя болѣею частью несправедливо и всегда нужно соединять ее съ сильнѣйшими средствами, напр. изъ класса острыхъ, эфирно-маслястыхъ, соляныхъ веществъ, если желаютъ достигнуть значительнаго отдѣленія мочи. Всего полезнѣе она еще при сывороточныхъ эксудатахъ, напр. въ подкожной соединительной ткани, въ брюшинѣ, которые произошли при извѣстныхъ порокахъ сердца или большихъ сосудовъ и когда больной вмѣстѣ съ тѣмъ страдаетъ сердцѣбіемъ и т. п.; также при острыхъ эксудативныхъ процессахъ (напр. острой головной водянкѣ) со скорымъ и полнымъ пульсомъ, при сопряженіи съ настоящимъ воспаленіемъ сывороточныхъ оболочекъ, кожи или венъ, какъ это особенно можетъ встрѣчаться при рожѣ и бѣлой воспалительной опухоли (*phlegmasia alba dolens*); или когда, способствуя къ отдѣленію мочи, желаютъ дѣйствовать отвлекающимъ образомъ, какъ при воспалительныхъ страданіяхъ, особенно сердца, грудной плевры (тутъ по болѣею части въ соединеніи съ каломелемъ). Однако и во всѣхъ этихъ случаяхъ наперстянка можетъ почитаться только побочнымъ средствомъ, и вмѣстѣ съ нею должно употреблять другія, болѣе сильныя вещества, въ случаѣ надобности кровоизвлеченіе, холодъ и т. д. Съ другой стороны ея обыкновенно нельзя давать и противъ водянки малокровнымъ, весьма изнуреннымъ лицамъ, потому что она можетъ произвести опасную слабость и уменьшеніе дѣятельности сердца.

Нельзя еще опредѣлить случаевъ и обстоятельствъ, при которыхъ можно назначать наперстянку какъ *мочегонное средство*; однако большая часть врачей согласна въ томъ, что это прилично особенно при водянкѣ съ болѣзню сердца и при грудной водянкѣ. Во всякомъ случаѣ она, по видимому, опасна для лицъ, страдающихъ водянкою и вмѣстѣ значительнымъ расширеніемъ праваго сердца или размягченіемъ и ожиреніемъ его. Для мочегоннаго лучше всего употреблять наливку наперстянки.

Даютъ наперстянку въ плотномъ видѣ, по  $\frac{1}{2}$ —2 гранъ, на приемъ, 2—4 раза въ день, осторожно увеличивая приемъ, въ порошокъ или пилюляхъ. По болѣею части употребляютъ наливку, принимая ее по 20—30 гранъ и болѣе въ день. Отваръ

содержитъ немногія наркотическія составныя части, но по преобладанію въ немъ острыхъ вытяжныхъ веществъ, онъ болѣе усиливаетъ мочеотдѣленіе.

Какъ исправляющія средства, нерѣдко прибавляютъ корицу и другія ароматныя вещества, китайскій чай, также спиртныя вещества, нести, хотя особенно послѣднія, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, могутъ мѣшать дѣйствіямъ наперстянки (по крайней мѣрѣ какъ успокоительному средству). Вспомогательными средствами служатъ, смотря по обстоятельствамъ, каломель, селитра, вообще мочегонныя соли, морской лукъ, терпентинъ, можжевеловое ма-

сло, зеленый чай; въ другихъ случаяхъ опій, морфій, лавровишневая вода (aq. laurocerasi), камфора. Цианистый потассій, который во Франціи часто назначаютъ вмѣстѣ съ порошкомъ наперстянки, разлагается послѣднимъ.

Вообще большіе, но рѣдкіе приемы (напр. 2—3 раза въ день) лучше, нежели малые, которыми рѣдко достигается надлежащее успокоительное дѣйствіе на сердце и нервную систему, какъ и дѣйствіе на мочеотдѣленіе. Съ другой стороны большіе, рвоту производящіе, приемы англичанъ опасны.

Снаружи наперстянка употребляется рѣдко и только съ цѣлью достигнуть ея дѣйствія на нервную жизнь, кровообращеніе или отдѣленіе мочи, такимъ образомъ



(*Erythraea Centaurium.*) (Золотыščыchnigъ.)  
(Къ стр. 108).

какъ при внутреннемъ употребленіи, — съ цѣлью, которая, къ несчастію, рѣдко достигается. Такимъ образомъ употребляютъ наперстянку въ порошокъ эндематическимъ способомъ, нѣсколько гр. на приемъ, или втираютъ его со слюною, также въ видѣ мази. Кромѣ того пользовались иногда наливкою и отваромъ

травы для примочекъ, припаровъ и умываній и свѣжую, раздавленную траву и его выжатый сокъ прикладывали или втирали иногда при кожныхъ страданіяхъ, въ железистыя опухоли, однако безъ дальнѣйшей пользы.

*Дигиталинъ* представляетъ бѣловатый порошокъ весьма горькаго вкуса, растворяющійся легко въ алкогольъ, весьма трудно въ водѣ и эфирѣ; не оказываетъ ни кислой, ни щелочной реакцій (индифферентный), и не содержитъ азота. Онъ безъ сомнѣнія единственная дѣйствующая составная часть наперстянки.

Онъ дѣйствуетъ какъ наперстянка, только несравненно слабѣе, также мѣстно (напр. на кожѣ, лишенной кожицы, и потому дигиталина нельзя употреблять эндерматическимъ способомъ). Припадки состоятъ въ душеніи, значительной слабости мышцъ, упадкѣ пульса и т. д. Вообще онъ дѣйствуетъ, говорятъ, около 100 разъ сильнѣе, нежели высушенные листья или сильнѣйшіе препараты наперстянки.

У больныхъ  $\frac{1}{8}$  гр. производитъ разительныя дѣйствія на пульсъ, на мозгъ, подобно самой наперстянкѣ, и замѣчательно, что часто проходитъ нѣсколько дней до появленія этихъ дѣйствій. Даютъ его на приемъ около  $\frac{1}{100}$  гр., разъ или нѣсколько разъ въ день, осторожно увеличивая приемъ, въ порошокъ или пилюляхъ. Можно давать его также въ алкаголическомъ растворѣ, или съ водою и сиропомъ; снаружи въ видѣ мази (напр. 1 гр. растворенной въ очищенномъ винномъ спиртѣ и смѣшанный съ 2 гранами жира).

Вообще при употребленіи наперстянки должно начинать съ самыхъ малыхъ приемовъ, т. е. отъ  $\frac{1}{2}$  до 1 грана два раза въ день, и мало по малу умножать до 2 и 3 гр., прибавляя какую-нибудь пряность, чтобы не ослабить желудокъ. При нервическомъ воспаленіи легкихъ и водяной головной болѣзни (*hydrocephalus acutus*) и слѣдуетъ давать въ соединеніи съ сладкою ртутью (*submurias hydrargyri*), также какъ въ воспалительной жабѣ гнилаго свойства (*angina scarlatinosa s. putrida*). Въ видѣ пилюль, разводящихъ золотушныя и другія упорныя опухоли железъ, хорошее дѣйствіе оказываютъ, смѣшанный порошокъ травы съ болголовнымъ экстрактомъ, желто-румяною сѣрою (*hydrosulphuret, sibirii aurantiac.*) и сладкою ртутью. Для наливки полагается 1 драхма сухой травы на 8 унцій кипячей воды, которую, процѣдивъ чрезъ  $\frac{1}{4}$  часа, прибавляютъ 1 унцію мятной воды, либо 1 каплю мятнаго масла, растерши съ сахаромъ и даютъ чрезъ 2 часа по столовой ложкѣ; для отвара берется 1 унц. листовъ, на полтора фунта воды, увариваемой до 1 фунта; принимаютъ этотъ отваръ по 2 столовыхъ ложки въ день, прибавляя къ оному 1 унцію ароматной настойки. Выжатый сокъ, смѣшанный съ медомъ, или сахаромъ, въ видѣ сиропа, даютъ по одной драхмѣ, поутру и вечеромъ или одну столовую ложку этого сока, раз-



веденную 12 унц. пива, употреблять въ раздѣленныхъ приѣмахъ ежедневно означенное количество. Въ водяной болѣзни съ успѣхомъ даютъ сѣмя наперсточной травы такимъ-же образомъ, какъ и сухую траву въ порошокъ. Для приготовления спиртной настойки: 1 унцію сухихъ листьевъ наливаютъ 8 унц. виннаго спирта и даютъ стоять имъ въ тепломъ мѣстѣ не менѣе 7 дней, послѣ чего наливку процѣживаютъ. Свѣжихъ листьевъ для нея кладутъ 1 унцію на 5 унц. крѣпкаго спирта. На приѣмъ ее даютъ отъ 10—30 капель. Для составленія мази, берутъ произвольное количество свѣжей цвѣтной травы и, мелко истолокши ее или выжавъ изъ нея сокъ, смѣшиваютъ съ свѣжимъ коровьимъ масломъ, или съ чистымъ саломъ. Отваромъ, приготовленнымъ изъ 1 унции сухой травы, промываютъ и примачиваютъ золотушные язвы.

*Сиропъ наперсточной травы* составляется изъ 1 унц. высушенной травы съ цвѣтами, налитыхъ 8 унціями крѣпкаго винограднаго уксуса, въ которыхъ давъ настояться, прибавляютъ 10 унцій сахару. Этотъ сиропъ даютъ дѣтямъ по чайной ложкѣ, а взрослымъ по 1 драхмѣ, 3 раза въ день.

При употребленіи наперстянки, какъ уже было замѣчено выше, большой иногда чувствуетъ помраченіе зрѣнія, тошноту, боль головы и не рѣдко отъ умноженныхъ приѣмовъ, особенно излишнихъ, появляется сильная рвота, желудочныя спазмы, икота, поносъ, конвульсіи, холодный потъ и обмороки, оканчивающіеся апоплексическимъ ударомъ. Примѣтивъ первыя признаки подобной слабости и паденіе пульса, должно тотчасъ-же уменьшить количество приѣмовъ наперстянки. При отравленіи наперстянкою, дается молоко, смѣшанное съ слизью для питья, и какъ промывательное.

\* *Dracoscephalum moldavicum* L. (*Змееголовникъ молдавскій; турекая мелисса. — Türkischer Drachenkopf. — Moldavique; La mélisse de Moldavie*). Растетъ въ приволжскихъ губерніяхъ по песчанымъ берегамъ рѣкъ; запахъ травы этого растенія ароматическій, вкусъ пріятный. Свойства его возбуждающія, укрѣпляющія.

Этотъ видъ змееголовника употребляютъ при худосочиі, желудочныхъ спазмахъ, біеніи сердца, головной боли, боляхъ послѣ родовъ, мокротныхъ завалахъ и въ простудной комотѣ. Снаружи, свѣжую толченую траву его прикладываютъ для заживленія ранъ. Выжатый сокъ и смѣшанный съ простымъ виномъ, служитъ хорошею ранозѣлительною примочкою. Въ видѣ катаплазмы съ мукою излечиваетъ ногтиду.

На гореть травы наливаютъ 6 унц. кипячей воды, и подсластивъ пьютъ вмѣсто чаю, или наливаютъ бѣлымъ виномъ, и настоявъ процѣживаютъ его. Настойка эта гораздо дѣйстви-

тельнѣ водяной, которую можно принимать по 1 и по 2 столовых ложки нѣсколько разъ въ день. Снаружи ее употребляютъ въ видѣ припарки и примочки.

\* *Brosera rotundifolia* L. (*Рослянка круглолистная*. — *Rundblättriger Sonnentau*. — *Rosée du soleil*). Растетъ по торфянымъ болотамъ. Листья этого миниатюрнаго растенія представляютъ тоже самое явленіе, какъ и листья мухоловки (*Diopaea muscipula*). Какъ только на нихъ садится какое-нибудь небольшое насекомое, покрывающія ихъ железистыя волоски подвергаются раздраженію и сближаясь другъ съ другомъ обхватываютъ насекомое. Сокъ рослянки на вкусъ чрезвычайно ѣдокъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіи отваръ листьевъ этого растенія употребляютъ противъ водяной болѣзни и перемежающихся лихорадокъ.

Е.

\* *Erica Vulgaris* L. (*Верескъ обыкновенный*. — *Gemeines Heidekraut*. — *Bruyère*). Растетъ въ лѣсахъ на песчаной почвѣ и по пустышамъ. Этотъ видъ вереска составляетъ одну изъ самыхъ распространенныхъ породъ сѣверной флоры: чѣмъ дальше на сѣверъ, тѣмъ чаще встрѣчаются обширныя пространства поросшія дикимъ верескомъ, и на оборотъ рѣже и рѣже встрѣчается онъ по направленію на югъ. Ученая медицина вычеркиваетъ это растеніе изъ списка одаренныхъ цѣлебною силою; но народъ видитъ въ немъ одно изъ вѣрнѣйшихъ средствъ противъ каменной болѣзни. Во многихъ изъ нашихъ губерній, избилующихъ верескомъ, поселяне пьютъ съ этою цѣлію отваръ его, какъ чай. Приносить-ли онъ дѣйствительно въ этомъ отношеніи какую-либо пользу, того, за недостатокъ опытовъ, сказать пока еще невозможно. Кромѣ того, верескъ употребляется въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ для дубленія кожъ и въ пивовареніи, какъ суррогатъ хмѣлю, которому онъ, впрочемъ, уступаетъ въ ароматъ.

\* *Erigeron acre* L. (*Блошица полевая; мелкопестичикъ полевой*. — *Gemeines Berufungskraut*. — *L'érigeron acre*). Растетъ по сухимъ и песчанымъ мѣстамъ.

Трава этого растенія имѣетъ вкусъ острый, напоминающій вкусъ горчицы; свойства его возбуждающія противуцинготныя. Свѣжая трава, въ видѣ салата или консервы, употребляется противу цинги; снаружи толченую и подогрѣтую съ коровьимъ не соленымъ масломъ или съ какимъ-нибудь саломъ и мукою

ту же траву прикладываютъ къ твердымъ нарывамъ, болячкамъ и чирьямъ для ускоренія ихъ назрѣванія.

\* **Eryngium campestre L.** (*Синеголовникъ*. — *Feld Mannstreu*. — *Barbe de chèvre*; *Chardon Roland*; *Panicaut des champs*). Растетъ по краямъ дорогъ. Запахъ корня этого растенія ароматическій, вкусъ сладковатый. Дѣйствіе его мочегонное, кровоочистительное. Въ нѣкоторыхъ странахъ молодые побѣги синеголовника употребляютъ въ пищу, приготовляя ихъ на подобіе спаржи. Это кушанье, по отзыву весьма многихъ лицъ, заслуживающихъ довѣрія, весьма полезно для укрѣпленія и возбужденія желудка.

\* **Erythraea centaureum Rich. (Gentiana centaureum L.)** (*Золототысячникъ*; *золотникова трава*. — *Gemeine Erythräe*. — *Herbe à Chiron*; *petite Centaurée*). Растетъ по открытымъ лугамъ. Всѣ части этого растенія имѣютъ цѣлебныя свойства. Запахъ цвѣтовъ слабый, вкусъ болѣе или менѣе горькій: свойства ихъ тоническія, крѣпительныя и противулихорадочныя. Золототысячникъ содержитъ въ себѣ: экстрактивное вещество, свободную кислоту, камедь и соли. Его употребляютъ въ формѣ наливки, порошка, экстракта и настойки, въ тѣхъ же болѣзняхъ, которыя будутъ указаны при описаніи горечавки (*Gentiana*) и въ томъ же самомъ размѣрѣ.

\* **Eupatorium Cannabinum L.** (*Водяная конопля*; *конопая чирва*; *дикая посконь*. — *Hanfartiger Wasserdost*. — *Eupatoir d'Avicenne*; *Chanvrin*). Растетъ по берегамъ ручьевъ и влажнымъ лугамъ.

Трава и корень этого растенія запахъ имѣютъ острый; вкусъ: очень горькій.

Свойства корня мочегонныя слабительныя и рвотныя; травы ранозѣлительныя, разбивающія.

Водяную коноплю употребляютъ въ слабости брюшныхъ органовъ, завалахъ внутренностей, особливо печени и селезенки; запорѣ кровей, желтухѣ, кожныхъ болѣзняхъ, худосочи, отека ногъ, водяной шудлатной грыжѣ и гнилыхъ цинготныхъ язвахъ; сокъ выжатый изъ ея свѣжихъ листовъ и смѣшанный съ сывороткою, рекомендуютъ не только въ упомянутыхъ болѣзняхъ, но также въ упорныхъ перемежающихся лихорадкахъ, зависящихъ отъ астеническихъ заваловъ.

Корень принимаютъ въ порошокъ отъ 5—10 гранъ; для наливки на одну щепоть ея берутъ 4 унц. горячей воды или на 1 горсть оной наливаютъ 12 унц. сыворотки и вскипятить, даютъ по 2 столовыхъ ложки каждыя 2 часа; снаружн отваренная трава въ водѣ служитъ хорошою припаркою. Свѣжая толченая трава очищаетъ цинготныя раны и другія язвы и за-

живляетъ ихъ. Кромѣ того она разбиваетъ золотушныя и другія холодныя опухоли.

Крестьяне употребляютъ эту траву въ видѣ водянаго отвара или съ пивомъ: противъ водяной болѣзни, цинги, желтjаницы, 3 и 4-дневныхъ лихорадокъ и повальныхъ гнилыхъ болѣзней. У многихъ поселянъ это растеніе служитъ также домашнимъ универсальнымъ лекарствомъ: въ мокротныхъ хроническихъ болѣзняхъ, водяныхъ опухоляхъ, вѣтряной колѣкѣ, и проч. Въ Швеціи простолоудины, корень и траву этого растенія, отваривъ съ молочной сывороткою, пьютъ отъ водяной болѣзни.

\* *Euphorbia palustris* L. (*Молочай болотный*. — *Sumpf-Wolfsmilch*. — *L'Euphorbe des marais*). Растетъ по влажнымъ лугамъ, и болотамъ. Млечный сокъ истекающій изъ ея стеблей, на воздухѣ сгущается и высыхаетъ, образуя мелкія зернинки блѣдно-желтаго цвѣта и имѣющія чрезвычайно острый, ѣдкій вкусъ. Это вещество имѣетъ свойства чрезвычайно сильнаго слабительнаго, которое должно быть употребляемо съ величайшею осторожностію, такъ какъ употребленіе его можетъ причинить воспаленіе желудка и кишокъ. При наружномъ его употребленіи оно притягиваетъ кровь къ тому мѣсту, къ которому приложено. Это камедисто-смолистое вещество употребляется растворенное въ винномъ спиртѣ, какъ наружное средство, для успокоенія боли гнилыхъ зубовъ. Нѣкоторые врачи совѣтуютъ, растерши его съ постнымъ свѣжимъ коровьимъ масломъ или саломъ, употреблять какъ мазь: для очищенія шелудивыхъ струпеевъ, бородавочъ, мозолей и летучихъ огневицковъ или лишаевъ. Молочайный ѣдкій сокъ изъ сорваннаго стебелька впускаемый въ полый гниущій зубъ, помогаетъ нерѣдко утоленію боли.

Для приготовленія спиртной настойки (*tinctura euphorbii*) кладется 1 унц. сгущеннаго сока на 8 унц. виннаго спирта. Давъ настояться въ теченіи трехъ дней, настойку за тѣмъ процѣживаютъ и употребляютъ какъ примочку для костоедныхъ язвъ и натиранія парализованныхъ членовъ. Сѣмя, въ приемахъ отъ 5—10 и 20 гранъ, сильно слабитъ и гонитъ мочу. Отваръ полунціи свѣжаго молочая въ 1 фунтѣ молока, даютъ по получайной чашки противъ глиствъ и какъ доказываютъ опыты, это средство достигаетъ въ большинствѣ случаевъ желаемой цѣли.

Молоко животныхъ, будучи смѣшано съ бѣлымъ сокомъ молочая, дѣлается краснымъ. Козье молоко и овечье отъ этой травы пріобрѣтаютъ слабительныя свойства.

Подобными-же свойствамъ отличаются и другіе виды молочая, каковы: *молочай плащевый*, или *круглолистный* и *м. ѣдкій* (*E. esula*, и *E. repilis*); *м. придорожный* (*E. lathyris*) и *м. солмечный* (*E. helioscopia*), растущіе по обработаннымъ полямъ, пашнямъ, сѣдамъ, огородамъ и при дорогахъ. Въ деревняхъ называютъ

это растеніе вообще водчьимъ молокомъ. По свидѣтельству Кашинскаго крестьяне въ отчаянной водяной болѣзни даютъ отъ 10—20 капель выжатого сока съ сывороткою, или съ молокомъ: одна столовая ложка этого сока, растертая съ такимъ же количествомъ мелкаго сахара и 1 свѣжимъ яичнымъ желткомъ, съ прибавленіемъ 3 столовыхъ ложекъ воды, составляетъ оршадъ, принимаемый чрезъ 2 часа по 1 ложкѣ, для изгнанія тесемочной глисты, и по отзыву того же автора это средство весьма часто оказывается дѣйствительнымъ. Съ этою же цѣлью даютъ отъ 8—10 и 12 гранъ, сгущенаго сока, растерши его съ сахаромъ и прибавивъ 1 драхму порошка папоротниковаго корня (р. *filix mas* L.). Снаружи: свѣжій сокъ молочая употребляютъ для согнанія бородавокъ и очищенія венерическихъ язвъ. Полунціи того-же сока, смѣшанныя съ 5 унц. терпентиннаго масла и 2 унц. крѣпкаго виннаго спирта, образуютъ мазь, весьма полезную для натиранія парализованныхъ членовъ.

\* *Euphrasia officinalis* L. (*Глазница аптечная; очная по-мощь; очная трава; свѣтликъ.*—*Gemeiner Augentrost.*—*L'Euphrasie officinale*). Растетъ по краямъ дорогъ и лѣсовъ и на дугахъ.

Трава этого растенія *запаху* не имѣетъ; вкусъ ея горьковатый и слабо-вяжущій. Свойства ея разбивающія, укрѣпляющія.

Народная медицина почитаетъ это растеніе однимъ изъ лучшихъ средствъ противъ глазныхъ болѣзней и именно начальной слѣпоты и пятенъ, застилающихъ зрѣніе. Выжатый сокъ изъ свѣжихъ листовъ, и смѣшанный съ бѣлымъ виномъ и медомъ, впускаютъ съ этою цѣлью ежедневно по одной каплѣ въ глаза.

\* *Evonymus europaeus* L. (*Берескледъ.*—*Gemeiner Spindelquitt.*—*Fusain*). Растетъ по гористымъ мѣстамъ въ средней и сѣверной полосѣ Россіи. Всѣ части бересклёда издаютъ слабо-тошнотворный запахъ. Древесина его употребляется для приготовленія угля, употребляемаго въ фабрикаціи пороха. Изъ молодыхъ вѣтвей этого дерева, посредствомъ пережиганія ихъ въ желѣзныхъ трубкахъ, готовятъся тушевальные карандаши, отличающіеся своею нѣжностію. Плоды бересклёда имѣютъ горькой вкусъ и дѣйствуютъ какъ рвотное и спльное слабительное. Коробочки ихъ истертыя въ порошокъ отличаются противуглистными свойствами; кромѣ того, по свидѣтельству Lesson'a, тотъ-же самой порошокъ можетъ быть употребленъ для уничтоженія вшей. Порошокъ плодовъ бересклёда принимается преимущественно въ видѣ отвара, также какъ и его сушеные листья.

Р.

\* **Festuca fluitans L. (Glyceria fluitans R.).** (*Овсянка пловучая*.—*Fluthendes Schwindel*.—*L'Herbe à la maine*). Растетъ въ стоячихъ водахъ и сырыхъ мѣстахъ по всей Россіи. Сѣмена мучнистыя, сладко-слизистыя на вкусъ. Въ жаркія лѣтнія дни колоски этой породы злаковъ очень часто покрываются сахаристымъ коричневатого цвѣта веществомъ. Въ Польшѣ, Венгріи и Швеціи зерна овсянки употребляются въ пищу, подъ названіемъ *манной крупы*. Въ Польшѣ съ этою цѣлію колосья ея собираютъ на восходѣ солнца въ особаго рода сита и за тѣмъ сушатъ ихъ въ теченіе 15 дней на лучахъ солнца, высыпавъ ихъ тонкимъ слоемъ на полотнѣ. Какъ скоро зерна высохнутъ ихъ молотятъ на соломѣ или тростникѣ. Послѣ этого, вымолоченное зерно овсянки высыпаютъ въ закромы, перекладывая его пласты лепесткамъ ноготковъ (*Calendula officinalis L.*), или листьями яблони или орѣшника.

Овсянка сваренная съ молокомъ доставляетъ чрезвычайно питательное кушанье полезное въ особенности для слабыхъ больныхъ.

**Ficaria ranunculoides Moench.** См. **Ranunculus Ficaria L.**

\* **Fragaria vesca L.** (*Земляника лѣсная; земляника; суница; полуница*—*Wilde Erdbeere*. — *Fraisier*). Растетъ по всей Россіи по лугамъ и гористымъ лѣсамъ.

Зрѣлыя ягоды запахъ имѣютъ пріятный; вкусъ кислотоватосладкій; трава и корень на вкусъ вяжущіи.

Ягоды земляники полезны во всѣхъ лихорадочныхъ болѣзняхъ; Фонъ Свигтенъ рекомендуетъ по нѣскольку фунтовъ ихъ въ день давать меланхоликамъ и сумасшедшимъ. Знаменитый ботаникъ Линней, употребляя ежегодно землянику въ большомъ количествѣ, излечился отъ подагры. Землянику со сливкамъ не слѣдуетъ давать больнымъ, ибо эти послѣднія свертываясь въ творогъ; отягощаютъ желудокъ. Ежедневное и продолжительное употребленіе ягодъ, земляники весьма полезно также для страдающихъ, ломотою, каменною болѣзнію и цингою. Листья и корни земляники приносятъ пользу въ чревныхъ завалахъ, желтухѣ, поносахъ, кровотеченіяхъ, теченіи гнойной матеріи изъ дѣтородныхъ частей, сыпяхъ, бѣляхъ и отекахъ. Пивной отваръ земляничнаго корня усиливаетъ отдѣленіе молока у кормилицъ.

Свѣжія ягоды можно давать больнымъ въ произвольномъ количествѣ; выжатый изъ нихъ сокъ даютъ отъ 2—4 унцій. Полуниця листовъ и корня полагается на фунтъ воды для отвара, которую кипятятъ до тѣхъ поръ, пока останется 6 унцій жидкости, и принимаютъ по двѣ столовыя ложки чрезъ 2 часа. На бутылку пива кладется 1 унц. корня, и оно уваривается на половину. Снаружи листы прикладываются къ ножнымъ застарѣлымъ язвамъ.

Клубника садовая (*Fragaria vesca hortensis*) бѣлая и красная, имѣетъ одинакія качества съ земляникою; выжатый сокъ изъ этихъ ягодъ чрезъ броженіе, доставляетъ пріятное вино.

**Fraxinus ornus L** (*Ясень. — Esche. — Frêne*). Встрѣчается въ гористыхъ мѣсахъ южной Россіи.

Изъ стволонъ какъ этого, такъ и другихъ ясеней вытекаетъ сокъ, извѣстный подъ именемъ *манны*. Этотъ сокъ содержитъ въ себѣ: манный сахаръ (маннитъ) съ слизистымъ сахаромъ, камедь; далѣ красильныя, тошнотворныя, слабительныя, отчасти смолистыя вещества.

Манна дѣйствуетъ въ малыхъ приемахъ какъ всѣ сахаристыя вещества; но большіе приемы легко производятъ тошноту, рвѣ въ животѣ и поносъ. Эти дѣйствія на желудокъ и кишки являются тѣмъ сильнѣе, чѣмъ манна старше и менѣе чиста, т. е. чѣмъ болѣе она содержитъ желтыхъ, смолистыхъ веществъ. Манну можно употреблять какъ прочія сахаристыя средства, или особенно какъ легкое слабительное, для дѣтей, чувствительныхъ нѣжныхъ лицъ, или когда надобно избѣгать вообще всякаго сильнаго раздраженія органовъ живота, напр. при воспаленіи брюшины, кровавомъ поносѣ, воспаленіи печени, почечкѣ и т. п. Но къ ней обыкновенно надобно прибавлять болѣе сильныя слабительныя.

Принимаютъ обыкновенно съ сенною, слабительными солями, также съ пряностями, для исправленія вкуса. Ее просто растворяютъ въ водѣ и пропускаютъ, или прибавляютъ къ весику или отвару не задолго до пропусканія.

*Манный сиропъ.* (*Syrupus Mannae*) водный растворъ манны съ сахаромъ прибавляютъ къ слабительнымъ унціями, или даютъ дѣтямъ чайн. ложками.

*Манный сахаръ, Маннитъ* (*Mannitum*); сахарное вещество, неспособное бродить, находится всего болѣе въ свѣжихъ и хорошихъ сортахъ манны (также въ медѣ, свекловичѣ и пр.). Кристаллизуется, бѣлъ, легко растворяется, особенно въ горячей водѣ. Его употребляютъ вмѣсто манны, чтобы избѣгать ея тошнотворнаго дѣйствія; впрочемъ, имъ пользуются въ такихъ же приемахъ и формахъ, напр. раствореннымъ въ кипяткѣ,

ароматическихъ водахъ (онъ становится при охлажденіи густымъ и вязкимъ).

\* *Fumaria officinalis* L. (Дымница аптечная; земляной дымъ; чистякъ; полевая рута; кокорышъ; дымянка — *Gemeiner Erdrauch*. — *Fumeterre*). Растетъ по пашнямъ и обработаннымъ мѣстамъ.

Свѣжая трава *zapaхu* не имѣетъ; *вкусъ* ея горькій, непріятный, солоноватый. Свойства дымянки укрѣпляющія, противуцинготныя, разбивающія и очищающія. Ее совѣтуютъ употреблять въ слабости желудка, желчной рвотѣ, желтухѣ, брюшныхъ завалахъ (особенно печени), цингѣ и цинготной порчѣ соковъ. Соками этого растенія и одуванчиковъ излечивается проказа (лега).

Двѣ драхмы травы наливаются 12 унц. молочной сыворотки; или 1 горсть травы варятъ съ 2 фунтами пива, которое, процѣдивъ и выжавъ, пьютъ по чайной чашкѣ нѣсколько разъ въ день. Выжатый сокъ даютъ отъ 2—4 унцій съ сывороткою два раза въ день. Сокъ дымянки, впускаемый въ глаза по каплѣ разбиваетъ темную воду и укрѣпляетъ зрѣніе.

Другой видъ этого рода: \* *Fum. bulbosa* L. (Дымница оршистая; земляные оршики; дымчатка луковичная), растущій въ тѣнистыхъ мѣстахъ и гористыхъ лѣсахъ, имѣетъ свойства потогонныя.

Ее употребляютъ какъ и всѣ горькія растенія: въ слабости желудка, запорѣ мочи и мѣсячныхъ кровей, при неправильномъ кровоочищеніи послѣ родовъ, желтухѣ, цингѣ и чесоткѣ. Снаружи: ея корень и трава, отваренные въ водѣ, служатъ полосканьемъ, уничтожающимъ гнилость во рту; толченая свѣжая трава одобрается для ошпеченія и заживленія цинготныхъ ранъ; вареная въ припаркахъ прикладывается въ подагрической боли и для разведенія опухлыхъ частей отъ ушиба. Сушеный корень дается въ порошокъ полдрахмы и болѣе, 2 или 3 раза въ день; снаружи трава служитъ для припарки. Выжатый сокъ изъ всего растенія, подслащенный медомъ, принимаютъ отъ 1—2 унцій.



G.

\* **Galeopsis Ladanum L.** (*Курятникъ вонючій; Ладанъ лѣсной.*—*Acker-Hohlzahn.*—*Galéopsis*). Растетъ между посѣвами на песчаныхъ мѣстахъ. Цвѣты и трава этого растенія употребляются въ истощительной чахоткѣ, преимущественно въ соединеніи съ сладкогорькимъ (*Solanum dulcamara*), алтейнымъ корнемъ и солодкою. Обыкновенно на горсть цвѣтовъ лѣснаго ладона кладутъ, полгорсти алтейнаго корня и такое же количество солодковаго корня и побѣговъ сладкогорькаго, и пьютъ этотъ сборъ какъ чай два раза въ день.

\* **Galium Aparine L.** (*Подморенникъ ползучій.*—*Klebedes-Labkraut.*—*Le Caille-lait grateron*). Растетъ по краямъ дорогъ, пашнямъ и кустамъ. Корни этого растенія доставляютъ, подобно родственной съ нимъ маренѣ, красную краску. Вопреки довольно распространенному во многихъ мѣстностяхъ Россіи мнѣнію о цѣлебныхъ силахъ этаго вида подмаренника, онъ повидимому совершенно лишенъ ихъ и не имѣетъ вовсе значенія во врачебномъ искусствѣ.

**Genista tinctoria L.** (*Дрокъ; Шильная трава.*—*Färber-Ginster.* — *Le genêt des teinturiers*). Растетъ въ южной Россіи по холмамъ и необработаннымъ мѣстамъ. Вкусъ всѣхъ частей дрока горькій, тошнотворный. Свойства ихъ мочегонныя и слабительныя. Употребляется съ пользою, противъ водяной и каменной болѣзней. Въ первой изъ нихъ даютъ настойку бѣлаго вина дрокомъ (всѣми частями его), а во второй наливку сѣмян по 2 или по 3 раза въ день. Для приготовления наливки на  $\frac{1}{2}$  унціи цвѣтовъ или сѣменъ берутъ 16 унцій кипятку и за тѣмъ кипятъ въ закрытомъ сосудѣ, пока останется не болѣе фунта жидкости. Процѣдивъ, ее принимаютъ по 2 столовыхъ ложки, черезъ каждые 2 часа, до тѣхъ поръ, пока не начнетъ слабить или гнать мочу.

**Gentiana lutea L.** (*Горчавка желтая.*—*Gelber Enzian.* — *La gentiane jaune*). Растетъ въ гористыхъ частяхъ Россіи. Горчавка содержитъ въ себѣ: особое вещество — генцианинъ, горькія вытяжныя вещества, пектинъ, сахаръ и т. д. со слѣдами эфирнаго масла.

Горчавка дѣйствуетъ, какъ горькія вещества вообще; хотя она менѣе горька, нежели квасцья, однако это, по видимому, скорее составляетъ преимущество, нежели невыгоду, и потому, по крайней мѣрѣ у насъ, она можетъ замѣнить всѣ подобныя горькія вещества.

Горькія экстрактивные ея вещества, какъ и такъ называемый генціанинъ, даже введенныя непосредственно въ кровь, по видимому, не обнаруживаютъ никакихъ вредныхъ дѣйствій. Вода, перегнанная надъ горчавкою и содержащая такимъ образомъ только летучія составныя части, а не вытяжныя вещества, причиняетъ тошноту и головокруженіе.

Горчавка всего чаще употребляется при разстройствѣ пищеваренія, не зависящемъ отъ воспалительныхъ или вообще значительныхъ болѣзней желудочныхъ оболочекъ; также при золотухѣ, англійской болѣзни (rhachitis) и ломотѣ слабыхъ, изнуренныхъ лицъ.

По содержанію неваримыхъ составныхъ частей (древесины и т. д.), приемы горчавки въ видѣ порошка (6—20 гр.) неудобны. Лучше всего давать ее въ видѣ настойки или отвара отъ 1—2 драхмъ на день; иногда въ пилюляхъ, болюсахъ.

Изъ горчавки приготавливаются слѣдующіе препараты:

1) *Вытяжка горчавки (Extractum Gentianae)*. Ее даютъ приемами отъ 5—10 гр. разъ въ день, въ пилюляхъ, также съ ароматными водами, испанскимъ виномъ и др. по 1 столовой ложкѣ черезъ каждыя 4 часа.

2) *Настойка (Tinctura Gentianae)*. Получается вареніемъ корня горчавки съ виннымъ спиртомъ. Какъ при всѣхъ подобныхъ настойкахъ дѣйствіе измѣняется по содержанію виннаго спирта. Принимаютъ каплями отъ 10—20 капель нѣсколько разъ въ день, по себѣ, съ микстурами или другими настойками.

Кромѣ того горчавка входитъ въ составъ различныхъ сложныхъ настоевъ и элекспровъ.

3) *Генціанинъ (Gentianinum)*. Кристаллизующаяся масса, растворяется легко въ винномъ спиртѣ и эфирѣ, трудно въ водѣ. Употребляется подобно самой горчавкѣ, однако безъ дальнѣйшей пользы, также при перемежающейся лихорадкѣ, противъ которой его даютъ по 5—10 гр. на приемъ, сверхъ того онъ дорогъ.

Корни другихъ видовъ горчавки употребляются какъ корень желтой горчавки (*G. lutea*), и часто смѣшаны съ послѣднимъ; дѣйствіе ихъ, впрочемъ, то же самое. Такъ:

*Gentiana purpurea, punctata, panonica* (пурпуровая горчавка точечная, венгерская и др.) употребляются на Альпахъ для приготовления травянаго вина и пива, также горчавковой водки.

\* *Gent. cruciata (Rad. Gent. minoris)*, сокомій перелетъ, крестовая стародубка). Прежде ее хвалили противъ перемежающейся лихорадки и укушенія бѣшеною собакою.

\*

\* **Geranium Robertianum L.** (*Айстникъ вонючій. — Stinkender Storchnabel. — L'Herbe à Robert*). Растетъ по тѣнистымъ лѣсамъ.

Трава имѣетъ запахъ козлиный, вкусъ солоноватый и легко вяжущій.

Свойства айстника вяжущія, разбивающія сгустившееся въ грудяхъ молоко, ранозѣлительныя.

Наливку айстника съ горячею водою полезно пить: въ кровавомъ мочетеченіи, поносахъ, боляхъ въ животѣ, почкахъ и поясницѣ. Снаружи, свѣжая толченая трава его прикладывается для разведенія грудницы, раковыхъ затвердѣній и заживленія язвъ на сосцахъ и дѣтородныхъ частяхъ. Листы, сваренные съ винограднымъ виномъ, полезны въ особенности для примочки грудныхъ трещинъ и венерическихъ язвъ.

Для отвара берется 1 унція листовъ на фунтъ воды или вина; этотъ отваръ употребляется внутрь и снаружи. Въ порошокъ айстникъ употребляется и въ видѣ катанглазмы, для разведенія отекалыхъ и другихъ холодныхъ опухолей.

Въ деревняхъ свѣжую толченую траву айстника прикладываютъ къ грудямъ для разогнанія молока, послѣ отнятія младенца. Свѣжо-выжатымъ сокомъ, смѣшаннымъ съ медомъ, излечиваютъ злокачественныя язвы.

\* **Geum urbanum L.** (*Чаирскій чай; чистецъ; гробенникъ; мумальскій чай. — Gemeines Geum. — La benoite officinale*). Растетъ по лѣсамъ.

Свойства гравилата зависятъ отъ вяжущаго начала, соединеннаго съ небольшимъ количествомъ летучаго масла. Свѣжій корень, собираемый весною на сухой почвѣ, запахъ имѣетъ гвоздичный; сухой же утрачиваетъ его; вкусъ пріятный, горьковато-вяжущій. Онъ содержитъ въ себѣ: смолу, тонинъ, существенное масло, адрагантинъ, камедистое вещество и древесину.

Дѣйствіе гравилата возбуждающее, укрѣпляющее, противугниlostное.

Гравилатъ можетъ быть употребляемъ во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ одобряется хинная корка (*cinchona officinal.*). Гравилатный корень полезенъ въ особенности въ упорныхъ перемежающихся лихорадкахъ и другихъ болѣзняхъ астеническаго свойства. Въ Германіи и Швеціи не разъ производили опыты надъ сотнями больныхъ лихорадкою, происходящею отъ слабости (*febris atonica*), въ которой часто хина не приносила никакой пользы, между тѣмъ какъ корень гравилата исцѣлялъ ихъ. Онъ можетъ быть употребляемъ также въ слабости желудка, трудномъ пищевареніи, поносѣ, запорѣ мѣсячныхъ кровей, блѣдной немочи, теченіи бѣлей, истерикѣ, судорожномъ кашлѣ, долговременныхъ кровотеченіяхъ, водяной болѣзни, чахоткѣ и въ хро-

ническихъ дѣтскихъ болѣзняхъ, какъ-то: въ сухоткѣ, золотухѣ, англійской болѣзни и проч. Снаружи отваръ корня употребляется для укрѣпляющихъ примочекъ, омываній и полосканья въ цинготной гнилости десенъ, гнилыхъ язвахъ и рытникахъ, испускающихъ смрадную матерію. Наливку свѣжихъ листьевъ гравилата совѣтуютъ употреблять противъ подагры.

Корень дается въ порошокъ отъ  $\frac{1}{2}$ —1—2 и 3 драхмъ съ медомъ, въ видѣ кашки; для отвара полагается 1 унція на фунтъ воды, которую должно кипятить въ закрытомъ сосудѣ, до тѣхъ поръ, пока останется 6 унцій жидкости. Эту наливку пьютъ по чайной чашкѣ; винная-же наливка дается черезъ 2 часа по 2 столовыя ложки. Въ лихорадкахъ и гнилыхъ горячкахъ нѣкоторые врачи совѣтуютъ прибавлять къ отвару гравилатнаго корня гошмановы капли или винный спиртъ.

Съ этою цѣлю можно приготовить гравилатную настойку (tinctura rad. gei urbani), наливъ 2 унц. толченаго корня 4 фунтами французской воды, или виннаго спирта и, настоявъ ее въ тепломъ мѣстѣ нѣсколько дней, процѣдить. Въ весеннихъ и осеннихъ лихорадкахъ дается съ успѣхомъ  $\frac{1}{2}$  унціи на приемъ по 2 или 3 раза въ день.

Корень гравилата должно выкапывать въ апрѣлѣ или маѣ мѣсяцахъ. Очистивъ и высушивъ, его хранятъ въ закрытыхъ сосудахъ. Этотъ корень не только замѣняетъ хину, но таже ангустурную корку и персидскіе лавровые бобы (*laurus reschurim*).

Въ Швеціи, по свидѣтельству Линнея, гравилатнымъ корнемъ настаиваютъ пиво, которому онъ даетъ геоздичный запахъ и пріятный вкусъ, и предохраняетъ отъ окисанія.

Положенный въ сундукъ или шкафъ, между платья, онъ сообщаетъ пріятный запахъ, и прогоняетъ моль.

\* *Geum rivale* L. (*Гравилатъ береговой*. — *Vach-Geum*. — *La depoite à ruisseaux*). Растетъ по влажнымъ лугамъ и берегамъ ручьевъ.

Свойства гравилата береговаго сходны съ свойствами предыдущаго вида, но слабѣ ихъ; *вкусъ* корня горьковатый, вяжущій; *запахъ* слабый, затхлый.

Дѣйствіе его вяжущее, укрѣпляющее, противулихорадочное, противувишлотное.

Употребляется въ слабости желудка, продолжительныхъ носсахъ, маточныхъ и геморроидальныхъ кровотеченіяхъ и весеннихъ перемежающихся лихорадкахъ.

Въ порошокъ корень гравилата береговаго дается отъ 2 скрупуловъ до 1 драхмы; снаружи имъ присыпаются венерическія язвы. Для отвара кладутъ полунціи корня на фунтъ воды.

\* *Glechoma hederacea* L. (*Будра ползучая; плющикъ; кротовикъ; душистый худри*. — *Gemeine Gandelrebe*. — *Le lierre ter-*

*restre*). Растетъ по влажнымъ мѣстамъ. Запахъ будры слабо-ароматическій, вкусъ ея горько-острый, слабо-бальзамическій. На листьяхъ этого растенія образуются не рѣдко твердые, круглыя орѣшки, производимыя уколами особой живущей на пей породой насѣкомыхъ (*cupirs glechomatis* L.). Свойства будры разящительныя и укрѣпляющія мочу.

Народная медицина признаетъ ее за одно изъ лучшихъ средствъ противъ застарѣлой простуды, упорнаго кашля, мокротной чахотки, кровохарканія, дѣтской сухотки и водяной болѣзни. Кроме того ее рекомендуютъ въ желтухѣ, коликѣ и каменной болѣзни, въ послѣдней изъ которыхъ и пьютъ въ видѣ чая. Свѣжую толченую траву этого растенія прикладываютъ съ успѣхомъ къ цинготнымъ и гнилымъ язвамъ. Выжатый изъ будры сокъ, даютъ въ упомянутыхъ болѣзняхъ по унціи два раза въ день. При этомъ надо замѣтить, что леченіе сокомъ ея можетъ быть производимо только весною, т. е. при выжиманіи его изъ молодыхъ растеній, въ прочее-же время года будру принимаютъ въ порошокъ или въ видѣ каши съ медомъ въ пріемахъ до полудрагмы. Для приготовленія наливки на 4 унціи выпитку кладутъ щепоть травы. Крѣпкая настойка будры употребляется какъ наружное средство для примачиванія и промыванія упомянутыхъ выше ранъ.

***Globularia vulgaris* L.** (*Клубочникъ обыкновенный; шаровидная трава.—Gemeine Kugelblume.—Globulaire*). Растетъ по извѣстковымъ сухимъ холмамъ въ умѣренной полосѣ Россіи. Вкусъ листьевъ горькій. Это растеніе хвалятъ какъ разбивающее мокроты и заживляющее раны. Внутрь употребляютъ свѣжую траву его съ сывороткою (1/2 унціи травы на фунтъ сыворотки). Снаружи прикладываютъ толченую траву.

***Glycyrrhiza glabra et echinata* L.** (*Солодка жесткая и колючая.—Lakritze.—La réglisse*). Растетъ въ южной Россіи по влажнымъ мѣстамъ и берегамъ ручьевъ.

Солодка содержитъ въ себѣ: глицирризинъ или глиціонъ (трудно растворяется въ холодной водѣ, не кристаллизуется, не бродитъ), раздражающее вытяжное вещество, смолу, крахмалъ, алтеинъ (аспарагинъ), соли.

Солодкокорень и его препараты походятъ на другія сладкія вещества, они имѣютъ разрѣшающее дѣйствіе, и вытяжнымъ веществомъ нѣсколько раздражаютъ, особенно кора и кожа, почему ихъ и употребляютъ преимущественно при кашлѣ, воспаленіи дыхательныхъ вѣтвей. Еще чаще ими пользуются для исправленія вкуса. Даютъ корень по себѣ, въ видѣ порошка, произвольными пріемами; для воспріятія лекарствъ въ видѣ порошка, когда не желаютъ употреблять сахара. Часто его да-

ють въ видѣ наливки, вскипа — но не отвара, потому что въ немъ раздражающій вкусъ несравненно сильнѣе.

Изъ солодки приготовляются слѣдующіе препараты:

**Солодковый сокъ** (*Succus Liquiritiae s. Glycyrrhizae crudus*) готовится въ большомъ количествѣ, часто подмѣшая въ крахмаломъ, мѣдью и пр.

**Лакрица** (*Succus Glycyrrhizae s. Liquiritiae depuratus*) получается изъ продажной вытяжки, которую растворяютъ или вымачиваютъ въ водѣ, пропускаютъ, выпаряютъ и превращаютъ въ порошокъ. Употребляется особенно для исправленія вкуса, напр. нашатыря, микстуръ и пр.

**Солодковый экстрактъ** (*Extractum Glycyrrhizae s. Liquiritiae*), вытяжной констистенци, жиже предъидущаго, слаще, потому годнѣе для подслащиванія, вообще служитъ также воспринимашимъ веществомъ для пилюль (въ случаѣ надобности его смѣшиваютъ съ порошокомъ солодкокорня).

**Лакричный сиропъ** (*Syrupus Liquiritiae*), прибавляютъ къ микстурамъ.

**Грудной элексиръ** (*Elixir e Succo Glycyrrhizae s. E. pectorale*). Растворъ 1 ч. сока солодкокорня въ 3 ч. укропной воды, смѣшанный съ 1 ч. *Liq. ammonii anisati*. Довольно невинный препаратъ.

**Грудныя лепешки** (*Trochisci bechici (nigri)*): солодкокорень, фіялковый корень, анисъ и т. п., обращенные съ сокомъ солодкокорня, сахаромъ и трагянтою слизью въ лепешки. Приемъ по производу.

\* **Gnaphalium dioicum L.** (*Змѣвикъ двудомный; кошачья лапка. — Zweihäusiges Rhurkraut. — Immortelles*). Растетъ на открытыхъ солнечныхъ мѣстахъ.

Цвѣты запаху не имѣютъ; вкусъ вяжущій. Свойства этого растенія грудныя.

Употребляется вмѣсто чаю въ удушливомъ кашлѣ, кровохарканіи, чахоткѣ, въ простудной ломотѣ, сильныхъ кровотеченіяхъ, женскихъ бѣляхъ и теченія слизи изъ мочевого канала, происходящихъ отъ слабости органовъ, въ поносахъ, глистныхъ припадкахъ, ломотѣ и судорожномъ кашлѣ. Снаружи листья змѣвика прикладываютъ къ ранамъ для ихъ заживленія.

Другой видъ этого растенія, \* *Gnaph. arenarium L.* (змѣвникъ кустарный, или комарникъ), растущій по безплоднымъ мѣстамъ и имѣющій цвѣты отзывающіеся мускусомъ, употребляется въ тѣхъ же случаяхъ и такимъ же образомъ какъ и предыдущій.

\* **Gratiola officinalis L.** (*Аврамъ аптечный; благодать; Божья милость; лихорадочная трава. — Aechtes Gnadenkraut. — Grâce de Dieu*). Растетъ на влажныхъ мѣстахъ и по бѣрегамъ

ръкъ. Это растеніе содержитъ въ себѣ: горько острое смолнистое вытяжное вещество камедь, бѣлокъ и др.

Въ большихъ приемахъ авранъ производитъ поносъ, рвоту, часто даже воспаление желудка и кишокъ. Прежде его употребляли какъ одно изъ болѣе легкихъ слабительныхъ, особенно при водянкѣ, при такъ назыв. черной желчи, меланхоліи, сумасшествіи и вторичномъ сифилисѣ.

Трава съ цвѣтами, собираемая въ іюнѣ и іюль мѣсяцахъ, запаху не имѣетъ; вкусъ свѣжей травы весьма горькій, острый, тошнотворный. Свойства эти у травы сушеной слабѣе.

Свѣжая толченая трава аврана прикладывается для разведенія комотныхъ опухолей и къ ушибамъ, соединеннымъ съ подкожнымъ кровоизліяніемъ.

Для приготовленія настойки одна драхма травы берется на 4 унціи кипящей воды или 3 драхмы наливаются 6 унц. горячей сыворотки. Эта наливка, принимается въ 2 или 3 приема какъ слабительное.

Экстрактъ дикаго аврана (*extractum gratiolæ*), приготовляемый чрезъ отвариваніе въ водѣ и выпареніе, почитается весьма дѣйствительнымъ средствомъ: въ венерическихъ опухоляхъ костей, костобѣдѣ, застарѣлыхъ и раковыхъ язвахъ, затвердѣніи железъ и ядеръ; въ твердыхъ паховникахъ (бубонахъ), венерическомъ долговременномъ теченіи бѣлей, ломотъ, темной водѣ и упорной чесоткѣ.

Экстрактъ: дается приемами отъ 2—4 гранъ, по утру и въ вечеру въ пилюляхъ или отъ 5—10 гранъ, растворивъ въ мятной или другой ароматической водѣ по столовой ложкѣ; для проноснаго въ водяной болѣзни, его даютъ по 10 гранъ въ пилюляхъ; въ сумасшествіи: отъ 20—30 гранъ, и до поддрахмы.

Свѣжая трава этого растенія имѣетъ слабительное и рвотное дѣйствіе; сухая же только слабитъ, а потому можетъ замѣнить александрійскій листъ (*cassia senna*), ялпный корень (*convolvulus jalappa*), сабуръ (*aloë perfolata*) и желтую камедь (*stalagmitis cambo-gioides*).

Сухой корень дикаго аврана, принятый до 2 скрупуловъ, дѣйствуетъ наподобіе ипекакуанны (*psychotria emetica*, s. c. *ipescuanha*).

\* *Gypsophila muralis* L. (*Алебастреникъ стѣнной*. — *Mauer Gypskraut*. — *Gypsophila des murs*). Растетъ по полямъ и пашнямъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Тульской губерніи свѣжую траву алебастреника, поселяне пьютъ какъ чай, противъ грудныхъ болѣзней и кашля.

Н.

**Hedera helix L.** (*Плющъ. — Gemeiner Epheu. — Le lierre commun*). Встрѣчается въ лѣсахъ южной Россіи. Всѣ части плюща при растираніи издають сильный запахъ; листья его вкусъ имѣють горькій, тошнотворный. Свойства ягодъ слабительныя и рвотныя. Изъ стволовъ этого растенія, при надрѣзѣ ихъ вытекаетъ смолисто-камедистый сокъ, который на воздухѣ твердѣетъ и приобретаетъ видъ непрозрачнаго, темно-коричневаго вещества, издающаго при горѣніи запахъ, сходный съ запахомъ ладона. Изъ него готовятъ съ виннымъ спиртомъ лакъ, употребляемый въ живописи масляными красками. Плющевой смоль (*resina hederae*) или такъ-называемому—гедерину приписываютъ свойство уничтожать запоръ мѣсячныхъ кровей у женщинъ. Настояемъ листьевъ плюща примачиваютъ гнойныя раны. Впрочемъ употребленіе этого растенія съ лечебною цѣлю до того ограничено, что нельзя сказать съ достовѣрностію принадлежатъ-ли въ дѣйствительности, приписываемыя ему нѣкоторыя силы.

**Helleborus niger L.** (*Черная чемерица. — Schwarze Niesswurz. — Roses de Noël; L'Helléb. noir*). Растетъ въ садахъ южной половины Россіи.

Черная чемерица содержитъ въ себѣ: острое жирное масло и смолу, эфирное масло, летучую кислоту (сходную съ вртоновою или ятрофановою кислотой), горькое вытяжное вещество, камедь и др.

Знаменитая въ древности *чемерица* была по видимому корень черной чемерицы.

Дѣйствіе корня этого растенія можетъ произвести воспаленіе кожи, особенно свѣжій корень. Вкусъ его острый, жгучій и горькій. Въ малыхъ приемахъ онъ нерѣдко причиняетъ рвоту и поносъ съ жжениемъ и рѣзью. Подобно другимъ сроднымъ веществамъ и слабительнымъ, черная чемерица имѣетъ вліяніе преимущественно на органы тазовой полости, на матку, мочевые пути, прямую кишку, и производитъ боль, приливъ, усиленное отдѣленіе, даже кровотеченіе изъ этихъ органовъ, особенно когда они уже расположены къ этому прежними неправильностями, какъ напр. при геморояхъ.



Отъ большихъ приемовъ (по 30—40 гран. и больше) черной чемерицы происходитъ воспаленіе желудка и кишечника, и преимущественно слизистая оболочка толстой и прямой кишки раздражается и приходитъ въ приливновоспалительное состояніе. Вместе съ тѣмъ являются: головокруженіе, бредъ, судороги, столбнякъ, обморокъ и наконецъ смерть.

Черную чемерицу употребляютъ противъ помѣшательства, меланхоліи, эпилепсіи и другихъ нервныхъ страданій, и перемеж. лихорадки, особенно четырехдневной.

На востокѣ часто употребляютъ черную чемерицу противъ эпилепсіи и душевныхъ болѣзней, большею частью, какъ секретное и шарлатанское средство, напр. жаренную и превращенную въ порошокъ.

По дѣйствию на кишечный каналъ и отдѣленіе мочи даютъ ее противъ водянки, а также для изгнанія глистовъ и при упорномъ запорѣ (особенно въ видѣ пилюль какъ слабительное). Кроме того черная чемерица можетъ быть полезною и противъ хроническихъ страданій кожи.

Какъ мѣсячногонное средство ее хвалятъ при угнетенномъ отдѣленіи мѣсячныхъ кровей.

Если желаютъ употреблять черную чемерицу, то не должно забывать, что она мѣстно можетъ сильно раздражать и, при большихъ приемахъ или долгомъ употребленіи, поражать въ высокой степени нервную систему, что она такимъ образомъ прилична развѣ только для болѣе сильныхъ или нечувствительныхъ лицъ и при отсутствіи всякаго воспалительнаго состоянія.

Снаружи пользуются черною чемерицею рѣдко—какъ остро-раздражительнымъ средствомъ противъ хроническихъ страданій кожи, чесотки, противъ ядовитыхъ укушенныхъ язвъ и т. п. Вообще ее употребленіе, безъ совѣта врача не должно быть допускаемо.

\* *Heracleum Spondylium* L. (*Борщъ*.—*Heilkraut*.—*Brancheursine*; *Berce*; *Acanthe d'Allemagne*). Растетъ во всей Россіи по возвышеннымъ мѣстамъ и лѣсамъ. Различныя части этого растенія имѣютъ и совершенно различныя свойства: корень и кора до того остры, что могутъ производить воспаленіе и вздутіе кожи; напротивъ того, стебли очищенные отъ коры и листья при наливаніи ихъ водою даютъ, по истеченіи нѣсколькихъ недѣль, слизистую, кислотоватую на вкусъ жидкость. Въ польскомъ краѣ траву борща употребляютъ противъ извѣстной болѣзни волосъ, такъ называемаго колтуна. Толченые листья его прикладываютъ также къ ожогамъ и для заживленія свѣжихъ ранъ. Въ Сибіри, по словамъ Гмелина, туземцы приготовляютъ изъ борща водку и спиртъ.

Корень употребляютъ въ видѣ отвара, приготовляемаго изъ  $\frac{1}{4}$  унціи корня съ 8 унціями воды, которыя кипятятъ до тѣхъ поръ пока останется полфунта жидкости. Для наливки на унцію кипятку владуть 2 щепотки травы.

\* **Herniaria glabra L.** (*Грыжовникъ голый.* — *Behaartes Bruchkraut.* — *Herniole; Turquette; Herbe au turc; Herbe aux hernies.*) Растетъ по сухимъ и песчанымъ мѣстамъ. Трава этого растенія запаху не имѣетъ; вкусъ его солоноватый и нѣсколько вяжущій.

Свойства грыжовника разбивающія, мочегонныя. Врачи XVII столѣтія давали внутрь выжатый сокъ грыжовника, а снаружи прикладывали свѣжую траву въ ущемленной грыжѣ. Его хвалятъ также въ завадахъ внутренностей, водяныхъ опухоляхъ и для изгнанія мелкихъ камешковъ и песка изъ мочевыхъ путей; и равно въ притупленіи зрѣнія или тусклости глазъ.

Горсть сухой травы наливается 12 унц. горячей воды, которую пьютъ вмѣсто чая; выжатый сокъ изъ свѣжей травы принимаютъ одинъ или съ бѣлымъ виномъ по 1 унціи, 3—4 раза въ день. Снаружи грыжовникъ употребляется въ видѣ припарки и глазной примочки.

\* **Hieracium pilosella L.** (*Сокольникъ солосатый; ноготная трава; мышии ушки.* — *Mausöhrlin-Habichtskraut.* — *L'épervière piloselle.*) Растетъ на сухихъ лугахъ, холмахъ и по краямъ дорогъ. Свойства этого растенія ранозѣлительныя и вяжущія. Другой видъ того-же рода \* *Hier umbellatum L.* (*Сокольникъ зонтичный.* — *Schirmblumiges Habichtskraut.* — *L'épervière ombellifère.*) почитается весьма хорошимъ средствомъ противъ кашля и легочной чахотки. въ которыхъ водяную наливку травы сокольника принимаютъ по 2 столовыхъ ложки, 4 раза въ день.

\* **Hordeum vulgare L.** (*Ячмень.* — *Gemeine Gerste.* — *L'orge.*) Воздѣлывается во всѣхъ полосахъ Россіи.

Ячмень часто употребляли въ пищу или для слизистыхъ напитковъ и какъ воспринимающее вещество (напр. для выздоравливающихъ, при поносѣ и пр.), удаливъ предварительно мякнну, въ видѣ *ячменной крупы* (*Hordeum mundatum s. decorticatum*). Зерна, освобожденные отъ всѣхъ кожицъ, округленные и обглаженные называются *перловою крупю* (*Hordeum perlatum*).

*Приготовленная ячменная мука* (*Farina Hordei praeparata, Amylum Hordei*), которую называли также гуфеландовою мукою: пшеничная мука, варенная въ горячихъ водяныхъ парахъ, потомъ высушенная и обращенная въ порошокъ; красноватожелта. Она полезна какъ питательное вещество подобно апоруту, особенно для атрофическихъ, слабыхъ дѣтей, чахоточныхъ и др. Она содержитъ кромѣ клейковины амилянъ (гордеинъ), варится

легче и немного питательнѣе обыкновеннаго ячменя. Употребленіе п т. д., какъ у арорута.

*Солодъ (Maltum Hordei)*, (проросшій и потомъ высушенный ячмень) содержитъ кромѣ крахмала, клейковину, большее количество дѣстаза (превращенный протеинъ) и камедь (дектринъ), сахаръ. Употребляется часто въ видѣ напитка при цингѣ, золотухѣ, туберкулезныхъ страданіяхъ, водянкѣ, катаррѣ, слизетеніи (отъ большихъ приѣмовъ легко происходитъ поносъ). Для этого берутъ нѣсколько унцій на 2 фун. воды, отвариваютъ до половины, и потомъ прибавляютъ вино, сахаръ, лимонный сокъ. Снаружи употребляли (особенно только что полученный отъ пивовара, еще теплый) солодъ для припарокъ, напр. при жесткости, старыхъ переломахъ, часто вмѣстѣ съ пивными дрожжами; даже для ваннъ (напр. золотушнымъ, атрофическимъ, рахитическимъ дѣтямъ) по 3—6 фунт. и больше на ванну.

*Пивныя дрожжи (Fermentum Cerevisiae)*, вещество, богатое азотомъ, состоитъ изъ растительныхъ ячеекъ, которыя образуются во время броженія изъ клейковины ячменя. Онѣ удобоваримы, довольно питательны. Ихъ употребляли внутри при цингѣ по нѣскольку стол. ложекъ въ день, или съ отваромъ отрубей въ видѣ напитка; снаружи (напр. варенныя съ мукою, при чемъ развивается углекислота) для припарокъ на цинготныхъ, омертвѣлыхъ частяхъ. Дрожжи нѣкоторые врачи хвалятъ также противъ тифа.

\* *Humulus Lupulus L.* (*Хмѣль. — Gemeiner Hopfen. — Houblon*). Растетъ въ лѣсахъ преимущественно по берегамъ ручьевъ. Шишки хмѣля издають сильный наркотическій, одуряющій запахъ и имѣютъ горькій вкусъ. При вымачиваніи ихъ въ холодной или горячей водѣ изъ нихъ выдѣляется ихъ главное начало—*лупулинъ*. Отъ прибавленія къ этого рода наливки желѣзнаго купороса, она получаетъ коричневый цвѣтъ. Свойства хмѣля пищеварительныя и мочегонныя. Шишки хмѣля, какъ извѣстно всѣмъ, употребляются въ пивовареніи для замедленія броженія пива, предохраненія его отъ окисанія и сообщенія ему пріятной горечи и аромата, способствующихъ пищеваренію. Шишки хмѣля употребляются, какъ средство противъ золотухи и хроническихъ болѣзней кожи.

Принимаютъ ихъ въ этихъ случаяхъ въ формѣ водяной наливки. Молодые побѣги и листья хмѣля почитаются антискорбутными.

\* *Nyctagynus niger L.* (*Бѣлена черная; блекота. — Schwarzes Bilsenkraut. — Hannebane; Potélée; Careilade*). Растетъ по пустырямъ и около заборовъ. Сѣмена бѣлены содержатъ въ себѣ: гіосціаминъ (алкалоидъ), жирное масло, камедь, бѣловъ, смолу и др. Трава содержитъ кромѣ гіосціамина горькое вытяж-

ное вещество, камедь и т. д. Жирное масло съмени дѣйствуетъ не наркотически, а скорѣе только какъ другія жирныя масла.

Бѣлена дѣйствуетъ почти также какъ сонная одурь, и отличается преимущественно только меньшею силою, особенно мѣстнаго раздраженія.

Малые приемы не производятъ у здоровыхъ замѣтныхъ измѣненій ни въ пищеварительныхъ путяхъ, ни въ нервной жизни, въ мозгу, только что зрачекъ часто расширяется и можетъ происходить боль и круженіе головы, даже рвота, и все это иногда уже отъ употребленія бѣлены, напр. на глазу или на кожѣ.

Но когда мозгъ, или отдѣльныя нервныя части и мышечные аппараты находятся въ состояніи возвышеннаго отравленія, когда были судороги, сильная боль и т. п., то онѣ часто исчезаютъ уже при слабой степени дѣйствія бѣлены.

Большіе приемы нервѣдо производятъ душевное и рвоту безъ особенной боли около желудка. Но скоро происходитъ раздраженіе мозга и лица, которое большею частью красно, глаза показываютъ особенный блескъ, зрачекъ обыкновенно расширяется въ высокой степени, являются различныя неправильности въ отправленіи зрительныхъ нервовъ, нестрѣніе и искры въ глазахъ, круженіе и тупая боль головы. Потомъ происходитъ высокая степень мышечной слабости, даже безгласіе; отравленный сонливъ, а шаги его шатки; является бредъ, оглушеніе, сонливость, иногда съ сильною яростью и судорожными сокращеніями отдѣльныхъ мышцъ лица (судорожный смѣхъ); между тѣмъ какъ пульсъ становится все меньше и дыханіе все труднѣе. Въ рѣдкихъ случаяхъ видѣли даже корчу нижней челюсти или сильныя общія судороги. Наконецъ можетъ воспослѣдовать параличъ и смерть.

Терапевтически бѣлена употребляется снаружи и внутрь какъ успокоительное, противосудорожное и болеутоляющее средство, и при обстоятельствахъ она наводитъ сонъ, подобно сонной одури.

Противъ раздраженія и усиленнаго отравленія нервныхъ центровъ, какъ и периферическихъ нервныхъ частей, особенно при болѣзненныхъ страданіяхъ, напр. при гастралгіи, личной и зубной боли и т. д., противъ болѣзненныхъ (ревматическихъ, ломотныхъ) страданій суставовъ, судорогъ и другихъ нервныхъ припадковъ, особенно дыхательныхъ органовъ, противъ коклюша, грудной жабы (*angina pectoris*) и сильнаго раздраженія къ кашлю; далѣе въ эпилепсіи. Наконецъ, когда при воспалительныхъ страданіяхъ нервы поражены въ высокой степени и такимъ образомъ являются необыкновенно сильныя боли или судороги и т. п., со всѣми дальнѣйшими послѣдствіями, — такъ особенно во многихъ болѣзняхъ глазныхъ оболочекъ (*ophthalmia*),

дыхательныхъ путей, сердца (напр. pericardisis), половыхъ и мочевыхъ органовъ, напр. при переломѣ, каменной болѣзни.

Бѣлена, кромѣ того, по мнѣнію нѣкоторыхъ врачей, оказываетъ раздѣшающее дѣйствіе въ золотушныхъ страданіяхъ железъ и другихъ органовъ, при затвердѣніи и зернистости печени и т. п., надо думать впрочемъ, что въ этихъ случаяхъ она полезна только какъ палліативно успокоивающее, болеутоляющее средство.

Бѣлена дѣйствуетъ всего вѣрнѣе, когда она употребляется (подобно сонной одурѣ) для расширенія зрачка, напр. при воспаленіи радужной оболочки, до и послѣ глазныхъ операцій.

Вообще бѣлена не имѣетъ особеннаго преимущества передъ сонною одурью; въ большей части упомянутыхъ случаевъ она уступаетъ въ вѣрности и силѣ дѣйствій, особенно опію и морфію. Но обыкновенно предпочитаютъ бѣлену опію въ случаяхъ, гдѣ опасаются запора или сильныхъ дѣйствій опія на нервную жизнь и кровообращеніе. Съ другой стороны бѣлена не можетъ замѣнить опія, всего менѣе какъ болеутоляющее, снотворное средство, и кромѣ того, бѣлена не представляетъ совсѣмъ невиннаго вещества для мозга и сосудистой системы. Приличнѣе она для наружнаго употребленія, когда нужно облегчить боль и судороги, какъ при рактѣ, железистыхъ опухоляхъ, язвахъ, нарывахъ, сыпи, зудѣ и другихъ кожныхъ страданіяхъ; при болѣзненныхъ, вшемленныхъ геморроидальныхъ шишкахъ, при судорогахъ маточнаго рывца и шейки мочевого пузыря.

Какъ при наружномъ, такъ и при внутреннемъ употребленіи представляется то неблагоприятное обстоятельство, что высушенные листья и всѣ препараты бѣлены чрезвычайно не вѣрны, и часто вовсе не дѣйствуютъ. Только алкоголическій экстрактъ дѣйствуетъ сильнѣе. Сѣмя по большей части дѣйствуетъ гораздо вѣрнѣе травы, напр. на зрачекъ.

Траву или сѣмя рѣдко назначаютъ по себѣ: въ приемахъ отъ 2—4 гран., въ порошкѣ, пилюляхъ, также въ видѣ наливки, — даже сѣмя (напр. для расширенія зрачка); послѣднее даютъ также въ эмульсіи (напр. съ миндалемъ или маковымъ сѣменемъ). Смотря по обстоятельствамъ обыкновенно присоединяютъ меркуриальныя средства, іодъ, селитру, окись цинка, при катаррѣ и другихъ страданіяхъ дыхательныхъ органовъ желтую сурьмяную сѣру, рвотный корень, наперстянку и др.

Снаружи трава употребляется всего чаще для припарокъ (напр. при нарывахъ, болѣзненныхъ железистыхъ опухоляхъ, язвахъ, судорогахъ мочевого пузыря), съ пятнистымъ омегомъ (*conioplas macul.*), сонною одурью (*belladonna*), мукою льнянаго сѣмени и т. п.; также въ видѣ вскипа для примочекъ, вырысыванія и промывательныхъ (напр. при болѣзненныхъ и судорожныхъ

страданіяхъ прямой кишки). Сѣмя хвалили также для куренія противъ зубной боли.

Изъ бѣлены готовятъ:

*Экстрактъ (Extractum Hyoscyami)* готовится настаиваніемъ выжатого сока съ виннымъ спиртомъ и выпареніемъ въ умѣренной температурѣ; имѣетъ вытяжную консистенцію и крошится немного. Употребляется преимущественно внутрь по 1—3 гран. по нѣскольку разъ въ день, осторожно увеличивая приемъ, часто до появленія наркотическихъ припадковъ. Даютъ его въ пилюляхъ, рѣже въ порошокъ, также въ растворѣ (напр. въ простой или лавровишневой водѣ, винномъ спиртѣ, винѣ рвотнаго камня), по 10—15 гран. въ день, даже безъ опасности и въ 2—3 раза большихъ приемахъ. Въ Англійи его часто даютъ съ вытяжкой волоцинта, потому что онъ, говорятъ, уменьшаетъ дѣйствіе ея. Снаружи его можно употреблять, какъ всѣ подобныя экстракты.

*Настойка (Tinctura Hyoscyami)* готовится вымачиваніемъ травы въ винномъ спиртѣ и водѣ. Даютъ внутрь по 10—30 капель.

*Бѣленое масло (Oleum Hyoscyami infusum) (coctum)* готовится вареніемъ высушенной травы съ 4 ч. прованскаго масла въ песчанной банѣ. Весьма невинный препаратъ, почти безъ наркотическаго дѣйствія. Иногда его даютъ внутрь, напр. при воспаленіи кишечъ или брюшины, при кровотеченіи изъ легкихъ, даже столовыми ложками безъ вреда; обыкновенно въ эмульсіи. Снаружи его употребляютъ часто по его «успокоительному, болеутоляющему» дѣйствію, для промывательныхъ, впрыскиванія и втиранія, особенно при воспаленіи брюшины, болѣзненныхъ опухоляхъ железъ, вмѣстѣ съ сѣрою ртутною мазью. Приемы произвольны.

Изъ бѣлены готовятъ еще 2 вида мази: *Unguent. Hyoscyami* (спиртная настойка съ 4 ч. жира) и *Ungu. populeum* (водной экстрактъ тополевыхъ почекъ и бѣлены съ 12 ч. жира).

Другой видъ этого рода: *Hyoscyamus albus L.* (*Бѣлена бѣлая. — Weisse Bilsenkrout. — La jusquiame blanche*), встрѣчаемый въ южной Россіи имѣетъ тѣ-же свойства какъ и предыдущій, но дѣйствуетъ слабѣе.

\* *Hypericum perforatum L.* (*Звербой. — Gemeines Hartheu. — Le mille-pertuis perforé*). Растетъ по холмамъ и лѣсамъ.

Цвѣтныя верхушки запахъ имѣютъ тяжелый; вкусъ горьковатый, бальзамическій, зависящій отъ содержащагося въ этомъ растеніи камедисто-смолистаго горькаго вещества.

Употребляется въ народной медицинѣ, въ чахоткѣ, кровохарканіи и кровавомъ мочетеченіи, брюшныхъ завадѣхъ, истерическихъ и гипохондрическихъ припадкахъ, трясеніи членовъ и

меланхолической задумчивости. Снаружи, по своему бальзамическому свойству, это растение полезно для заживления ранъ и разведенія ушибленныхъ опухолей.

Для отвара полунціи цвѣточныхъ верхушекъ наливають 6 унц. горячей воды и пьютъ его вмѣсто чаю. Иначе: 1 горсть цвѣтныхъ верхушекъ варятъ въ 3 фунтахъ бѣлаго вина до тѣхъ поръ, пока останется 2 фунта жидкости, которую, процѣдивъ, даютъ по утру и вечеру, по 3 унціи ежедневно, больнымъ чахоткою. Снаружи употребляются въ видѣ катаплазмы или припарки.

Крестьяне звѣробойные цвѣты настаиваютъ простымъ виномъ, полагая на бутылку 2—3 горсти и пьютъ эту настойку по чашкѣ: отъ ушиба внутренностей, чахотки и другихъ внутреннихъ поврежденій. Иные пьютъ видѣ въ горячей водяной наливки вмѣсто чаю, отъ тѣхъ-же болѣзней. Если въ 1 фунтѣ водяной или винной звѣробойной настойки распустиа 1 золотникъ поташу, то эта настойка хорошо разводитъ ушибы, затверденіе грудей, ядеръ и скиррныя холодныя опухоли.

Звѣробойное масло считается домашнимъ ранозѣлительнымъ средствомъ, полезнымъ въ особенности отъ ожогъ.

***Nyssopus officinalis* L.** (Исопъ. — *Gemeiner Ysop*. — *Nyssopore*). Растетъ въ южныхъ странахъ Россіи и Сибири въ особенности на мѣловыхъ холмахъ Дона и гористомъ берегу Волги, близъ Саратова и Камышина.

Трава, съ цвѣтными верхушками, собираемая до разцвѣтанія, содержитъ въ себѣ летучее масло, соединенное съ экстрактивнымъ горькимъ началомъ. Запахъ свѣжая и сухая трава имѣетъ благовонный; вкусъ горьковато-пряный, горячительный.

Свойства исоба слабо возбуждающія, грудныя, разбивающія.

Употребляется исопъ въ грудныхъ мокротныхъ болѣзняхъ, простудномъ кашлѣ, мокротной жабѣ и удушья. Снаружи ею пользуются въ ушибахъ и багровыхъ кровяныхъ застояхъ.

Внутрь исопъ дается въ видѣ наливки, полагая 2 драхмы верхушекъ на 4 унціи горячей воды. Для наружнаго употребленія 1 унцію травы варятъ въ 8 унціяхъ воды, прибавляя краснаго вина 2 унціи; отваръ этотъ служитъ хорошимъ полосканьемъ и примочкою; вареная трава съ водою и уксусомъ употребляется для припарки и полосканья рта отъ простудной боли зубовъ.

J.

\* **Juula Helenium L.** (*Девясилъ большой; уманъ.—Aechter Alant.—Aunée; Inule campane*). Растетъ по пустырямъ и около заборовъ въ одичаломъ состояніи. Корень этого растенія содержитъ въ себѣ твердое бѣлое вещество, занимающее средину между существеннымъ масломъ и камфорой, горькое экстрактивное начало, свободную уксусную кислоту, кристаллизующуюся смолу, альбуминъ и *инулинъ*, нерастворимый въ холодной водѣ и алкоголѣ, а растворяющійся въ кипяткѣ и селитряной кислотѣ. Запахъ его ароматическій отзывающійся фиалкою, вкусъ—пряный, островатогорькій.

Свойства его тоническія и возбуждающія.

Его употребляютъ въ повальныхъ упорныхъ кашляхъ, мокротномъ удущѣ, чревныхъ засалахъ, чесоткѣ и другихъ болѣзняхъ, соединенныхъ съ кожными сыпями. Кроме того корень девясила даютъ въ блѣдной немочи, теченіи бѣлей, трясеніи членовъ, отъ неумѣренного употребленія ртутныхъ средствъ и злокачественныхъ горячекъ, худосочи, цинготной ломотѣ, астеническихъ лихорадкахъ и мокротномъ почечуѣ. Снаружи толченныя листья прикладываются: для разведенія твердыхъ опухолей, утоленія ломотныхъ болей, очищенія гнилыхъ язвъ и заживленія ранъ; листья смѣшанные съ свѣжимъ коровьимъ масломъ или свинымъ саломъ употребляются съ успѣхомъ отъ чесотныхъ и золотушныхъ сыпей. Порошокъ корня, въ видѣ мази, полезенъ также въ этихъ послѣднихъ случаяхъ. Корень въ порошокъ



Хмѣль. (*Humulus Lupulus.*)  
(Къ стр. 124).



дается отъ  $\frac{1}{2}$ —1 драхмы; для наливки 2 драхмы толченаго корня владутся на 6 унц. горячей воды или бѣлаго вина.

Для составленія противучесоточной мази, берутъ полфунта свѣжаго очищеннаго и мелко изрѣзаннаго корня и варятъ въ 3 фунтахъ воды, пока оны превратится въ слизь которую, выжавъ, смѣшиваютъ съ 6 унц. свѣжаго несоленнаго коровьяго масла. Этою мазью намазываютъ страждущія части на ночь, а по утру обмываютъ ихъ теплою водою съ мыломъ, при этомъ употребляютъ внутрь выше упомянутую водяную наливку девясильнаго корня.

\* *Jnula dysenterica* L. (*Девясиль слабительный; девясиль меньшій.*—*Ruhr Alant.*—*Jnule dysentérique*). Растетъ во рвахъ и каналахъ.

Трава этого вида имѣетъ запахъ слабый, пріятный; вкусъ островато-горькій

Свойства его вяжущія, кровоочистительныя. Оны употребляются въ простомъ и кровавомъ поносахъ эпидемическаго характера, кровотеченіяхъ, чесоткѣ и другихъ кожныхъ нечистыхъ сыпяхъ. Снаружи толченые листья употребляются въ видѣ припарки, для очищенія гнилыхъ ранъ.

Корень этого растенія дается по 1 драхмѣ въ порошокъ, или въ видѣ винной наливки.

\* *Jris pseudo-acorus* L. (*Касатикъ болотный; сабельникъ.*—*Wasser-Schwertlilie.*—*La flambe d'eau; Glayeu des marais; La flambe bâtarde*). Растетъ по берегамъ водъ и въ болотахъ.

Свѣжій корень касатика болотнаго запаху не имѣетъ; вкусъ острый, нѣсколько вяжущій.

Свойства его вяжущія, мочегонныя.

Сокъ выжатый изъ корня, употребляется въ водяной болѣзни, противъ круглыхъ глистовъ и зоба, при которомъ даютъ этотъ корень жевать, прикладывая въ то-же время снаружи толченый корень въ теченіи 50 или 60 дней. Корень, положенный на больной зубъ, утоляетъ боль; при употребленіи его въ видѣ полосканья, отвращаетъ цинготную порчу десенъ. Катаплазма изъ распаренныхъ листовъ утоляетъ домотную и подагрическую боли.

Сокъ дается съ приличными жидкостями, отъ 1—4 драхмъ; сухой корень въ поносахъ и кровотеченіяхъ принимается въ порошокъ отъ 20 гранъ до полудрахмы.

Красные, вяжущіе корни, пригодны для выдѣлки кожъ. Изъ высушенныхъ цвѣтовъ, посредствомъ укуса, извлекаютъ желтую постоянную краску, предпочитаемую желтилицѣ (*сигсма*), потому что темнѣе оной, и на воздухъ не измѣняется.

\* *Jris sibirica* E. (*Касатикъ сибирскій; птышокъ; чистякъ; бубенчикъ.*—*Sibirische Schwertlilie.*—*La flambe de Sibirie*).

Растетъ въ Сибири, а также у рѣки Волхова недалеко отъ Чертовой деревни.

Дѣйствія касатика сибирскаго при небольшихъ приемахъ слабительное, въ болѣе же значительныхъ дозахъ рвотное. Сибиряки пользуются этимъ корнемъ для врачеванія венерической болѣзни и ломоты того-же свойства; съ этою цѣлю они принимаютъ его отваръ по утрамъ по стакану или въ порошокъ по 1 золотнику съ молочною сывороткою. Нѣкоторые, смѣшавъ отъ 4—6 лотовъ свѣжаго сока съ равнымъ количествомъ постнаго масла и настоявъ сутки въ тепломъ мѣстѣ, трутъ имъ части тѣла, страдающія ломотою.

Для отвара полагаютъ  $\frac{1}{2}$  унціи корня на 12 унцій воды. Въ порошокъ сушеный корень даютъ отъ 15—20 гранъ; дѣтямъ отъ 3—8 гранъ. Для винной наливки берутъ полуунціи корня, или сѣмень на полубутылку жидкости, и принимаютъ по 1 рюмкѣ.

*Jris germanica* L. (Касатикъ германскій; кас. сикій; нѣмецкая ирѣ.—*Deutsche Schertlilie*.—*La flambe*). Растетъ въ южной Россіи по возвышеннымъ мѣстамъ, въ прочихъ полосахъ воздѣлывается въ садахъ.

Свойства корня германскаго касатика сходны съ свойствами предыдущаго вида.

Выжатый сокъ этого растенія употребляется въ брюшной водяной болѣзни—въ приемахъ каждый часъ по 80 капель съ медомъ; сушеный корень, въ видѣ водяной или винной наливки, полезенъ отъ насморка, грудныхъ мокротныхъ припадковъ и запора кровей.

Сокъ свѣжаго корня даютъ съ медомъ, или съ какимъ-нибудь сиропомъ, или смѣшавъ 2—3 унціи онаго съ 2 фунтами молочной сыворотки, даютъ пить по чайной чашкѣ, нѣсколько разъ въ день. Для приготовленія наливки: полуунціи корня кладутъ на фунтъ горячей воды, сыворотки, или винограднаго вина.

Свѣжій корень, при внутреннемъ употребленіи, требуетъ большой осторожности, хотя его по свидѣтельству Соболевскаго, въ нѣкоторыхъ земляхъ и употребляютъ въ водяной болѣзни; но по весьма острому и жгучему свойству, онъ при большихъ приемахъ можетъ произвести сильную желчную рвоту, кровавое испражненіе, жженіе въ горлѣ и жаръ въ желудкѣ и кишкахъ. Для наружнаго употребленія, корень этотъ настаиваютъ въ деревянномъ или постномъ маслѣ, въ количествѣ 2—3 унцій на бутылку. Это масло приноситъ ту-же пользу въ ломотныхъ боляхъ, какъ и настой его сибирскимъ касатикомъ.

*Juglans regia* L. (Грецкій орешникъ.—*Gemeine Wallnuss*.—*Le noyer*). Растетъ въ южной Россіи въ особенности въ Киев-

сей губерніи. Орѣхи этой породы дѣйствуютъ какъ вяжущія, немного горькія вещества; концентрированные и въ большихъ приѣмахъ они раздражаютъ пищеварительные пути, производятъ поносъ и т. д. Ирѣдка еще употребляютъ и хвалятъ ихъ для изгнания круглыхъ и даже плоскихъ глистовъ; особенно для послѣдовательнаго леченія. Далѣе въ дискрапическихъ состояніяхъ, какъ золотухѣ, комотѣ, сифилисѣ, ртутномъ худосочіи и хроническихъ упорныхъ страданіяхъ кожи.

Высушенные листья весьма полезны противъ золотухи, золотушныхъ страданій железъ, слизистыхъ оболочекъ, кожи и воспаления глазъ.

Даютъ ихъ только въ видѣ вскипа или отвара высушенныхъ листьевъ, часто съ сарсапарелью, гваякомъ, сюрмяными препаратами.

Снаружи иногда назначаютъ листья и кору грецкихъ орѣховъ въ видѣ отвара или вытяжки, при торпидныхъ, золотушныхъ и сифилитическихъ язвахъ, даже при рагѣ—для умыванія, примочекъ, впрыскиванія и ваннъ.

Для истребленія глистовъ, даютъ орѣховую зеленую корку въ отварѣ, который однако производитъ рвоту; а потому для этого болѣе удобенъ водяной экстрактъ или густая выварка изъ упомянутой кожуры. Для истребленія тесемочной глисты полезно орѣховое свѣжее масло (*oleum piscum inglandium*), отъ 1 до 2 унцій съ малагою. Орѣховое масло приноситъ пользу въ мочевыхъ припадкахъ, особенно при каменномъ мочерѣзѣ, запорѣ мѣсячнаго очищенія и глистныхъ припадкахъ. При сухомъ воспаленіи глазъ совѣтуютъ ежедневно впускать по нѣскольку капель этого масла посредствомъ мягкаго перушиа. Этимъ способомъ предохраняются глаза отъ пятенъ, бывающихъ нерѣдко послѣ оспы, кори и краснухи; имъ же смазываютъ два или три раза въ день ожоги и трещины грудныхъ сосцовъ. Выжатый сокъ изъ молодыхъ зеленыхъ орѣховъ и смѣшанный съ медомъ, примѣшиваютъ къ полосканьямъ отъ жабы, воспаления и опухоли гортанныхъ железъ; въ дѣтской молочницѣ и другихъ язвахъ во рту, тоже полезно смазывать кисточкою, напитанною подслащеннымъ сокомъ. Отваръ сухой зеленой корки рекомендуютъ въ венерической застарѣлой болѣзни, въ томъ періодѣ, когда ртутныя средства болѣе уже не дѣйствуютъ. Этого рода кровоочистительный отваръ готовятъ изъ песочной осои (*saxa asenaria*), можжевельоваго дерева (*lignum radicis juniperi c.*), высушенной зеленой орѣховой кожуры, взятыхъ по 4 унціи каждая, и 1 унціи сюрмы (*antimonium crudum*). Означенное количество этого сбора отвариваютъ въ 20 фунтахъ воды и пьютъ этотъ отваръ при затвердѣніи железъ, опухоляхъ костей, въ грудныхъ припадкахъ и сухотѣхъ, послѣдовавшей послѣ долговременнаго леченія и во всѣхъ застарѣлыхъ припадкахъ венери-

ческаго свойства. Снаружи промываютъ тѣмъ-же отваромъ застарѣлыя язвы и опухоли.

Для отвара берутъ 1 унцію зеленой сухой корки на фунтъ воды, которую кипятятъ до тѣхъ поръ, пока останется 8 унцій жидкости; порошокъ корки присыпаются гнилыя язвы, вмѣсто хины. Горсть свѣжихъ изрѣзанныхъ листовъ наливаютъ 8 унц. кипячей воды и подсластивъ, принимаютъ по половинѣ чайной чашки. Орѣховое свѣжее масло внутрь дается отъ 1—2 и 3-хъ унцій, какъ хорошее противуглистное средство и отъ каменной боли.

Чистое орѣховое масло, по своему пріятному вкусу, ни мало не уступаетъ миндальному и прованскому; а потому и замѣняетъ ихъ какъ во врачбномъ, такъ и въ поваренномъ искусствѣ. Съ прибавленіемъ садовой руты и уксуса, оно служитъ катаплазмой, укрощающею антоновъ огонь и гнилость чумныхъ огневицъ. *(Ка. рѣд. ж. к. с. п.)*

Отваръ зеленой орѣховой скорлупы полезенъ для истребленія гусеницы и садовыхъ червей, пожирающихъ зелень.

\* *Juniperus communis* L. (*Можжевелникъ обыкновенный; яловецъ. — Gemeiner Wachholder. — Genévrier commun*). Растетъ по сухимъ холмамъ и на безплодныхъ мѣстахъ. Ягоды содержатъ въ себѣ смолу, эфирное масло, крахмалъ, сахаръ, воскъ, камедь и др.

Относительно дѣйствій можно было-бы разсматривать можжевелевыя ягоды и дерево, какъ весьма разведенный терпентинъ. Поэтому ихъ можно давать какъ побочное средство, для дѣтетическаго питья во всякъ случаяхъ, гдѣ употребляется терпентинъ и свицидаръ внутрь. Всего чаще они употребляются для усиленія отдѣленія мочи, какъ-то: при водянкѣ, ломотѣ, каттаральныхъ, бленоройныхъ страданіяхъ дыхательныхъ вѣтвей, мочевыхъ и половыхъ органовъ.

10—20 зрѣлыхъ ягодъ на пріемъ или ихъ наливка употребляются какъ народное средство противъ перемежающейся лихорадки, также при недостаточномъ отдѣленіи мѣсячныхъ кровей.

Ягоды и древесина большею частью даются въ видѣ наливки или наливочнаго отвара; послѣдняя въ двое большихъ пріемахъ; ягоды даются иногда также въ видѣ порошка и болуса. Обыкновенно ихъ прописываютъ на продолжительное время въ видѣ чайнаго сбора, съ морскимъ лукомъ, волчковымъ корнемъ, съ анисовымъ или укропнымъ сѣменемъ, солодокорнемъ, и приготавливаютъ ихъ дома у больнаго. Для настойки и наливки иногда берутъ вино или пиво вмѣсто воды. Должно пить всегда холодную жидкость, если желаютъ умножить отдѣленіе мочи.

*Снаружи* эти вещества употребляются всего чаще для куренія (дерево имѣетъ болѣе пріятный запахъ). Ихъ насыпаютъ по

себѣ или съ мастикою, янтареиъ, сахаромъ на раскаленные угли, для уничтоженія дурнаго запаха комнатъ, или чтобы парами ихъ дѣйствовать на больныя части, какъ напр. при подожной водянкѣ, при болѣзненныхъ, ревматическихъ и судорожныхъ страданіяхъ и наконецъ для прокуриванія елани и шерсти, которыя привладываются на больныя части, или трутъ ими эти мѣста.

*Можжевельное эфирное масло (Oleum Juniperi aethericum).* Получается изъ ягодъ. По дѣйствию оно сходствуетъ со скипидаромъ, однако его можно употреблять въ тѣхъ же случаяхъ, какъ скипидаръ, или какъ можжевельныя ягоды, на сахарѣ, въ видѣ элеосахара, или въ пилюляхъ, эмульсіяхъ и т. д. Снаружи иногда употребляютъ его какъ скипидаръ (напр. для втиранія при водянкѣ, въ парализованныя части и т. д.).

(*Можжевельный спиртъ (Spiritus Juniperi).* Получается вымачиваніемъ и перегонкою ягодъ съ виннымъ спиртомъ и водою. Употребляется иногда какъ возбуждающее мочегонное въ соединеніи съ другими веществами, большею частію въ микстурахъ. Снаружи онъ употребляется какъ острое, вожу раздражающее средство, подобно скипидару, напр. для втиранія, смѣшанный съ мыльнымъ или камфарнымъ спиртомъ, съ эфирными маслами.

*Можжевельный морсъ (Succus Juniperi inspissatus i Rosb Juniperi).* Получается изъ зрѣлыхъ ягодъ посредствомъ кипятка. Не содержитъ эфирнаго масла, а въ немъ находятся только смолистая и камедистыя вещества ягодъ. Поэтому онъ возбуждаетъ только мало, и скорѣе его можно употреблять діететически съ водою какъ прохлаждающее, слабое мочегонное питье: при трудномъ мочеиспусканіи, остромъ выпотѣннн сывороточной жидкости въ кожѣ и брюшной полости. Иногда его даютъ съ уксомедомъ морскаго лука (*Oxumel Scillae*), въ микстурахъ, напр. съ отваромъ можжеведьнива.

\* *Junipersus Sabina L.* (*Можжевельникъ донской или казачкй; верссъ; артышъ; арца; можжуха. — Sadebaum. — La Sabine*). Растетъ въ южной Россіи и Сибири по возвышеннымъ мѣстамъ. Составныя части тѣже, какъ и предъидущаго вида.

Сабина и ея эфирное масло производятъ остро раздражающее дѣйствіе, такъ что они въ прикосновенныхъ тканяхъ часто могутъ причинить даже довольно сильное воспаленіе. Отъ большихъ приѣмовъ, введенныхъ внутрь, животныя погибаютъ воспаленіемъ желудка; *Ovina* даже нашель изъязвленіе слизистой оболочки желудка. Подобно другимъ острымъ веществамъ, сабина въ большихъ приѣмахъ, по видимому, дѣйствуетъ преимущественно на тазовые органы, такъ что она можетъ произвести въ нихъ извѣстное раздраженіе, приливъ и даже воспаленіе. Вѣрнѣе, что

она часто производит сильные сокращения беременной матки, отъчего происходит выкидышъ.

Это растение употребляется противъ ломотныхъ, ревматическихъ и бленноройныхъ страданій, также противъ перелоя, торpidныхъ состояній матки и женскихъ половыхъ органовъ вообще, какъ при недостаточномъ отдѣленіи мѣсячныхъ кровей, бѣляхъ, бесплодіи и т. д.

Сабину даютъ въ видѣ вскипа, рѣдко въ плотномъ состояніи (высушенная трава дѣйствуетъ слабо).

Снаружи сабина иногда употребляется какъ раздражающее средство на торpidныхъ язвахъ, дикихъ мясныхъ сосочкахъ, мясныхъ наростахъ; чтобы поддерживать нагноеніе фонтанелей и на мѣстахъ, гдѣ были положены нарывныя средства. Назначаютъ свѣжій выжатый сокъ, раздавленные листья вмѣстѣ съ молодыми вѣтками, или смѣшиваютъ ихъ съ жирами.

*Сабинное масло* можно употреблять, наподобіе скипидара, напр. для втиранія, для мазей.

*Сабинная мазь* (*Unguentum Sabinae*), получается смѣшеніемъ спиртной вытяжки (также свѣжихъ листьевъ) съ жиромъ.

---

## L.

### \* *Lactuca sativa* L. (*Салатъ.*—*Garten Salat.*—*La Laitue*).

Растеніе воздѣлываемое. Салатъ принадлежитъ къ числу малопитательныхъ съѣдобныхъ растений, но тѣмъ не менѣе употребленіе его въ пищу очень здорово. Онъ дѣйствуетъ на организмъ освѣжающимъ и утоляющимъ жажду образомъ, прозводитъ сонъ, предупреждаетъ запоры и содѣйствуетъ отдѣленію мочи. Салатъ не должно употреблять въ чрезмѣрномъ количествѣ во время сильныхъ лѣтнихъ жаровъ и въ особенности вечеромъ, когда ощущается потребность во снѣ. Изъ сѣмянъ салата можетъ быть приготовляема освѣжающая и успокоительная эмульсія. Изъ нихъ выжимается также очень хорошее салатное масло. Салатъ въ слишкомъ большихъ приѣмахъ можетъ оказывать слабое наркотическое дѣйствіе, это свойство принадлежитъ въ особенности салату, развивающемуся негронутымъ въ теченіе лѣта; этотъ послѣдній содержитъ въ себѣ горькій, бѣловатый, млечный сокъ, который можетъ дѣйствовать почти также ядовито, какъ описанный ниже видъ салата ядовитаго (*Lact. virosa*). Салатъ содержитъ въ себѣ: вытяжное вещество лактуцинъ, воскъ, эфирное масло, камедь, альбуминъ и др.

Изъ этого вида, также какъ изъ салата ядовитаго, добывается такъ-называемый *лактукарій*, т. е. сгущенный и высушенный сокъ, истекающій изъ надрѣзовъ стеблей этого растенія.

Лактукарій употребляется какъ успокоительное и болеутолятельное средство при невралгяхъ, судорогахъ желудка, ревма-



Глухая крапива. (*Lamium album* L.).  
(Къ стр. 137.)

тическихъ страданійхъ и т. п. Его принимаютъ по 5—10 гранъ по нѣскольку разъ въ день (лактукарій салата ядовитаго упо-

требляется въ половинной пропорціи) въ видѣ порошка, пилюль, болгуса, или въ растворѣ, особенно спиртномъ, а иногда стертымъ съ арав. камедью, сахаромъ и нѣсколькими унціями воды. Снаружи лактукарій нѣкоторые врачи еще до сихъ поръ употребляютъ противъ воспаления глазъ въ формѣ примочекъ и припаровъ; но большинство медиковъ въ этомъ отношеніи довольно давно уже отказались отъ него.

Изъ него-же готовится, такъ-называемый *тридаксъ*, которымъ неудачно пытались замѣнить опиѣ. Для приготовления его: листья и кору стеблей салата толкутъ въ ступкѣ и затѣмъ, выдавивъ изъ нихъ сокъ, сушатъ этотъ послѣдній на тарелкахъ посредствомъ выпаренія.

\* *Lactuca sylvestris* En. (*Lac. scariola* L.) (*Дикій салатъ*.— *Wilder Salat*.— *La laitue sauvage*). Растетъ по сухимъ мѣстамъ и краямъ дорогъ. По своему дѣйствию сильнѣе предыдущаго вида и слабѣе послѣдующаго, хотя и обладаетъ тѣми-же самыми свойствами; почему при недостаткѣ того или другаго изъ нихъ. дикій салатъ можетъ быть употребляемъ вмѣсто ихъ въ приемахъ сильнѣйшихъ противъ приѣмовъ салата ядовитаго и слабѣйшихъ сравнительно съ дозами салата огороднаго (*Lact. sativa*).

*Lactuca virosa* L. (*Ядовитый салатъ; проклятый лотусъ*.— *Giftiger Salat*. — *La laitue vireuse*). Растетъ по бесплоднымъ и невоздѣланнымъ мѣстамъ. Сокъ этого вида, какъ мы уже замѣтили выше, дѣйствуетъ довольно ядовито. Вкусъ его чрезвычайно горькій, запахъ непріятный. Лактукарій салата ядовитаго дѣйствуетъ подобно опиѣ. Лактукарій въ настоящее время добывается преимущественно изъ *салата-шаптскаго* (*Lact. altissima* Bieb.), растущаго на Кавказѣ.

Существенную часть лактукарія составляетъ *лактучинъ*, горькое кристаллизующееся вещество, кромѣ того въ немъ заключаются: маннитъ, аспарагинъ, свободная кислота, коричневое красящее начало, смола, альбуминъ, камедь и нѣкоторыя соли.

Лактукаріемъ полезно замѣнять опиѣ, въ особенности для особъ слишкомъ впечатлительныхъ.

\* *Lamium album* L. *Крапива бѣлая, глухая; яснотка бѣлая; чмелососка*.— *Weisser Bienensaug*.— *Ortie blanche*). Растетъ по воздѣланнымъ и невоздѣланнымъ мѣстамъ, преимущественно между развалинами, во всѣхъ полосахъ Россіи.

Трава глухой крапивы имѣетъ запахъ тяжелый; вкусъ травяной, горьковатый. Свойства ея мочегонныя, разбивающія, раноздѣлительныя.

Цвѣтныя верхушки ея употребляются какъ мочегонное, мѣсячногонное и содѣйствующее родовому очищенію средство; трава и цвѣты, въ видѣ наливки и отвара, полезны: въ разныхъ маточныхъ болѣзняхъ, истерическихъ припадахъ, судорогахъ-



въ животѣ, желтилицѣ, отъ застарѣлаго кашля и удушья, жабы въ горлѣ и воспаленій въ груди, печени и почкахъ; а также нѣ припадкахъ каменной болѣзни; выжатый сокъ изъ свѣжаго растенія, приноситъ пользу въ маточномъ и носовомъ кровотеченіяхъ, теченіи бѣлей, золотухѣ и чахоткѣ. Снаружи она употребляется въ видѣ ваннъ и припарокъ противъ грудницы и упомянутыхъ выше болѣзней. Цвѣтныя верхушки, настоянныя на солнечной теплотѣ съ деревяннымъ или свѣжимъ льнянымъ масломъ, составляютъ раноцѣлительный бальзамъ противъ застарѣлыхъ ранъ на ногахъ. Кашинскій имѣлъ случай испытать пользу этого бальзама въ излеченіи сухожильныхъ ранъ, наливая верхушки глухой крапивы звѣробойнымъ масломъ, какъ упомянуто было выше.

Для наливки на 1 или 2 щепоти цвѣстныхъ верхушекъ берутъ 6 унц. горячей воды. Эту наливку пьютъ вмѣсто чаю. Для отвара:  $\frac{1}{2}$  унціи травы варятъ въ фунтѣ воды, до тѣхъ поръ пока останется 10 унц. жидкости; отваръ этотъ принимаютъ по чайной чашкѣ, 2 или 3 раза въ день, какъ сказано выше. Выжатый сокъ можно принимать по 2 унціи.

Молодые листья этого растенія, по свидѣтельству Линнея, въ Швеціи употребляютъ весною въ пищу подобно обыкновенной крапивѣ. При вареніи и выжиманіи его неприятный запахъ утрачивается.

\* *Lappa communis* Germ. (*Arctium lappa* L.) (*Лягушникъ; ртпейникъ*. — *Klette*. — *Bardane*; *Glouteron*; *Herbe aux teigneux*; *Pitasite*). Растетъ по невоздѣланнымъ мѣстамъ и краямъ дорогъ. Свойства этого растенія потогонныя, укрѣпляющія. Отваръ корней его употребляютъ противъ болѣзней кожи и мочевого пузыря, также какъ венерическихъ болѣзней, скорбута и т. п. Отваръ листьевъ полезенъ какъ желудочное и противулихорадочное средство. Катаплазма изъ вымоченныхъ листьевъ дѣйствуетъ разбивающимъ образомъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ молодые побѣги лягушника употребляютъ въ пищу подобно артишокамъ. Сѣмена дѣйствуютъ кровоочистительнымъ образомъ; изъ нихъ готовятъ мочегонную эмульсію. Въ золѣ лягушника содержится въ большомъ количествѣ поташъ. Свѣжія листья этого растенія прикладываютъ къ ранамъ для заживленія ихъ. Онѣ входятъ въ составъ особой мази, известной подъ именемъ *populeum*.

*Laserpitium latifolium* L. (*Коперь*. — *Breiblättriges Laserkraut*. — *Le laser à larges feuilles*; *faux turbit*; *turbit des montagnes*; *gentiane blanche*). Растетъ по сухимъ мѣстамъ средней и южной полосы Россіи, въ особенности часто встрѣчается коперъ по берегамъ Волги и Калмыцкой степи. Корень и сѣмена копра имѣютъ запахъ ароматный, сходный съ запахомъ кыпна,

вкусъ горько-пріятный, острый. Корень содержитъ въ себѣ щелочный, острый, ѣдкій сокъ.

Свойства ихъ возбуждающія, желудочныя, вѣтрогонныя, гононшія мочу и мѣсячныя крови.

Коперь полезенъ: при расстройствѣ пищеваженія, вѣтряной коликѣ и боли живота, отъ запора кровей а также во всѣхъ маточныхъ астеническихъ болѣзняхъ, падуцей болѣзни и судорожной одышкѣ. Въ порошокъ сѣмена копра даютъ приѣмами по 1 драхмѣ. Для наливки: на 6 унцій горячей воды кладутъ 2 драхмы корня, а для промывательнаго: на то же количество воды 3 драхмы его.

\* *Lathræa squammaria* L. (*Чешуйчатый корень; Петровъ крестъ. — Gemeine Schuppenwurz. — La clandestine à fleurs pendantes*). Растетъ въ тѣнистыхъ мѣстахъ. Этому растенію народъ приписываетъ способность доставлять плодородіе бесплоднымъ женщинамъ. Съ этою цѣлю поселянки нѣкоторыхъ мѣстностей (напр. Коломенскаго уѣзда, Московской губерніи) собираютъ ее на восходѣ солнца и отваривъ все растеніе, пьютъ этотъ отваръ ежедневно по чашкѣ. Другія кипятятъ его съ пивомъ и употребляютъ такимъ же образомъ.

*Lathræa clandestina* L. (*Колдунья. — Schuppenwurz. — Madratte; Herbe cachée; clandestine de Léon; Herbe de la matrice*). Растетъ въ южныхъ частяхъ Россіи, во влажныхъ мѣстахъ, между мхомъ на корняхъ тополей. Этому виду приписываются простолудинами тѣ-же свойства какъ и предыдущему.

*Lavandula spica* L. (*Увѣчная трава; нарѣз. — Schmal-Nättriger Lavendel. — Lavandule commune*). Растетъ во всей Россіи въ садахъ.

Свойства цвѣтныхъ верхушекъ зависятъ отъ содержанія въ нихъ большаго количества летучаго масла. Запахъ свѣжей и сухой цвѣтной травы благовонный, специфической; вкусъ пряно-горьковатый, жгучій.

Дѣйствіе лаванды возбуждающее, мѣсячногонное, разбивающее. Употребленіе, по отзыву нѣкоторыхъ врачей, полезно: въ слабости нервовъ, головныхъ и маточныхъ припадкахъ, частыхъ обморокахъ, головокруженіи, параличѣ, трясеніи членовъ, тяжеломъ слухѣ, тупомъ зрѣніи, слабой памяти или забывчивости, безгласіи и расслабленіи языка. Снаружи, въ видѣ сухихъ или мокрыхъ припарокъ, ее употребляютъ какъ разбивающее мочегоннаго опухоли, застой влагъ, а также для устраненія отековъ, багровыхъ, ушибовъ, и проч. Ароматныя ванны изъ лаванды полезны въ англійской дѣтской болѣзни и блѣдной немощи, послѣдовавшей отъ остановки мѣсячнаго очищенія простудюю.

Для наливки: на полгорсти цвѣтныхъ верхушекъ или 1 драхму вѣтвѣвъ берутъ 4 унціи кипячей воды. Эту наливку пьютъ

вмѣсто чаю; съ прибавленіемъ 1 унціи виннаго спирта, она служитъ хорошимъ полосканьемъ въ параличныхъ расслабленіяхъ. Винная настойка цвѣтныхъ верхушекъ, въ упомянутыхъ болезняхъ гораздо сильнѣе дѣйствуетъ на нервную систему, возвышая вмѣстѣ и біеніе пульса.

Приготовляемую изъ свѣжихъ цвѣтовъ ея консерву, Кранцъ совѣтуетъ принимать, отъ 1—2 драхмъ, ватошахъ дряхлымъ астеникамъ и слабымъ старикамъ. Для ваннъ къ лавандѣ прибавляютъ: душицу (*origanum m.*), чаберъ (*satureia*), тимьянъ (*thymus*) и богородскую траву (*serpyllum*). Изъ лаванды приготовляются слѣдующія препараты:

1) *Лавандное масло (oleum lavendulae)*, дѣйствующее слишкомъ горячительно. Его совѣтуютъ впускать по каплямъ въ ядовитыя раны и уязвленія, соединенныя съ судорогами. Смѣшанное съ виннымъ нашатырнымъ спиртомъ (*alcohol ammoniacum*), оно полезно какъ наружное средство въ бездѣйствіи членовъ и при другихъ параличныхъ расслабленіяхъ. Если одну драхму этого масла смѣшать съ фунтомъ виннаго спирта и прибавить такое же количество розовой воды и нѣсколько капель росолодонной настойки (*inctura benzoes*), то получается весьма пріятное и адровое умыванье.

2) *Лавандный спиртъ (spiritus lavendulae)*. Дѣйствуетъ какъ возбуждающее и укрѣпляющее средство, при быстромъ упадкѣ силъ, обморокахъ и мокротномъ ударѣ. Внутрь его даютъ на сахарѣ отъ 8—10 капель; снаружи трутъ имъ виски, запястья рукъ и даютъ нюхать. Лаванднымъ спиртомъ полезно также натирать члены при ихъ бездѣйствіи, трясеніи, ушибахъ, отекахъ и судорожныхъ корчахъ. Будучи смѣшанъ съ камфоромъ, этотъ спиртъ укрощаетъ судорожныя движенія, боль, происходящую отъ ужаленія насѣкомыхъ, и уничтожаетъ происходящія отъ того опухоли и воспаленіе. Это же средство разбиваетъ мягкія опухоли на головѣ дѣтей.

Полученное перегонкою лаванды масло и сложный лавандный спиртъ, двоянный съ размаринномъ, очень полезны какъ наружныя средства отъ расслабленія нервовъ и паралича. Раппинскій давалъ упомянутый спиртъ внутрь вмѣсто гофмановыхъ капель отъ 10—20 капель на сахарѣ, при обморокахъ и истерическихъ припадкахъ, и натиралъ приведеннымъ выше бальзамомъ расслабленные члены отъ паралича. Другіе врачи хвалятъ бальзамъ отъ паралича, составляемый слѣдующимъ образомъ: на полбутылки сложнаго лавандоваго спирта, упомянутого выше, берутъ  $\frac{1}{4}$  фунта червяваго масла (*liquamen lumbric. terrestr.*) столько же терпентиннаго (*ol. terebinth.*) и чернаго смолянаго мыла (*sapo piceus*) 3 лота, смѣшавъ все это, должно болтать закупоренную бутылку до тѣхъ поръ, пока все соединится. Этимъ бальзамомъ должно тереть парализованныя части, употребляя

для этого напнтанное имъ полотенце или суконку. Это втираніе производятъ два раза въ день, и кромѣ того, смочивъ полотенце тѣмъ-же бальзамомъ обвиваютъ имъ больной членъ. Если нужно произвести сильнѣйшее раздраженіе, то къ этому бальзаму можно прибавить 16 золотниковъ летучаго нашатырнаго спирта (*ammonia liquida*) или настойки шпанскихъ мухъ (*linctura cantharides*).

\* **Ledum palustre L.** (*Багуна; багульникъ; клоповникъ.* — *Sumpf Porst.* — *Le ledum des marais*). Растетъ по торфянымъ болотамъ сѣверной полосы Россіи.

Свойства багуна зависятъ отъ заключающагося въ немъ снотворнаго масла, соединеннаго съ горьковязущимъ экстрактивнымъ веществомъ.

Трава и цвѣты имѣютъ запахъ тяжелый, снотворный; вкусъ горьковато-пріяный и нѣсколько вязущій.

Дѣйствіе его снотворное, потогонное, разводящее, мочегонное и очищающее.

Водяная наливка багуна полезна въ кровавомъ поносѣ, судорожномъ кашлѣ, ломотныхъ членовыхъ боляхъ, злокачественной чесоткѣ, шолудяхъ и шишковатой проказѣ.

Для отвара: 3 или 4 драхмы травы варятъ въ 12 унціяхъ воды, а для наливки: на полунціи ее наливаютъ 1 фунтъ горячаго молока или сыворотки, которую, настоявъ и процѣдивъ, принимаютъ нѣсколько разъ въ день по чайной чашкѣ. Водяной отваръ служитъ также для полосканія горла въ жабѣ и для омыванія паршивыхъ частей; мытье головы имъ истребляетъ вшей.

Во время падежа скота, листья багуна можно по немногу давать, стерши съ кормомъ и прибавляя къ нему немного селитры, что производитъ потъ и испраженіе, и чрезъ это предохраняетъ скотину отъ заразы. Его отваромъ полезно также омыватъ коростовую и вшивую скотину; мош и клопы также пропадаютъ отъ багуна. Крѣпкимъ отваромъ этого растенія обрызгивая стѣны и кровати, истребляются клопы.

\* **Lemna L.** (*Ряска.* — *Wasserlinse.* — *Lentille d'eau*). Растетъ въ стоячихъ водахъ. Различныя виды ряски покрываютъ поверхность стоячихъ водъ, хорошо знакомо каждому пловучею зеленою и подобно нитчаткѣ (*conferva*) содѣйствуютъ образованію торфянистыхъ пластовъ на днѣ водъ. Ряска кромѣ того (вопреки распространенному мнѣнію) содѣйствуетъ очищенію атмосферы болотныхъ мѣстъ отъ вредныхъ миазмовъ. Выдыхая большое количество кислорода, это растеніе доставляетъ запасъ его, необходимый для дыханія животныхъ. Въ виду этого, очищеніе водъ отъ ряски должно быть признано не только бесполезнымъ, но даже вреднымъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ су-

шествуетъ обыкновеніе сносить ряску на поля для удобренія ею оныхъ; но этого рода операція должна быть названа совершенно излишнею, потому что по высыханіи масса собранныхъ растеній оказывается крайне ничтожною. Древніе врачи, какъ-то Dioscoridъ и др., приписывали ряскѣ способность успокоивать геморроидальныя страданія, противъ которыхъ они совѣтуютъ употреблять ея водяной или молочный отваръ. У насъ встрѣчаются слѣдующіе виды ряски: *Lemma minor*. L., *Lemma gibba* L., *L. polyrhiza*, *L. trisulca* L.

\* *Leontodon taraxacum* L. (*Одуванчикъ*; *попово глуменцо*; *кульбаба*; *хасакъ*; *цикорій дикій*; *пльшивецъ*; *попова скуфья*; *камчадалка*. — *Gemeines Löwenzahn*. — *Pissenlit*). Растетъ повсюду во всей Россіи.

Свѣжая трава и корень избилуютъ молочнымъ, горько-слоноватымъ сокомъ, состоящимъ изъ экстрактаго вещества, соединеннаго съ слизью и селитрою.

Дѣйствіе одуванчика мочегонное, разбивающее. Его употребляютъ какъ средство разбивающее густыя мочроты и брюшныя завалы. Его совѣтуютъ употреблять въ завалѣ печени, желтухѣ, упорныхъ четырехдневныхъ лихорадкахъ, начальной водяной болѣзни и отекахъ ногъ; въ кожныхъ хроническихъ болѣзняхъ, какъ-то: лишаяхъ, золотухѣ и проказѣ и въ начальной чахоткѣ. Снаружи клистиры изъ одуванчика полезны въ затвердѣніи внутренностей, меланхоліи и гипохондрическихъ припадкахъ. Свѣжій корень и толченныя листья прикладываются съ большимъ успѣхомъ, для разведенія твердыхъ и болящихъ опухолей, также для заживленія разнородныхъ нечистыхъ ранъ.

Выжатый изъ всего растенія сокъ дается съ мясною похлебкою, или съ молочною сывороткою по 2 унціи въ теченіе нѣсколькихъ недѣль сряду, или въ отварѣ, полагая отъ 2—3 унцій травы и корня на 3 фунта воды, которую кипятятъ до тѣхъ поръ, пока останется половина жидкости. Этотъ отваръ, съ прибавленіемъ къ нему 2 растертыхъ яичныхъ желтковъ, пьютъ въ означенномъ количествѣ ежедневно. Молодые весенніе листья одуванчика употребляютъ вмѣсто салата и варятъ въ супахъ. Сухой корень пьютъ въ отварѣ, особенно зимою въ грудныхъ простудныхъ припадкахъ и лихорадкахъ того-же свойства. Выжатый сокъ изъ всего растенія и помощью броженія превращенный въ спиртную жидкость, принимаютъ противъ угреватости и красныхъ пятенъ, обезображивающихъ лицо, а также въ худосочной чесоткѣ, изнурительной тихой лихорадкѣ, сухоткѣ, каменной болѣзни и долговременной желтяницѣ. Количество пріемовъ его въ этихъ случаяхъ можетъ простираться ежедневно отъ 3 до 4 унцій. Изъ одуванчика готовится экстрактъ или сгущенный сокъ одуванчиковъ (*extractum taraxaci*), одобряемый въ упомянутыхъ болѣзняхъ; въ пріемахъ отъ 20

грань до половины и дѣлой драхмы въ пилюляхъ, или микстурахъ съ другими приличными лекарствами. Его рекомендуютъ особенно: въ ипохондрии, упорномъ ревматизмѣ, желтухѣ, худозочныхъ сыпяхъ, водяной болѣзни и отъ чахотки, съ примѣсю уксусно-поташной соли (*kali acetic.*), ревенной настойки (*linctura rhei*) и очищеннаго меда (*mel despumat.*) Въ пилюляхъ: отъ золотушныхъ болѣзней и другихъ долговременныхъ сыпей, дается въ соединеніи съ болголовнымъ экстрактомъ (*extract. conii m.*) и бычачею желчью (*fell tauri*).

\* *Leonurus Cardiaca* L. (*Львиоустъ сердечный; сердечная трава; сердечникъ; усная лапа; львиный хвостъ; дикая крапива.* — *Gemeiner Löwenschwanz.* — *Agripaume*). Растетъ по необработаннымъ и каменнымъ мѣстамъ.

Все растеніе имѣетъ запахъ крѣпкій, который при сушеніи теряется; вкусъ пряно-горькій, жгучій.

Дѣйствіе этого растенія желудочное, укрѣпляющее и разбивающее.

Въ видѣ наливки употребляется въ истерикѣ, трепетаніи сердца, желудочныхъ спазмахъ, отъ кислоты и вязкихъ мокротъ; въ брюшныхъ мокротныхъ завалахъ, ипохондрическихъ припадкахъ, запорѣ мѣсячныхъ и родовыхъ кровей, теченіи бѣлей, слабости нервовъ, отъ глисть, въ простудныхъ мокротныхъ лихорадкахъ, мокротной одышкѣ и во всѣхъ астеническихъ припадкахъ, не соединенныхъ съ судорожными движеніями. Снаружи, тоже прикладываются съ пользою свѣжіе толченые листы къ ушибеннымъ частямъ, и для заживленія ранъ.

Для внутренняго употребленія полуциці травы наливается 8 унціями воды, которую, вскипятивъ и процѣдивъ принимаютъ по 2 столовыхъ ложки, нѣсколько разъ въ день, или каждые два часа. Сушеной травы тоже количество наливается бѣлымъ виномъ. Снаружи употребляется въ видѣ катаплазмы или припарки.

\* *Lepidium sativum* L. (*Крессъ садовый; жеруха огородная.* — *Gartenkresse.* — *Cresson alénois*). Растеніе воздѣлываемое.

Выжатый изъ этого растенія сокъ полезенъ: въ цингѣ, мокротныхъ брюшныхъ завалахъ и каменной болѣзни; а сѣмя въ водяной болѣзни и какъ внѣшнее возбуждающее средство. Снаружи: толченая трава и сѣмя смѣшанныя съ саломъ, прикладываютъ съ успѣхомъ къ головнымъ полуудамъ и къ астеническимъ нечистымъ язвамъ. Этою же мазью съ пользою можно натирать злую чесотку какъ у людей, такъ и у скота.

Молодая трава, съ щавелемъ и цикоріемъ, служитъ вмѣсто салата, полезнаго для цинготныхъ; выжатый сокъ даютъ по 2 унціи съ сывороткою. Этимъ средствомъ Роке въ два мѣсяца излечилъ значительное число цинготныхъ разслабленныхъ. Багровыя пятна онъ примачивалъ однимъ выжатымъ сокомъ. Толченые

сыма дается по 1 драхмѣ съ медомъ, въ видѣ каши. Наружное употребленіе должно соединять всѣгда съ приемами внутрь.

Почти тѣми-же самыми свойствами обладаютъ: \* *крессъ дикій* (*lepidium gudeale*), и *перечный крессъ*, или широколистный (*lepidium latifolium*). Первый растетъ по сухимъ пустырямъ, а второй въ тѣнистыхъ мѣстахъ и на плодоносной почвѣ, въ Куманскихъ, Калмыцкихъ, Киргизскихъ и Сибирскихъ соляныхъ степяхъ.

При недостаткѣ садоваго кресса и ложечной травы, этими послѣдними можно удобно замѣнить оныя. Корень перечнаго кресса, при жеваніи возбуждаетъ слюнотеченіе, и потому можетъ замѣнять корень зубнаго жигунца (*rad. anthemidis pyrethri*).

Упомянутыя породы кресса, по мнѣнію нѣкоторыхъ авторовъ, служатъ наилучшими противудинготными средствами.

\* **Lichen apthosus L.** (*Лишай прыщеватый*. — *Flechte*. — *Le lichen apthosus*). Растетъ по лѣсамъ, между мхами и травой.

Запахъ и вкусъ имѣетъ противный, вонючій.

Дѣйствіе его слабительное противуглистное. Въ наливкѣ или отварѣ его пьютъ для изгнанія глистовъ, а смѣшавъ съ медомъ имъ полощутъ ротъ отъ молочницы.

Дѣтямъ даютъ его по 12 гранъ въ порошокъ съ медомъ; взрослымъ отъ  $\frac{1}{2}$ —2 драхмъ; или полунціи моха варятъ въ 6 унціяхъ воды, пова останется 4 унціи жидкости, процѣдивъ которую, и подсластивъ медомъ, принимаютъ чрезъ 2 часа по столовой ложкѣ.

Прыщеватый лишай можетъ замѣнить корсианскій глистогонный мохъ (*fucus helminthochorton s. conferva dichotoma L.*), а также ямайскую и суринамскую противуглистные корки (*cortices geoffroyi inermis, et g. surinamensis*), рекомендуемыя опытными врачами.

\* **Lichen caninus L.** (*Лишай собачій; земляной мохъ*. — *Hund-Elechte*. — *Le lichen des chiens*). Растетъ по тѣнистымъ лѣсамъ и влажнымъ лугамъ, большею частію на землѣ, также при заборахъ, и нерѣдко на пняхъ деревь покрываетъ другіе мхи.

Запахъ и вкусъ его противные.

Дѣйствіе разводящее и поправляющее соби.

Въ Англіи Морей и Меадъ испытали полезное дѣйствіе его въ укушеніяхъ бѣшеныхъ собакъ, или такъ называемой водобоязи. Его можно также въ отварѣ пить съ пользою для очищенія мокроты и отъ глистовъ.

Даютъ его такимъ же образомъ, какъ выше описанный прыщеватый лишай (*l. apthosus*).

Этому лишаю приписываютъ свойство укрощать припадки водобоязи, отъ чего онъ и получилъ свое названіе. Англійскіе врачи, Соанъ и Гартлей, составляли порошокъ отъ бѣшенства изъ 2 частей этого моха и 1 части церца, и давали его на

приемъ людямъ: отъ 1—2 золотниковъ; собакамъ и другимъ домашнимъ животнымъ отъ 1—2 лотовъ.



Роза лясная. (*Malva Sylvestris* L.).  
(Къ стр. 154).

***Ligusticum levisticum* L.** (Зоря. — *Gebräuchliche Liebstockel.* — *Livèche; âche des montagnes*). Растетъ по гористымъ мѣстамъ южной Россiи.



Запахъ корня, травы и сѣмянъ довольно душистый, неприятный; вкусъ—пряно-острый, горячительный; сѣмена сообщаютъ мочѣ черный цвѣтъ; они изобилуютъ летучимъ ароматнымъ масломъ. Дѣйствіе корня и травы вѣтрогонное, мѣсячныя и родовыя крови гонящее, разводящее, сѣмень: горячительное, потогонное, противуглистое.

Зорьный корень особенно рекомендуютъ въ маточныхъ болязняхъ, при неправильномъ мѣсячномъ и родовомъ кровоочищеніи; для облегченія ослабѣвшихъ роженицъ и удобнѣйшаго разрѣшенія въ трудныхъ родахъ; зорьяная трава, употребляемая въ баняхъ или ваннахъ, припаркахъ и клистирахъ, полезна для утоленія боли въ животѣ и въ другихъ припадахъ, случающихся послѣ родовъ. Настойка листовъ и сѣмень, употребляемая внутрь, утоляетъ судороги, спазмы и истерическіе припадки. Для отвращенія истерическаго пароксизма, даютъ толченое сѣмя по 20 гранъ и болѣе съ бѣлымъ виномъ. Впрочемъ зорьяное сѣмя имѣетъ сходныя качества съ волоскимъ укропомъ (*a. foeniculum*), а корень съ дягилемъ (*a. archangelica*) и императорскимъ корнемъ (*imperatoria ostruthium*), а потому ихъ можно употреблять, во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ употребляются упомянутыя средства. Въ нервныхъ или астеническихъ лихорадкахъ, зорьяный корень совѣтуютъ принимать, въ видѣ наливки.

Для внутренняго употребленія: 2 драхмы корня наливается 6 унц. горячей воды или бѣлаго вина; въ порошокъ приемы его достигаютъ до полдрахмы; трава употребляется снаружи въ видѣ припарки, ваннъ и промывательнаго; выжатый сокъ изъ свѣжихъ листовъ, принимаемый отъ 1—3 унцій, служитъ лучшимъ кровогоннымъ средствомъ; сѣмена даются въ порошокъ: отъ 15 — 20 гранъ.

Зорьяная водка, или настойка корня и сѣмень, приготовленная съ водкою и употребляемая предъ обѣдомъ и ужиномъ по рюмкѣ, укрѣпляетъ желудокъ и полезна особенно для меланхоликовъ, склонныхъ къ вѣтрамъ, спазмамъ и для одержимыхъ глистами. Выжатый сокъ изъ свѣжаго корня не уступаетъ дѣйствію камедьносмолистыхъ веществъ (*gummi-resina*), одобряемыхъ въ истерическихъ припадахъ.

**Ligustrum vulgare L.** (*Бирючина*.—*Liguster*.—*Troene*). Растетъ въ лѣсахъ. Запахъ цвѣтовъ пріятный. Листья имѣютъ вкусъ горькій, вяжущій; ягоды доставляютъ темно-синюю краску для рисованія. На бирючницѣ встрѣчаются въ обилии кантарыды (*Lytta vesicatoria L.*). Крестьяне пьютъ отваръ листьевъ бирючины противъ лихорадки и какъ кажется не безъ пользы.

**Lilium candidum L.** (*Кринъ; лилія бѣлая*.—*Weisse Lilie*.—*Le lis blanc*). Растетъ въ полуденной Россіи, по лѣснымъ горамъ.

Луковичный корень бѣлой лиліи запаху не имѣтъ; запахъ свѣжихъ цвѣтныхъ лепестковъ пріятный, ароматическій; вкусъ луковицъ клейкій, зависящій отъ обилія въ нихъ слизи, которая составляетъ почти  $\frac{1}{4}$  часть ихъ вѣса.

Дѣйствіе корня смягчительное; цвѣтовъ: ободряющее, болеутоляющее, уменьшающее болѣзненное напряженіе частей.

Растертыя луковицы снаружи прикладываются въ видѣ смягчительной катаплазмы, для нагноенія твердыхъ воспалительныхъ опухолей. По свидѣтельству Шпильманна, лепешки испеченные изъ сока лилейныхъ луковицъ, смѣшаннаго съ яичною мукою, излечиваютъ водяную болѣзнь. Розе совѣтуетъ для этой-же дѣли испекши лилейныя луковицы въ горячей золѣ, на 2 унціи къ мякоти налить 6 унц. бѣлаго вина и принимать это средство по столовой ложкѣ. По его отзыву оно сильно гонитъ мочу и приноситъ въ водяной болѣзни и мокротной одышкѣ желаемую пользу. Цвѣтные лепестки, налитые виномъ, служатъ пріятнымъ ободряющимъ средствомъ; свѣжіе листья, цвѣты и корень, настоянные съ деревяннымъ или свѣжимъ льнянымъ масломъ на солнечной теплотѣ три недѣли, служатъ вѣшнимъ смягчительнымъ и болеутоляющимъ лекарствомъ, которымъ съ пользою натираютъ части одержимыя жестокою болью, спазмами и судорожными корчами. При опухоли ушныхъ железъ и глухотѣ, отъ сгустившейся сѣры, лилейное масло, смѣшанное съ бычачьею желчью и водкою, впускаютъ въ слуховой проходъ по 3 раза въ день, по 3 — 4 капли, преимущественно ложась спать. При расслабленія слуховыхъ нервъ, лилейный луковичный сокъ, употребляемый такимъ-же образомъ, содѣйствуетъ не менѣе излеченію.

\* *Linnaea borealis* L. (*Линной чай; линнея сѣверная.* — *Nordische Linnae.* — *La linnée du Nord*). Растетъ по тѣнистымъ и влажнымъ мѣстамъ всей сѣверной Россіи.

Цвѣтная трава линнеи имѣтъ запахъ пріятный, ощущаемый сплѣтѣ въ ночное время. Вкусъ ея горьковатый и нѣсколько вязущій.

Дѣйствіе ее слабо-вязущее и мочегонное.

Наливку, этого растенія пьютъ вмѣсто чаю съ молокомъ: въ простудной ломотѣ, поясничной и вертлужной боляхъ, въ запорѣ мочи, отъ чесотки и другихъ нечистыхъ сыпей. Снаружи, въ видѣ припарки, ее прикладываютъ къ больнымъ членамъ; для утоленія боли.

Для наливки на 3 драхмы цвѣтной травы или верхушекъ, наливаютъ 8 унцій кипяченой воды, или молока.

\* *Linum usitatissimum* L. (*Ленъ.* — *Gewöhnlicher Flachs.* — *Le lin cultivé*). Растеніе воздѣлываемое.

Сѣмена льна клейко-масляны и содержать въ себѣ небольшое

количество бѣлочно-сахарнаго вещества; запаху они не имѣютъ; вкусъ ихъ клейкій, сладковато-приторный.

Дѣйствиe льнянаго сѣмени притупляющее, мочегонное и смягчающее.

Клейкій отваръ или наливку льнянаго сѣмени, даютъ въ болѣзняхъ мочевыхъ путей, особенно въ воспалительномъ мочротномъ теченіи, хрипотъ, перхотъ, простудномъ кашлѣ, воспаленіи легкихъ, одышкѣ и трудномъ отдѣленіи мокротъ. Въ воспалительномъ запорѣ мочи, наливка этихъ сѣменъ, равно какъ и конопляныхъ, съ прибавленіемъ 1 драхмы селитры на 2 фунта жидкости, подслащенной уксомедомъ или клюквеннымъ вареньемъ, оказываетъ большую пользу; также какъ и въ передоимомъ мочерѣзѣ, при приѣмѣ оной по чайной чашкѣ нѣсколько разъ въ день. Снаружи: въ видѣ полосканья, подслащеннаго медомъ, ее употребляютъ въ жабѣ и молошницѣ во рту; въ видѣ промышленнаго, она смягчаетъ боль въ кишкахъ, рѣзъ и частыя потуги, нѣрѣдко соединенные съ кровавымъ поносомъ; въ видѣ припарки: толченныя сѣмена, варенныя съ молокомъ, служатъ самою лучшею мягчительною катаплазмой, употребляемою при твердыхъ воспалительныхъ опухоляхъ, особенно нарывахъ, паховикахъ, и проч.

Для наливки берутъ: отъ  $\frac{1}{2}$ —1 унц. льняныхъ сѣменъ на 2 фунта кипячей воды, которую, вскипятивъ разъ и процедивъ, употребляютъ, какъ сказано выше. Слизь, извлекаемая изъ сѣменъ вареніемъ или наливкою горячей воды, (1 унц. сѣменъ на 6 унцій воды), замѣняетъ проскурничную (*mucilago althaeae offic.*), квітную (р. *cydoniae*), трагакантовую (а. *tragacantha et a. gummiifer*) и арав. камеди (*minosae n.*).

*Масло льняное* (*oleum sem. lini u.*) выжимаемое безъ поджариванія сѣменъ, скоро горкнетъ, и можетъ служить вмѣсто деревяннаго и миндальнаго масла. Оно употребляется отъ глестовъ всякаго рода, вмѣсто клецевиннаго (ol. ricini s.); также въ подвздошной боли, свинцовой коликѣ и сухомъ запорѣ, въ которыхъ его даютъ внутрь по нѣскольку унцій, смѣшавъ съ медомъ. Съ свѣжимъ яичнымъ желткомъ льняное масло полезно въ кровохарканіи, легочномъ нарывѣ, гнойной чахоткѣ и для притупленія острыхъ ядовитыхъ веществъ, въ кровавомъ поносѣ, при частыхъ потугахъ на низъ и рѣзѣ въ кишкахъ. Въ геморроидальныхъ спазмахъ, каменныхъ боляхъ почекъ или мочевого пузыря, льняное масло можно съ пользою принимать ежедневно по 1 столовой ложкѣ. Не менѣе, свѣжее льняное масло полезно и въ кровохарканіи, происходящемъ отъ спазмовъ и раздраженія легочныхъ сосудовъ; при воспалительной и судорожной коликѣ, это масло втираютъ въ животъ, смѣшанное съ камфорою (полагая 2 лота камфоры на полбутылки). Члены, страдающіе ломотою, при уязвленіи ядовитыхъ насѣкомыхъ и

для скорѣйшаго нагноенія нарывовъ или абсцессовъ, болящія части можно натирать тѣмъ-же масломъ, также какъ бока, въ грудномъ водотѣбѣ; животъ, при брюшныхъ спазмахъ и сильныхъ запорахъ на низъ; поясницу, при коликѣ въ почкахъ и проч.

Внутрь свѣжее масло даютъ по 1 или 2 унціи и больше, нѣсколько разъ въ день; къ промывательнымъ оно примѣшивается по 3 или 4 унціи. Льняную наливку сѣмень, смѣшавъ по равной части съ этимъ же свѣжимъ масломъ, впрыскиваютъ въ мочевою каналъ, при воспалительномъ мочерѣзѣ и перелогѣ. Снаружи припариваютъ ущемленное мѣсто льняною паклею, наптанною теплымъ масломъ. Имъ-же смазываютъ: больныя почечуйныя шишки, устье маточнаго рукава при трудныхъ родахъ, ожоги, и втираютъ въ десны при воспаленіи ихъ. Если  $\frac{1}{2}$  фунта льнянаго масла смѣшать съ 4 свѣжими яйцами, то составляется весьма хорошая домашняя мазь отъ ожогъ, которою намазываютъ при помощи кисточки обожженные мѣста ежедневно, до тѣхъ поръ пока они заживутъ. Другіе составляютъ мазь отъ ожога иначе, а именно: на  $\frac{1}{4}$  фунта льнянаго масла, кладутъ 4 золотника желтаго воска, столько же второй зеленой истолченной кожи бузиннаго дерева, и распустивъ на огнѣ въ глиняномъ горшкѣ вымѣшиваютъ четверть часа, потомъ прожавъ сквозь полотенцо, когда остынетъ, намазываютъ ее на ветошку и прикладываютъ къ обожженной части, перемѣняя два раза въ день, пока заживетъ. Когда ожога столь сильна, что кожа ссажена или сошла долой, то въ такомъ случаѣ полезно намазывать обожженные мѣста масломъ, съ равною частію меда, присыпая сверху бобовою мукою, до заживленія.

\* *Linum catharticum* L. (Ленъ пропускной; ленъ слабительный; кокушкинъ ленъ. — *Purgier-Flachs*. — *Le lin purgatif*). Растетъ по сухимъ лугамъ, краямъ дорогъ и гористымъ мѣстамъ.

Трава этого растенія запаха не имѣетъ; вкусъ: горьковато соляной, тошнотавый.

Дѣйствіе его слабительное, безъ всякаго отягощенія желудка, и мочегонное.

Его употребляютъ внутрь въ болѣзняхъ, происходящихъ отъ засоренія кишечнаго канала, летучей или непостоянной комотъ, начальной водяной болѣзни и въ каменной боли почекъ или мочеваго пузыря.

Для наливки: 2 драхмы сушеной травы этого вида льна наливаютъ 6 унціями кипячей воды или сыворотки. Въ порошокъ онъ дается по 1 драхмѣ; для винной настойки берутъ сушеной травы 1 унцію на бутылку и по прошествіи 12 часовъ сливаютъ процѣженную жидкость.

Растеніе это можетъ совершенно замѣнить сенну или александрійскій листъ (*s. senna*).

Домашнее слабительное питье можно составлять слѣдующимъ образомъ: на 1 лотъ сухихъ листьевъ слабительнаго льна налить пивной стаканъ горячей воды, прибавить къ этому: 1 золотникъ сѣмянъ волосяго укропа (a. fœniculum) или анису и 2 золотника солодкового корня; настоявъ полчаса процѣдить и принимать чрезъ часъ, по чайной чашкѣ, пока послабитъ.

\* *Lithospermum officinale* L. (Воробейникъ аптечный. — *Gewöhnlicher Steinsame*. — *Grémil officinal*; *Herbe aux perles*). Растетъ подъ сухими кустами. Сѣменамъ этого растенія приписываютъ силу разбивать каменную болѣзнь, въ которой народныя лекаря даютъ принимать порошокъ сѣмянъ воробейника ежедневно по чайной ложкѣ или щепотѣ на стаканъ воды. Листья его пьютъ въ видѣ отвара, какъ мочегонное. Изъ сѣмянъ приготовляютъ также прохладительную эмульсію; что касается до упомянутаго выше употребленія сѣмени воробейника въ каменной болѣзни, то надо замѣтить, что вопросъ о томъ: можетъ-ли принести оно какую-либо въ этомъ отношеніи пользу, едва-ли можетъ быть разрѣшенъ утвердительно.

\* *Lolium temulentum* L. (Плевель; *оловоломя*. — *Betünder Lolch*. — *Ivraie*). Растетъ между посѣвами. Зерна этой сорной травы очень нерѣдко перемѣшиваются съ хлѣбными зёрнами и въ слѣдствіе этого приготовленная изъ нихъ мука, производитъ при употребленіи въ пищу, рвоту, головокруженіе, моментальную потерю зрѣнія и дрожаніе всего тѣла. Плевель принадлежитъ къ числу весьма сильныхъ наркотическихъ ядовъ. Впрочемъ ядовиты только зерна его, и при томъ эти послѣдніе утрачиваютъ свою ядовитость при высушиваніи ихъ въ печномъ жару. Корни плевела могутъ замѣнять корни пырея (*Triticum repens* L.).

\* *Lonicera caprifolium* L. (*Жимолость козья*. — *Durchwachsenes Geissblatt*. — *Le chèrefeuille des jardins*) и \* *Lonicera periclymenum* L. (*Жимолость благовонная; несіи гроздь*. — *Deutsches Geissblatt*. — *Le chèrefeuille des bois*). Растетъ въ лѣсахъ и садахъ.

Листы, стебли и цвѣты первой породы, запахъ и вкусъ имѣютъ противный; при жеваніи нѣсколько вяжутъ.

Дѣйствіе листьевъ слегка вяжущее, очищающее; цвѣтовъ и ягодъ — мочегонное.

Свѣжіе толченые листы и выжатый сокъ прикладываются къ нечистымъ язвамъ, лишаямъ и другимъ кожнымъ пятнамъ. Отваръ листовъ употребляется для полосканья въ жабѣ; наливка цвѣтовъ, употребляемая вмѣсто чаю, полезна для утоленія колющаго и рѣза въ животѣ, бывающаго послѣ родовъ, при недостаточномъ очищеніи и припадкахъ мочевыхъ путей.

Для отвара берутъ 2 драхмы листовъ на 6 унцій воды. Щепоть цвѣтовъ наливается тѣмъ-же количествомъ горячей воды.

\* *Lycoperdon bovista*. (Дождевикъ; земляная губка; волчье яйцо. — *Kugelschwamm*. — *La vesse-loup*). Встрѣчается на безплодныхъ поляхъ и гористыхъ лугахъ.

Употребляется, какъ наружное, для остановленія кровотеченій такимъ-же образомъ, какъ и губка древесная или трутъ (*boletus igniarius*). При ножныхъ ампутаціяхъ дождевикомъ можно останавливать кровотеченіе, накладывая на устья разсѣченныхъ сосудовъ тампонъ и нажимая сверху обыкновенною повязкою; по рошкомъ сухаго дождевика присыпаются поверхностныя кровотеченія изъ разорванныхъ небольшихъ сосудовъ и мокрыя язвы. Впрочемъ съ дождевикомъ надо обходиться осторожно, чтобы его сухая пыль не попала въ глаза, что можетъ причинить сильную боль и воспаленіе; а потому порошокъ дождевика лучше употреблять смѣшаннымъ съ яичнымъ желткомъ и намазывая на корню; въ почечуйномъ излишнемъ кровотеченіи закладывается цѣльный сухой дождевикъ, какъ обыкновенная закладка, въ зданій проходъ.

Дождевики слѣдуетъ сушить на открытомъ воздухѣ противъ солнца, ибо въ закрытомъ мѣстѣ они превращаются въ жидкость и гниютъ. Кожица ихъ служитъ хорошимъ трютомъ, унимающимъ кровотеченія и для высѣванія огня.

\* *Lycopodium clavatum* L. (Плаунъ. — *Gemeiner Bärlapp*. — *Le lycopode en masse*). Растетъ по гористымъ лѣсамъ. Подъ именемъ плауна (*semen Lycopodii*) извѣстна во врачеваніи сѣменная пыль этого растенія.

Желтоватый порошокъ безъ запаха и вкуса, не смѣшивается съ водою; къ нему часто подмѣшана сѣменная пыль хвойныхъ деревьевъ, орѣшника, сѣра и пр. Брошенный на огонь онъ сгараетъ яркимъ пламенемъ.

Составныя части его суть: полленинъ (индифферентный порошокъ, безъ запаха, вкуса и дѣйствія; онъ самъ вѣроятно состоитъ изъ нѣсколькихъ веществъ), жирное масло, сахаръ, крахмалъ, слизь и пр.

Его иногда употребляютъ въ болѣзненныхъ судорожныхъ страданіяхъ мочевыхъ органовъ, преимущественно дѣтей, при катаррѣ мочевого пузыря, при коклюшѣ, элампсїи дѣтей, при эпилепсїи, ревматизмѣ, геморрояхъ и т. п.

Въ этихъ случаяхъ его даютъ съ сиропомъ, ароматными наливками, въ видѣ лизунца, кашекъ или съ микстурами; также въ видѣ эмульсїи съ арав. камедью. Но гораздо чаще имъ пользуются какъ наружнымъ средствомъ для присыпокъ перепрѣлыхъ мѣстъ у дѣтей и при ссадинахъ на кожѣ, язвахъ, рожѣ, въ

позднѣйшіе періоды пузырьчатой сыпи; даютъ сѣмя по себѣ или съ крахмаломъ, магнезією, окисью цинка.

Женщины, которыя занимаются нѣжною работою, употребляютъ его для того, чтобы руки были сухи и безъ пота.

*Трава плюна (Herba Lycopodii)* содержитъ острое, вытяжное вещество и можетъ произвести въ большихъ приѣмахъ поносъ и даже рвоту; она усиливаетъ также отдѣленіе мочи и мѣсячныхъ кровей. Прежде употребляли ее при колтунахъ, катаррѣ, атоніи, параличѣ мочевого пузыря, какъ мочегонное въ видѣ отвара.

\* *Lycopus europæus L.* (*Волконогъ; водяная шандра; волчья лапа. — Gemeiner Wolfsfuss. — Marrube d'eau. — Pied de loup*). Это средство даютъ противъ перемежающейся лихорадки по значительной горькости, въ плотномъ состояніи, въ порошокъ, въ видѣ отвара, особенно же водяную и спиртную вытяжки, и въ пилюляхъ или растворѣ. Кромѣ того, обработываніемъ порошка известью и т. д. приготавливаютъ такъ назыв. *ликопинъ*, который даютъ нѣсколько разъ въ день по 3—6 гр. на приемъ.

\* *Lysimachia vulgaris L.* (*Вербейникъ. — Gemeine Lysimachie. — Corneille; chasse-bosse; Perse-bosse; Souci d'eau*). Растетъ по влажнымъ мѣстамъ и берегамъ ручьевъ.

Трава вербейника имѣетъ вкусъ вяжущій. Дѣйствіе его стягивающее и ранозѣлительное.

Въ видѣ чая или наливки употребляется въ кровохарканіи, кровавомъ поносѣ, сильномъ теченіи мѣсячныхъ кровей, долговременномъ стволловомъ теченіи и въ женскихъ бѣдахъ, въ глазныхъ ранахъ и ушибахъ. Снаружи толченая трава его прикладывается для прекращенія носоваго кровотеченія и къ ранамъ, при поврежденіи небольшихъ кровеносныхъ сосудовъ. Выжатый сокъ изъ свѣжей травы еще лучше для этой цѣли. Отваръ этого растенія, подслащенный медомъ и подкисленный уксуомъ или слабою сѣрною кислотой, служитъ хорошимъ полосканьемъ отъ молошницы и маленькихъ язвъ во рту.

Въ порошокъ вербейникъ дается по драхмѣ и болѣе; для наливки полагается 1 унц. травы на фунтъ горячей воды, которую, вскипятивъ разъ, чрезъ  $\frac{1}{2}$  часа должно процѣдить и принимать холодную каждыя 2 или 3 часа по половинѣ чайной чашки; снаружи употребляется въ видѣ промывательнаго и для шприцеванія. Свѣжо-выжатый сокъ, въ приѣмахъ внутрь по ложкѣ, полезенъ въ астеническихъ кровотеченіяхъ, простыхъ и кровавыхъ поносахъ.

\* *Lysimachia Nummularia L.* (*Вербейникъ полушечный; полушечная трава; луговой чай; денежникъ. — Kriechende Lysimachie. — Monayerc; herbe aux escus*). Растетъ по тѣнистымъ и влажнымъ мѣстамъ.

Трава имѣетъ вкусъ кисловатый и нѣсколько вяжущій.  
Свойства и дѣйствіе этого вида сходны съ свойствами и дѣйствіемъ предыдущей породы.

\* *Lythrum salicaria* L. (Дербенникъ обыкновенный.—*Gemeines Blutkraut*.—*La salicaire commune*). Растетъ по болотистымъ мѣстамъ, подъ кустами. Свойства этого растенія ранозѣлительныя, вяжущія. Обитатели Камчатки употребляютъ въ пищу



Ромашка. (*Matricaria Chamomilla* L.).  
(Къ стр. 154).

варенныя листья дербенника, и пьютъ наливку всего растенія какъ чай. Наливая водою сердцевину стволонъ и подвергая ее броженію они готовятъ вино, которое можетъ быть превращено въ уксусъ.



М.

**Malus communis** Juss. (**Pyrus malus** L.) (*Яблоня. — Apfelbaum. — Pommier*). Растетъ въ садахъ и лѣсахъ. Яблоки содержать въ себѣ въ обиліи яблочную и рябиновую кислоты. Дѣйствія ихъ освѣжающее и смягчительное. Вообще сладкія яблоки дѣйствуютъ слабительнымъ образомъ, кислыя вяжущимъ, сырыя они производятъ у людей съ слабымъ желудкомъ вѣтры; но вареные составляютъ легкую, здоровую, укрѣпляющую грудь пищу. Отваръ и сиропъ изъ яблоковъ укрощаютъ кашель. Сокъ ихъ уничтожаетъ запоры.

\* **Malva sylvestris** L. (*Просвирки. — Wilde Malve. — La mauve sauvage*). Растетъ по мусорнымъ мѣстамъ и краямъ дорогъ. Листья и цвѣты просвирокъ дѣйствуютъ смягчительнымъ образомъ. Ихъ употребляютъ въ видѣ наливки при воспаленіи дыхательныхъ органовъ и другихъ подобнаго рода болѣзней.

**Marrubium vulgare** L. (*Шандра. — Fremder Andorn. — Le marrube commun*). Растетъ повсемѣстно, по невоздѣланнымъ мѣстамъ и краямъ дорогъ.

Употребляется какъ домашнее средство при бленноройныхъ и катарральныхъ страданіяхъ, чтобы способствовать къ выхаркиванію и т. п., въ видѣ вскипа. *Вытяжка шандры (Ex. Marrubii)* полезна въ перемежающейся лихорадкѣ.

\* **Matricaria Chamomilla** L. (*Ромашка. — Mutterkraut. — Matricaire camomille*). Растетъ между посѣвами и по дорогамъ. Этотъ видъ ромашки имѣетъ вкусъ горькій, ароматическій. Дистилировкою изъ нея получается существенное масло, лазуревато-сапфирнаго цвѣта. Употребляется въ тѣхъ-же случаяхъ какъ и послѣдующій видъ.

*Matricaria parthenium* L. (*Pyrethrum parthenium* Smith) (*Ромашка аптечная. — Mutterkraut Wucherblume. — Matricaire officinale*). Растетъ въ южныхъ губерніяхъ Россіи по необработаннымъ и каменистымъ мѣстамъ. Запахъ этого вида сильный и пронизательный, вкусъ очень горькій. Употребляется какъ тоническое желудочное и противуглистное средство. Ее не должно употреблять при существованіи у больного сильной наклонности къ воспаленію. Ее принимаютъ въ порошокъ, въ формѣ сова и дистилированной воды.

\* **Melilotus officinalis L.** (*Донникъ аптечный.* — *Gemeiner Steinklee.* — *Melilot*). Растетъ по краямъ дорогъ и каналовъ. Свойства донника мягчительныя, разбивающія. Его употребляютъ противъ коликъ и поносовъ, въ формѣ водяной наливки.

**Melissa officinalis L.** (*Маточникъ; медовка; потогонная трава.* — *Gebrauchliche Melisse.* — *Citronnelle*). Растетъ въ южной Россіи по краямъ лѣсовъ и дорогъ.

Запахъ свѣжей и сухой травы благовонный, цитронный; вкусъ пріятный, островатый.

Дѣйствіе мелиссы возбуждающее, противосудорожное, мѣсячногонное и мочегонное.

Употребленіе мелиссы въ нервныхъ лихорадкахъ, нѣсколько ободряетъ силы и утоляетъ жажду. Она полезна также въ желудочныхъ спазмахъ, рвотѣ, коликѣ, трепетаніи сердца, въ истерическихъ припадкахъ, головокруженіи, частыхъ обморокахъ нервного свойства, въ блѣдной немочи, запорѣ кровей, боляхъ послѣ родовъ, простудной ломотѣ, подагрѣ и параличныхъ расслабленіяхъ. Ножныя ванны до колѣнъ изъ теплой воды и питье теплаго настоя мелиссы по стакану, 3—4 раза въ день, помогаютъ открытію мѣсячнаго очищенія.

Для наливки полагаются двѣ драхмы травы на 6 унц. горячей воды, или бѣлаго вина; сухая дается въ порошокъ отъ 20 гр. до полдрахмы съ виномъ. Снаружи употребляется въ видѣ припарки, разводящей опухоль; свѣжая трава, истолченная съ мукою, составляетъ полезную катаплазму отъ ноготѣды. Изъ мелиссы готовятъ:

1) *Мелиссную консерву (conserva melissæ citrate)*, которая сохраняетъ свойства самаго растенія, и дается отъ 2—3 драхмъ на пріемъ.

2) *Мелиссовое масло (oleum melissæ e herba destillatum)*, имѣетъ чрезвычайно ободряющую силу; дается отъ 3—6 капель, два или три раза въ день на сахарѣ, съ бѣлымъ виномъ или съ гофманскими калями при истерическихъ обморокахъ и при другихъ нервныхъ ослабленіяхъ.

3) *Мелиссовый спиртъ (spirit. melissæ)*, которымъ натираютъ расслабленныя и параличныя части, также простудныя и ломотныя опухоли.

\* **Mentha aquatica L.** (*Мята болотная.* — *Wasser Münze.* — *Baume aquatique*). Растетъ по болотистымъ мѣстамъ и берегамъ рѣкъ.

Трава имѣетъ запахъ пріятный, отзывающійся лимоннымъ; вкусъ—пріано-горьковатый.

Употребляется въ тѣхъ-же случаяхъ какъ мята кудрявая, описанная ниже. Снаружи, свѣжую толченую траву этого вида и въ формѣ припарки, прикладываютъ для разведенія простуд-

ныхъ грудныхъ опухолей и ушибовъ; растертые листья ея полезны отъ укушенія осъ и пчелъ.

Болотная мята, употребляемая внутрь вмѣсто чаю (гореть листовъ на фунтъ кипячей воды), утоляетъ желудочную боль и спазмы, притомъ гонитъ мочу. Выжатый сокъ въ приемахъ по столовой ложкѣ съ бѣлымъ виномъ, гонитъ песокъ изъ мочевыхъ путей и помогаетъ отъ глухоты.

Для укрѣпленія желудка эту мяту ѣдятъ сырую съ салатомъ.

Такія-же свойства и дѣйствія имѣютъ слѣдующія породы мяты: *м. лѣсная* или *дикая* (*mentha sylvestris, s. spicata*), *м. садовая простая* (*m. hortensis*), растущія по всей Россіи, по краямъ лѣсовъ, въ садахъ и огородахъ на мокроватой землѣ, особенно при рѣкахъ Окѣ и Волгѣ. Эти породы мяты содержатъ въ себѣ много камфоры и по своимъ превосходнымъ качествамъ могутъ быть употребляемы вмѣсто кудрявой садовой мяты.

*Mentha crispa* L. (*Мята кудрявая*. — *Kraus Münze*. — *Baume crépue*). Растетъ въ Сибири и вездѣ разводится въ садахъ сѣменами и разсаживаемъ черенковъ.

Свойства травы ея зависятъ отъ содержащихся въ ней летучаго масла и экстрактнаго начала. Изъ 1 фунта мятныхъ листовъ получается до 3 драхмъ существеннаго масла. Запахъ ея благовонный, крѣпкій, несовсѣмъ пріятный; вкусъ—горьковато-пріятный, горячительный.

Дѣйствіе кудрявой мяты побуждающее, вѣтрогонное, желудочное, гонящее мѣсячныя кровя и мочу, противуглистное. Снаружи она дѣйствуетъ какъ разбивающее и ранозлѣтительное.

Ее употребляютъ съ пользою въ слабости желудка, отвращенія отъ пищи, вѣтряной коликѣ, брюшныхъ спазмахъ, икотѣ, рвотѣ, истерическихъ припадкахъ, астенической лихорадкѣ, непомѣрной похотливости (*satyriasis*) и болѣзненнымъ бѣшенствѣ матки (*furog uterinus*). Снаружи она прикладывается въ видѣ катлазмы или припарки: къ ушибамъ, отекамъ, судорожнымъ членовымъ болямъ, простуднымъ опухолямъ и груднымъ, происходящимъ отъ излишняго накопленія молока или отъ створоженія оваго, а также для разведенія холодныхъ опухолей; толченые листья ея прикладываются къ ранамъ унимаютъ кровотеченіе, изгоняютъ червей и способствуютъ заживленію оныхъ.

Для наливки, которую пьютъ какъ чай по чайной чашкѣ, на фунтъ кипячей воды кладется сухой травы 1 унція. Эта наливка служитъ также промывательнымъ и припаркою. Для разведенія упомянутыхъ опухолей, къ горячей наливки прибавляется немного мыла и молока и напитокъ ею сложенный полотенца или суконки, перемѣняютъ ихъ при остываніи. Отъ колики въ животѣ, остановки мѣсячныхъ и родовыхъ кровей, припариваютъ

животъ, сваривъ мяту съ ромашкою; для облегченія головной боли прикладываютъ мяту растертую съ хлѣбнымъ мякишемъ. смочивъ ее немного уксусомъ. Отъ осплости, свѣжовыжатый сокъ изъ мяты, подсластивъ медомъ или сахаромъ, принимаютъ на ночь по 3 столовыхъ ложки, въ продолженіи недѣли. Растертые листья съ сахаромъ въ видѣ консервы, полезны для укрѣпленія пищеварительныхъ органовъ. Отъ мокротнаго и сыраго поноса консерву даютъ отъ 2—4 драхмъ на приемъ. Изъ мяты вудрявой приготавливаютъ:

1) *Мятную воду (aqua m. crispae distillata)*, которую можно составлять: растирая 12 капель мятнаго масла съ 4 драхмами сахара и прибавляя мало по малу до 12 унцій чистой воды. Дается по столовой ложкѣ отъ вѣтровъ и для укрошенія рвоты; служитъ также для составленія укрѣпляющихъ микстуръ.

2) *Мятный спиртъ (spiritus menthae c.)* Употребляется какъ дѣйствительное побуждающее средство въ упомянутыхъ выше болѣзняхъ; полезенъ особенно для ипохондриковъ, истерическихъ женщинъ и въ поносахъ.

3) *Мятное масло (ol. destill. menthae crispae)*. Дается на сахаръ отъ 3—4 капель въ тѣхъ случаяхъ же гдѣ и самая мята. Особенно это масло полезно для женщинъ страдающихъ слабостію матки, вѣтрами и спазмами въ животѣ. Снаружи кормилицы, по отнятіи отъ груди младенца, натираютъ себя этимъ масломъ подъ мышками, для уменьшенія прилива молока къ грудямъ и для разогнанія сгустившагося молока.

4) *Ароматные травяные сборы (species aromaticae)*, употребляемые въ видѣ сухихъ и мокрыхъ разбивающихъ припарокъ, какъ сказано выше.

Мяту, какъ всѣмъ извѣстно, кладутъ въ квасъ и кислые щи, для доставленія имъ приятной пряности; съ уксусомъ она служитъ здоровымъ и благовоннымъ куреніемъ, поправляющимъ воздухъ въ жилыхъ покояхъ и больницахъ.

\* *Menta piperita L.* (*Мята перечная, англійская.* — *Pfeffer Münze.* — *Baume poivrée*). Разводится въ огородахъ и садахъ.

Собирать ее должно въ іюль мѣсяцъ при появленіи цвѣтовъ.

Свойства ея травы зависятъ отъ избытка летучаго камфорнаго масла. Запахъ свѣжей и сухой травы благовонный, отызывающійся камфорою; вкусъ пряно-острый, камфарный, въ началѣ жгущій, а затѣмъ прохладяющій ротъ.

Дѣйствіе сходно съ дѣйствіемъ выше описанной мяты вудрявой (*m. crispae*); но потогонное и мочегонное дѣйствіе этого вида значительно сильнѣе.

Полезна въ различныхъ видахъ нервной слабости, какъ-то: въ астеническихъ лихорадкахъ, маточныхъ спазмахъ, продолжающихся во время мѣсячныхъ кровей, упорномъ кашлѣ, хрипотѣ,

простудномъ ревматизмѣ, запорѣ кровей, блѣдной немочи и теченіи бѣлей; также въ нервныхъ горячкахъ и лихорадкахъ, соединенныхъ съ слабостію желудка, тошнотою, рвотою, поносомъ, рвзью въ кишкахъ и во всѣхъ астеническихъ припадкахъ, въ которыхъ перечная мята служитъ подкрѣпляющимъ и ободряющимъ средствомъ. Снаружи она употребляется для разведенія водяныхъ опухолей, молочныхъ, простудныхъ и подагрическихъ и воспалительной рожи, для чего ее прикладываютъ вмѣстѣ съ ромашкою или съ бузинымъ цвѣтомъ (*florae chamomillae v. sambuci n.*) въ видѣ сухой и мокрой припарки, смотря по обстоятельствамъ.

Въ порошокъ, сухая трава дается отъ 20—30 гранъ; въ видѣ наливки (1 унція травы на фунтъ кипячей воды) ее пьютъ подсластивъ медомъ или сахаромъ вмѣсто чаю. Снаружи она прикладывается въ сухихъ мѣшечкахъ и въ мокрыхъ припаркахъ, упомянутыхъ при описаніи кудрявой мяты. Мятная консерва, гнанная вода и масло, даются въ тѣхъ-же болѣзняхъ и тѣми-же образомъ, какъ сказано было выше.

Перечная мята, въ водяной и винной наливкѣ употребляемая вмѣстѣ съ мауновымъ корнемъ (*rad. valerianae*), замѣняетъ виргинскій змѣвикъ (*arist. serpentaria*).

\* *Menyanthes trifoliata* L. (*Вахта; бобровица; стрѣла; папуны.*—*Dreiblättriger Zottenblume.*—*Trefle d'eau*). Растетъ по болотамъ и влажнымъ мѣстамъ. Вахта употребляется съ пользою въ худосочіи и блѣдной немочи, въ мокротной обрюзлости, водяныхъ отекахъ, водяной болѣзни, ревматизмѣ, членовой ломотѣ, подагрѣ, цингѣ, сведеніи и бездѣйствіи членовъ, ножныхъ струповатыхъ сыпяхъ, лишаяхъ, паршахъ, чесоткѣ, золотухѣ, застарѣлыхъ язвахъ и рытикахъ. Въ Англіи деревенскіе жители весною выжатые изъ свѣжей травы сокомъ лечатся какъ отъ упомянутыхъ болѣзней, такъ и отъ глистовъ не безъ успѣха. Снаружи отваромъ вахты промываютъ цинготныя раны и другія застарѣлыя язвы; а свѣжими листьями или сухими, размоченными въ теплой водѣ, пережидываютъ ихъ, и какъ доказываютъ опыты, это средство заживляетъ ихъ дѣйствительнѣе другихъ.

Для наливки 1 унція сухой травы наливается 2 фунтами горячей воды и вскипятивъ, процеженный отваръ принимаютъ по чайной чашкѣ, 3 раза въ день; изъ свѣжей травой выжатый сокъ дается по столовой ложкѣ съ сывороткою нѣсколько разъ въ день. Въ порошокъ или въ видѣ каши съ медомъ даютъ ее по поддрахмы. Можно также употреблять вахту въ клистирахъ, полезныхъ особенно въ чревныхъ завалахъ или обструкціяхъ. Изъ этого растенія приготовляются:

1) *Горькій экстрактъ (extractum amarum)*, который для подкрѣпленія желудка дается отъ 10—20 гранъ.

2) Противогинготные сборы (*species antiscorbuticae*), употребляемые въ отварѣ, въ цинготныхъ припадкахъ.

Англичане, при вареніи пива и портера, вмѣсто полуунта хмѣля, кладутъ по два лота листовъ вахты, которая доставляетъ пріятную горечь, подобную квасци.

\* *Mercurialis perennis* L. (*Пролѣсникъ многолтній; курзелье. — Ausdauerndes Ringelkraut. — Chou de chien; mercuriale des montagnes*). Растетъ въ лѣсахъ. Свойства пролѣсника мочегонныя и прохладительныя. Вкусъ его горькій, непріятный. Онъ содержитъ въ себѣ: горькое, нѣсколько слабѣющее начало, хлорофилл, альбуминъ, бѣлое эфирное вещество, летучее масло, различные соли и пр. Употребляется какъ слабительное. При вареніи пролѣсникъ утрачиваетъ свою горечь и можетъ быть употребляемъ въ пищу. Принимаютъ сокъ пролѣсника и отваръ.

*Morus nigra* L. et *Morus albus* L. (*Шелковица. — Maulbeerbäum. — Mûrier noir et blanc*). Оба вида разводятся въ садахъ южной Россіи. Ягоды черной шелковицы дѣйствуютъ мягчительнымъ, прохладжающимъ и слабительнымъ образомъ. Изъ нихъ готовятъ сиропъ, полезный при горловыхъ воспаленияхъ. Изъ коры бѣлой шелковицы, обработкою ея подобно коноплю, можно готовить ткани и бумагу. Молодые вѣтви ея доставляютъ болѣе нѣжныя волокна.

\* *Myrica Gale* L. (*Пахучка сухолиственная; восковой модный верескъ. — Gemeiner Gagel. — Piment royal; myrte bâtard; poivre de Brabant*). Растетъ по болотамъ. Всѣ части растенія, въ особенности плоды издаютъ сильный ароматическій запахъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ пахучку употребляютъ противъ различныхъ болѣзней, въ формѣ чая; но по ея одурающему дѣйствию этого рода приемы могутъ принести скорѣе вредъ, почему и нельзя рекомендовать ея употребленія внутрь.

N.

\* *Herpetis cataria* L. (*Кошечья трава; кошечья мята. — Gemeine Katzenminze. — Chataire*). Растетъ по краямъ дорогъ и несмышномъ влажныхъ мѣстамъ южной Россіи.

Свойства кошечей травы зависятъ отъ летучаго масла; трава имѣетъ запахъ противный, козлиный; вкусъ пряно-горькій, приторный. Дѣйствіе ея возбуждающее, мѣсячегонное, противуглистное; сокъ втнутый въ ноздри возбуждаетъ чиханіе и отдѣленіе носовыхъ мокротъ.

Употребляется въ маточныхъ болѣзняхъ, блѣдной немощи, запорѣ кровей, истерикѣ, судорожномъ кашлѣ, одышкѣ, брюшныхъ завалахъ, особенно печени и въ желтухѣ. Снаружи, въ видѣ припарокъ и ваннъ, она полезна въ тѣхъ же болѣзняхъ.

Для наливки полагаютъ 1 драхму травы, или цвѣтныхъ верхушекъ на 4 унціи бѣлаго вина; въ порошокъ даютъ траву съ цвѣтными верхушками по 20 гранъ, 3 или 4 раза въ день; свѣжевыжатаго сока даютъ по 2 унціи; для клистировъ кладутъ 1 унцію травы на фунтъ жидкости.

Это растение получило свое названіе отъ того, что кошелъ чрезвычайно любятъ его.

*Nicotiana tabacum* L. (Табакъ.—*Gemeiner Taback*.—*La nicotiane tabac*). Воздѣлываемое въ южныхъ губерніяхъ Россіи растеніе.

Не только листья, но также корень и сѣмя табаку могутъ дѣйствовать ядовито и содержать также никотинъ.

Составныя части листьевъ суть: никотинъ (алкогольдъ, сильный ядъ; никоціанинъ (такъ назыв. табачная камфора, видъ стеаролита), горькое вытяжное вещество, смола, камедь, бѣлокъ, яблочная кислота, соли (особенно селитра) и др.

Табачный дымъ состоитъ изъ никотина и различныхъ пригорѣлыхъ веществъ, какъ-то: изъ пригорѣлой кислоты и смолы, табачной камфоры или никоціанина съ углекислымъ амміакомъ, угольною кислотою, углекислымъ газомъ, уксусною кислотою и др.

Мѣстно свѣжіе листья и сокъ ихъ вообще раздражаютъ мало. Но искусственно на фабрикахъ приготовленный табакъ, подвергавшійся обыкновеннымъ процессамъ броженія и т. д., дѣйствуетъ мѣстно довольно скоро, какъ это видно изъ дѣйствія его, которое обнаруживается при нюханіи, жеваніи и куреніи такихъ листьевъ табаку.

Когда принимаютъ табакъ въ маломъ количествѣ, или когда курятъ его умѣренно, то онъ обыкновенно производитъ только щекотаніе и сухость въ зѣвѣ, и умножаетъ (особенно при куреніи его) отдѣленіе слюны и вообще жидкости рта. Дѣйствующія составныя части его, никотинъ и т. д., переходятъ въ кровь съ большою скоростью, усиливаютъ притомъ отдѣленіе мочи и дѣйствуютъ на мозгъ и душевную жизнь.

При высшей степени дѣйствія (отъ большихъ приѣмовъ, является круженіе и боль головы, тошнота даже рвота съ поносомъ, чувство сильнаго нездоровья и слабости. Дѣятельность сердца уменьшается и пульсъ упадаетъ значительно, становится слабымъ, вмѣстѣ съ тѣмъ весьма медленнымъ, нерѣдко напротивъ чрезвычайно частымъ; происходитъ оглушеніе, зрѣніе прекращается, зрачекъ суживается, кожа покрывается холоднымъ потомъ, и наконецъ можетъ происходить обморокъ и иногда да-

же судороги. Табакъ, по видимому, никогда не наводитъ сна, какъ другія оглушающія средства. Но всѣ эти припадки отравленія большею частью скоро исчезаютъ, и наконецъ, при частомъ повтореніи, они вовсе не являются.

Отъ большихъ приѣмовъ упомянутыя разстройства скоро достигаютъ несравненно высшей степени: происходитъ головокруженіе, оглушеніе, одышка, тошнота, слабость и сильное дрожаніе мышцъ, даже судороги, дыханіе затрудняется все болѣе и болѣе, пульсъ становится неощутительнымъ и часто является еще сильное душеніе, рвота, икота, поносъ, ознобъ, а наконецъ можетъ воспослѣдовать сонливость и даже смерть.

Табакъ употребляется только снару- жи. Наливку его или самые листья, варенные съ водою, даютъ для примочекъ, припарокъ, умываній и промывательныхъ, при чемъ однако всегда должно помнить, что особенно отъ промывательныхъ весьма легко можетъ происходить отравленіе.

Елистіры изъ табаку помогаютъ при вѣшленныхъ грыжахъ, подвздошной коликѣ (ileus), упорномъ поносѣ, воспаленіи кишекъ, утомленіи. При катаррѣ евстахіевой трубы и барабанной полости наполняютъ ротъ табачнымъ дымомъ, который запирая ротъ и сильно выдыхая, вгоняютъ въ евстахіеву трубу. Нюханіе табаку хвалили противъ хроническаго катарра и слизетеченія изъ носовыхъ и лобныхъ полостей, изъ слезнаго канала, противъ хроническаго воспаленія глазъ, слабаго зрѣнія (amblyopia); куреніе табаку противъ зубной боли и одышки.

*Никотинъ* получается проведеніемъ табачныхъ паровъ въ воду, содержащую сѣрную кислоту, разложеніемъ сѣрнистаго никотина посредствомъ кали и т. д., также перегонкою алкоголическаго экстракта съ кали, обработываніемъ перегона посредствомъ зеира, щавельной кислоты и т. д. Безцвѣтная, маслообразная летучая жидкость растворяющаяся легко въ винномъ спиртѣ, зеирѣ и маслахъ, менѣе въ водѣ; образуетъ отчасти кристаллизующія соли; разлагается постепенно на воздухъ, и становится бурною, густоватою; имѣетъ острый жгучій запахъ и вкусъ, на подобіе табаку. Никотинъ дѣйствуетъ почти ядови-



Незабудка болотная.  
(*Myosotis palustris* L.)



тѣе, нежели синильная кислота, какъ это нашли болѣе точными изслѣдованіями, особенно вслѣдствіе случая отравленія.

*Никоціанинъ* (табачная камфора) также ядъ, и однимъ гр. онъ можетъ производить головокруженіе, тошноту и т. д., а введенный въ нозь—чиханіе.

\* *Nymphaea alba* L. (*Кувшинка бѣлая; водяная маковки; лататъе.*—*Weisse Seerose.*—*Lymphé des eaux; Eys d'étang; Blanc d'eau; plateau blanc*). Растетъ въ проточныхъ водахъ.

*Nymphaea lutea* L. (*Кувшинка желтая, кубышечки; водяной лягушникъ.*—*Gelbe Teichrose.*—*Lys jaune d'eau; Jaunet d'eau; plateau jaune*). Растетъ въ стоячихъ и проточныхъ водахъ.

Корень и цвѣты перваго вида содержатъ смолисто-горькое начало и большое количество клейко-мучнаго вещества; цвѣты имѣютъ благовонный запахъ, который при сушеніи улетучивается.

Цвѣты обѣихъ видовъ прохладяютъ и успокаиваютъ. Корень бѣлыхъ кувшинчиковъ производитъ воспаленіе кожи и натягиваетъ морщоты.

Отваръ корня желтоцвѣтныхъ кувшинчиковъ составляетъ хорошее смягчительное притупляющее и прохладяющее средство, полезное въ воспалительномъ задержаніи мочи, мочерѣзѣ, гноетеченіи, бѣлахъ, воспаленіи почекъ и другихъ внутренностей; и въ астеническихъ теченіяхъ. Цвѣты и плоды этого растенія тоже полезны; ихъ толкутъ и наливаютъ кипяткомъ, для составленія утоляющаго жаръ, жажду и наводящаго сонъ питья. Иногда ихъ варятъ вмѣстѣ съ кореньями и отваръ этотъ пьютъ въ ночномъ сѣменотеченіи, безсонницѣ, завалахъ внутренностей и желтухѣ. Толченые листья его прикладываются къ воспалительнымъ опухолямъ и къ ножнымъ подошвамъ для утоленія жару. Корень бѣлыхъ кувшинчиковъ, разрезанный вдоль пластинками и приложенный къ подошвамъ, служитъ воспаляющимъ или отвлекающимъ средствомъ. Толченный свѣжій корень, смѣшанный съ еловою или сосновою бѣлою смолою наподобіе мази, прикладываютъ къ головнымъ паршамъ, для очищенія струповъ и отращенія выдѣвшихъ волосъ; причемъ должно мыть голову отваромъ этого корня.

Для наливки горсть бѣлыхъ или желтыхъ свѣжихъ цвѣтовъ наливаютъ 8 унц. кипячей воды; наливка эта служитъ питьемъ, какъ выше сказано, и болеутолительнымъ промывательнымъ. Для отвара 1 или 2 унцій корня желтоцвѣтныхъ маковокъ кладется на фунтъ воды. Нѣкоторые моютъ этимъ отваромъ голову для рошенія волосъ.

Простолудины отваръ этихъ корней въ водѣ или суслѣ даютъ пить въ сухоткѣ и чахоточномъ кашлѣ. Кромѣ того онъ полезенъ для кормилицъ, для усиленія отдѣленія молока.

Цвѣты, настоянные съ деревяннымъ, льнянымъ или инымъ постнымъ масломъ, могутъ служить хорошимъ смягчительнымъ и болеутолятельнымъ средствомъ для наружнаго употребленія.

О.

**Ocimum basilicum.** (*Базилукъ. — Basilienkraut. — Grand basilic*). Растеніе воздѣлываемое въ садахъ.

Запахъ свѣжей и сухой травы базилика благовонный, вкусъ пряный; вкусъ сѣмьей клейкій, зависящій отъ содержащихся въ нихъ летучаго масла и экстрактнаго начала. Дѣйствіе этого растенія укрѣпляющее и разбивающее.

Въ наливкѣ употребляется для укрощенія рвоты, въ слабости желудка, ревматизмъ и запоръ мѣсячныхъ кровей отъ простуды. Сухая трава, истертая въ порошокъ, возбуждаетъ чиханіе и облегчаетъ головную боль, являющуюся послѣдствіемъ долговременнаго насморка; слизь, извлекаемая горячею водою изъ сѣмьей, прикладывается съ пользою къ глазамъ при ихъ воспаленіи и трещинамъ на грудныхъ сосцахъ. Летучее масло базилика помогаетъ въ головной сочувственной боли (*cephalalgia sympathica*).

Для наливки на 1 или 2 драхмы травы наливаютъ 4 унціи горячей воды и пьютъ вмѣсто чая. Существенное масло базилика дается на сахаръ отъ 3—10 капель въ день. Снаружи трава его служитъ для приготовленія разбивающихъ припаровъ и ароматныхъ ваннъ; истертая трава въ порошокъ прикладывается для разведенія отековъ. При вкюхиваніи ея вмѣсто табаку, она уничтожаетъ долговременный насморкъ.

\* **Orchis bifolia L.** (*Кокушиница двулистая; кокушкины слезки; стачка; салець; дѣтскія ядрышки; дѣтская трава; бѣлый самуръ. — Zweiblättriger Ragwurz. — Orchis bifolié*). — **Orchis latifolia L.** (*Кокушиница широколистная; мисье ядро; самуръ. — Dreiblättriger Ragwurz. — Orchis à larges feuilles*). — **Orchis mascula L.** (*Кокушиница мужская. — Salep-Ragwurz. — Orchis mâle*). — **Orchis morio L.** (*Кокушиница женская; дремликъ; царикъ; царь. — Gemeine Ragwurz. — Orchis bouffon*). Всѣ поименованныя здѣсь виды ортышника растутъ въ умѣренной и сѣверной полосахъ Россіи по лѣсистымъ и влажнымъ лугамъ и вообще на сырой почвѣ, лучшее время для собиранія этихъ растеній въ августъ, когда сѣмена совершенно созрѣли и стволъ начинаетъ увядать.

Корни упомянутыхъ растеній отличаются до того сильною клейкостью, что одна драхма ихъ истертая въ порошокъ со-

\*

общаетъ при вареніи съ 8 унціями воды этимъ послѣднимъ клейкую, слизистую консистенцію. Запахъ нѣкоторыхъ породъ благовонный; вкусъ слизистый.

Свойства ихъ питательныя, притупляющія остроту влаги, сгущающіе, смягчительныя.

Употребляется въ простыхъ и кровавыхъ поносахъ, сухоткѣ, чахоткѣ, изнурительныхъ лихорадкахъ, при внутреннихъ язвахъ, ссадинахъ кишекъ, въ мочерѣзѣ, худосочи, сильныхъ нагноеніяхъ, особенно послѣ ампутацій, въ цинготныхъ язвахъ, долговременномъ простудномъ кашлѣ, при язвахъ легкихъ, почекъ и мочевого пузыря, въ дѣтской грыжѣ, рѣзѣ въ кишкахъ. Гарманъ совѣтуетъ давать порошокъ салепа съ винограднымъ виномъ женщинамъ изнуреннымъ сильнымъ кровотеченіемъ и увѣряетъ, что этимъ средствомъ многія не только излечились въ короткое время, но даже сдѣлались способными къ оплодотворенію.

Для отвара отъ 1—2 драхмъ въ порошокъ кладутъ на фунтъ воды или молока; его пьютъ по чайной чашкѣ 2 или 3 раза въ день; въ порошокъ даютъ приемами по полудрахмѣ, съ прибавленіемъ сахара, корицы и т. п. пряностей. Можно также варить порошокъ ятрышникового корня съ бѣлымъ или краснымъ виномъ, съ сухими вишнями и другими плодами въ супахъ, служащихъ легкою и питательною пищею для больныхъ. Изъ него приготавливаютъ:

*Отваръ кокушницы, простой и ароматной (decoctura o. morionis per se, vel aromatica)*, который употребляютъ съ пользою какъ сказано выше: въ поносахъ, мочерѣзѣ, каменныхъ припадкахъ и проч.

Турецкій или персидскій привозный салепа, нисколько не лучше салепа нашихъ кокушницъ.

**Origanum majoranum L.** (*Душица садовая. — Majoran Dosten. — Origan marjolaine*). Растетъ въ садахъ.

Вкусъ травы ея и цвѣтныхъ верхушекъ горьковатый, зависящій отъ экстрактнаго вещества и летучаго масла. Свойства душицы возбуждающія, разводящія, желудочныя, укрѣпляющія, мѣсячногонныя и возбуждающія чиханіе.

Это растение полезно въ застарѣлой простудѣ, мокротной одышкѣ, нервныхъ головныхъ и маточныхъ припадкахъ, продолжительномъ насморкѣ, головокруженіи, звонѣ въ ушахъ, трясеніи членовъ и параличныхъ расслабленіяхъ, происходящихъ отъ старости. Въ падучей болѣзни, цвѣтныя верхушки, стертые съ сахаромъ, даютъ по 30 гранъ.

Для наливки, которую пьютъ вмѣсто чая, 1 драхма верхушекъ наливается 4 унціями кипячей воды; снаружи употребляется въ видѣ порошка, растертаго съ сахаромъ, и присарки, или свѣжей

таплавмы, разводящей твердыя грудныя опухоли. Маіораннымъ масломъ (oleum destill. m.) натирають съ пользою параличныя члены, животь для утоленія вѣтрянной колики и мажутъ дѣтямъ въ носу при заважѣ ноздрей клейкими мокротами, или при притупленіи у нихъ обонанія. Это-же масло даютъ внутрь отъ 5 — 6 каплей и прибавляютъ его къ параличнымъ мазямъ и бальзамамъ, какъ упомянуто при описаніи лаванды.

Эфирное масло маіорана, при долговременномъ стояніи въ холодномъ мѣстѣ, получаетъ камфорный отсѣдъ. Это смолисто-камфорное вещество можетъ замѣнять камфору.

Маіоранъ, душица простая, богородская трава, базиликъ, лаванда, мята и розмаринъ составляютъ лучшіе ароматныя травныя сборы (*species aromaticæ*), употребляемые въ видѣ сухихъ и мокрыхъ припарокъ или нервоуврѣдительныхъ ваннъ.

\* *Oriognum vulgare* L. (Маіоранъ; душица обыкновенная; материнка. — Gemeiner Dosten. — Origan sausage). Растетъ по гористымъ лѣсамъ.

Свойства травы ея зависятъ отъ обилія въ ней летучаго остраго масла; запахъ свѣжей и сухой травы этого вида благовоный, вкусъ пріятный, горьковатый, при жеваніи нѣсколько острый. Дѣйствіе материнки возбуждающее, разбивающее и мѣсячногонное. Это растение полезно для разведенія густыхъ мокротъ, укрѣпленія разслабленныхъ органовъ и исцѣленія внутреннихъ, особенно легочныхъ и маточныхъ поврежденій. Кроме того его можно употреблять съ успѣхомъ въ кашлѣ, удущьѣ, мовротной чахоткѣ и блѣдной женской немочи, происходящей отъ неправильнаго очищенія или запора мѣсячныхъ кровей. Какъ наружное средство материнка употребляется для разбивающихъ припарокъ и укрѣпляющихъ ваннъ, полезныхъ въ отекахъ и другихъ наружныхъ болѣзняхъ, зависящихъ отъ слабости частей.

Для внутренняго употребленія 2 драхмы сухой травы наливаются 6 унц. горячей воды и эту наливку пьютъ съ медомъ вмѣсто чая; снаружи въ видѣ припарки прикладывается для разведенія грудныхъ опухолей, въ простудномъ колотѣѣ и брюшной коликѣ отъ вѣтровъ. Траву съ цвѣтными верхушками, истертую въ порошокъ, нюхаютъ отъ насморку и головной боли. Изъ материнки готовятъ:

1) Ароматныя травныя сборы (*species aromaticæ*), употребляемые для вышеупомянутыхъ ваннъ и припарокъ.

2) Гнанное душичное масло (*oleum destill. origani vulg.*) употребляется для утоленія зубной боли, происходящей отъ гнилости, и въ костовѣѣ. Внутрь принимается отъ 3—5 капель для утоленія икоты.

**Ornus** см. **Fraxinus** L.

\* **Osmunda regalis L.** (*Стручечникъ*. — *Königs - Traubenfarrrn.* — *L'osmonde*). Растетъ во влажныхъ лѣсахъ.

Свойства стручечника тоническія, вяжущія. Рай употреблялъ его съ пользою противъ авглійской болѣзни. Во многихъ странахъ поселяне сушатъ его листья на солнцѣ и за тѣмъ настаиваютъ ихъ на постель дѣтей, страдающихъ авглійскою болѣзнію; во всякомъ случаѣ если это средство даже и не достигаетъ желанной цѣли, оно полезно въ томъ отношеніи, что листья своею свѣжестью укрѣпляютъ почки. Алліони испыталь съ пользою въ той-же болѣзни отваръ корня этого растенія.

\* **Oxalis acetosella L.** (*Заячій щавель; кислица.* — *Gemeiner Sauerklee.* — *Alleuia; Surelle; pain de cocou; petite oseille*). Растетъ по тѣнистымъ лѣсамъ у подножія деревъ. Дѣйствіе кислицы прохладящее, противужелчное, противугниlostное, утоляющее жажду, рвоту и восстанавливающее аппетитъ.

Употребляется въ цингѣ, желчныхъ и гнилыхъ горячкахъ. Снаружи толченые листья прикладываются: къ золотушнымъ, цинготнымъ, раковымъ и другимъ злокачественнымъ язвамъ. Сокъ кислицы полезно принимать ежедневно въ питьѣ употребляемый: при меланхоліи, сумашествіи, огневицахъ, желтяницѣ, воспаленіи мозга, гортанной жабѣ, астеническихъ лихорадкахъ и сильномъ волненіи крови.

Для внутренняго употребленія горсть свѣжей травы варятъ въ 1 фунтѣ похлебки, или яливъ на полунціи ея 12 унцій молока, кипятятъ его и прецѣдивъ пьютъ полученную сыворотку въ упомянутыхъ выше болѣзняхъ по чайной чашкѣ. Выжатый сокъ дается также съ сывороткою, приемами отъ 1 — 2 унцій; кисличный сокъ, смѣшанный съ равнымъ количествомъ воды и сотоваго меда, служитъ весьма хорошею разноцѣлительною водою, второю кромѣ того полезно полоскать ротъ въ цинготной порчѣ десенъ и гниложелчной жабѣ. Кисличную соль принимаютъ дозами до полудрагмы.

\* **Oxycoccus palustris Pers.** См. **Vaccinium oxycoccus L.**

Р.

\* *Papaver Somniferum* L. (*Макъ бѣлый, садовый; макъ бѣлый.* — *Garten Mohn.* — *Le pavot des jardins.*). Растетъ на огородахъ и по пашнямъ.

Зеленя маковки этого вида имѣютъ запахъ снотворный; вкусъ горьковато-травяной; сѣмень: сладко-масляный, миндальный.

Дѣйствіе маковокъ болеутолительное, снотворное; сѣмень: питательное, смягчительное, притупляющее; масло имѣетъ тѣже свойства.

Древніе врачи отваръ маковыхъ головокъ, подслащенный медомъ, давали съ пользою въ простудномъ кашлѣ и другихъ грудныхъ припадкахъ. Листы и цвѣты употребляются какъ снотворное и противусудорожное средство; свѣжія маковки, толченныя вмѣстѣ съ листьями, служатъ болеутолительною припаркою противъ ломотныхъ болей и опухлей. Цвѣтная водяная или молочная наливка, также какъ цвѣты вареные съ медомъ или сахаромъ, полезны отъ бессонницы, простуды, упорнаго кашля, боли въ животѣ и поносовъ. То и другое изъ этихъ средствъ дается дѣтямъ чрезъ нѣсколько часовъ по столовой ложкѣ; сиропъ по чайной. Надо замѣтить, что ежели дѣтей часто поятъ маковою настойкою, то онѣ становятся слабоумными. Маковое сѣмя хвалятъ какъ нѣжную питательную пищу, которая имѣетъ свойства подобныя сладкому миндалю; а потому приготовляемый изъ него оршадъ или молоко даютъ съ пользою: въ воспалительной лихорадкѣ или огневицѣ, мочерѣзѣ, болѣзненномъ стволномъ теченіи, кашлѣ, хрипотѣ и пр. Маковое масло, по своей чистотѣ и пріятности, лучше постнаго или льнянаго масла; а потому не только употребляется въ пищу вмѣсто прованскаго и миндальнаго масла, но и служитъ также для составленія жидкихъ мазей.

Для отвара на полунціи маковогъ кладутъ фунтъ воды, которую кипятятъ до тѣхъ поръ, пока останется 8 унц. жидкости. Отваръ этотъ можетъ служить болеутолительнымъ промывательнымъ, особенно полезнымъ въ колликѣ и болѣзненномъ теченіи мѣсячныхъ кровей. Толченныя или истертыя въ порошокъ и со ржанюю мукою смѣшанныя сѣмена составляютъ болеутолительную катаплазму. Для эмульсиі 1 унц. сѣмень кладутъ на

фунтъ воды масло дають дозами отъ 1—2 унц. и болѣе въ тѣхъ же болѣзненныхъ przypadкахъ.

Маковое масло дають внутрь по столовой ложкѣ, при застуженіи кори или паденія ея на внутренности.



Кукшиины слезки. (*Orchis Maculata.*)  
(Къ стр. 163.)

***Papaver Rhoeas* L.** (*Макъ красный полевой; дикій мачокъ.*—*Klatsch Mohr.*—*Le coquelicot.*). Растетъ въ южной Россіи на поляхъ и во рѣп.

Запах свѣжихъ цвѣтовъ непріятный, слабо снотворный; вкусъ горьковато-клейкій. Содержитъ въ себѣ летучее масло и клейкое начало. Дѣйствіе дикаго мака сходно съ дѣйствіемъ предыдущей породы.



Макъ снотворный. (*Papaver Somniferum* L.).  
(Къ стр. 167).

Употребляется въ грудныхъ простудныхъ боляхъ, кашлѣ, холотѣ, чревныхъ спазмахъ, бессонницѣ и высыпныхъ лихорадкахъ.



Для наливки кладется полунціи цвѣтовъ на 6 унц. горячей воды, которую пьютъ вмѣсто чаю. Дѣтямъ даютъ въ видѣ сиропа (symp. p. rhoeados.) по чайной ложкѣ, нѣсколько разъ въ день; взрослымъ: по 1 унц. прибавляютъ на фунтъ груднаго отвара, который полезенъ въ упомянутыхъ простудныхъ припадкахъ.

Сгущенный сокъ изъ незрѣлыхъ маковыхъ цвѣтовъ можетъ служить вмѣсто опія, въ двойныхъ приемахъ противу этого послѣдняго.

Опій получается надрѣзываніемъ зеленыхъ, незрѣлыхъ коробочекъ сѣменъ или, какъ обыкновенно находящіяся въ продажѣ сорта, раздавливаніемъ, выжиманіемъ и сгущеніемъ сока. Нерѣдко продажный опій подмѣшивается камедью, льнянымъ или сезамовымъ масломъ, салепомъ, рисовою мукою, мякотью дурмана и т. п.

Составныя части опія суть: кристаллизующіеся алкалоиды (морфій, наркотинъ, кодеинъ, тебаинъ или параморфинъ и папаверинъ); далѣе кристаллизующіяся, неосновныя вещества (нарцеинъ, меконинъ, псевдоморфинъ, порфиросинъ), меконная кислота, смолистыя и вытяжныя вещества, камедь, жирное масло и летучее, пахучее вещество.

Изъ всѣхъ кристаллизующихся веществъ опія только морфій, кодеинъ, тебаинъ и вѣроятно также опіанъ (наркотинъ) и нарцеинъ дѣйствуютъ болѣе или менѣе наркотически; другія, какъ меконная кислота, по видимому, болѣе или менѣе не дѣйствительны. Ни одна изъ составныхъ частей опія, также морфинъ, не дѣйствуетъ такимъ же образомъ, какъ самый опій въ плотномъ состояніи, что легко понятно изъ сложнаго состава опія, содержащаго столь многіе дѣйствительные элементы.

Мѣстно опій дѣйствуетъ съ весьма незначительною силою. Нерѣдко онъ въ первое мгновеніе производитъ на нѣжныхъ или язвенныхъ частяхъ сильную боль, красноту, словомъ, онъ можетъ дѣйствовать раздражительно; но скоро (по крайней мѣрѣ отъ большихъ приемовъ) происходитъ и въ прикосновенныхъ частяхъ притупленіе чувствительности, слабость нервной системы, чувствительныхъ и двигательныхъ нервовъ, которая можетъ переходить даже въ параличъ.

Растворимыя части опія скоро переходятъ изъ мѣсть употребленія въ кровяную массу, если этому не препятствуетъ толстый слой кожицы и т. п., и потому можетъ происходить (напр. при употребленіи опія на кожу, на язвахъ) боль и круженіе головы, оглушеніе, сонливость и т. д. Отдѣленіе и испарина тѣхъ, которые принимали опій въ большихъ приемахъ, пахнутъ опіемъ, и эти отдѣленія часто сами ядовиты, напр. молоко матери для младенца.

При малыхъ приемахъ  $\frac{1}{2}$ —1 гр., или 10—20 капель лавдана, не замѣтно сильнаго дѣйствія въ прикосновенныхъ частяхъ, за исключеніемъ чувства сухости въ пищепріемномъ и дыхательномъ горлѣ, теплоты около желудка, обыкновенно и жажды. Но когда отправленіе желудочныхъ нервовъ и т. д. болѣзненно разстроено, какъ при гастралгіи, изжогѣ, или когда чувствуютъ сильный голодъ, то эти ощущенія и возвышенная чувствительность могутъ исчезать, чѣмъ и подтверждается успокоительное дѣйствіе опія на нервную систему. При дѣйствіи его на мозгъ и всю нервную жизнь въ душевной жизни замѣтна особенная живость, по крайней мѣрѣ въ отдѣльныхъ отправленіяхъ (въ воображеніи): теченіе мыслей свободнѣе, глаза блестятъ, чувствуютъ себя бодрѣе и сильнѣе; половое побужденіе часто усиленно, является бессонница, а пульсъ частъ, температура тѣла возвышена и нерѣдко происходитъ потъ. Рано или поздно это усиленное отправленіе переходитъ въ угнетенное состояніе, при чемъ особенно нервная и душевная жизнь можетъ опускаться ниже физиологическаго уровня. Такъ душевная дѣятельность расслаблена; сокращенія сердца и мышцы вялы и лишены прежней силы. Происходитъ чувство пустоты въ головѣ; часто также незначительная головная боль и сонливость, а пульсъ становится рѣже и меньше. Обыкновенно однако возбужденіе мало или вовсе не наблюдается.

У чувствительныхъ лицъ нерѣдко наблюдаютъ послѣ употребленія опія сильную слабость, боязливость, безпокойство, блѣдность лица, тошноту, даже душеніе и рвоту; потомъ круженіе и боль головы, оглушеніе, незначительную сонливость п т. д. Словомъ, дѣйствія опія весьма различны, съ одной стороны, смотря по личности больнаго, а съ другой, смотря по препаратамъ п т. д., и столь же ошибочно называть ихъ «возбуждающими» какъ и «успокоивающими», потому что у одного уже 1—2 гр. производятъ оглушеніе, сонливость п настоящій сонъ, у другаго отъ 6—8 гр. не происходитъ сильнѣйшаго дѣйствія, а третій отъ такихъ малыхъ приемовъ совершенно развеселяется.

Отъ немного большихъ приемовъ (напр. отъ 2—3 гран.), также при частомъ повтореніи малыхъ приемовъ или у чувствительныхъ, раздражительныхъ лицъ, упомянутыя дѣйствія успиваются. Происходитъ родъ хмѣля, почти какъ отъ спиртныхъ напитковъ. Часто является сильное душевное возбужденіе, которое однако скоро переходитъ въ неодолимую склонность ко сну; или эта склонность происходитъ съ самаго начала, часто съ круженіемъ и болью головы и слабостью мышцъ. Пульсъ, который сначала частъ, становится чаще и полнѣе, можетъ потомъ сдѣлаться рѣже, нежели въ нормальномъ состояніи, и между тѣмъ какъ прежде кожа часто была горяча п суха, она теперь

нерѣдко покрыта потомъ. Чувствительные нервы кожи и нервы наружныхъ чувствъ, какъ и мозгъ, по видимому, находятся въ состояніи угнетеннаго отравленія, такъ что наружныя впечатлѣнія воспринимаются съ меньшею силою и ясностью, и поврежденія, производившія прежде сильную боль, ощущаются теперь менѣе ясно. Если наконецъ является сонъ, то онъ глубокъ, а зрачекъ суженъ и болѣе или менѣе неподвиженъ, какъ уже до появленія сна; дыханіе совершается спокойно и медленно обыкновеннаго. Во время сна часто являются (особенно, по видимому, у сладострастныхъ лицъ, восточныхъ жителей) чрезвычайно живыя сновидѣнія, обыкновенно съ особеннымъ отношеніемъ къ половой жизни; они, по видимому, зависятъ особенно отъ мыслей, которыми занимался до засыпанія. Проснувшись, чувствуютъ себя слабымъ, тупость головы, или жалуются на тупую боль около лба и затылка. При этомъ замѣчается, что

а) *Пищевареніе* обыкновенно разстроено во время дѣйствія опія, и какъ видѣть съ тѣмъ полость рта и зѣвъ сухи, отдѣленіе слюны уменьшено, то можно предполагать, что уменьшается также образованіе слизи на слизистой оболочкѣ желудка. Нерѣдко бываетъ также, что отъ употребленія большихъ порціонъ происходитъ не только рвота, но и поносъ, по крайней мѣрѣ сначала; впоследствии же на оборотъ, даже при дѣйствіи рвотныхъ веществъ, рвота производится трудно, вѣроятно по уменьшенію чувствительности мозга.

б) Какъ отъ другихъ наркотическихъ веществъ, такъ и отъ опія замедляется *дыханіе* и кровотоеніе, между тѣмъ какъ раздраженіе къ кашлю, напр. при грудныхъ болѣзняхъ можетъ уменьшаться и исчезать. На *мочеотдѣленіе* медицинскіе приемы опія имѣютъ незамѣтное, во всякомъ случаѣ непостоянное вліяніе, такъ какъ нѣкоторые наблюдали умноженіе, а другіе уменьшеніе мочи; по почти всегда испраженіе мочи затрудняется или даже совершенно прекращается, вѣроятно влѣдствіе недостаточнаго сокращенія мочевого пузыря и брюшнаго пресса. Потому мочевой пузырь (напр. отравленныхъ опіемъ) наполненъ большимъ количествомъ мочи, если не спустили ея помощью катетера. Нѣчто подобное происходитъ въ *печени*, такъ какъ желчные каналцы и желчный пузырь наполнены желчью, которая не вливается въ тонкія кишки. Этотъ недостаточный переходъ желчи можетъ впоследствии разстроить образованіе кала и надлежащее движеніе къ заднему проходу содержимаго кишечника. Можетъ быть, что уменьшается также отдѣленіе *слизистой оболочки дыхательныхъ путей*, особенно когда оно было не нормально умножено. Но собственно не по этой причинѣ часто уменьшается или прекращается отъ опія изверженіе слизи и т. д.; скорѣе это большею частью зависитъ отъ уменьшеннаго раздраженія къ кашлю и меньшей потребности дыханія. Изъ дыхательныхъ

путей и ихъ (чувствительныхъ) нервовъ уже не легко происходить такъ назыв. рефлекторное движеніе, наблюдаемое въ кишечномъ каналѣ и прямой кишкѣ, въ мочевомъ пузырьѣ и кожѣ.

с) *Половая жизнь, половые органы* вообще, по видимому, не поражаются особенно отъ дѣйствія опія. Однако опій славится на востокѣ какъ средство, возбуждающее дѣтородныя части, особенно мужскаго пола, и отъ большихъ приемовъ опія у отравленныхъ, дѣтородный стволъ нерѣдко находится въ продолжительномъ напряженіи.

Едва-ли есть ядъ, къ дѣйствию котораго организмъ привыкаетъ легче, нежели къ опію. Когда уже привыкли къ нему, то и большіе приемы его мало или вовсе не дѣйствуютъ. Это наблюдаютъ особенно у привычныхъ опіеядовъ и курителей опія, у ееріакоядовъ на востокѣ, въ Китаѣ, также въ Англии и сѣверной Америкѣ. Когда принимаютъ, курятъ или жуютъ опій продолжительное время, то пищевареніе обыкновенно разстроивается, appetite исчезаетъ, и вмѣсто прежняго запора нерѣдко происходитъ поносъ. Половые органы до этого весьма раздраженные слабѣютъ, какъ и мышцы; теряется понятливость и память, и люди остаются въ этомъ недѣятельномъ и тупомъ состояніи, пока не прибѣгнутъ опять къ опію.

При высшей степени дѣйствія опія, скоро происходитъ острое отравленіе, и для этого, по видимому, обыкновенно требуются приемы по крайней мѣрѣ въ 10—15 гр., хотя въ нѣкоторыхъ случаяхъ достаточно также половины, у дѣтей можетъ быть уже нѣсколькихъ капель лавдана, и наоборотъ въ другихъ случаяхъ гораздо большіе приемы не производятъ столь сильнаго дѣйствія. Рѣдко происходитъ рвота или какой-либо другой припадокъ, обусловливающийся особеннымъ пораженіемъ пищеварительныхъ путей, и столь же мало наблюдаютъ припадки возбужденія, являющіеся нерѣдко при употребленіи малыхъ приемовъ. Но съ большою скоростью происходитъ головокруженіе, оглушеніе, упадокъ мышечной силы, и отравленный вскорѣ потомъ впадаетъ въ глубокой сонъ. Онъ лежитъ спокойно, и кожа или другія чувствительныя части не показываютъ слѣда чувствительности; мышцы расслаблены, нижняя челюсть опускается, на блѣдномъ лицѣ выражается смертный покой, а зрачекъ малъ и вовсе неподвиженъ. Дѣйствіе сердца почти прекращено, пульсъ такимъ образомъ чрезвычайно малъ, часто неправиленъ и едва ощутителенъ. Дыханіе совершается сначала свободно, но вскорѣ потомъ оно становится рѣже, глубже, и часто оно прерываемо вздохами; бывали даже случаи, что только въ каждые 3 — 5 минутъ дѣлалось одно дыханіе и пульсъ едва былъ замѣтнымъ. Въ дыхательныхъ вѣтвяхъ постепенно накапливается слизь, небная занавѣса нѣмѣетъ, происходитъ храпѣніе и наконецъ совершенный параличъ дыхательныхъ мышцъ. Кожа обыкновенно холо-

дна и влажна, отдѣленіе мочи прекращается, происходитъ также запоръ и наконецъ совершенный параличъ запирающихъ мышцъ (sphincteres), которыя еще при жизни разслаблены въ такой степени, какъ это обыкновенно бываетъ только у мертвыхъ, такъ что напр. можно ввести въ задній проходъ одинъ или два пальца безъ всякаго затрудненія. Отравленнаго нельзя разбудить никакимъ образомъ изъ смертнаго сна, и если это даже удастся, то онъ остается въ безсознательномъ состояніи и бредитъ спокойно и тихо. Только весьма рѣдко являются еще передъ смертью судороги. По большей части отравленіе кончается смертью въ теченіе 15—30 часовъ; если же въ это время больной не умираетъ, то смерть вообще происходитъ рѣдко. Но отъ большихъ приемовъ тотчасъ можетъ являться спячка и скорая смерть.

Если отравленные оправляются, то они обыкновенно выздоравливаютъ весьма скоро, и кромѣ нѣкотораго разстройства пищеваренія и т. п. съ сильною усталостью, иногда дрожаніемъ мышцъ и даже судорогами не остается замѣтныхъ слѣдовъ отравленія. Однако были случаи, что первые припадки исчезали, напр. отравленный могъ опять говорить, но потомъ снова подвергся оглушенію и глубокому сну и умираетъ.

*Леченіе отравленныхъ.* Всего важнѣе при этомъ скорое выведеніе яда посредствомъ желудочнаго насоса или сильнаго рвотнаго, цинковаго купороса, зметина (въ случаѣ нужды назначаютъ также клистиры). Жидкости должно употребить въ сколько возможно меньшемъ количествѣ, чтобы не способствовать къ растворенію и всасыванію опія, если его проглотили въ плотномъ состояніи. Весьма часто ядъ не извергается даже сильнѣйшими рвотными, и тогда остается только прибѣгать къ желудочному насосу.

Чтобы осаждать алкалоиды опія и дѣлать ихъ недѣйствительными, предлагали отвары, содержащіе дубильное вещество, также настойку чернильных орѣшковъ, однакожь дѣль, по видимому, не достигается ими. Позднѣе во всякомъ случаѣ остается только прибѣгать къ симптоматическому леченію, при чемъ должно предотвращать угрожающій упадокъ силъ и параличъ и особенно прекращеніе дыханія помощью возбуждающихъ средствъ (кофе, чай, камфоры, вина, нефтей, амміакальныхъ препаратовъ). Болѣе полезны, по видимому, обливанія головы холодною водою продолжительное время, во многихъ случаяхъ ими не только удалось пробудить отравленнаго изъ смертнаго сна и произвести дѣйствительное исцѣленіе. Въ случаѣ надобности назначаютъ также острораздражительные клистиры (напр. съ камфорой, водкою), горчицу и подобныя средства, раздражающія кожу; изрѣдка употребляли также электрогальванизмъ. При слабыхъ степеняхъ отравленія или въ первыхъ періодахъ, при сильномъ раздраженіи или приливѣ къ мозгу со всѣми при-

падками угнетенія мозга, кровоизвлеченіе часто оказываетъ хорошую пользу; однако достаточно мѣстное кровопусканіе, напр. рожки или пиявки за ушами или между лопатками. Притомъ въ такихъ случаяхъ внутреннее употребленіе кислотъ, холодной воды и др. предпочитается упомянутымъ возбуждающимъ средствамъ, при сонливости и т. д. кладутъ ледъ на голову.

Опій употребляется во врачеваніи вездѣ, гдѣ обнаруживается возбужденіе нервной жизни, отправленія нервныхъ центровъ, какъ и чувствительныхъ или двигательныхъ нервовъ, особенно же при возбужденіи мозга, опій вообще можетъ быть полезнымъ какъ успокоивающее, болеутолятельное и противосудорожное средство. Припадки такихъ болѣзненныхъ состояній, если пораженъ мозгъ, бываютъ бессонница, возбужденіе и постоянное беспокойство, часто бредъ, видѣнія и т. п.; при пораженіи чувствительныхъ и двигательныхъ нервовъ усиленная раздражительность, сильная боль, дрожаніе мышцъ, судорожное подергиваніе или сокращеніе однихъ или другихъ мышечныхъ органовъ. Но всѣ эти расстройства и припадки могутъ быть независимы отъ измѣненія тканей и строенія страдающихъ органовъ и такимъ образомъ представлять идиопатическія нервныя болѣзни или—что обыкновеннѣе встрѣчается—они обусловлены, по крайней мѣрѣ сопряжены съ вещественнымъ измѣненіемъ, какъ прилибомъ, воспаленіемъ, размягченіемъ, изъязвленіемъ, механическимъ давленіемъ пазвнѣ и т. д., также общимъ дискразическимъ состояніемъ, порочнымъ смѣшеніемъ крови и т. д., какъ при водянкѣ. Пораженіе спиннаго мозга обнаруживается отчасти подобными припадками въ частяхъ, въ которыхъ преимущественно развѣтвляются нервы спиннаго мозга, какъ члены, грудная и брюшная стѣнка, половые и мочевые органы, отчасти же усиленными рефлекторными движеніями, напр. кишечнаго канала, мочевого пузыря, матки, прямой кишки и сжимающихъ ее мышцъ, конечностей, нижней челюсти и т. д., далѣе (такъ назыв. рефлекторными) судорогами, корчею нижней челюсти и столбнякомъ.

Въ большей части изъ этихъ случаевъ опій можетъ считаться однимъ изъ вѣрнѣйшихъ палліативныхъ и успокоительныхъ средствъ, и особенно вѣтъ вещества, которое столь вѣрно производитъ сонъ и удаляетъ боль всякой степени, какъ опій. Онъ даже представляетъ отличное средство для прекращенія подобныхъ припадковъ (напр. личной боли) или предотвращенія ихъ, если прибѣгаютъ къ скорому и энергическому употребленію его. Это совершается тѣмъ вѣрнѣе, и мы можемъ, даже должны давать опій тѣмъ смѣлѣе, чѣмъ больше эти припадки могутъ считаться идиопатическими, чисто нервными; также чѣмъ спокойнѣе совершается кровообращеніе и біеніе пульса, чѣмъ нормальнѣе отдѣленія слизистыхъ оболочекъ, кожи и т. д., или также, чѣмъ они

обильнѣе. Наконецъ опій тѣмъ полезнѣе, чѣмъ больше больной изуренъ предшествовавшими болѣзнями, особенно значительною потерей соковъ, кровоизвлеченіемъ и т. д., или чѣмъ онъ слабѣе и раздражителнѣе вообще, между тѣмъ какъ напротивъ опій менѣе вѣренъ даже противъ нервныхъ страданій у вѣршихъ, полносочныхъ лицъ, особенно при склонности къ приливамъ важныхъ органовъ и преимущественно мозга.

По дѣйствию на кишечный каналъ и дыхательныя органы употребляютъ опій противъ поноса (съ болѣе значительнымъ измѣненіемъ тѣани кишечнаго канала, ободочной кишки или безъ этого), бленоройныхъ страданій дыхательныхъ вѣтвей и сильнаго раздраженія къ кашлю; далѣе по дѣйствию на кожу и ея выдѣлительныя процессы вездѣ, гдѣ нужно способствовать къ испаренію.

Сюда, по видимому, принадлежитъ употребленіе его въ нѣкоторыхъ случаяхъ кровотеченій.

Опій нерѣдко полезенъ также противъ другихъ болѣзней, непонятнымъ для насъ образомъ, потому что нельзя объяснить ихъ пзвѣстными физиологическими дѣйствіями его; такъ напр. при чрезмѣрномъ мочеотдѣленіи.

Изъ сказаннаго явствуетъ, что едва-ли есть болѣзнь, въ которой опій не могъ бы быть полезнымъ и конечно, наоборотъ, также вреднымъ, смотря по обстоятельствамъ.

Отдѣльныя болѣзни, противъ которыхъ употребляется опій особенно, слѣдующія:

1) *Болѣе общія нервныя страданія; разстройство отправленія спиннаго и черепнаго мозга.* Въ этихъ случаяхъ опій вообще полезенъ, по крайней мѣрѣ какъ палліативное средство, если эти страданія завясыть отъ возбужденія съ раздражительнымъ характеромъ, а не отъ измѣненія тѣани, отъ воспаленія или остраго прилива въ центральнымъ органамъ и ихъ оболочкамъ, и столь-же мало отъ кровотеченія въ нихъ (апоплексія) или же отъ опухолей и механическаго давленія вообще.

Такъ опій принадлежитъ къ сильнѣйшимъ средствамъ противъ различныхъ *нервныхъ припадковъ тѣяницъ* (*delirium tremens, chorea alcoholica, formicatio, convulsiones, tremor etc.*), если при этомъ нѣтъ настоящаго воспаленія мозговыхъ оболочекъ, что однако часто случается.

Въ *душевныхъ болѣзняхъ* какъ ипохондрія, уныніе, помѣшательство, особенно съ большимъ возбужденіемъ, бессонницею, раздраженіемъ, — при простыхъ и слабыхъ степеняхъ сумасшествія, помѣшательствѣ родильницъ, склонности къ меланхоліи, страданіяхъ, зависящихъ отъ возвышенной раздражительности, напряженія, бессонницы и т. д., или при особенномъ пораженіи половой жизни (*satyriasis, nymphomania*) часто давали опій съ успѣ-

хоть. Не менѣе благоприятно онъ дѣйствуетъ при сильномъ возбужденіи половыхъ органовъ.

Противъ бессонницы опій употребляютъ вообще, если она продолжительна, угрожаетъ изнурить больного и не зависитъ отъ воспаления или остраго прилива къ мозгу.

Весьма часто бессонница является безъ всякой замѣтной причины, не только у взрослыхъ, но и у дѣтей; у послѣднихъ неосновательное опасеніе вреднаго дѣйствія опія не всегда и не долго должно удерживать отъ осторожнаго употребленія его.

Изъ различныхъ, особенно судорожныхъ болѣзней, зависящихъ отъ неизвѣстныхъ еще разстройствъ нервной и душевной жизни, спиннаго и черепнаго мозга, опій всего полезнѣе у тѣхъ, которыя происходятъ отъ болѣзненнаго возвышеннаго рефлекторнаго дѣйствія центральныхъ органовъ; другими словами, когда уже вслѣдствіе незначительнаго вліянія на чувствительныя поверхности, на чувствительныя и ощущающіе нервы (часто, конечно, безъ периферическаго вліянія являются необыкновенно сильныя клоническія или тонические сокращенія мышечныхъ или тоникоконтрактильныхъ тканей, какъ въ произвольныхъ мышцахъ, въ сжимающихъ (sphinteres) и пр., въ гортанной щели, дыхательныхъ вѣтвяхъ и др. Такъ даютъ опій противъ истерическихихъ припадковъ, пляски св. Влѣта, эпилепсїи, водобоязни, лихорадки отъ ранъ, столбняка, дрожанія мышцъ, судорожной одышки, сухаго судорожнаго кашля (laryngismus stridulus), коклюша, вообще противъ сильнаго раздраженія къ кашлю (напр. при хроническомъ воспаленіи дыхательныхъ вѣтвей при нахожденіи воздуха въ груди, при легочной чахоткѣ, эмфиземѣ и накопленіи гноя въ легкихъ).

Противъ *эпилепсїи* можно употреблять опій только какъ палліативное средство. Иногда угнетаютъ или замедляютъ имъ припадки; но для полносочныхъ, при наклонности къ мозговымъ приливамъ и т. п., употребленіе опія во всякомъ случаѣ запрещается.

Другое дѣло въ нѣкоторыхъ случаяхъ *столбняка*, потому что нѣтъ средства, которое тутъ могло бы замѣнить опій; только большіе приемы онаго могутъ спасти больного.

Тоже самое, можетъ быть еще въ высшей степени, относится къ *водобоязни*, противъ которой слѣдовало бы побольше давать опій уже какъ палліативное средство. Однако при полномъ явленіи болѣзни онъ обыкновенно мало дѣйствуетъ и какъ облегчительное средство, даже въ самыхъ большихъ приемахъ.

Менѣе вѣрна польза опія противъ отдѣльныхъ нервныхъ припадковъ или страданія спиннаго и черепнаго мозга — напр. противъ бессонницы, возбужденія, сильнаго безпокойства, давленія мушекъ (caprophagia), подергиванія сухихъ жилъ, бреда, возрастающей слабости и т. д., — *припадки и сопряженія*, назы-



ваемые *нервозными, тифозными, атаксическими* и являющиеся обыкновенно при тифѣ; также въ другихъ случаяхъ и эпидеміяхъ родильной лихорадки, воспаления венъ, острыхъ сыпныхъ болѣзней, особенно сливающейся оспы; также въ нѣкоторыхъ видахъ и степеняхъ кроваваго поноса, холеры, перемежающейся лихорадки и т. д.

Въ подобныхъ случаяхъ, напр. въ тифѣ, мы отъ опія обыкновенно можемъ ожидать только палліативнаго дѣйствія противъ отдѣльныхъ припадковъ, однако и это часто имѣетъ благопріятное вліяніе. Когда такіе припадки являются внезапно, неожиданно и съ необыкновенною силою, или когда общее возбужденіе, продолжительная бессонница и бредъ, дрожаніе, судороги и т. п. угрожаютъ лишить изнуреннаго больнаго послѣдней силы, тогда самое приличное время прибѣгать къ опію, въ случаѣ надобности вмѣстѣ въ холоднымъ умываніямъ и обливаніямъ, теплымъ ваннамъ или возбуждающимъ средствамъ, къ вину, камфорѣ, средствамъ раздражающимъ кожу и т. д. Словомъ, поступаютъ тутъ какъ при бѣлой горячкѣ, съ которою состояніе нервной жизни имѣетъ большое сходство. Напротивъ достоянъ порицанія и вреденъ способъ нѣкоторыхъ французовъ, англичанъ и врачей въ сѣверной Америкѣ, которые съ самаго начала стараются прервать болѣзнь огромными приемами, или по крайней мѣрѣ дѣйствовать ими на теченіе и исходъ болѣзни. Не одного тифознаго больнаго привели они такимъ образомъ въ сонъ, изъ котораго онъ никогда не пробуждался.

Опій, по видимому, также полезенъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ *перемежающейся лихорадки*, когда напр. дрожь необыкновенно сильна, когда являются судороги или сильная рвота и поносъ, — такимъ образомъ въ нѣкоторыхъ видахъ, такъ назыв. *тифозной перемежающейся лихорадки* (*febris algida, cholericæ* и др.). Тутъ опій помогаетъ, если давать его во время, напр. предъ приступомъ и въ началѣ его (часто съ нефтями), не только противъ отдѣльныхъ припадковъ, но онъ также можетъ скорѣе превратить самый пароксизмъ, такъ что до открытія хины онъ считался однимъ изъ лучшихъ средствъ противъ перемежающейся лихорадки. Тогда давали опій въ большихъ приемахъ не долго передъ приступомъ лихорадки; теперь обыкновенно даютъ ихъ вмѣстѣ, если вообще имѣемъ показаніе къ употребленію опія.

2) *Больше мѣстныхъ, частныхъ страданій нервовъ; разстрой-ство отправленія отдѣльныхъ нервныхъ волоконъ и мышечныхъ частей*, какъ боль, невралгіи, судороги различныхъ органовъ и въ разныхъ болѣзняхъ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ опій весьма часто употребляется какъ болеутолятельное и противосудорожное средство.

Противъ всѣхъ весьма болѣзненныхъ страданій, особенно же противъ невралгіи, личной и нервной головной боли (ми-

грени), гастралгій и судорогъ желудка; далѣ противъ боли кишекъ и свинцовой колики; также противъ ревматическихъ страданій суставовъ и мышцъ.

При употребленіи опіи противъ *изжоги, судорогъ желудка и астралическихъ страданій* вообще не должно упускать изъ виду, что онъ часто разстраиваетъ пищеварительные процессы, замедляетъ ихъ необыкновеннымъ образомъ, и что должно другими средствами препятствовать или удалять запоръ, который при этомъ можетъ происходить. Часто въ такомъ случаѣ даютъ его съ магнезією и т. п. Опій (часто съ рвотнымъ камнемъ, рвотнымъ корнемъ) очень полезенъ противъ *ревматизма суставовъ*, особенно въ позднѣйшихъ періодахъ, въ хроническомъ состояніи, также противъ бедренной боли, *ломоты*; между тѣмъ какъ онъ въ острыхъ случаяхъ, при болѣе сильной лихорадкѣ негодится. Опій, говорятъ, менѣе полезенъ противъ боли весьма чувствительныхъ нервовъ, напр. пятой пары, при боли лица. Однако, напр. при зубной боли, онъ, какъ и эфированіе, принадлежитъ къ лучшимъ палліативнымъ средствамъ; вообще онъ составляетъ средство, къ которому можно сперва и вѣрнѣе прибѣгать при всѣхъ, часто внезапныхъ и загадочныхъ по происхожденію приступахъ сильной боли, напр. при боли печени, почекъ, лица, головы и др., также при весьма болѣзненномъ отдѣленіи мѣсячныхъ кровей, истерическихъ припадкахъ и необыкновенной сильной боли послѣ родовъ. Въ такихъ случаяхъ по крайней мѣрѣ достигаютъ цѣли тѣмъ, что при этомъ выигрываютъ время, удаляютъ первые опасные припадки, и потомъ можно тѣмъ вѣрнѣе приступать къ болѣе основательному леченію.

Опій можетъ считаться лучшимъ палліативнымъ средствомъ и противъ боли, являющейся столь часто при значительныхъ измѣненіяхъ въ строеніи тканей, при разнородныхъ образованіяхъ и опухоляхъ или другихъ припадкахъ: такъ напр. при весьма болѣзненныхъ ранахъ, язвахъ (напр. при меркуріальныхъ язвахъ въ полости рта) и мѣстномъ помертвѣніи, при цингѣ, сухомъ помертвѣніи (*gangraena senilis*) и пролежнѣ; при болѣзненной или зудящейся сыпи, желѣзистыхъ опухоляхъ; противъ болѣзненнаго раздраженія задняго прохода и прямой кишки при геморояхъ; далѣ при водянкѣ, нахожденіи воздуха въ груди (*pneumothorax*), нарывѣ въ легкихъ, какъ и при ракѣ желудка, грудныхъ желѣзъ, матки, прямой кишки и т. д.

Опій еще полезенѣе при біеніи и т. п. въ головѣ, которое сопровождается болью и круженіемъ головы, какъ это часто встрѣчается при изнуреніи, малокровіи и послѣ большой потери крови.

Его употребляютъ также противъ сильнаго *голода* и *жажды*, когда удовлетвореніе ихъ невозможно или опасно по случаю бо-

лѣзней глотательныхъ и пищеварительныхъ органовъ, напр. воспаленія, продыравленія и язвъ желудка и кишечнаго канала, также медовитаго мочеотдѣленія и др.

Какъ противосудорожное средство опій при обстоятельствахъ также заслуживаетъ величайшаго вниманія (хотя можетъ быть менѣе сонной одури, бѣлены и др.), особенно когда нужно вы- стѣ дѣйствовать противъ боли, раздраженія и т. п. Такъ при судорожныхъ страданіяхъ мочеиспускательнаго канала, мочеваго пузыря, съ образованіемъ песка и камня или безъ этого; про- тивъ судорогъ и боли при введеніи бужей и катетеровъ въ мо- чеиспускательный каналъ (особенно при стриктурахъ). Далѣе при судорогахъ, какъ и весьма болѣзненныхъ или чрезмѣрныхъ сокращеніяхъ матки при родахъ; противъ судорогъ мышечной оболочки желудка и кишекъ, грудобрюшной преграды (при лю- тѣ) и при судорожномъ смѣхѣ; противъ чрезмѣрной рвоты (хо- леры) и поноса, какъ напр. послѣ сильнаго дѣйствія рвотныхъ и слабительныхъ веществъ; при (такъ назыв. нервной) рвотѣ беременныхъ и при морской болѣзни. Такъ какъ предохраняю- щее средство при угрожающемъ или уже начинающемся «выпа- дышѣ» опій (внутрь или въ видѣ клистира) часто успокаивалъ нервную систему и матку и предотвращалъ роды. Наконецъ должно еще упомянуть объ употребленіи опіи противъ припад- ковъ, которые обыкновенно приписываютъ существованію и пе- ремѣненію *желчныхъ камней* въ шейкѣ желчнаго пузыря и жел- чныхъ каналахъ, — какъ противъ боли, судорогъ, желтушнаго окрашенія кожи и рвоты.

Часто тутъ, конечно, припадки завязятъ не отъ желчныхъ камешковъ, а скорѣе отъ раздражительнаго или воспалительнаго состоянія желчнаго пузыря и желчныхъ канальцевъ — совсмѣ независимо отъ всѣхъ каменнстыхъ отложеній. Всегда однако опій представляетъ хорошее противъ нихъ средство.

3) *Конгестивная, острожсудативная (воспалительная) со- стоянія и ихъ послѣдствія; острая, сыпная болѣзни и т. д.* Противъ этихъ болѣзней по себѣ опій дѣйствуетъ только при особенныхъ обстоятельствахъ; часто однакъ являются еще дру- гіе припадки, или эти самыя болѣзни развиваются при обстоя- тельствахъ, которые требуютъ употребленія опія.

4) По дѣйствию опія противъ *усиленныхъ процессовъ отдѣленія*, особенно слизистыхъ оболочекъ, его употребляютъ противъ по- носса съ пзъязвленіемъ слизистой оболочки кишекъ или б. зъ этого. также противъ *кровоаваго поноса* и *холеры*. Даже въ азиатской холерѣ опій, принятый въ самомъ началѣ, представляетъ одно изъ лучшихъ средствъ для удаленія или по крайней мѣрѣ для уменьшенія рвоты и поноса. При *слизетеченіи дыхательныхъ путей* при обильномъ нагноеніи туберкулезныхъ легкихъ, опій, по видимому, часто уменьшаетъ отдѣленіе, хотя онъ тутъ дѣй-

ствуетъ большею частью короткое время и рѣдко съ значительна-  
во Тоже самое должно сказать о его дѣйствіи противъ мерку-  
ріальнаго слюнотеченія, между тѣмъ какъ онъ (напр. при впры-  
скиваніи) дѣйствуетъ благопріятнѣе противъ хроническаго на-  
тарра мочевого пузыря и передоя, какъ и мѣстно при употре-  
бленіи его противъ насморка.

Опій, по видимому, полезнѣе всѣхъ эмпирическихъ средствъ,  
противъ чрезмѣрнаго *отдѣленія почекъ (diabetes)*. Часто умень-  
шается количество мочи довольно скоро послѣ принятія опія, а  
если и потомъ болѣзнь возвращается, то часто однако помощью  
опія и другихъ приличныхъ, особенно діететическихъ мѣръ мож-  
но ограничить отдѣленіе мочи до извѣстной степени. Опій часто  
оказывался полезнымъ также противъ *альбуминурии* съ образо-  
ваніемъ мясныхъ сосочковъ въ почкахъ, изліяніемъ воды въ  
брюшную полость и т. д., или безъ всего этого.

Наконецъ сюда относится употребленіе опія противъ *крово-  
теченій*, особенно желудка, матки и легкихъ. Но его нельзя да-  
вать при такъ назыв. активныхъ приливахъ къ этимъ органамъ,  
когда пульсъ полонъ и твердъ, или когда потерялось мало крови.  
Напротивъ, когда кровотеченіе происходитъ у вѣжныхъ, весьма  
чувствительныхъ лицъ, когда потеря крови была значительна,  
когда вмѣстѣ существуютъ боль, судороги или другіе признаки  
раздраженія пораженныхъ органовъ, то опій часто дается съ  
успѣхомъ, также въ случаяхъ крайней опасности.

При *кровомотъ поносъ* средней пріемъ опія, принятый вече-  
ромъ, часто можетъ доставлять по крайней мѣрѣ относительный  
покой въ теченіи ночи. Еще полезнѣе онъ обыкновенно при  
внезапномъ появленіи чрезмѣрной рвоты и поноса, при такъ  
назыв. *спорадической холерѣ*. Иногда даже послѣ изверженія  
содержимаго желудка не прекращается еще душеніе, рвота и  
якота, и когда капли жидкости прикасаются къ глотательнымъ  
органамъ, къ желудку, то является судорожная рвота или по-  
носъ, съ жгненіемъ и сильною болью. Тутъ-то именно самое  
приличное время для употребленія большихъ пріемовъ опія, въ  
случаѣ надобности въ видѣ клистира.

5) Нерѣдко опій готовится какъ *вспомогательное и  
исправляющее* средство, къ другимъ лекарствамъ, чтобы вмѣстѣ  
достигнуть и дѣйствія опія, также чтобы препятствовать или  
уменьшить дѣйствія другихъ веществъ на пищеварительные пу-  
ти и т. д., или наоборотъ, чтобы какии-либо образомъ спо-  
собствовать къ ихъ дѣйствіямъ. Съ послѣднею цѣлью прибав-  
ляютъ опій къ другимъ наркотическимъ веществамъ, съ первою  
цѣлью напр. къ хинной коркѣ и ея алкалоидамъ, также къ вяжу-  
щимъ веществамъ, а съ іодомъ и рутью его часто даютъ,  
чтобы препятствовать дѣйствію ихъ на слюнныя железы, или

Чтобы поддержать другія общія дѣйствія ихъ, — цѣль, которая достигается впрочемъ довольно рѣдко.

При внутреннемъ употребленіи опій дѣйствуетъ вѣрно и сильно; общія дѣйствія его благотвѣтельны для больного, но мѣстные дѣйствія опія вообще ненадежны, и даже тѣ отдаленныя дѣйствія опія, которыя происходятъ при наружномъ употребленіи (на коожъ, въ прямую кишку), не могутъ быть опредѣляемы съ вѣрностью. Хотя иногда наблюдается, что относительно малые приемы, употребляемые въ клистирѣ, дѣйствуютъ съ неожиданною силою, и въ другихъ случаяхъ (напр. при зубной боли, воспаленіи глазъ) наружное употребленіе его нерѣдко оказывается полезнымъ; но часто бываетъ наоборотъ, такъ что всего болѣе затрудняются въ вѣрномъ опредѣленіи приемовъ. Вообще употребляютъ опій снаружи вездѣ, гдѣ назначаютъ сонную одурь, аконитъ и бѣлену, а именно:

1) Чтобы привести мѣство въ самыхъ прикосновенныхъ частяхъ успокоительное, противосудорожное и болеутолятельное дѣйствіе—въ случаяхъ, о которыхъ мы уже упомянули выше. Такъ употребляютъ опій противъ боли и судорогъ доступныхъ снаружи частей, противъ невралгій, болѣзненной чувствительности, раздраженія, противъ свѣтобоязни и т. д., воспаленія глазъ и остающихся послѣ этого припадковъ, многихъ накожныхъ болѣзней съ зудомъ, жженіемъ и даже при рактъ кожи; далѣе противъ насморка, ушной и зубной боли, мигрени, бѣдренной боли, противъ раздраженія къ кашлю, сильной грудной боли чахоточныхъ и т. д. (во всѣхъ этихъ случаяхъ въ видѣ мази или пластыря для груди и другихъ болѣзненныхъ частей). Далѣе при востоядѣ зубовъ, при язвахъ въ полости рта и на коожъ, также при болѣзненныхъ помертвѣлыхъ язвахъ (напр. для присыпки послѣ очищенія ихъ): при болѣзненныхъ стрададаніяхъ суставовъ и опухоляхъ; при сифилитическихъ язвахъ и другихъ страданіяхъ половыхъ органовъ, при переломѣ съ болѣзненнымъ напряженіемъ и искривленіемъ дѣтороднаго ствола, при незалупѣ и неотлупѣ (*phymosis et paraphymosis*), напр. для примочекъ, клистира; при невралгіяхъ и судорогахъ мочеиспускательнаго канала, мочеваго пузыря или матки, при рактъ прямой кишки, также при полипахъ носа и т. д. по вяжущему дѣйствію опія. Наконецъ при вщемленныхъ грыжахъ, при выпаденіи прямой кишки или рукава, чтобы облегчить вправленіе ихъ.

Во многихъ изъ упомянутыхъ случаевъ опій однако дѣйствуетъ менѣе сильно и вѣрно, нежели другія наркотическія вещества, напр. сонная одурь, аконитъ, или морфій заслуживаютъ преимущества предъ опіемъ въ плотномъ состояніи. Обыкновенно и тутъ мѣстное дѣйствіе опія скорѣе обуславливается дѣйствіемъ его на спинной и черенной мозгъ и т. д. И въ но-

вѣйшее время излечивали, говорятъ, даже раковыя язвы, ракъ кожи лепешкою изъ опія, хотя роль, которую при этомъ игралъ опій, неясна.

2) По общимъ его дѣйствіямъ въ случаѣ, гдѣ внутреннее упстребленіе невозможно или недостаточно, какъ при помѣшательствѣ, меланхоліи, корчѣ нижней челюсти, водобоязни, отравленіи острыми веществами и т. д.,—вообще при обстоятельствахъ, гдѣ больной не можетъ или не хочетъ принимать внутрь, или проглоченное тотчасъ извергаетъ рвотою.

При наружномъ употребленіи всегда должно имѣть въ виду, что на нѣжныхъ или изъязвленныхъ мѣстахъ кожи, также въ прямой кишкѣ, даже въ мочеиспускательномъ каналѣ и рукавѣ совершается всасываніе морфія и другихъ составныхъ частей опія, и такимъ образомъ отъ большихъ приѣмовъ легко можетъ происходить отравленіе.

Опредѣленіе приѣмовъ у такого средства, какъ опій, почти невозможно, такъ какъ это зависитъ отъ состоянія больныхъ и ихъ воспримчивости къ дѣйствію опія и отъ привычки къ нему.

Опій обыкновенно даютъ въ порошокѣ, съ сахаромъ или въ видѣ пилюль и болюса съ вытяжкою солодковаго корня и подобными воспринмающими средствами, смотря по обстоятельствамъ вмѣстѣ съ другими лекарствами. Въ жидкомъ видѣ онъ менѣе прилипченъ, потому что нельзя при этомъ точно опредѣлить приѣма; однако иногда даютъ опій съ сахаромъ и слизью арав. камеди или стертый съ яичнымъ желткомъ и водою, слизистыми отварами и т. п. Часто назначаютъ его также съ чернымъ кофе.

Для *наружнаго употребленія* часто пользуются настойками или подобными растворами и эмульсіями опія, иногда съ прибавленіемъ жирныхъ маселъ, — для впрыскиванія и клистировъ (для послѣднихъ приѣмы сначала никогда не должны быть больше, нежели при внутреннемъ употребленіи). Язвы присыпаютъ порошкомъ опія съ крахмаломъ и т. п., или дѣлаютъ лепешку—съ водою—и прикладываютъ, напр., на раковыя язвы (по удаленіи корки); прибавляютъ его также къ припаркамъ, въ соединеніи съ бѣленою, сонною одурью и омегомъ. Опій назначается также въ большихъ пилюляхъ и сосульбахъ. Можно бы-ло-бы назначать его также въ видѣ пластыря, прибавляя къ пластырнымъ массамъ или къ растопленной смолѣ (1 ч. опія на 4—8 ч. воспринмающаго средства), но въ такомъ видѣ онъ рѣдко производитъ вѣрное и сильное дѣйствіе. Для куренія, опій употребляется рѣдко; бросаютъ 10—20 гр. на угли и вдыхаютъ паръ, напр. при одышкѣ и др.

Изъ опія готовится:

1) *Экстрактъ (Extractum Opii)* получается извлеченіемъ опія перегн. водою и выпареніемъ до суха; плотень. превращается въ порошокъ. Этотъ экстрактъ дѣйствуетъ, по вѣдому, почти какъ опій въ плотномъ состояніи, и его можно давать въ тѣхъ же видахъ, только немного меньшими приемами (около  $\frac{1}{2}$  меньше). Для наружнаго употребленія, напр. для глазныхъ примочекъ, его можно растворять въ водѣ.

2) *Доверовъ порошокъ (Pulvis Ipecacuanhae opiatas (s. compositus) Pulvis Doveri)*, состоитъ изъ опія и рвотнаго корня и сѣрнокислаго кали; 10 гр. его содержатъ 1 гр. опія. Этотъ препаратъ дѣйствуетъ слабѣ другихъ, и употребляется преимущественно какъ потогонное средство. Но какъ, безъ сомнѣнія, опій составляетъ самую дѣйствующую составную часть этого порошка, то понятно, что его можно давать только при обстоятельствахъ, не представляющихъ противопоказаній къ употребленію опія. Вообще къ этому порошку относится все, что было сказано у опія, и такъ какъ сѣрнокислое валп тутъ довольно излишне, то лучше прописывать опій съ рвотнымъ корнемъ и сахаромъ магистрально. Это тѣмъ приличнѣе, такъ какъ при долгомъ лежаніи въ коробкахъ верхніе слои Доверова порошка часто содержатъ больше опія и рвотнаго корня, нежели нижніе слои.

3) *Опійная настойка (Tinctura Opii simplex)* получается вымачиваніемъ опія въ винномъ спиртѣ и водѣ. Употребляется, подобно всѣмъ настойкамъ опія, въ случаяхъ, гдѣ онъ не переносится или не можетъ быть принятъ въ плотномъ состояніи, напр. у дѣтей, при корчѣ нижней челюсти, также когда желаютъ достигнуть весьма скорого дѣйствія на нервную систему.

Принимаютъ отъ 5—15 капель и больше, и въ тѣхъ же приемахъ для клистира. Часто употребляютъ настойку сна; ужн, съ водою, наливкамъ и т. п. для глазныхъ и другихъ примочекъ, полосканій, впрыскиванія, зубныхъ и глазныхъ капель и т. д., Мѣстно (напр. на глазахъ при воспаленіи ихъ) она немного меньше раздражаетъ, нежели лауданъ. Для малолѣтнихъ дѣтей должно опредѣлять приемы весьма осторожно, даже 1 до 2 капель внутрь и въ клистирѣ производили сильныя дѣйствія. Иногда и самые осторожные приемы слишкомъ сильны, какъ у всѣхъ наркотическихъ настоекъ, потому что растворъ можетъ концентрироваться постепеннымъ испареніемъ жидкости, такъ что дѣйствіе становится вдвое сильнѣе.

4) *Сиденгамовъ лауданъ (Tinctura Opii crocatus; Laudanum liquidum Sydenhami (Vinum Opii))*, готовится вымачиваніемъ опія, шафрана, индійской корицы (cass. cinnam) и гвоздики въ мадерѣ или малагѣ. Лауданъ возбуждаетъ въ болѣе высокой

степени, и особенно приличенъ въ случаяхъ, гдѣ желаютъ вѣ-  
сть шадить желудокъ или при судорогахъ, гастралгій, холерѣ,  
чрезмѣрной рвотѣ и простомъ поносѣ. Принимаютъ отъ 10—  
20 капель по нѣскольу разъ, по себѣ или съ другими настойка-  
ми, напр. съ *Tinct. cinnam. Liq. Ammoniaci vin., succin., Tinct. Valerian.*,  
съ мускусомъ, камфорою и подобными веществами, также съ  
мигстурамп.

Снаружи можно употреблять лауданъ только когда желаютъ  
достигнуть мѣстнаго раздражающаго дѣйствія его, которое  
является сначала, или когда оно по крайней мѣрѣ не вредитъ;  
всего чаще пользуются имъ при воспаленіи глазъ съ большою  
чувствительностью вѣкъ и глазнаго яблока, съ свѣтобоязнью  
или судорогами вѣкъ. Тутъ онъ сначала производитъ сильную  
боль, но этимъ именно онъ отчасти уничтожаетъ чрезмѣрную  
чувствительность. Также должно знать, что онъ окрашиваетъ  
кожу на нѣкоторое время желтымъ цвѣтомъ. Рѣже онъ упо-  
treбляется въ концентрированномъ видѣ, напр. намазываютъ  
имъ мясные наросты, венерическія шишки и носовые полипы,  
или вкапываютъ въ глазъ, чаще смѣшанный съ 2—3 ч. персн.  
воды. Напитанные имъ компрессы часто прикладываютъ, напр.  
въ опухолямъ желѣзъ или яичекъ; въ видѣ клистира и вры-  
сыванія употребляютъ его нерѣдко противъ колики, раздраже-  
нія половыхъ органовъ и т. д.

5) *Болеутолительный элексиръ (Tinctura Opii benzoica (Elixir  
paregoricum))*, получается настаиваніемъ опія и камфоры въ анисо-  
вомъ маслѣ, росноладанной кислотѣ и винномъ спиртѣ. Сла-  
бый и излишній препаратъ, у котораго едва-ли можно приписать  
опій въ расчетъ; его даютъ еще развѣ только дѣтямъ какъ  
противосудорожное средство при коклюшѣ и другихъ судорож-  
ныхъ страданіяхъ, въ приемахъ отъ 10—20 капель.

Другіе приготовляемые въ аптекахъ опійные препараты мало  
употребительны и потому мы не упоминаемъ о нихъ.

*Морфинъ*, алкалоидъ маковыхъ растений, представляетъ самую  
дѣйствительную и притомъ всего лучше извѣстную составную  
часть опія, въ которомъ онъ вѣроятно соединенъ съ меконовою  
кислотою. Получается при обработываніи водянаго экстракта  
известью, хлористымъ кальціемъ или нашатыремъ, растворе-  
ніемъ выдѣленнаго морфія въ соляной кислотѣ и разложеніемъ  
солекарбоната морфія аммиакомъ (или нашатыремъ и известковымъ  
молокомъ). Кристаллическое вещество, бѣловатаго цвѣта или  
бѣзцвѣтное, не измѣняется на воздухѣ, весьма горькаго вкуса  
(какъ и всѣ соли его), вовсе не растворяется въ эфирѣ, весьма  
немного ( $\frac{1}{1000}$ ) въ холодной водѣ, немного больше въ кипячей,  
еще больше въ холодномъ и особенно въ горячемъ алкоголѣ, а  
всего легче наконецъ въ эфирныхъ и жирныхъ маслахъ, въ ще-



докъ кали и натра, известковой водѣ, также въ разведенныхъ кислотахъ, напр. въ сѣрной, соляной, азотной и уксусной кислотахъ. Съ этими-то кислотами морфій образуетъ соли, которыя употребляются терапевтически.

*Физиологическія дѣйствія* морфія и его солей, по видимому, совершенно одинаковы и вообще сходствуютъ съ дѣйствіями опія, однако неполнѣе. Такъ морфій, по видимому, отличается отъ опія особенно тѣмъ, что онъ не возбуждаетъ въ такой степени, и менѣе ускоряетъ дѣйствіе сердца и обращеніе соковъ, и напротивъ обыкновенно дѣйствуетъ больше на желудокъ, менѣе производитъ запоръ, а при большихъ приемахъ можетъ произвести даже поносъ. Дѣйствія же весьма большихъ приемовъ показываютъ нѣкоторое сходство съ дѣйствіями спильной кислоты. Особенно его вліяніе на мозгъ и душевную жизнь не обнаруживается такимъ-же образомъ, какъ при употребленіи опія, не происходятъ, напр. такіа живыя сновидѣнія и потомъ не такой глубокой сонъ.

Мѣсто морфій, при эндерматическомъ употребленіи, обыкновенно производитъ зудъ и жжение, особенно на нѣжной, чувствительной кожѣ, у женщинъ; часто мѣсто употребленія покрывается потомъ, и могутъ даже происходить различныя сыпи, прыщеватая, пузырьчатая и др. Кроме того, часто наблюдали при такомъ наружномъ употребленіи сухость въ зѣвѣ, жажду, иногда тошноту, потерю аппетита съ запоромъ и затрудненіе при мочеиспусканіи.

Принятый внутрь, морфій, часто уже въ малыхъ приемахъ ( $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  гр. и больше), разстроиваетъ пищевареніе, даже можетъ происходить рвота, уже по весьма горькому и противному вкусу его. Нередко онъ сначала производитъ запоръ, особенно при эндерматическомъ употребленіи, между тѣмъ какъ отъ внутренняго употребленія его часто происходитъ поносъ съ самаго начала. Но еще постояннѣе дѣйствія его на нервную жизнь, такъ что является боль и круженіе головы, незначительное оглушеніе и сонливость, а зрачекъ суживается. Пульсъ не измѣняется, по крайней мѣрѣ непостоянно,—по нѣкоторымъ онъ становится рѣже. Напротивъ въ носу, также въ кожѣ происходитъ несносный зудъ и жжение, особенно на спинѣ, часто даже постепенно по всему тѣлу, и затѣмъ обыкновенно слѣдуетъ краснота, приливъ и воспаленіе кожи, послѣднѣе всего чаще на лицѣ, на шеѣ и въ поясницѣ и можетъ образоваться даже прыщеватая, пузырьчатая и крапивная сыпь и т. п. Вмѣстѣ съ тѣмъ кожа покрывается сильнымъ потомъ, особенно у женщинъ, у которыхъ кожа вообще поражается скорѣе. Половая жизнь и мочевые пути часто претерпѣваютъ дѣйствіе морфія, которое впрочемъ мало отличается отъ дѣйствія опія. Часто, напр. мочеиспусканіе совершается съ нѣкоторымъ затрудненіемъ, вѣроятно по недо-

статочному сокращенію мочевого пузыря и брюшныхъ мышць; количество мочи часто, по видимому, уменьшено.

Отъ большихъ приемовъ поражаются особенно нервныя центры и душевная жизнь въ высокой степени, по большей части безъ замѣтнаго страданія нервныхъ прикосновенныхъ частей, безъ боли желудка, рвоты и т. д. Зрѣніе темнѣетъ и исчезаетъ. Происходитъ головокруженіе, зрачекъ въ высшей степени суженъ, является слабость, спячка, дрожаніе мышць, даже судорога, короткое дыханіе, часто съ сильною одышкою. Наконецъ, происходитъ оглушеніе, коматозное состояніе и корча нижней челюсти или настоящій столбнякъ, и при такихъ и другихъ припадкахъ можетъ являться смерть отъ задушенія или вследствие апоплексическихъ припадковъ.

Почти тѣже самыя дѣйствія происходятъ, употребляется-ли морфій снаружи, эндерматически, или вводится въ прямую кашку, непосредственно въ вену или наконецъ въ желудокъ. По нѣкоторымъ онъ при эндерматическомъ употребленіи скорѣе всасывается и сильнѣе дѣйствуетъ, нежели принятый въ желудокъ.

*Трансвентическое его употребленіе* вообще какъ у опія. Однако при этомъ обыкновенно полагаютъ, что морфій возбуждаетъ нервную жизнь, кровообращеніе и т. д.; что онъ мало или вовсе не производитъ запора, менѣе ограничиваетъ отдѣленіе дыхательныхъ вѣтвей и выхаркиваніе мокроты, а напротивъ сильнѣе и вѣрнѣе успокоиваетъ чувствительныя нервы (напр. при болѣзненныхъ страданіяхъ) и вообще нервную систему. Особенно же его справедливо предпочитаютъ во всехъ случаяхъ, гдѣ желаютъ достигнуть успокоительнаго, противосудорожнаго и болеутолятельнаго дѣйствія *наружнымъ*, особенно эндерматическимъ употребленіемъ. Такимъ образомъ пользуются морфіемъ и его солями при невралгіяхъ (лицной, головной, желудочной и бедренной боли), острымъ ревматизмъ суставовъ и другихъ болѣзненныхъ страданіяхъ (напр. при разѣдающихъ язвахъ, ракъ, весьма болѣзненныхъ шанкерахъ и другихъ язвахъ), воспалительныхъ состояніяхъ упомянутого при опіи рода, напр. при воспаленіи глазъ, сифилитическомъ воспаленіи радужной оболочки, сифилитической боли костей, хроническомъ воспаленіи желудка, кровавомъ поносѣ и т. д. Далѣе назначаютъ его какъ снотворное, успокоительное и палліативное средство вообще противъ спльнаго раздраженія къ кашлю при чахоткѣ, водянкѣ и т. д., не ограничивая притомъ выхаркиванія или испраженія, чего опасаются (большею частью безъ основанія) при употребленіи опія. Морфій можно употреблять съ большею вѣрностью, нежели опій, также при помѣшательствахъ и сродныхъ душевныхъ расстройствѣхъ съ возбужденіемъ, бессонницею и т. д., при страданіяхъ сердца и нѣкоторыхъ видахъ одышки. Во многихъ случаяхъ воспаленія околосердечной сумки съ большимъ измѣ-

нiемъ и отъ большихъ приѣмовъ морфія видно по крайней мѣрѣ облегченіе сильной боязливости, одышки и чрезмѣрнаго сокращенія сердца; подобныхъ палліативныхъ дѣйствій можно было-бы ожидать при эксудативномъ воспаленіи брюшины, тутъ однако преимущественно отъ эндерматическаго употребленія, чтобы какъ можно меньше тревожить желудокъ и кишечный каналъ.

Дальнѣйшее его употребленіе существенно сходно съ тѣмъ, что было приведено у опія. Въ обыкновенныхъ случаяхъ опіи всегда заслуживаетъ преимущества, если нѣтъ важныхъ противопоказаній относительно его дѣйствія на теплоту тѣла, сосудистую систему и т. д.; однако такія противопоказанія принадлежатъ къ исключеніямъ. Притомъ, у опія не нужно такъ тщательно опредѣлять приѣмовъ и кругъ его дѣйствія несравненно больше. Но особенно при *отравленіи стрижниномъ*, также при столбнякѣ, при сильныхъ продолжительныхъ судорогахъ и срочныхъ состояніяхъ морфіи вообще, говорятъ, заслуживаетъ преимущества, по скорѣйшему и сильнѣйшему дѣйствию, также потому, что тутъ нѣрѣдко эндерматическое употребленіе необходимо.

Приѣмъ морфія и его солей при внутреннемъ употребленіи всегда  $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{2}$  гр., предусмотрительно увеличивая приѣмъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ до 1 даже до 2 гр., по нѣскольку разъ въ день; если же прекращаютъ употребленіе на нѣкоторое время, то потомъ должно начинать опять только съ малыхъ приѣмовъ. При эндерматическомъ употребленіи обыкновенно можно брать немного побольше, по  $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{2}$  гр., смѣшивая его немного съ сахаромъ. Чистый морфіи употребляется рѣдко, всего чаще уксуснокислая соль его, хотя солянокислый или серновокислый морфіи несравненно лучше препараты. Ихъ даютъ внутрь въ порошокъ, пилюляхъ, болуся или въ растворѣ, и избѣгаютъ прибавленія всѣхъ минеральныхъ, особенно металлическихъ веществъ, также всѣхъ растительныхъ средствъ, содержащихъ дубильное вещество.

*Уксуснокислый морфіи (Morphium aceticum)*. Получается раствореніемъ морфія въ уксусной кислотѣ. Кристаллизуется и имѣетъ весьма горькій вкусъ; легко растворяется въ водѣ, мѣтѣ въ винномъ спиртѣ, на воздухѣ онъ со временемъ теряетъ немного уксусной кислоты, и потому, по крайней мѣрѣ отчасти, также растворимость. Если эту соль желаютъ давать внутрь въ видѣ раствора, то должно прибавлять нѣсколько капель уксусной кислоты, чтобы получить опять среднюю, растворимую соль.

*Морфіи сернокислый (Morph. sulphuricum)*. Получается раствореніемъ морфія въ серной кислотѣ. Кристаллическая масса, легко растворимая въ водѣ, винномъ спиртѣ, не пзмѣняется въ послѣдствіи. Эта соль назначается довольно рѣдко.

Проція основныя, кристаллизующіяся составныя части опія недостаточно извѣстны даже въ химическомъ отношеніи и гораздо менѣе еще какъ касательно дѣйствія ихъ, и потому ихъ мало или вовсе не давали больнымъ.

*Тебаинъ или Параморфинъ* (*Thebainum s. Paramorphinum, Paramorphia*), имѣетъ острый вкусъ; дѣйствуетъ, во видимому, на подобіе морфія, однако слабѣе и менѣе постепенно; но, говорятъ, что онъ можетъ причинить сильнѣйшія судороги.

*Кодеинъ* (*Codcinum Papaverinum*), кристаллизующійся алкалоидъ, растворяется довольно трудно въ водѣ, но легко въ алкогольѣ и эфирѣ. Дѣйствуетъ несравненно слабѣе морфія, по нѣкоторымъ даже слабѣе опія, а также онъ мѣстно сильно раздражаетъ, возбуждаетъ кровообращеніе и, напротивъ, менѣе или вовсе не оглушаетъ подобно опію. Другіе-же приписываютъ ему сильно оглушающія свойства. Его назначали какъ успокоительное средство противъ судороги желудка, гастралгіи и среднѣхъ страданій, почти какъ морфію, однако, по видному, безъ особеннаго успѣха.

*Папаверинъ*, основное вещество опія, не растворяется въ водѣ, сѣрною кислотою онъ окрашивается темносинимъ цвѣтомъ, не дѣйствуетъ даже въ большихъ приемахъ, по крайней мѣрѣ у животныхъ.

*Наркотинъ или опіанъ* (*Narcotinum s. Narcotina s. Opian*), почти вовсе не растворяется въ водѣ, трудно растворимъ въ алкогольѣ, легче въ эфирѣ, эфирныхъ и жидкихъ маслахъ. Прежде его считали за собственно оглушающее или наркотическое, потомъ за раздражающее, возбуждающее начало опія, но наконецъ оказалось, что онъ почти не дѣйствителенъ. Во всякомъ случаѣ неизвѣстно съ точностью, какимъ образомъ онъ дѣйствуетъ. Его испытывали противъ судорогъ, невралгій, ревматизма и т. д., также въ перемеж. лихорадкѣ.

*Норцинъ*, еще неизслѣдованъ съ точностью относительно дѣйствій, но по многимъ наблюденіямъ онъ едва-ли дѣйствуетъ ядовито даже въ большихъ приемахъ, во всякомъ случаѣ не столь сильно, какъ морфію.

*Мексиканская кислота* растворяется въ водѣ и алкогольѣ; также не дѣйствующее вещество, хотя ее прежде считали ядовитою. Прежде думали, что она также полезна противъ одышки, судорогъ и ленточнаго глиста.

\* *Paris quadrifolia* L. (*Вороненъ; вороний глазъ; одноплодникъ*. — *Vierblättrige Einbeere*. — *Raisin de renard*). Растетъ по прогалинамъ тѣнистыхъ лѣсовъ.

Листья и ягоды этого растенія употребляются снаружи въ видѣ катеплазмы въ злокачественныхъ нарывахъ, опасныхъ воспаленіяхъ глазъ и ногтей. Корень этого растенія имѣетъ

самую легкую рвотную силу и своимъ дѣйствиємъ можетъ за-  
жвѣнить дорогую перувианскую ипекакуанну. Онъ полезенъ для  
облегченія желудка при излишествѣ мокротъ, причиняющихъ  
невареніе пищи и тяжесть въ груди; дается также для очищенія  
желудка въ желчныхъ лихорадкахъ.

Дается корень въ порошокъ съ сахаромъ или солодковымъ  
корнемъ: по 1 или 2 грана, каждые два часа; для рвотнаго:  
отъ 40 гранъ до полудражды и 3 скрупуловъ, заливая теплою  
водою или чаемъ, какъ выше сказано; для наливки полагаются  
2 дражды на 6 унцій кипячей воды, которую принимаютъ  
каждый часъ по столовой ложкѣ. Въ клистерахъ помогаетъ въ  
подвздошномъ колотѣ. Трава и ягоды снаружи прикладываются  
въ видѣ сырой катаплазмы и припарки.

\* *Parnassia palustris* L. (*Золотничка болотная; перелой-  
ная трава.*—*Sumpf Parnassie.*—*Foin du Parnasse*). Растетъ по  
гористымъ и влажнымъ мѣстамъ.

Трава и цвѣты ~~запаху~~ не имѣютъ; вкусъ ихъ горьковато-  
вяжущій.

Дѣйствіе золотнички вяжущее.

Траву и цвѣты пьютъ въ отварѣ, при астеническихъ крово-  
теченіяхъ, также отъ завала или затвердѣнія печени; снаружи  
полезно толченую траву прикладывать на наружныя раны и  
къ больнымъ воспаленнымъ глазамъ. Сѣмя ея гонитъ мочу и  
утоляетъ рвоту.

Для внутренняго употребленія: двѣ щепоти цвѣтовъ нали-  
ваютъ 6 унц. кипячей воды, или полунціи травы варятъ въ  
8 унц. воды, до тѣхъ поръ пока останется полфунта отвара.

Въ Сибири этимъ растеніемъ пользуются для леченія пере-  
лоя или мокротнаго стволоваго теченія.

\* *Peucedanum officinale* L. (*Горичникъ аптечный; хвосто-  
вая трава; желтоленъ; свиной хвостъ.*—*Haarstrang.*—*Queue de  
porc; fenouil de porc*). Растетъ въ лѣсахъ. Корень горичника  
содержитъ бѣловатый сокъ. Запахъ его тошнотворный; вкусъ  
сладковато-пріятый. Свойства корня этого растенія разбивающія,  
мочегонныя и возбуждающія.

Употребляется противъ мокротнаго кашля, головной боли,  
въ грудныхъ простудныхъ припадкахъ, запорѣ мѣсячныхъ кровей,  
зубной боли, цынготной чесотки и гнилыхъ язвъ.

Отваръ корня составляетъ полосканье и примочку. Для его  
приготовленія на фунтъ воды кладется 1 унція корня. Сухой  
корень кладутъ на зубы для утоленія боли, при чемъ полезно  
сверхъ того полоскать ротъ отваромъ.

*Physalis alkekengi* L. (*Мяуника; вишня жидовская; мошна;  
пузырная трава.*—*Gemeine judenkirsche.*—*Coqueret; alkekenge*).

Растетъ по тѣнистымъ и воздѣланнымъ мѣстамъ южной Россіи, въ особенности часто встрѣчается на Кавказѣ.

Зрѣлые плоды мяхунки запаху не имѣютъ; вкусъ ихъ сначала яслоовато-пріятный, послѣ горькій; сѣмяна и кожицы плодовъ весьма горькій.

Дѣйствіе ихъ слабительное сильно гонящее мочу и утоляющія зубную боль.

Употребляется въ почечныхъ мокротныхъ припадкахъ, трудномъ мочеиспражненіи, водяной болѣзни и ломотѣ, ощущаемой въ суставахъ. Сухія ягоды, растертыя и съ воскомъ смѣшанныя въ видѣ шарика, бросаютъ на раскаленную плитву или горящіе уголья, и исходящій дымъ, набираемый въ ротъ, исцѣляетъ боль зубовъ.

Для употребленія внутрь: 2 унціи толченныхъ ягодъ наливаютъ 12 унц. бѣлаго вина и настоявъ и выжавъ чрезъ полотно, принимаютъ по 1 или 2 столовыхъ ложки, каждые два часа; средство это хвалятъ также въ кровоожарваніи. Свѣжій выжатый сокъ и заквашенный въ видѣ морса принимаютъ по одной унціи и болѣе на тощакъ какъ превосходное мочегонное средство, полезное въ отекахъ и водяной обрюзглости, бывающей послѣ продолжительныхъ лихорадокъ. Высушенныя ягоды принимаютъ въ порошокъ отъ  $\frac{1}{4}$ —1 драхмы.

Простолюдины называютъ эти ягоды жидовскими вишнями, и глотая по 4, 5 и даже по 6 сырыхъ или вареныхъ ягодъ, пользуются этимъ отъ водяной болѣзни и желтухи. Коровьему маслу эти ягоды придаютъ желтый пріятный цвѣтъ.

При собираніи этихъ ягодъ, должно отдѣлять цвѣтную чашечку, въ коей онѣ прирастаютъ; ибо она содержитъ чрезвычайно горечь, которая причиняетъ тошноту и рвоту.

\* *Pimpinella Saxifraga* L. (*Бедренецъ каменистый*. — *Ge-meine Biebernell*. — *Boucage*).

Употребляется въ жабѣ, запорѣ кровей, истерикѣ, маточныхъ припадкахъ и въ припадкахъ бывающихъ послѣ ртутнаго продолжительнаго леченія.

Въ порошокъ дается рѣдко приемами до 20 гранъ, чаще употребляется въ видѣ водяной наливки (2 драхмы корня на 8 унцій кипячей воды). Водяная наливка служитъ также полосканьемъ въ упомянутыхъ болѣзняхъ; для чего въ ней можно примѣшпвать равную часть шалфея, ромашки или бузиннаго цвѣта.

\* *Pinus abies* L. (*Ель*. — *Fichte*. — *Sapin*). Растетъ на песчаной почвѣ.

Еловую смолу, для изгнанія песка изъ мочевыхъ путей и въ простудномъ кашлѣ, принимаютъ растертую съ яичнымъ

желткомъ, величиною въ лѣсной орѣхъ. Расплавленная съ саломъ, служитъ мазью, очищающею проказу, паршивые струпы: и для поддержанія нагноенія послѣ нарывнаго пластыря. Одна вязкая смола вмѣсто пластыря прикладывается между лапатовъ, какъ отвлекающее средство въ разныхъ головныхъ и глазныхъ болѣзняхъ. Каннфоль или сухая еловая смола (*colophonium*), въ видѣ присыпки, служитъ для нагноенія, очищенія и заживленія ранъ и язвъ, и одобряется также въ водяной мошонковой грыжѣ и мясныхъ опухоляхъ. Куреніе каннфолью полезно: въ выпаденіи задвей кишки, въ английской болѣзни и отеклыхъ опухоляхъ.

Для отвара 2 драхмы еловыхъ верхушекъ полагаются на 6 унцій воды.

Изъ еловаго терпентина, перегоняють съ водою масло, называемое скипидарнымъ (*oleum ter-benthinae*), которое гораздо хуже соснового (*ol. destillatum p. sylvestris*); однако оно часто продается вмѣсто этого послѣдняго. Еловая смола, сплавленная съ желтымъ воскомъ и свѣжымъ постнымъ масломъ, составляетъ липкій пластырь, соединяющій свѣжія раны.

*Домашній пластырь для ранъ* составляется: изъ 1 фунта еловой или сосновой бѣлой смолы (*resina alba*), столько-же желтаго воска и  $\frac{1}{4}$  фунта постнаго масла, т. е. льянаго, коноплянаго или сурьпичнаго; распустивъ ихъ въ муравленомъ горшкѣ на угольномъ жару, должно варить, прибавляя по немногу истертыхъ бѣлизъ или сурнику, отъ 16 золотниковъ до цѣлаго фунта, мѣшая безпрестанно, пока не станетъ больше появляться пѣны; тогда, снявъ горшокъ съ огня, продолжать мѣшаніе, пока остынетъ масса. Пластырь этотъ очень полезенъ отъ всѣхъ ранъ, какъ огнестрѣльныхъ, такъ и порубленныхъ, также отъ ссадинъ, нарывовъ и прѣжней; а равно для заживленія ожогъ.

**Pinus larix L.** (*Диственница*.—*Lerche*.—*Mélézé*). Добываемый изъ смолы этого дерева чистый терпентинъ, вмѣстѣ съ углекислою водою, оказываетъ очень полезное дѣйствіе въ каменной болѣзни, сильныхъ запорахъ на низъ и въ водяной болѣзни. Смѣшанный съ яичнымъ желткомъ онъ помогаетъ отъ плоской глисты. Въ домотныхъ боляхъ, хирагрѣ и подагрѣ: натрянуть страждущее мѣсто терпентиннымъ масломъ, смѣшаннымъ съ медомъ; въ чахотныхъ загноеніяхъ легкаго, кшпечныхъ язвахъ и расслабленія задняго прохода послѣ долговременныхъ поносовъ его можно давать до  $\frac{1}{2}$  драхмы смѣшавъ съ вишневымъ клеємъ, сахаромъ или медомъ, наблюдаютъ, чтобы не было при томъ лихорадки или внутренняго воспаленія. Мазью, состоящею изъ терпентина и меда, въ короткое время излечиваютъ головныя парши и пльшивость.

Внутрь терпентинъ дается отъ 10—20 гранъ и больше, въ плодахъ или въ видѣ эмульсіи. Снаружи употребляется въ

видъ промывательнаго (2 драхмы на 6 унцій молока). Для составленія терпентинной нагнаивающей мази (unguent. terebinthinae s. digestiv), 12 частей терпентина смѣшиваютъ съ 4 частями меда. Эта мазь служитъ превосходнымъ ранозѣлительнымъ средствомъ.

Въ Сибири дубъ лиственничы, умягчая въ водѣ, употребляютъ вмѣсто хлѣба. Молодые зеленые отрасли, изрѣзавъ, ва-



СЛОВАРЕ

Горсхъ. (*Pisum Sativum* L.).

(Къ стр. 194).

рять весной съ молокомъ или сывороткою, которая имѣетъ слабительное свойство. Выступающій изъ нихъ смолистый сокъ, стущаемый солнечною теплотою въ видѣ бѣловатыхъ зеренъ, представляетъ сладковатую манну (*manna lagicea*), имѣющую слабительное свойство. Древніе евреи собирали эту манну предъ



восхожденіемъ солнца и она имъ служила очищающимъ средствомъ отъ свойственной или врожденной имъ коросты.

Листвничный терпентинъ входитъ въ разные составы мазей, пластырей и скоросохнущихъ масляныхъ лаковъ.

**Pisum Sativum L.** (*Горохъ. — Gemeine Erbse. — Pois*). Растеніе воздѣлываемое.

Дѣйствіе гороха питательное; мочегонное; гороховой муки, разбивающее.

Зеленые молодые стручки варятъ нѣ похлебкахъ, составляющихъ легкую и питательную пищу; сухой горохъ, растертый въ супъ, тоже питателенъ, но производитъ пученіе живота отъ вѣтровъ. Гороховый отваръ сильно дѣйствуетъ на мочевые пути и гонитъ каменную дресву изъ почекъ и мочевого пузыря. Гороховая мука, прикладываемая въ видѣ сухой припарки, весьма хорошо разводитъ твердыя опухоли грудей и ядеръ.

\* **Polygala amara L.** (*Истода. — Bittere Kreuzblume. — Polygala amer*). Растетъ во влажныхъ лѣсахъ по мѣстамъ поросшимъ густою травою, на гористыхъ лугахъ и преимущественно по извѣтковымъ холмамъ.

Свойства корня и листовъ истода зависятъ отъ экстрактнаго вещества, содержащагося болѣе въ листьяхъ; запаху корень и листы не имѣютъ; вкусъ корня сладковато-горькой, клейкій; листы очень горькій.

Дѣйствіе его слегка побуждающее, разводящее мокроты, желудочное, укрѣпляющее.

Употребляется въ грудныхъ астеническихъ болѣзняхъ, мокротной чахоткѣ (особенно въ соединеніи съ исландскимъ мохомъ), въ судорожномъ кашлѣ, язвахъ легкаго, водяной болѣзни, ломотѣ, грудномъ колотѣ, для разрѣшенія воспаления и отдѣленія мокроты. Въ мѣстныхъ грудныхъ болѣзняхъ, соединенныхъ съ кровохарканіемъ, сухоткою и чахоткою, даютъ отваръ: изъ 3 унц. корня, отвареннаго въ 3 фунтахъ воды до половины, по чайной чашкѣ, три раза въ день.

Въ порошокъ корень дается отъ  $\frac{1}{2}$  до 1 драхмы, 2 или 3 раза въ день; для отвара берется 1 унція на 2 фунта воды, которую кипятить должно до тѣхъ поръ, пока останется половина жидкости; процедивъ его принимають по чайной чашкѣ, нѣсколько разъ въ день. Для винной настойки полагается тоже количество корня на бутылку бѣлаго винограднаго вина, которое, настоявъ 3 дня въ тепломъ мѣстѣ и процедивъ, даютъ больнымъ по рюмкѣ, 3 раза въ день.

По опытамъ дю-Гамеля и новѣйшихъ врачей, горькій истода и слѣдующая порода качествами своими подходятъ къ корню сенегги (*polygala senega*), а потому могутъ замѣнять ее.

Матери и кормилицы, имѣющія недостатокъ молока въ грудяхъ, употребляя корень истода въ горячей наливкѣ вмѣсто чаю, достигаютъ желаемой цѣли, т. е. умноженія молока.

\* *Polygala vulgaris* L. (*Вика коничья*. — *Gemeine Kreuzblume*. — *Polygala commin*). Растетъ по кочкамъ, краямъ лѣсовъ и на необработанныхъ поляхъ.

Корень запаху не имѣетъ; вкусъ: слабо-горькій, островатый. Дѣйствие сходно съ дѣйствіемъ вышеописаннаго вида.

Употребляется въ боковомъ колотѣ и въ другихъ грудныхъ болѣзняхъ. Дается такимъ же образомъ какъ и вышеописанный истода.

\* *Polygonum hydropiper* L. (*Горецъ водоперечный; водяной перецъ; трава чечина; почечуйникъ; собачій перецъ*. — *Pfefferiger Knobloch*. — *La renouée poivre d'eau*). Растетъ въ ямахъ и канавахъ наполненныхъ водою и по берегамъ ручьевъ.

Трава запаху не имѣетъ; вкусъ острый, жгущій. Дѣйствие мочегонное ѣдкое и воспаляющее кожу.

Снаружи прикладывается толченая трава къ ножнымъ водянымъ опухольямъ, для разведенія твердыхъ холодныхъ опухолей, очищенія шелудивыхъ струpeeвъ и отдѣленія помертвѣлости. Внутрь, по причинѣ ѣдкости, принимать это средство опасно, хотя нѣкоторые и рекомендуютъ его въ почечуѣ и каменной болѣзни.

Простолудины прикладываютъ листья этой травы къ почечуйнымъ шишкамъ.

\* *Polytrichum commune*. (*Ленъ кокушкинъ; волосистый мохъ*). Растетъ по влажнымъ лѣсамъ и тѣнистымъ дугамъ между хлами.

Трава имѣетъ вкусъ вяжущій. Свойства ея разводящія потогонныя грудныя.

Употребляется въ грудныхъ мокротныхъ припадкахъ, простудномъ кашлѣ, удушѣ и грудномъ колотѣ. Отваромъ этого растенія моютъ голову для отращенія волосъ, когда они вывалили послѣ горячки.

Для отвара горсть травы варятъ въ 12 унц. воды, пока уцпнитъ половина жидкости, которую подсластивъ медомъ пьютъ какъ чай, съ прибавленіемъ краснаго вина.

\* *Populus tremula* L. (*Осина; иудино дерево*. — *Zitter Pappel*. — *Le peuplier tremble*).

Почки осны, собираемыя до развитія листовъ, смолпсты; вкусъ имѣютъ горьковатый. Свойства ихъ смягчительныя и притупляющія.

Въ отварѣ, употребляются въ простомъ и кровавомъ поносахъ и простудной ломотѣ въ членахъ. Корку ея также пьютъ въ отварѣ отъ крестцовой боли, и при задержаніи мочи; молодые толченые листья, смоченные горячею водою, служатъ полезною

припаркою, утоляющею ломотныя и подагрическія боли. Сокомъ, извлекаемымъ изъ дерева, гоняютъ лишай и бородавки. Почка, еще не распутившіяся, растираемая съ тучнымъ масломъ или настоянная съ водкою, служатъ ранозѣлительнымъ средствомъ.

Почекъ, или смолистыхъ глазковъ и корки, для отвара, берутъ 1 унцію на фунтъ воды и кипятятъ до тѣхъ поръ, пока останется 8 унцій; процѣдивъ и подсластивъ пьютъ этотъ отваръ по чайной чашкѣ, 3 раза въ день. Почка эти настаиваютъ также въ винномъ спиртѣ и даютъ отъ 20 — 30 и 40 капель, съ тѣмъ же отваромъ, при внутреннихъ нагноеніяхъ. Снаружи, листья припариваютъ почечуйныя шишки и другія болящія опухоли, какъ сказано выше.

Подобныя же свойства имѣютъ почки и кора *Тополя бѣлаго* и *Осокора чернаго* (*populus alba et nigra*), растущихъ въ южной Россіи, на мокрыхъ и сухихъ мѣстахъ. Листья ихъ служатъ здоровымъ кормомъ для скотины. Изъ осокорныхъ почекъ (gesch. pop. n.) приготовляемая мазь (ungv. populeum) служитъ превосходнымъ лекарствомъ для смягченія болящихъ почечуйныхъ шишекъ, трещинъ на грудяхъ или сосцахъ и отъ ожоговъ. Свѣжовыжатый сокъ изъ листовъ осокори бѣлой или черной прикладываютъ къ зубамъ для утоленія боли; его же подогрѣвъ впускаютъ въ слуховой каналъ, отъ простуднаго шума или звону въ ушахъ. Изъ этихъ смолистыхъ почекъ, собираемыхъ весною и смягченныхъ кипячею водою, выжимаютъ смолистое вещество, подобное воску, изъ котораго дѣлаютъ свѣчи, хорошо горящія и пахнущія. Почка черной осокори, употребляемая въ видѣ горячей наливки, сильно гонятъ потъ. Винная настойка ихъ полезна въ цингѣ и грудной застарѣлой простудѣ.

\* *Populus balsamifera* L. (*Осокоръ душистая; тагамаакъ; рай дерево. — Aromatische Pappel. — Peuplier balsamique*). Растетъ въ Сибири и на Терекѣ, а также разводится у насъ въ садахъ.

Смола (*lacamahaca*), извлекаемая изъ этого дерева насѣчкою древесной коры и выжиманіемъ смолистыхъ почекъ, запахъ имѣетъ благовонный, пріятный, отзывающійся амброю, вкусъ: слегка горьковатый, тошнотворный.

Дѣйствіе этой смолы укрѣпляющее, разводящее, ранозѣлительное. Въ видѣ куренія, она возбуждаетъ ослабѣвшія части, разводитъ отеки или простудныя опухоли и помогаетъ въ истерическихъ припадкахъ.

Снаружи, смола, намазанная на холстину, прикладывается въ видѣ пластыря въ груди и животу: для унятія рвоты и поноса, происходящихъ отъ слабости кишечнаго канала; этимъ-же пластыремъ покрываютъ холодныя простудныя опухоли. Въ видѣ куренія, одобряется: въ ревматизмѣ, членовныхъ боляхъ, истерикѣ, зубной боли, ушной простудѣ и глухотѣ. Смола, раство-

ренная въ винномъ спиртѣ, служить ранозѣлительнымъ средствомъ и укрощающимъ гнилость, а потому съ успѣхомъ прикладывается къ цинготнымъ и другимъ гнилымъ язвамъ, а также къ обнаженнымъ костямъ и костовѣдъ. Спиртная настойка таганьгана (tinct. tasmahanae) замѣняетъ совершенно мастичную, мирровую и амбровую настойки. Въ леченіи венерическихъ язвъ, особенно застарѣлыхъ, прикладываютъ съ пользою эту настойку съ прибавленіемъ по 1 грану сулемы (oxymurias hydrargyri), на каждую унцію ея. Внутрь ее даютъ съ успѣхомъ (безъ сулемы), въ астеническихъ лихорадкахъ, при большой слабости нервной системы и недостаткѣ аппетита, или въ трудномъ пищевареніи: на приемъ отъ  $\frac{1}{2}$  — 1 драхмы (съ винограднымъ виномъ); отъ 20—30 капель, на сахарѣ, по 2 или 3 раза въ день, укрощаетъ продолжительные поносы, зависящіе отъ слабости кишекъ, а также прекращаетъ теченіе женскихъ бѣлей и отдѣленіе гноеватой мокроты у чахоточныхъ. Въ цинготный порчѣ десевъ и губовъ, отваръ дубовой коры, съ прибавленіемъ той-же настойки, служитъ очень полезнымъ полосканьемъ. Почка осокори душистой (gemmae p. balsamiferae), толченныя и смѣшанныя съ виннымъ спиртомъ, терпентиномъ или съ свинымъ саломъ наподобіе мази, полезны для заживленія застарѣлыхъ ранъ и язвъ.

Смола этого рода, вытекающая сама собою изъ дерева блѣдыми каплями, по своей чистотѣ, для внутренняго употребленія предпочитается получаемой чрезъ надрѣзываніе коры, которая бываетъ темно-краснаго или бурога цвѣта. Выжимаемая горячимъ прессомъ изъ древесныхъ почекъ, тоже употребляется единственно снаружи для заживленія ранъ и составленія желудочнаго пластыря, именно: изъ 7 драхмъ осокорной душистой смолы, 1 драхмы мятнаго масла и 8 капель анисоваго. Пластырь этотъ съ большою пользою прикладываютъ малолѣтнимъ для унятія рвоты и кишечной рѣзы, которую простолудины называютъ обыкновенно дѣтскою грыжею.

Въ Италіи, изъ смолистыхъ почекъ душистой осокори и тополи, готовятъ искусственный воскъ.

Если эту душистую смолу извлечь изъ почекъ осокори посредствомъ виннаго спирта, то она имѣетъ свойства, подобныя стираксу и качествами своими можетъ замѣнять: мастяку (pistacia lentiscus), мирру или смирну (laurus mirra), росной ладонъ (styrax benzoin), и перувианскій бальзамъ (myroxylon peruiferum).

\* *Potentilla anserina* L. (Мощникъ гусиный; гусиная пасть; серебрянникъ; молка; жабликъ. — Gänse-Fingerkraut. — L'argentine). Растетъ по краямъ дорогъ и мѣстамъ поросшимъ травою.

Корень и трава запаху не имѣютъ; вкусъ травяной, вязущій и нѣсколько соляной.

Свойства мочушника укрѣпляющія, мочегонныя, раноздѣлательныя.

Употребляется въ легочномъ нарывѣ, чахоткѣ, поносахъ, теченіи бѣли и кровотеченіяхъ. Выжатый изъ всего растенія сокъ даютъ по столовой ложкѣ предъ лихорадочнымъ ознобомъ; такъ же отъ кровохарканія и для изгнанія песка изъ мочевыхъ путей. Выжатый изъ свѣжаго серебряника и зеленой ржи сокъ, почитается дѣйствительнымъ средствомъ отъ каменной болѣзни.

Для внутренняго употребленія: горсть травы наливають 6 или 8 унц. кипячей воды, которую, подсластивъ, принимаютъ по 3 унціи, нѣсколько разъ въ день. Для отвара: 1 унція корня полагается на фунтъ воды. Въ порошокъ дается до полудрахмы; выжатый сокъ изъ всего растенія принимаютъ отъ 4—6 унцій въ день. Снаружи употребляютъ въ видѣ промыванья—примочки и катапазмы изъ свѣжей травы, заживляющей раны и застарѣлыя язвы. Свѣжую траву, истолокши въ ступкѣ и прибавивъ къ ней немного соли и уксусу, прикладываютъ къ ручнымъ вѣстамъ предъ лихорадочнымъ приступомъ; отъ чего пароксизмы скорѣе бывають прерваны, а иногда и совсѣмъ проходитъ лихорадка.

\* *Potentilla reptans*. (Мочушникъ пятилиственный; пятилистникъ; яммуналишникъ; жонна; ланцетика ползучая.—*Kriechendes Fingerkraut*.—*La potentille rampante*). Растетъ по краямъ дорогъ, поросшихъ травомъ.

Употребляется въ тѣхъ-же случаяхъ и такъ же, какъ предыдущее растеніе.

\* *Primula officinalis* L. (Скороспѣлка аптечная; бѣлая буквица; баранчики. — *Gebrauchliche Primel*. — *Primerolle; bruyette; coucou*). Растетъ по лугамъ, лѣсамъ и вообще на хорошей почвѣ. Свойства цвѣтовъ этого растенія антиспазмотическія. Ихъ наливка, употребляемая въ видѣ чая, гонитъ мочу. Въ нѣкоторыхъ странахъ прибавляя въ наливку сахаръ, медъ или лимонъ, подвергаютъ ее броженію и такимъ образомъ получаютъ кисловатый спиртный напитокъ. Цвѣты скороспѣлки подмѣшиваютъ къ вину для сообщенія ему большаго вкуса, а въ пиво прибавляютъ ихъ для предохраненія онаго отъ окисанія.

\* *Prunus cerasus* L. См. *Cerasus* J.

\* *Pteris aquilina* L. (Орлякъ.—*Adler-Saumfarnn*.—*Pteris aigle impériale*). Растетъ по гористымъ и песчанымъ лѣсамъ и лугамъ.

Варослымъ дается въ порошокъ отъ  $\frac{1}{2}$ —1 драхмы съ медомъ, по утру и вечеромъ, или съ бѣлымъ виномъ по драхмѣ, 3 раза въ день; дѣтямъ по 20 гранъ съ молокомъ, два раза въ день.

Корень этого растенія имѣетъ дѣйствія подобныя мужскому папоротнику (*Asidium filix mas*). Въ соединеніи съ мауновымъ корнемъ, онъ изгоняетъ глисты разнаго рода.

Въ Англіи съ успѣхомъ дѣлали опытъ надъ золою папоротниковъ, разведенною въ водѣ, для бѣленія полотна, вмѣсто мыла. Если эту золу смочить отваромъ мыльной травы (*saponaria offic.*) и, сдѣлавъ шарики, высушить, то они могутъ служить для мытья бѣлья, вмѣсто обыкновеннаго мыла.

Крѣпкій отваръ всего растенія пьютъ въ деревняхъ отъ старѣлаго кашлю, простудной ломоты и примачиваютъ застарѣлыя язвы. Для дѣтей одержимыхъ англійскою болѣзью, со-вѣтуютъ дѣлать подушки и покрывала изъ папоротныхъ листовъ.

\* *Pulmonaria officinalis* L. (*Медуница аптечная; медуница листнистая.*—*Gebräuchliches Lungenkraut.*—*Pulmonaire officinale*). Растетъ въ лѣсахъ.

Трава запаху не имѣетъ; вкусъ травяной, клейковатый и нѣсколько соляно-горькій. Свойства ея разводящія, вяжущія.

Употребляется въ грудныхъ припадкахъ, сухоткѣ, чахоткѣ, воспаленіи легкихъ, долговременномъ кашлѣ, хрипотѣ, завалахъ печени, желтятицѣ и почечныхъ боляхъ. Молодую свѣжую траву варятъ въ супахъ, для больныхъ одержимыхъ упомянутыми болѣзнями.

Для внутренняго употребленія гореть сухой травы наливаютъ 6 унц. кипячей воды и пьютъ съ медомъ вмѣсто чаю. Снаружи прикладывается свѣжая истолченная, для заживленія ранъ.

*Punica granatum* L. (*Гранатникъ.*—*Granatbaum.*—*Le grenadier*). Растетъ по морскимъ берегамъ на югѣ Россіи.

Сокъ гранатовыхъ яблокъ холодитъ, утоляетъ жажду и укрѣпляетъ остроту желчи; а потому одобряется въ воспалительныхъ лихорадкахъ, рвотѣ и цингѣ.

Цвѣты, въ видѣ водяной или винной наливки, составляютъ укрѣпляющее полосканье, полезное при расслабленіи гортаннаго язычка и въ мокротной жабѣ, а также употребляемое для впрыскиванья и примочки: въ мокротномъ стволловомъ теченіи, бѣлахъ и расслабленіяхъ маточнаго рукава или задняго прохода.

Корка гранатника дается въ порошокъ по 1 драхмѣ каждый часъ страдающимъ лихорадкою, наблюдая, чтобы приемы дѣлались между припадками этой болѣзни. Для наружнаго употребленія 1 унція цвѣтовъ кладется на 1 фунтъ воды или краснаго вина, употребляемаго для полосканья, впрыскиванія и примочки въ упомянутыхъ болѣзняхъ.

\* *Pyrola rotundifolia* L. (*Грушовка круглолистная; дикая грушица.*—*Rundblättriges Wintergrün.*—*Pyrole à feuilles rondes*). Растетъ по тѣнистымъ и возвышеннымъ мѣстамъ.

Трава запаху не имѣетъ; вкусъ вяжущій, горьковатый. Свойства грушовки укрѣпляющія, очищающія, ранозѣлительныя.

Употребляется въ поносахъ, кровотеченіяхъ и слишкомъ гнойныхъ язвахъ; снаружи прикладывается къ фонтанелямъ вмѣсто пластыря, когда ихъ надобно заживить.

Для внутренняго употребленія: 2 щепоти сухой травы наливается 8 унціями горячей воды, которую пьютъ вмѣсто чая;



Первоцвѣтъ. (*Primula officinalis* L.).

(Къ стр. 198).

квѣпкій отваръ служитъ полосканьемъ, примочкою и омываніемъ для гнилыхъ ранъ; свѣжая толченая трава прикладывается на гнилыя раны. Въ порошокъ дается по 6 гранъ; снаружи тотъ же порошокъ употребляется въ видѣ присыпки.

*Pyrus cydonia* L. См. *Cydonia vulgaris* Jus.

Q.

\* **Quercus robur L.** (*Дубъ...—Eiche.—Chêne*). Эта древесная порода, вѣкогда обильная во всей Европѣ, въ настоящее время встрѣчается уже въ меньшемъ количествѣ, вслѣдствіе значительнаго истребленія дубовыхъ лѣсовъ. Она встрѣчается въ сѣверной полосѣ Россіи въ весьма незначительномъ количествѣ, а растетъ по преимуществу въ южной и умѣренной полосахъ ея. Во всѣхъ частяхъ дуба находятся: танинъ, дубильная кислота, горькія вытяжныя вещества, крахмалъ, камедь, смола, древесина и сахарное, сходное съ маннитомъ, вещество (кверцинъ). Жареніемъ дубовыхъ желудей образуется пригорѣлое масло и часть избыткаго въ нихъ крахмала превращается въ камедь, а древесина разрушается. Но ихъ не должно жарить слишкомъ много, чтобы не превратить всего крахмала въ камедь и не получить слишкомъ много пригорѣлыхъ веществъ.

Дубовые желуди употребляются только въ жаренномъ состояніи (*Glandes quercus tostæ; желудное кофе*). Своими составными частями они производятъ не только вяжущее, но и неинного питательное дѣйствіе; почему большимъ и даютъ какъ діатетическое средство, когда имѣютъ въ виду крѣпительное, питательное дѣйствіе; всего чаще ихъ предписываютъ атрофическимъ, золотушнымъ, рахитическимъ дѣтямъ, когда раздраженіе или воспалительныя состоянія, особенно пищеварительныхъ путей, не составляютъ противопоказанія. Далѣе жаренные желуди часто назначаютъ какъ вспомогательное средство, при употребленіи «крѣпительныхъ веществъ»; противъ блѣдной немочи, неправильныхъ мѣсячныхъ кровей, хроническаго поноса, перемежающейся лихорадки, такъ назыв. нервности и нервныхъ страданій, напр. вмѣсто обыкновеннаго кофе, особенно для молодыхъ лицъ и дѣтей.

Большіе приемы или продолжительное употребленіе ихъ могутъ произвести не только запоръ, но и расстройство пищеваренія и т. д.

Предварительнымъ настаиваніемъ разрѣзанныхъ желудей съ кипячею водою можно удалить большое количество ихъ вытяжкаго и дубильнаго вещества, отчего они переносятся легче.

Для отвара или желудочнаго кофе берутъ около 3—6 золотниковъ желудей на  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  фунта кофе и отвариваютъ какъ обыкновенный кофе.



Прибавленіемъ молока и сахара питье дѣлается немного пріятнѣе. Жаренные желуди слѣдуетъ только растолочь на крупные куски, а не превратить въ порошокъ; такимъ образомъ изъ нихъ получаютъ болѣе свѣтлый, менѣе кашевидный отваръ.

Нужно готовить каждый день свѣжее желудное кофе, и держать сосуды какъ можно чище, чтобы мало по малу не образовалась въ молокѣ уксусная кислота. Прибавленіемъ одной части жареннаго какао и 1 ч. сахара въ 1—2 ч. жаренныхъ желудей, приготовляли болѣе вкусный желудный шоколадъ.

Многіе дубы южныхъ странъ доставляютъ плоды, которые уже отъ природы содержатъ менѣе дубильнаго вещества, нежели наши отечественные, или лишены отчасти своего терпкаго вкуса искусственнымъ образомъ (напр. зарываніемъ въ землю, броженіемъ приготовленнаго изъ нихъ тѣста). Они принимаются несравненно пріятнѣе и питаютъ въ болѣе высокой степени, по большому содержанию крахмала, жирныхъ веществъ и т. п.

Дубовая кора въ порошокъ и отваръ дается вмѣстѣ хины, въ перемежныхъ лихорадкахъ. Водяной отваръ ея употребляли съ успѣхомъ въ болѣзняхъ, происходящихъ отъ слабости органовъ, а въ особенности мокротномъ почечуѣ, теченіи бѣлей и маточныхъ кровоточеніяхъ. Снаружи дубовая кора и листья служатъ для укрѣпляющихъ ваннъ въ дѣтской сухоткѣ и английской болѣзни. Свѣжіе толченые листья прикладываются къ цинготнымъ язвамъ; вѣрнѣй водянкой отваръ листовъ, съ прибавленіемъ виннаго спирта и меда, служитъ полосканіемъ въ мокротной упорной жабѣ и расслабленіи гортаннаго язычка. Отваръ корки, съ прибавленіемъ краснаго вина или квасцовъ, полезенъ для примочки и впрыскиванія: въ выпаденіи задней вишни или маточнаго рукава, въ мокротныхъ истеченіяхъ изъ дѣтородныхъ частей, и для промыванія застарѣлыхъ грибвидныхъ язвъ. Имъ же примачиваютъ расслабленныя членосоединенія послѣ вывиховъ и мокротныя астеническія опухоли. Порошокъ дубовой коры, зашитый въ суконный рѣдкій мѣшечекъ и вымоченный въ красномъ винѣ, совѣтуютъ прикладывать къ грыжѣ и носить его придерживая биндажемъ. Въ видѣ катаплазмы, съ прибавленіемъ нашатыря и уксуса, этотъ порошокъ укрощаетъ антоновъ огонь; но въ этомъ случаѣ онъ гораздо дѣйствительнѣе съ примѣсю къ нему терпентиннаго масла. Отваръ дубовой коры съ прибавленіемъ сладкой ртуты, служитъ хорошею примочкою при шанкерахъ и другихъ венерическихъ язвахъ.

Въ порошокъ дубовая кора дается отъ 20—30 гранъ, съ прибавленіемъ римской ромашки, горечавки или касатика; для отвара полагается 1 унція толченой коры на фунтъ воды или краснаго вина; этотъ отваръ внутрь дается по столовой ложкѣ, а снаружи прикладывается какъ сказано выше. Кофе изъ же-

лудей пьютъ по чайной чашкѣ. Истертыя въ порошокъ чашечки желудей даются вмѣсто хины, по подрахиѣ; ихъ употребляютъ также противъ кроваваго долговременнаго поноса. Изъ числа дубовыхъ препаратовъ слѣдуетъ упомянуть:

1) *Отваръ дубовой коры съ квасцами (decoctura cort. quercus almutinosa)*, который дается внутрь по 1 унціи, 3 или 4 раза въ день, и служитъ полосканьемъ въ вышеупомянутыхъ болѣзняхъ. Этотъ-же отваръ, при его употребленіи въ видѣ полосканья, умягчаетъ боль зубовъ и цинготную порчу десенъ; а въ видѣ впрыскиванья въ маточный рукавъ (*vagina uteri*) помогаетъ отъ долговременнаго теченія бѣлей и изнурительнаго маточнаго кровотеченія (*profluvia uterina*).

2) *Противулихорадочный порошокъ, замѣняющій хину (pulvis cort. quercus et anthemidis n.)*. Въ перемежныхъ трясучкахъ дается на приемъ: отъ двухъ скруполовъ до 1 драхмы, чрезъ 2 или 3 часа, въ нелихорадочный день.

Дубовая корка и всѣ части дуба служатъ для дубленія кожъ; для чего ее снимаютъ весною, а обнаженное дерево срубаютъ на слѣдующую весну.

Изъ желудныхъ чашечекъ и коры, съ прибавленіемъ зеленого купороса дѣлаютъ чернила для крашенія кожъ. Листья въ домашнемъ быту кладутъ въ соленые огурцы.

Дубовые желуди служатъ для откармливанія свиней, и могутъ быть употребляемы вмѣсто чернильныхъ орѣшковъ (*galiae quercinae*). Желудочныя чашечки, истолченныя въ мелкій порошокъ, деревенскіе лекаря даютъ внутрь до ползолотника: противъ сильнаго теченія кровей, бѣлей, желудочной изжоги, долговременной рвоты, поносовъ и трясучекъ. Въ тѣхъ-же болѣзняхъ и кровавомъ поносѣ совѣтуютъ принимать этотъ порошокъ съ краснымъ виномъ 3 раза въ день.

R.

\* *Ranunculus sceleratus* L. (Жабникъ вредный; болотный; пятитысяя нога. — *Blasenziehender Hahnenfuss*. — *Renoncule scélérat*).

\* *Ran. flammula* L. (Жабн. огненный; прищеница, купальница. — *Brennender Hahnenfuss*. — *Petite douve; flamme*).

\* *Ran. acris* L. (Жабн. остросочный, ѣдкій; лютик. — *Scharfer Hahnenfuss*. — *Grenouillette*).

\* *Ran. arvensis* L. (Жабн. полевой; куриная слепота. — *Acker Hahnenfuss*. — *Renonc. des champs*).

\* *Ran. bulbosus* L. (Жабинецъ. — *Zwiebelwurzeliger Hahnenfuss*. — *Benoncule bulbeuse*).

\* *Ran. lingua* L. (Жабникъ язычный. — *Grosser Hahnenfuss*. — *Grande douve*). Эти породы распространены у насъ до того въ сильной степени, что въ теченіи цѣлаго лѣта встрѣчаются почти на каждомъ шагу и на всевозможныхъ почвахъ. Между тѣмъ какъ одни изъ нихъ (напр. *Ran. lingua*) украшаютъ своими золотистыми цвѣтами воды, другіе покрываютъ поля (напр. *Ran. arvensis*). Однимъ словомъ трудно указать мѣстность, въ которой не произростало-бы какой-либо изъ этихъ породъ. Обширный родъ мотива (*Ranunculus*) заключаетъ въ себѣ растенія, содержащія въ ихъ свѣжестъ состояніи: лѣтучее, острое, ѣдкое вещество, отъ котораго зависитъ ядовитость нѣкоторыхъ видовъ его. Это ѣдкое начало при сушеніи уничтожается. Жабникъ вредный (*Ran. sceleratus*) при одномъ вдыханіи запаха его цвѣтовъ возбуждаетъ уже чиханіе и слезотеченіе. Жабинецъ (*Ran. bulbosus*), по отзыву Виларса, можетъ служить превосходнымъ нарывнымъ средствомъ. Впрочемъ листья другихъ жабниковъ, приложенные снаружи, натягиваютъ пузыри на кождѣ, подобно испанскимъ мухамъ, а перегнанная изъ нихъ вода производитъ рвоту. По свидѣтельству нѣкоторыхъ врачей, прикладываніе листьевъ ѣдкого жабника въ застарѣлой ломотѣ къ большимъ частямъ, исцѣляетъ ихъ радикально, даже тогда, когда другія средства оказываются безсплыными. Подобнымъ же образомъ прикладывая ихъ къ плечу, соответствующему сторонѣ большого зуба, часто излѣчиваютъ зубную боль. Толченые листья этихъ жабниковъ, прикладываемые снаружи, полезны какъ въ членовой простудной ломотѣ, такъ и въ упорныхъ перемежающихся

лихорадахъ. Въ послѣднемъ случаѣ они прикладываются къ пя-  
стью руки, за нѣсколько часовъ передъ пароксизмомъ или при-  
ступомъ лихорадки и оставляются на немъ на 8 или 12 часовъ.  
Въ долговременной головной боли ихъ прикладываютъ къ за-  
тылку. Вода перегнанная изъ огненнаго и язычнаго жабниковъ  
(г. *flammula*, et г. *lingua*), служитъ превосходнымъ рвотнымъ сред-  
ствомъ.

Внутреннее въ большомъ количествѣ употребленіе этихъ ядо-  
витыхъ растений смертоносно какъ для людей, такъ и для жи-  
вотныхъ. По вскрытіи собакъ и другихъ отравленныхъ ими  
животныхъ находили, что ѣдая острота жабниковъ производя-  
тъ въ желудкѣ и въ прочихъ внутренностяхъ антоновъ огонь.

Самое лучшее противоядіе противъ отравленія жабникомъ  
составляетъ чистая вода и сокъ щавеля, красной смородины,  
шюквы и даже укусъ, разведенный водою. Соболевскій хва-  
литъ тавъ-же конопляное и маковое масла.

Въ деревняхъ отваромъ остраго и огненнаго жабниковъ обмо-  
ываютъ чесотку и дѣтскіе шолуди; а свѣжую толченую траву ихъ  
прикладываютъ къ зубамъ и твердымъ опухолямъ железъ, для  
разведенія оныхъ; но въ этихъ вышеупомянутыхъ случаяхъ не-  
обходима большая осторожность, ибо оставаясь долго на тѣлѣ,  
травя жабника разѣдаетъ мягкія части и производитъ почти  
неизлечимыя раны. Гораздо лучше въ подобныхъ случаяхъ упо-  
треблять мазь изъ: 1 лота свѣжо-выжатаго сока съ 2 лот. ко-  
ровьяго, несоленнаго масла, или свиного сала.

\* *Ranunculus Ficaria* L. (*Ficaria ranunculoides*. Roth).  
(Жабникъ чистотельный; лютикъ почечуйный; чистякъ мень-  
шой. — *Feigwurzlicher Hahnenfuss*. — *Petite chélidoine*; *pe-  
tite laire*; *éclairette*). Растетъ по тѣнистымъ и влажнымъ  
лѣсамъ. Обладаетъ всеми свойствами предъидущихъ породъ;  
но острота этого растенія уже значительно слабѣе остроты вы-  
шеописанныхъ видовъ. Корень его вкусу почти не имѣетъ;  
свойства его мочегонныя, кровочистительныя.

Корень или листья пьютъ въ отварѣ для открытія почечуя  
и разведенія густыхъ мокротъ. Многіе весной употребляютъ  
молодую траву какъ кровочистительное средство вмѣсто салата  
и варенную въ похлебкахъ вмѣсто крапивы. Снаружи прикла-  
дываются съ пользою толченые листья съ свѣжимъ коровьимъ  
масломъ къ болящимъ почечуйнымъ шишкамъ. Относительно  
размѣра приѣмовъ можно замѣтить, что на 12 унцій сыворотки  
или похлебки можно влечь 1 унцію свѣжаго корня и за тѣмъ  
уваривать ту или другую до половины. Выжатый сокъ даютъ  
по столовой ложкѣ, черезъ каждыя 4 часа. Отваромъ этого рас-  
тенія полезно полоскать ротъ, при порчѣ десенъ и ранахъ въ  
горлѣ.

\* *Raphanus sativus* L. (*Хрннъ. — Rettig. — Raifort ordinaire*). Растеніе воздѣлываемое въ огородахъ. Хорошо знакомый корень каждому корень этой породы обладаетъ возбуждающими и антискорбутными свойствами. Его употребляютъ въ скорбутъ въ видѣ водяной, винной или пивной наливки, настойки и сиропа.

\* *Rhamnus catharticus* L. (*Крушина обыкновенная. — Kreuzdorn. — Le neprun purgatif*). Растетъ по лѣсамъ сѣверной и средней полосы Россіи. Вкусъ ягодъ крушины горькій, острый, тошнотворный; запахъ ихъ довольно пріятный. Они дѣйствуютъ какъ слабительное, но употребляютъ ихъ съ этою цѣлю можно только людямъ обладающимъ сильною комплекціею. Изъ этихъ ягодъ добывается краска, употребляемая въ акварельной живописи и известная подъ именемъ *vert de vessie*. Для ея приготовленія выжатый изъ зрѣлыхъ ягодъ сокъ завязываютъ въ бычачій пузырь, съ прибавленіемъ къ нему нѣкотораго количества раствора квасцовъ въ водѣ. Ягоды крушины слѣдуетъ собирать преимущественно самыя крупныя, лоснящіяся и сочныя. Въ нихъ содержится: особое красящее вещество, сахаръ, азотистое вещество, слизь и сѣровато-желтое начало—*рамнинъ*.

\* *Rhamnus frangula* L. (*Крушина; собачья ягода; баяданъ. — Glatter Wegerdorn; Faulbaum. — Bourgène; bourdaine; aune noir*). Растетъ въ лѣсахъ. Составныя части этого вида тѣ же какъ и предъидущаго. Помимо своего значенія во врачеваніи, эта порода крушины достойна вниманія по ея употребленію для приготовленія угля, идущаго на выдѣлку пороха. Заготовка угля для этой цѣли производится въ то время, когда деревья находятся еще въ соку; срубивъ дерево крушины съ него сдираютъ кору и затѣмъ распиливаютъ его на мелкія куски, ставятъ эти послѣднія стоймя въ яму и зажигаютъ въ ней огонь. Какъ скоро куски дерева обгорятъ и превратятся въ уголь, огонь тушатъ засыпая яму землею.

Внутренняя корка запаху не имѣетъ; вкусъ ея горьковато-вяжущій, приторный.

Дѣвствіе оной слабительное, мочегонное и противуглистное; корневая корка и древесина имѣютъ такія-же свойства, а листья дѣйствуютъ разводящимъ и ранозѣлительнымъ образомъ.

Корка употребляется какъ слабительное средство, но надо замѣтить, что въ большихъ приемахъ, а равно и свѣжая зеленая корка производятъ иногда рвоту и побужденіе на нлзъ; высушенная-же, она слабитъ и гонитъ мочу очень хорошо; а потому многіе съ успѣхомъ употребляютъ ее въ отварѣ: противъ водяной болѣзни, мокротаго кашля, удущья, желтухи, глистовъ, между-проходныхъ шпшекъ и чесотки; а растертая съ вишневымъ клеємъ и принимаемая въ видѣ пшлюдь помогаетъ про-

тивъ упорныхъ 5-ти-дневныхъ лихорадокъ и тесемочной глисты. Снаружи она употребляется въ видѣ свѣжей и вареной гаташмазы.

Ее даютъ въ порошокъ отъ 1—1 драхмы. Для отвара 2 или 3 драхмы корки кладутъ на 8 унцій воды. Снаружи, въ видѣ мази употребляютъ отъ чешотки толченную среднюю корку, смѣшанную съ свинымъ саломъ.

Въ деревняхъ корку или внутренній лубъ крушины, употребляютъ какъ обыкновенное слабительное лекарство, въ порошокъ: отъ 1—2 золотниковъ.

Корка крушины доставляетъ желтую, если-же предварительно ее размочить въ квасцовой водѣ, то красную краску, а при продолжительномъ вымачиваніи ея въ водѣ съ желѣзною ржавичною черную, употребляемую фабрикантами, столярами и токарями.

*Rheum palmatum L. et Rheum undulatum L.* (*Ревень*. — *Rhabarber*.—*La rhubarbe*). Растетъ въ восточной Сибири и Киргизскихъ степяхъ по возвышеннымъ мѣстамъ.

Корень ревеня содержитъ въ себѣ: смолы (флоретинъ, апоретинъ, эритроретинъ) красильныя вещества, хризофановую кислоту, реинъ, рабарбаринъ, дубильное вещество, крахмалъ, пектинъ, сахаръ, шавелекислоту извести и другія соли. Смолы и кислоты (рабарбаринъ) растворяются въ винномъ спиртѣ, но не въ водѣ.

Въ малыхъ приемахъ ремень не производитъ особенныхъ дѣйствій на здоровыхъ; онъ умножаетъ отдѣленія слюны и слизистой оболочки желудка и нерѣдко производитъ тошноту. Другія-же дѣйствія часто обнаруживаются при разстроенномъ пищевареніи или поносѣ; въ этомъ случаѣ отдѣлительные процессы могутъ возвращаться мало по малу къ нормальному физиологическому состоянію, пищевареніе улучшается, склонность къ образованію кислотъ исчезаетъ, испражненіе становится рѣже и гуще. Въ большихъ приемахъ ремень производитъ слабительное, даже проносное дѣйствіе, большею частью безъ урчанія и рвзы въ животѣ. Все обыкновенно совершается легко и спокойно и только большіе приемы могутъ исключительно произвести воспаленіе кишечъ.

Что важнѣйшія составныя части ревеня переходятъ въ кровь, это не подлежитъ никакому сомнѣнію. Красильныя и вообще всѣ вытяжныя вещества, также реинъ, нашли въ мочѣ, потѣ и даже пясокъ крови; моча напр., если она щелочна, можетъ окрашиваться краснымъ цвѣтомъ; молоко матери или кормилицы, принявшей ремень, можетъ произвести поносъ у груднаго младенца. Съ другой стороны ремень не дѣйствуетъ особенно на смѣшеніе крови, питательные процессы и т. д., по крайней мѣрѣ не такимъ образомъ, какъ предполагается у «крѣпитель-

ныхъ средствъ; дѣйствія его и у больныхъ, большею частью или вполне, ограничиваются желудкомъ и кишечнымъ каналомъ.

*Терапевтически* употребляется ревенъ:

Какъ слегка крѣпительное средство, въ малыхъ приѣмахъ, при разстройствѣ пищеваренія, образованіи кислоты, судорогахъ желудка, кардіалгии и т. п., при катаррѣ и раздраженіи слизистой оболочки кишекъ, поносѣ (особенно такъ назыв. желчно-ножъ), кровавомъ поносѣ и слизетеченіи прямой кишки.

Въ этихъ случаяхъ ревенъ нерѣдко оказываетъ хорошую пользу, бывають-ли эти страданія отдѣльно по себѣ или вмѣстѣ съ нервными страданіями (истерикою, ипохондрією), золотухою, легочною чахоткою и т. д.

Далѣе его употребляютъ какъ легкое слабительное, всегда когда слѣдуетъ вѣрно очистить кишки, особенно толстую, безъ дальнѣйшаго обремененія ихъ, напр. для новорожденныхъ и дѣтей вообще, при истерикѣ, ипохондріи, круглыхъ глистахъ, пищеварительныхъ и кардіалгическихъ страданіяхъ. Ревенъ иногда употребляется также при поносѣ, происшедшемъ вслѣдствіе остро раздражающей пищи и питья (*ingesta*) или отъ присутствія ненормальныхъ отдѣленій (желчи, кислыхъ слизистыхъ массъ въ желудкѣ, фекальныхъ массъ, выпотѣній), съ цѣлью скорѣе достигнуть испраженія этихъ веществъ, даже при кровавомъ поносѣ—однако съ незначительнымъ успѣхомъ.

Для слабительнаго ревенъ даютъ въ плотномъ видѣ въ формѣ порошка, болуса и пилюль, а также наливки. Какъ мѣтно крѣпительное средство его даютъ въ плотномъ видѣ, по 3—6 гр. на приѣмъ по нѣскольку разъ въ день. Для проноснаго даютъ ревенъ обыкновенно съ другими веществами, смотря по обстоятельствамъ: со средними солями, магнезією, сладкою ртутью, манною, ялапою, сенною; въ другихъ случаяхъ; съ хиною, ароматными и поглощающими средствами (металлическія соли, квасцы, минеральныя кислоты, дубильное вещество и др. производятъ разноеженіе).

Легкимъ жареніемъ (*Rheum tostum, torrefactum*) «крѣпительныя и вяжущія» свойства ревеня, говорятъ, усиливаются; въ такомъ видѣ хвалятъ его какъ другія горькія вяжущія противъ различныхъ разстройствъ пищеваренія, желудочной кислоты и т. д., даютъ напр. жевать куски его. Еще лучше это выполняется обыкновеннымъ ревенемъ при привычномъ запорѣ, геморрояхъ и др., особенно вечеромъ; 10—15 гр. могутъ уже произвести такимъ образомъ нѣсколько жидкія испраженія,

Снаружи едва-ли слѣдуетъ употреблять ревенъ; однако говорятъ, что онъ иногда можетъ быть полезнымъ при торшидныхъ упорныхъ язвахъ, особенно нижнихъ конечностей и хронической пузырьчатой сыпи (*eczema*). Тутъ его насыпаютъ въ

видъ порошка, въ 19 л. въ приличныхъ случаяхъ, съ (около  $\frac{1}{10}$ ) опиумъ, хиною, ромашкою, углемъ. Изъ препаратовъ ревеня заслуживаютъ вниманія:

1. *Ревенная вытяжка (Extractum Rhei)*. Она дается какъ ревенъ, въ плотномъ видѣ, но въ двойныхъ приемахъ.


2. *Сложная ревенная вытяжка (Extractum Rhei compositum)*. Состоитъ изъ предыдущей съ  $\frac{1}{3}$  вытяжки сабура и ялапагомыла, которые превращаютъ въ пилульную массу посредствомъ воды или виннаго спирта; слабятъ сильнѣе. Даютъ отъ 10—20 гр. по большей части въ пилюляхъ и болюсахъ.

3. *Водная ревенная настойка (Tinctura Rhei aquosa)*. Состоитъ изъ ревеня и углекислаго кали (натра), смѣшанныхъ со спиртною коричнею водою.

4. *Винная ревенная настойка (Tinctura Rhei vinosa)*, настойка изъ ревеня, кардамона и померанцевой корки съмалею (или малагою) и прибавленіемъ сахара. Этотъ препаратъ обнаруживаетъ не только ревенныя, но и возбуждающія дѣйствія, большею частью употребляется еще при рѣзи отъ вѣтровъ, при судорогахъ живота и т. п. принимаютъ по 20—30 капель.



Salix alba L. — Ива бѣлая (мужская сережка).  
(Къ стр. 216).



Salix alba L. — Ива бѣлая (женская сережка). (Къ стр. 216).

5. *Ревенный сиропъ (Syrupus Rhei)* кромѣ растворимыхъ въ горячей водѣ веществъ ревеня, онъ содержитъ также: корицу съ углекислымъ кали (натромъ) и сахаромъ. Малолѣтнихъ дѣтей онъ слабятъ достаточно; принимаютъ чайными ложками.

*Rhododendron chrysanthum*: L. (Камкара, шабина, келарскъ, черногривъ, пьяная трава, пьянишникъ. — *Rhododendron*. — *Rhododendron*). Растетъ на сѣжныхъ горахъ по всей Сибири, также около рѣки Енисея и озера Байкала, въ Камчаткѣ на островѣ Беринговомъ, какъ по каменнымъ утесамъ, такъ и у подошвы горъ по болотамъ.



Трава и стебли этого растенія содержатъ экстрактивно-горькое вяжущее начало, соединенное съ снотворнымъ веществомъ. *Zanaxu* свѣжїе листья не имѣютъ, сухїе-же отсыхается жѣвательно ревенемъ; *скусть* — вяжущій съ ощутительною горечью и остротою.

При небольшихъ приѣмахъ кашкара дѣйствуетъ разводящимъ потогоннымъ, мочегоннымъ и противуломотнымъ образомъ. Въ большихъ приѣмахъ дѣйствіе ее ядовитое, сильно раздражающее и усыпительное, подобное дѣйствию багуна (*Ledum palustre.*) Употребляется въ простудной ломотѣ, членовыхъ боляхъ, особенно застарѣлыхъ венерическихъ, бедренной ломотѣ, подагрѣ, сведенїи ногъ и параличѣ; въ астеническихъ ревматизмахъ, удушливомъ кашлѣ и другихъ грудныхъ мокротныхъ припадкахъ не соединенныхъ съ лихорадкою; въ поясничной и почечныхъ боляхъ, — кожныхъ болѣзняхъ и нечистыхъ высыпяхъ. — Снаружи ее употребляютъ въ видѣ припарки, примочки и присыпки въ застарѣлыхъ ножныхъ язвахъ, раковыхъ и скіррныхъ опухоляхъ груди, неподвижности членосоединенїй, и сведенїяхъ, послѣ подагры, паралича и проч.

Для наливки: 2 или 4 драхмы стеблей и листьевъ наливается 12 унціями горячей воды, давъ настояться въ теченїи 24 часовъ и предварительно процѣдивъ принимаютъ эту наливку по чайной чашкѣ, 2 или 3 раза въ день, смотря по надобности. — При употребленїи этой наливки, должно обращать вниманїе на крѣпость ея, и на количество, т. е. давать ее крѣпче или слабѣе, а равно и приѣмы: уменьшать, прибавлять или превращать на время вовсе. Это необходимо для, того что-бы избѣгать опасныхъ послѣдствїй, въ которыхъ можетъ повести употребленїе этого героическаго средства.

Татары, Осетинцы и другїе кочующїе народы траву эту употребляютъ ежедневно вмѣсто чаю для здоровья. Жители Байкала тоже употребляютъ горячую наливку ее, отъ простуды.

Сибирскїе жители для излеченїя отъ насморка или простуды боли головы, нюхаютъ истертую въ порошокъ траву этого растенїя; а слабую водяную наливку, употребляютъ, какъ лекарство отъ застарѣлой простуды, и реематизмовъ.

**Rhus cotinus.** L. (*Желтникъ, желтое кожанное дерево, сулозь, бала.* — *Gerberstrausch.* — *Sumac fustet*). Растетъ вообще по холмамъ и безплоднымъ мѣстамъ; въ Россїи встрѣчается на Терекѣ, Кавказскомъ хребтѣ и камышинскихъ степяхъ. Всѣ части этого дерева при разтиранїи издають сильный запахъ. Листья желтника весьма ядовиты, можно думать что даже прикосновенїе къ нему опасно, по крайней мѣрѣ, такъ надо заключить изъ того, что по разсказу Тисіе (*Tourm. Bot. V. 4, p. 124*) одна дама державшая нѣсколько минутъ въ рукахъ, цвѣтущую вѣтвь желт-

нива, почувствовала въ этой послѣдней онѣмѣніе, а на другое утро рука покрылась сыпью.

Корка, ягоды и сѣмяна имѣютъ свойства сильно-вяжущія. Дѣйствіе ихъ вяжущее, укрѣпляющее. Листья и семена въ видѣ попки, употребляются въ кровотеченіяхъ и бѣляхъ: — Корка налезна въ долговременныхъ поносахъ, астеническихъ кровотокахъ и мокротномъ теченіи изъ детородныхъ частей.

Въ порошокъ даютъ отъ 20—40 гранъ; для наливки, кладется полъ-унціи на фунтъ воды; которую, вскипятивъ однажды и процедивъ, даютъ по 2 или 3 унціи, три или четыре раза въ день. Снаружи употребляется въ видѣ вспыскиванія и примочки.

Изъ дерева получается желтая краска, употребляемая для сѣянна и шелка, листья идутъ для дубленія кожъ.

\* *Ribes nigrum* L. (Черная смородина. — *Schwarze Johannisbeere*. — *Cassis*). Растетъ по влажнымъ и лѣсистымъ мѣстамъ въ большей части Россіи. Ягоды черной смородины отличаются камендымъ, ароматическимъ вкусомъ и сочностью. Листья и побѣги ея дѣйствуютъ укрѣпляющимъ желудокъ образомъ; они между прочимъ входятъ въ составъ противузолотушнаго набора составляемаго изъ равныхъ частей: цвѣтовъ аютиныхъ глазокъ (*Viola tricolor*), травы череды (*Bidens tripartita*), калиныхъ побѣговъ (*Viburnum opulus*) и листьевъ черной смородины.

\* *Ribes rubrum* L. (Красная смородина. — *Rothe Johannisbeere*. — *Lagroseillier rouge*). Растетъ по тѣнистымъ и влажнымъ лѣсамъ. Ягоды этой породы, отличаются своею кислотю и содержатъ въ себѣ также, какъ и ягоды предъидущей породы: яблочную и лимонную кислоты, сахаръ, камедь, извѣсть, древесину и воду. Находящійся въ нихъ *гросулинъ* есть измѣненіе слизи; онъ представляется: состоящимъ изъ прозрачныхъ, розоваго цвѣта чешуекъ, выделяющихъ при дѣйствіи на нихъ азотной кислоты, значительное количество шавельковой кислоты.

Изъ ягодъ красной смородины приготавливаютъ прохладяющія морсы и сиропы.

*Ribes grossularia* L. (Крыжовникъ. — *Stachelbeere* — *Groscillier epineux; groselles à maquereaut*). Растетъ по необработаннымъ мѣстамъ. Сокъ его ягоды служитъ полезнымъ средствомъ противъ отравленій нѣкоторыми ягодами. Вообще ягоды этого вида дѣйствуютъ освѣжающимъ и слабительнымъ образомъ.

\* *Robinia pseudo-acacia* L. (Лжеакація. — *Schotendorn*. — *Faux-acacia*). Извѣстна у насъ, какъ акклиматизированное, встрѣ

чаемое въ садахъ и паркахъ растеніе. По пользѣ которую можетъ доставить эта порода, она должна быть признана однимъ изъ самыхъ драгоценнѣйшихъ растений, доставленныхъ намъ акклиматизаціею. Скотъ обыкновенно не употребляетъ въ пищу свѣжія листья лжеакаціи, которые будучи высушены составляютъ для него превосходный кормъ на зиму. Цвѣты ея обладаютъ антиспазмотическими свойствами и съ пользою могутъ быть упоурбляемы въ видѣ водяной наливки для утоленія спазмъ. Эту послѣднюю пьютъ по чайной чашкѣ и болѣе.

\* *Rosa canina* L. (*Шиповникъ*.—*Hunds Rose*.—*Eglantier*; *Rosier sauvage*). Растетъ въ лѣсахъ; свойства шиповника вяжущія. Это растеніе содержитъ въ себѣ: танинъ, галловую кислоту, красящее вещество, существенное масло, жирное вещество, альбуминъ, кремнеземъ, окиси желѣза и основные соли потассія и извѣсти. Изъ цвѣтныхъ лепестковъ шиповника приготавливаютъ консервы, употребляемыя въ діарей.

*Rosmarinus officinalis* L. (*Розмаринъ*. — *Rosmarin*.—*Romarin*; *Herbe aux courromnes*). Растетъ въ южной Россіи по гористымъ мѣстамъ. Какъ въ свѣжемъ такъ и сухомъ видѣ розмаринъ издаетъ сильный ароматическій запахъ. Вкусъ его вяжущій, горьковатый. Перегонкою изъ него получается лѣтучее прозрачное, сильно пахучее масло, содержащее въ себѣ большое количество фосфора.

Дѣйствіе розмарина преимущественно тоническое, возбуждающее. Его принимаютъ внутрь въ формѣ водяной наливки; а снаружи употребляютъ винный отваръ розмарина для укрѣпленія нервовъ, предупрежденія антонова огня и возстановленія чувствительности въ членахъ, пораженныхъ атоніею. Водяную наливку розмарина пьютъ какъ чай, при пораженіи нервной системы, блѣдной немощи, хронической діарей. Виннымъ отваромъ его примачиваютъ атоническія язвы.

Розмариновое масло даютъ на сахаръ, по 4 капли. Листья хвалятъ весьма многіе врачи, противъ четырехъ-дневныхъ лихорадокъ. Кромѣ врачебнаго употребленія, розмаринъ входитъ въ составъ весьма многихъ косметиковъ.

*Rubia tinctoria* L. (*Марена кизлярская*; *Krapf*.—*Gemeiner Färberröthe*; *Krapf*.—*Garance*). Растетъ по глинистымъ мѣстамъ южной Россіи, но известна преимущественно какъ воздѣлываемое растеніе. Марена разводится исключительно ради ея корня, изъ котораго добывается красная, — краповая краска, замѣчательная не столько по яркости колера, сколько по ея стойкости, противъ вліянія воздуха и свѣта. Эта краска имѣетъ такъ-же то характеристическое свойство, что при принятіи ее внутрь окраши-

васть у животныхъ и человѣка кости свойственнымъ ей цвѣтомъ, который не рѣдко сообщается кромѣ того: мочѣ, молоку, желчи: пасокѣ, а иногда даже жиру и поту. Марена содержитъ въ себѣ, красящее, красное вещество — *алицаринъ*, красящее желтое вещество — *ксантинъ*: древесную, растительную кислоту, слизь, животное-растительное вещество, камедь, сахаръ, горькое вещество, па-вучую смолу и различные соки. Запахъ (корни) при толченіи слабый; вкусъ: горьковато-вяжущій. Дѣйствие его вяжущее укрѣпляющее, гонящее мочу и мѣсячные крови.

Корень Марены не разъ употребляли съ успѣхомъ противъ: размягченія костей, опухоли составовъ, брюшныхъ заваловъ, упорной желтухи, запора кровей, худосочія, блѣдной женской немочи, млечныхъ струповъ, дѣтской сухотки, заваловъ печени, мокротныхъ болѣзней легкаго, поясничной боли отъ надсады, или излишняго насилія, астенической ломоты, вертлужной боли и для истребленія багровыхъ или красныхъ прыщей на лицѣ. Противъ послѣднихъ совѣтуютъ пить отваръ этаго корня въ теченія 20—30 дней, принимая по 4 унціи, по утру и въ вечеру.

Для отвара унція корня кладется на фунтъ воды, которую кипятятъ до тѣхъ поръ пока останется 8 унцій. Тогда процѣдивъ и подсластивъ медомъ отваръ, его даютъ дѣтямъ по 2 или 3 столовыхъ ложки на приемъ, нѣсколько разъ въ день.

Крѣпкій отваръ марены съ равною частію вербовой корки— (по полунціи каждаго изъ этихъ веществъ, истолокши варятъ для этой цѣли въ 2 фунтахъ воды, пока останется 12 унц. жидкости, и за тѣмъ прибавляютъ 1 драхму очищенной воды) по отзыву Кашинскаго, излечиваетъ англійскую болѣзнь, въ особенности если одновременно ѣ его употребленіемъ внутрь, берутъ ванны изъ вербовой корки—Въ порошокъ корень марены дается: отъ  $\frac{1}{2}$ —1 драхмы, каждыетри часа взрослымъ; дѣтямъ-же въ видѣ каши даютъ, смѣшавъ тоже количество порошка съ медомъ, по чайной ложкѣ: 3 или 4 раза въ день.

Противъ англійской болѣзни Кашинскій хвалитъ слѣдующее средство: взять 2 золотника корня марены, собраннаго осенью и высушеннаго, столько же травы водянаго трилистника или вахты и изрѣзавъ ихъ мелко, должно налить полбутылки воды и варить пока укипитъ половина жидкости; потомъ къ процеженному отвару надо прибавить ползолотника поташу или соды и подсластивъ сахаромъ или медомъ, давать больному по столовой ложкѣ, каждые 2 часа.

\**Rubus chamaemorus L.* (*Морошка; Мамура. — Zwerg Bromberstrauch. — Ronce*). Растетъ по торфяникамъ и болотистымъ мѣстамъ сѣверной полосы Россіи.

Свѣжія ягоды, желтоватыя, запаху не имѣютъ; темно-красныя, пріятно пахнутъ на подобіе малины; вкусъ кислотаты й,

пріятный, винный. Дѣйствіе ягодъ морошки прохлаждающе жажду и противуцынготное. — Употребляются въ лихорадкахъ, цынгѣ, чахоткѣ и кровохарканіи.

Свѣжія ягоды даютъ больнымъ кушать по желанію; или въ видѣ варенья примѣшиваютъ къ вѣтью, по нѣскольку унцій.

**Rubus fruticosus L.** (*Ежевика, ожина, дереза, куманика.* — *Ge-meiner Bromber-Strauch—Mures sauvages: meurons; mures de renard; ronce de St. Francois.*) Растетъ по лѣсамъ и полямъ.

Вкусъ ягодъ куманики кисло-сладкій; молодого стебеля и листовъ: вязущій, такъ же какъ и корня. Дѣйствіе ягодъ прохладительное разводящее, — листьевъ и стволловъ очищающе, корня мочегонное.

Ягоды, подобно малинѣ, утоляютъ жажду и жаръ; а потому даются съ пользою одержимымъ воспалительными лихорадками. Отваръ листьевъ и стволловъ, хорошъ для полосканія въ жабѣ и гортанныхъ ранахъ, а также въ кровохарканіи, теченіе бѣлей и въ поносахъ. — Снаружи: толченныя листья прикладываются къ лишаямъ и старымъ язвамъ на ногахъ: въ видѣ ватаплазмы, способствуютъ нагноевію упорной ноготѣды. — Корень полезенъ для страдающихъ водяной болѣзью.

Зрѣлыя ягоды даютъ больнымъ кушать по желанію; или въ видѣ варенья и сиропа примѣшиваютъ по 2 унціи къ питью. Поль-унціи сухаго корня полагается на 8 унцій воды для отвара. — Наружное употребленіе листовъ описано выше.

\* **Rubus idaeus L.** (*Малина.* — *Himbeere.* — *Le framboisier.*) Растетъ по лѣсамъ.

Свѣжія ягоды имѣютъ запахъ пріятный; вкусъ кисло-сладкій. Дѣйствіе ягодъ малины прохладительное, утоляющее жажду и потогонное, употребляется она въ воспалительныхъ лихорадкахъ, желчныхъ горячкахъ и цынгѣ. Цвѣты полезны въ рожѣ и воспаленіи глазъ. Листья въ видѣ полосканья, приносятъ пользу въ жабѣ и другихъ гортанныхъ воспаленіяхъ.

Больнымъ даютъ свѣжія ягоды въ большомъ или меньшемъ количествѣ по желанію. — Смѣсь изъ 3 унцій малиноваго сока и подражмы поташа, замѣняетъ риверо-соляное питье, которое полезно для страдающихъ каменною болѣзью.

**Rumex Patientia L.** (*Щавель садовой.* — *Garten Ampfer.* — *L'Oseille patience; Epinard immortel.*) Разводится въ садахъ. Вкусъ этого растенія горькій, вязущій.

Дѣйствіе его корня тоническое, слабительное, впрочемъ чрезвычайно медленное. Народныя лекаря употребляютъ его иногда противъ болѣзней кожи, въ которыхъ они даютъ пить по кружкѣ и болѣе его водяной отваръ.

\* *Rumex aquaticus* L. (*Щавель водяной. — Wasser Ampfer. — L'Oseille; Patience aquatique*). Растетъ во рвахъ и берегахъ ручьевъ. Корень этого вида имѣетъ тѣже и свойства, какъ и корень предыдущаго и употребляется съ тою же цѣлю и такимъ же образомъ. Кромѣ того жеваніе его, какъ утверждаютъ нѣкоторые укрощаетъ зубную боль.

\* *Rumex acetosa* L. et *Rumex acetosella* L. (*Кислица обыкновенная и кислица малая. — Gemeiner Ampfer und Kleiner Ampfer. — L'Oseille commune et L'Oseille surelle; petite Oseille*). Растутъ подугамъ, дорогамъ и лѣсамъ. Корень вѣтъ двухъ породъ такъ же, какъ и ихъ сѣмена имѣютъ свойства вяжущія. Водяная наливка ихъ листьевъ, употребляемая разъ въ день, какъ чай, помогаетъ въ цингѣ, продолжительныхъ жолчныхъ, перемежающихся лихорадкахъ.

*Rula graveolens* L. (*Рута. — Garten Raute. — Rue fetide*). Разводится въ садахъ. Вкусъ, руты острый, жгучій, очень горькій. Приложенная на кожу раздражаетъ ее и производитъ красноту. Приемъ руты внутрь причиняютъ сильное волненіе, сухость во рту и боль въ горлѣ. Промывательныя изъ руты, по отзыву нѣкоторыхъ врачей, полезны отъ листовъ; а полосканье противъ зловонныхъ ранъ десенъ.

S.

\* *Sagittaria Sagittaeifolia* L. (*Стрѣлолистникъ обыкновенный; стрѣлочная трава. — Gemeines Pfeilkraut. — Flèche d'eau*), Растетъ въ стоячихъ водахъ, почти по всей Россіи.

Развитіе стрѣлолистника заслуживаетъ особаго вниманія. Его корень представляется пучкомъ нитеобразныхъ, бѣложелтыхъ, отчасти мясистыхъ волоконъ. Изъ шейки его выходитъ подземное, ползучее корневище, оканчивающееся овалъною луковичкою покрытою такъ же какъ и самое корневище однимъ или нѣсколькими оболочками, переходящими во влагалищъ стебля. Изъ оконечности луковички выходятъ многочисленныя развѣтленія, снабженныя въ свою очередь конечными или расположенными четкообразно луковичками. Эти развѣтвленія достигаютъ нерѣдко до нѣсколькихъ футовъ длины. Внутренность луковички наполнена, исчезающимъ при старости растенія бѣловатымъ, сладкимъ, мучнистымъ веществомъ. Изъ вершины корня выходятъ: узкія, тонкія, линейныя, лентообразныя листья, чрезвычайно сходныя въ первый періодъ ихъ появленія съ листьями Валиснеріи. Го-

вора въ сущности, это собственно (надо полагать) не листья, а еще неразвившія пластинки листа черешки ихъ. Дѣйствительныя же листья появляются на нихъ, только по выходѣ ихъ на поверхность воды. Получивъ возможность къ воспріянію различной пищи изъ атмосферы они подвергаются особаго рода измѣненіямъ: ихъ клѣточки наполняются мыльновидною мякотью, въ слѣдствіе чего они раздуваются и такимъ образомъ измѣняютъ свою форму, сохраняя при этомъ прежнѣе расположеніе жилы. Можно очень нерѣдко замѣтить какъ на оконечности этихъ черешковъ, развивается листъ то расширяясь на подобіе лопатки, съ гладкими краями, то принимая триугольную стрѣловидную форму. Этому растенію приписываются народомъ ранозлѣчительныя, вяжущія, и кровоочистительныя свойства. Вкусъ его листьевъ: острый, но острота ихъ смягчается, содержаниемъ въ нихъ въ обиліи мыльновидною мякотью. Луковицы его по своей питательности должны быть названы драгоцѣнными, и это качество ихъ давно уже оцѣнено въ Китаѣ, гдѣ это растеніе воздѣлывается въ довольно обширныхъ размѣрахъ. Вкусъ луковицъ подходит къ вкусу каштановъ. Варенные луковицы стрѣлолиста, употребляемые въ произвольномъ количествѣ, даются нѣкоторыми знахарями для возстановленія силъ больныхъ, ослабѣвшихъ отъ продолжительной или сильной болѣзни и судя по составу ихъ это дѣйствіе ихъ представляются вполне вѣроятнымъ.

\* *Salix alba* L. (Верба бѣлая; ветла, ива. — *Weisse-Weide*. — *Saule blanc*). Растетъ по песчанымъ берегамъ и сухимъ мѣстамъ.

\* *Salix pentandra* L. (Пятимужная верба; черномаль; черныи мальникъ; лозина. — *Fünfmännige Weide*. — *Saule noire*). Растетъ въ лѣсахъ по берегамъ ручьевъ, около дорогъ и въ болотахъ.

\* *Salix fragilis* (Верба ломкая, ива хрупкая. — *Bruch Weide*. — *Saule fragile*). Растетъ по берегамъ и болотистымъ мѣстамъ. — Ивовая кора содержитъ въ себѣ: салицинъ, дубильную кислоту, кортицинъ (сходный съ краснымъ хиннымъ красильнымъ веществомъ), летучую кислоту и др.

Физиологическія дѣйствія ивовой коры такія, какъ у вяжущихъ горькихъ веществъ; въ малыхъ приемахъ она повидимому легко переносится.

Вообще она употребляется, при недостаткѣ и растройствахъ пищеваренія и подобныхъ страданіяхъ, а также при бленноройныхъ состояніяхъ слизистой оболочки дыхательныхъ вѣтвей, половыхъ и мочевыхъ органовъ, при глистахъ, и наконецъ въ перемежающей лихорадкѣ.

Однако во всѣхъ этихъ случаяхъ ивовая кора можетъ быть

полезною, развѣ только въ рѣдкихъ случаяхъ, и только въ незначительной степени заслуживаетъ названія «отечественной хины», которое ей нѣкоторые даютъ. Скорѣе она можетъ замѣнить хину при послѣдовательномъ леченіи, на примѣръ противъ расстройства пищеваренія, или чтобы предотвращать возвратъ перемежающейся лихорадки.

*Салицинъ* кристаллизующееся вещество ивовой коры (онъ находится также въ корахъ тополи, дуба и др.), растворяется довольно легко въ водѣ, еще легче въ винномъ спиртѣ, но не въ эфирѣ; горькаго вкуса; отъ сѣрной кислоты онъ становится ярко-краснымъ; отъ эмульсина (*symplicas*) онъ превращается въ сахаръ и салигенинъ, отъ хромовой кислоты и др., какъ и проходя чрезъ тѣло, въ салицильную кислоту.

Дѣйствіе салицина неизвѣстно, только онъ весьма горькаго вкуса. Его употребляли и хвалили противъ тѣхъ же страданій, какъ ивовую кору или хининъ, нѣкоторые предпочитаютъ его даже хинину, не только при недостаткѣ пищеваренія, поносѣ и т. п., но и при перемежающейся лихорадкѣ, невралгіяхъ, коклюшѣ и одышкѣ.

Въ перемежающейся лихорадкѣ его даютъ по 4—10 гранъ по нѣсколькx разъ въ день; въ другихъ случаяхъ по 1—3 гранъ на приемъ; всего лучше въ видѣ порошка, пилюль, съ соответственными прибавленіями.

Различныя *тополи*, напр. *осина*, *осоколь бѣлая* (*populus tremula, alba*), также содержатъ въ своей корѣ салицинъ (и пупинъ, кортицинъ).

Вербная корка, имѣетъ запахъ пріятно-душистый; вкусъ горько-вяжущій и нѣсколько бальзамическій.

Кромѣ упомянутыхъ выше случаевъ она полезна въ чахоткѣ, происходящей отъ ранъ въ легкомъ, въ цынги и застарѣлыхъ глихъ язвахъ, бывающихъ нерѣдко на ногахъ, пролежняхъ, гнидой жабъ и порчѣ зубовъ отъ гнилости; крѣпкій отваръ вербовой корки весьма хорошо противудѣйствуетъ гнилости, а потому во всѣхъ гнилыхъ ранахъ и самомъ антоновомъ огнѣ можетъ служить для промыванія оныхъ и примочки. По свидѣтельству Кампера, этимъ же отваромъ подкисленнымъ сѣрною кислотою—былъ пересѣкаемъ скотскій падежъ, особенно коровъ. Ванны изъ ивовой коры помогаютъ дѣтямъ, страдающимъ слабостью въ ногахъ и одержаннымъ сиднями.

Въ порошокъ ивовую зеленую корку тонкихъ вѣтвей, даютъ приемами отъ 20 гранъ до 1 драхмы; для отвара полагается: 2 унціи корки на 2 фун. воды, которую кипятятъ, до тѣхъ поръ, пока останется 16 унцій жидкости. Изъ препаратовъ ивовой коры должно упомянуть:

1. *Экстрактъ ивовой корки* (*extractum cort. salicis*).



дается въ тѣхъ же болѣзняхъ отъ 10—40 гранъ; для наружнаго употребленія растворяютъ въ горячемъ винѣ или горьглѣ.

2. *Отваръ изъ корки сложной (decoctura salicis composita)*. Замѣняющій при необходимости отваръ хины.

3. *Порошокъ сложный (pulvis cort. salicis composita)*. Можетъ быть употребляемъ въ лихорадкахъ, и другихъ болѣзняхъ вмѣсто хины, за недостаткомъ оной.

Кору ивы должно снимать съ молодыхъ деревъ весной. Изъ сухенныхъ листьевъ вывариваютъ желтую краску, употребляемую для крашенія разныхъ матерій. Отваръ корня въ водѣ, даетъ красную краску.

\* *Salsola kali* L. (*Солянка кали.— Gemeines Salzkraut.— La soude kali*). Растетъ по морскимъ берегамъ. Солянка своими корнями связуетъ пески береговъ и при содѣйствіи выбрасываемыхъ моремъ растений, останки которыхъ перемѣшиваются съ ея стеблями образуетъ родъ плотины и такимъ образомъ повышаетъ морскія берега и подготавливаетъ почву для новой разнообразной растительности. Солянка играющая такую важную роль въ эволюціи природы не менѣе приноситъ пользы человѣку и животнымъ. По словамъ Декадоля въ окрестностяхъ Нарбона сѣмена ея пахнѣются въ овесѣ, употребляемый для корма рабочихъ воловъ, которыми черезъ это сообщается большая сила и развитіе. Главный продуктъ, добываемый изъ солянки, черезъ ея пережиганіе составляетъ соль, извѣстная подъ именемъ соды, которая какъ извѣстно, кромѣ своего врачебнаго значенія играетъ громадную роль въ промышленности и техническихъ производствахъ. Для получения соды: на берегу моря вырываютъ яму и укрѣпляютъ въ ней желѣзные полосы поперечно, такъ что бы они образовали рѣшетку, на которую кладутъ высушенныя растенія и разводятъ снизу огонь. По мѣрѣ сгорания, получаемую золу мѣшаютъ, какъ можно чаще и она образуетъ черезъ это твердыя и плотныя комья, состояща: изъ угля, золы, земли и различныхъ солей, смѣшанныхъ въ разной пропорціи. Дѣйствіе этого растенія питательное, нѣсколько слабѣе, глистогонное и потогонное.

*Salvia officinalis* L. (*Шалфей.— Gemeine Salbey.— Sauge*). Растеніе воздѣлываемое въ огородахъ и садахъ. Вкусъ шалфея острый, горькій ароматическій, запахъ пріятный. Дѣйствіе его тоническое, возбуждающее дѣятельность пищеварительныхъ органовъ. Его употребляютъ въ слизнистыхъ лихорадкахъ, молочницѣ у новорожденныхъ и водяной болѣзни. Шалфей принимаютъ въ видѣ наливки, дистиллированной изъ него воды, спиртной настойки и существеннаго масла. Нѣкогда шалфей игралъ до того важную роль, что врачи Салернской школы утверждали, что человекъ, если бы только вообще было для него возможно безмер-

тіе, могъ бы достигъ его при помощи этого растенія. Безъ сомнѣнія. Шалфей, какъ обладающій высшею степенью, свойственныхъ веществъ веществъ губоцвѣтнымъ: горечи и арамата, долженъ быть предпочтенъ употребленію другихъ сходныхъ съ нимъ растеній, въ тѣхъ случаяхъ, когда употребленіе ароматическихъ средствъ считается полезнымъ; но, это не даетъ еще права, приписывать ему сверхъ естественныя силы. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Китая водная наливка Шалфея употребляется вмѣсто чая, а китайцы по свидѣтельству Гезера, изумляются, что Европейцы, владѣя этимъ растеніемъ выписываютъ отъ нихъ чай, отличающійся менѣе пріятнымъ вкусомъ. Въ нѣкоторыхъ странахъ листья шалфея употребляютъ для куренія, какъ табакъ.

\* *Sambucus nigra* L. (*Бузина черная, деревянная; боръ дерево*.—*Gemeiner Hollunder*.—*Sureau à fruits noirs*). Известна почти во всѣхъ полосахъ Россіи, какъ акклиматизированное растеніе, растущее въ садахъ и паркахъ, въ дикомъ состояніи встрѣчается на Кавказѣ. Цвѣты бузины, содержатъ въ себѣ: масло густой консистенціи и аммоніакъ.

Запахъ средней зеленой корки и цвѣтовъ крѣпкій, пріятный; вкусъ ея горьковатый, приторный; ягодъ пріятно-кислый.

Дѣйствіе свѣжей корки: проносное, и отчасти рвотное; сухія цвѣты: дѣйствуютъ, какъ потогонное и разбивающіе средство, а ягоды—какъ охлаждающіе и потогонное.

Средняя или лубовая—корка бузины полезна въ водяной болѣзни и ножныхъ отекахъ. Листья помогаютъ при трудномъ родовомъ кровоочищеніи. Толченныя листья прикладываются въ видѣ катаплазмы къ ножнымъ отекамъ, разбиваютъ или смягчаютъ подагрическія боли; употребленіе цвѣтовъ бузины одобряется въ простудномъ кашлѣ, грудныхъ мокротныхъ припадкахъ и колотѣхъ, особенно при трудномъ отдѣленіи мокроты, въ ревматизмъ, членовой ломотѣ, наложныхъ сыпяхъ и въ рождѣ.—Продолжительнымъ употребленіемъ бузиновыхъ цвѣтовъ, отваренныхъ въ молокѣ излечивается хроническая рожа и усиливается отдѣленіе молока въ грудяхъ.—Бузиновые цвѣты производя обильную испарину, служатъ домашнимъ средствомъ для превращенія простуды; въ кори, краснухѣ и другихъ ножныхъ сыпяхъ они содѣйствуютъ скорѣйшему выдѣленію оныхъ наружу.

Свѣжія и сухія ягоды хвалятъ въ водяныхъ, маточныхъ и простудныхъ опухоляхъ.

Для отвара корки, отъ  $\frac{1}{2}$ —1 ея владется на фунтъ воды, которую увариваютъ до тѣхъ поръ, пока останется 8 унцій жидкости; цвѣтовъ 2 или 3 драхмы наливаютъ 12 унц. воды, которую настоявъ, пьютъ вмѣсто чая съ медомъ или сахаромъ; въ видѣ сухой припарки, въ мѣшечкахъ они, прикладываются въ рождѣ, ломотнымъ и подагрическимъ опухолямъ.—Припарку изъ цвѣ-

втовъ, отаренныхъ въ молокъ, совѣтуютъ прикладывать для утолненія подагрическихъ болей и раковыхъ язвъ.—Ягоды въ видѣ варенья даются, въ простудныхъ лихорадкахъ: отъ 1—2 унцій въ приличныхъ микстурахъ, или съ бузинымъ чаемъ. Изъ этого растенія приготавливаютъ:

1. *Кисель бузиный*— (*roob sambuci*). Употребляемый въ упомянутыхъ болѣзняхъ, приемами по 1 унціи.

2. *Полосканье квасное*— (*gargarisma aluminosum*). Употребляемое отъ жабы и гортанныхъ ранъ.

Поселане пользуются отъ водяной болѣзни выжатымъ сокомъ изъ зеленой корки и свѣжихъ листьевъ, принимая его съ простымъ виномъ по утру и вечеромъ по столовой ложкѣ; коренныя стружки бузины они варятъ въ водѣ и пьютъ вмѣсто слабительнаго.

\* *Sambucus Ebulus L.* (*Бузникъ; Селеникъ; красная бузина.*— *Zwerg-Hollunder.* — *Sureau hibble; L'hibble*). Встрѣчается въ южной Россіи и на Кавказѣ, по полямъ и обработаннымъ мѣстамъ, въ прочихъ же частяхъ Россіи растетъ какъ и предъидущій видъ въ акклиматизированномъ состояніи. Дѣйствіе бузника сходное, но сильнѣе дѣйствія бузины черной, почему употреблять ее должно съ осторожностію. Она приноситъ пользу въ тѣхъ же случаяхъ, какъ и предъидущая.

Всѣ части растенія испускаютъ сильный, непріятный запахъ, который прогоняетъ крысъ и мышей съ гумень, почему ее полезно сажать около нихъ и хлѣбныхъ амбаровъ.

Ягоды красной бузины, съ уксусомъ и квасцами, придаютъ синій цвѣтъ пряжѣ и кожамъ. Изъ сѣмянъ, получается масло, разбивающее мокротные застои влагъ, и водяные опухоли.

Цвѣты черной и красной бузины могутъ, по своему потогонному свойству, замѣнить баккаутъ (*lignum guaiaci offic.*) Кисель изъ ягодъ можетъ служить, вмѣсто тамариндовъ, сенни и кассіи.

\* *Saponaria officinalis L.* (*Мыльная трава; Мыльнянка.*— *Ge-meines Seifen-Kraut.*— *La saponaire officinale*). Растетъ по берегамъ ручьевъ и каменистымъ мѣстамъ.

Содержитъ въ себѣ: острое, некристаллизующееся вещество (*сапонинъ*), смолу, камедь и др.

Корень и листья запаху не имѣютъ; вкусъ: сладковатый, горьковато-влейкій.

Дѣйствіе мыльнянки притупляющее, разбивающее, мочегонное, очищающее. Сѣмянамъ приписываютъ противуглистные свойства.

Корень и листья употребляются въ венерическихъ болѣзняхъ: въ отварѣ, въ соединеніи: съ сладкогорькимъ, и съ можжевельнымъ деревомъ, или съ волчьимъ лыкомъ. Кромѣ того они по-

лезны въ ломотныхъ членовыхъ боляхъ, застарѣломъ ревматизмѣ, брюшныхъ завалахъ, затвердѣннн железъ, желтухъ, запорѣхъ провей, загноеннн внутренностей, цынготномъ худосочнн, простудномъ мокротномъ и удушливомъ кашлѣ. тихой изнурительной лихорадкѣ, мокротномъ стволловомъ теченн, теченн женскихъ бѣлей, кожныхъ долговременныхъ сыпяхъ, худосочныхъ язвахъ: воспаленн легкихъ и печени, мокротныхъ завалахъ начальной водяной болѣзни, ипохондрнн, сухоткѣ, глистныхъ припадкахъ и задумчивостн. Снаружн свѣжее растенн истолченное съ корнемъ въ мякоть, прикладывается для очищенн кожныхъ болѣзней и нечистыхъ язвъ.

Для отвара на полуницн корня берется фунтъ воды, которую выпятятъ до тѣхъ поръ, пока останется 8 унцн отвара, принимаемаго по чайной чашкѣ, нѣсколько разъ въ день; свѣжихъ листовъ кладутъ горсть, на тоже количество воды и отваривъ ихъ употребляютъ для омыванн кожныхъ болѣзней, нечистыхъ язвъ, и для припариванн ломотныхъ опухолей. Свѣжовыжатый сокъ изъ всего растенн даютъ на тощакъ отъ 5—6 унцн.—Сгущенный сокъ, Кашинскн давалъ вмѣстѣ съ экстрактомъ вахты: отъ 1—4 драхмъ, въ брюшныхъ завалахъ и водяной болѣзнн. Сѣмяна въ порошокъ, прнемами отъ 15—20 и 30 гранъ, даются нѣкоторыми отъ падучей болѣзнн. Изъ мыльнянки готовятъ:

1. *Древесные кровочистительные сборы*—(*species lignorum purificantes*).

2. *Кровочистительный отваръ* — (*decoctum lignorum*), употребляемый въ вышеупомянутыхъ болѣзняхъ, по 2 фунта въ день, въ раздѣленныхъ прнемахъ, — Простѣе и дешевле можно готовить сборъ изъ корней мыльной травы, репейника, можжевельника и хмѣлевыхъ корешковъ, изрубивъ мелко которые, по равной части употребляютъ для отвара, вмѣсто дорогихъ иноземныхъ, такъ наз. кровочистительныхъ деревъ. На бутылку воды, увариваемой до половины кладутъ 2 лота этого сбора и пьютъ его ежедневно по 3 стакана.

Корень мыльной травы по словамъ Кашинскаго совершенно замѣняетъ дорогую сарсапарилъ, сассафрасъ (*l. sassafras*) и чапушннскн корень—(*smilax china*).

Отваръ этого корня можетъ служить вмѣсто мыла для мытья бѣлья; и при взбалтыванн или взбиванн его прутикомъ, онъ пѣнится подобно мыльной пѣнѣ, и при мытьѣ хорошо очищаетъ салыныя пятна.—Этнмъ растительнымъ мыломъ можно мыть всякн шелковыя матерн, не измѣняя ихъ цвѣта.

\* *Saxifraga Hirculus L.* (*Каменоломка козья*.—*Moor-Stein*

*brech.—La saxifrage*). Растетъ по влажнымъ, въ особенности известковымъ лугамъ.

Корень и сѣмяна камнеломки имѣютъ вкусъ острый. Дѣйствіе ихъ мочегонное.

Полезны они для отвращенія запоровъ, въ остановкѣ мочи и мѣсячныхъ кровей, также въ чесоткѣ, и другихъ наложныхъ сыпяхъ.

Корень и сѣмяна даются въ наливкѣ, для которой на 2 драхмы наливаютъ 6 унцій бѣлаго вина. Изъ пепла этого растенія, получается соль, которая весьма хорошо гонитъ мочу, и песокъ. Листья этого растенія въ Сибири употребляютъ наподобіе чая, и потому оно называется: Чигирскимъ чаемъ, который гонитъ мочу и песокъ.

\* *Scabiosa arvensis* L. (*Knautia arvensis*<sup>2</sup> Coult.)— *Короставикъ полевой.*—*Acker Scabiose.*—*Scabieuse des champs*). Растетъ по лугамъ и холмамъ. Этому растенію равно какъ и слѣдующему за нимъ приписываютъ свойство излечивать болезни кожи, какъ чесотку и т. в. По свидѣтельству Порта, этого рода качествомъ обладаютъ въ особенности чешуйки цвѣточныхъ обертокъ. Но это мнѣніе едва ли можетъ быть названо вѣрнымъ. Кромѣ того ему присвоиваютъ ранозѣлительное, потогонное и разбивающее грудныя мокроты дѣйствіе; но суда по отсутствію у короставика всякаго запаха, и только слабгорькому, едва замѣтному вяжущему вкусу и это едва-ли справедливо.

\* *Scabiosa succisa* L. (*Succisa pratensis*. Moench.)— *Скабіоза луговая.*—*Wiesen scabiose.*—*Scabieuse*). Растетъ по лугамъ и и лѣсамъ. Скабіоза луговая благодаря шарлатанизму получила во многихъ странахъ славу магическаго растенія, способнаго парализировать дѣйствіе самыхъ сильныхъ ядовъ. Водяная наливка, ея цвѣтовъ имѣетъ запахъ сходный съ запахомъ чая; сушеные цвѣты окрашиваютъ ткани желтымъ цвѣтомъ, а листья собранные весной и подвергнутые броженію доставляютъ зеленое красящее вещество.

*Scandix cerefolium* L. (*Кервель.*—*Gebrauchlicher Kerbel.*—*Peigne de Venus*). Растетъ по полямъ и между пашнями. Это растеніе нѣкоторыми авторами относится къ роду *Chaerophyllum*, а другими къ роду *Anthriscus*, такъ Гофманъ называетъ его *Anthriscus cerefolium*, а Ламаркъ *Chaerophyllum sativum*.

Свѣжая трава этого растенія особенно растертая имѣетъ пріятный запахъ, зависящій отъ содержанія въ немъ ароматнаго масла. Вкусъ ея приобальзамный, подходящій къ запаху во-

доложаго укропа. Дѣйствіе его разводящѣе, мочегонное, умножающее молоко въ грудяхъ, и уничтожающѣе зловоніе мѣсячныхъ и родовыхъ кровей.

Кервель употребляется: въ лихорадкахъ, чревныхъ завалахъ, водяной болѣзни, кровавыхъ маточныхъ застояхъ, особливо послѣ родовъ, зловонія родового и мѣсячнаго кровотеченій. Кервельная похлебка замѣняетъ всѣ другія лекарства, въ застарѣломъ кашлѣ, удущьѣ, кровохарваніи, чахоткѣ. Въ продолжительномъ грудномъ колотѣхъ, сильномъ скопленіи мокротъ, желтухѣ и геморроидальныхъ завалахъ совѣтуютъ выжатый изъ кервеля сокъ пить съ зельцерскою водою или съ молочною сывороткою. Средство это полезно также въ изнурительной или сухотной лихорадкѣ, золотушныхъ затвердѣніяхъ железъ, долговременныхъ кожныхъ болѣзняхъ, какъ-то: въ чесоткѣ, лишаяхъ и проч. Снаружи, толченые и подогрѣтые листья, прикладываются къ затвердѣлымъ грудямъ и раздутымъ почечуйнымъ шишкамъ, 2 или 3 раза въ день; иногда къ нимъ прибавляются и ольховыя листья, усиливающіе ихъ дѣйствіе. Поджаренные съ масломъ листья прикладываются къ животу и лбу для унятія сильной колики и отвращенія запора мочи. Кервельные клистиры и припарки съ прибавленіемъ болдаголова въ домотныхъ опухоляхъ и раковыхъ затвердѣніяхъ. При затвердѣніи внутреннихъ отъ заваловъ, круженіи головы, и какъ ранозлительное средство, хвалить кервельную катаплазму.

Свѣжую траву кервеля даютъ больнымъ въ супахъ. Для навлики, на 2 горсти травы берется фунтъ горячей сыворотки, которую настоявъ и прожавъ сквозь полотенцо, пьютъ по чайной чашкѣ нѣсколько разъ въ день. Выжатый сокъ принимаютъ по 2 унціи такъ-же съ сывороткою, поутру и вечеромъ.—

Выжатый изъ всего растенія сокъ, даютъ домашнимъ животнымъ, какъ мочегонное средство, до  $\frac{1}{2}$  фунта въ день.

\* *Scorzonera humilis* L. (*Козелецъ дикій; урзовникъ; космамикъ*.—*Niedrige Scorzonere*.—*La scorzonère petite*). Растетъ по лугамъ преимущественно торфянымъ въ средней и сѣверной полосѣ Россіи.

Корень этого растенія испускаетъ молочный горьковатый сокъ, который послѣ желтѣетъ.

Дѣйствіе его разводящѣе, притупляющѣе остроту влагъ, мочегонное и потогонное; почему отваръ козельца съ сочевицею, хвалить въ оспѣ и кори для ускоренія ихъ высыпанія.

Отваръ этого корня, съ прибавленіемъ уксуса и меда, служитъ прохладительнымъ питьемъ во всѣхъ воспалительныхъ болѣзняхъ; одинъ крѣпкій водяной отваръ, одобряютъ для разведенія густыхъ мокротъ, брюшныхъ заваловъ, въ мокротномъ

удушь, ипохондріи и подагрѣ; въ послѣднемъ случаѣ, впро-  
чемъ выжатый сокъ гораздо дѣйствительнѣе отвара.

Для отвара, 1-унцію корня полагаютъ на фунтъ воды ко-  
торую кипятятъ до 8 унцій; выжатый сокъ даютъ по 1, или 2  
унціи съ сывороткою.

Свѣжій молодой корень варятъ въ кушаньяхъ такъ, какъ  
гипспанскій козелецъ вмѣсто спаржи; изъ сухихъ кореньевъ,  
превращенныхъ въ муку, въ случаѣ нужды можно печь хлѣбъ.

\* *Scrophularia nodosa* L. (Норычникъ; собачья голова; зава-  
леуз; красный корень; зобный корень; старовина.—*Gemeine  
Braunwurz*.—*L'herbe du siége; serophulaire nouvelle*). Растетъ  
по влажнымъ мѣстамъ, около рвовъ, береговъ и подъ кустар-  
никами. На этомъ растеніи обитаетъ очень много насѣкомыхъ,  
такъ въ цвѣтахъ живетъ *Anthrenus scrophulariae* L.; въ плодахъ  
его обитаетъ *Curculio pericarpus* L.; а листья служатъ пищею  
и пріютомъ для личиновъ *Curculio scrophulariae* L. При пере-  
ходѣ этого послѣдняго насѣкомаго изъ состоянія личинки въ  
хризалиду (куколку), оно дѣлаетъ на концѣ вѣтвей норычника,  
близъ цвѣточныхъ почекъ округлое, пузыреобразное вздутіе.

Корень норычника имѣетъ запахъ противный, вонючій, уле-  
гучивающійся при сушеніи; вкусъ его островато-горькій, тошно-  
творный, зависящій отъ содержащейся въ немъ кислоты чер-  
нильныхъ орѣшковъ (*acidum gallic.*). Дѣйствіе этого корня  
разводящее, вѣтрогонное, болеутолительное, противуглистное  
потогонное и въ особенности дѣйствующее на пасочную систе-  
му. Его рекомендуютъ нѣкоторые врачи въ золотухѣ, зобѣ,  
воспалительной жабѣ въ горлѣ, почечуйныхъ шишкахъ, чесот-  
кѣ и въ другихъ накожныхъ болѣзняхъ. Снаружи листьями но-  
рычника припариваютъ разныя твердыя и болящія опухоли;  
порошкомъ корня присыпаютъ для очищенія и заживленія кож-  
ныхъ язвы.—Растертая свѣжая трава, прикладывается для за-  
живленія ранъ; а порошкомъ листьевъ присыпаютъ также за-  
старѣлыя язвы. Выжатый сокъ изъ всего растенія, смѣшанный  
съ коровьимъ масломъ, или свѣжнимъ саломъ, составляетъ мазь  
отъ чесотки, для людей и домашняго скота.

Сухой корень даютъ въ порошокъ по 1 драхмѣ или въ видѣ  
отвара, для котораго на полунціи корня кладутъ 8 унц. воды,  
и кипятятъ до тѣхъ поръ пока останется полфунта жидкости;  
за тѣмъ подсластивъ его даютъ по небольшой чайной чашкѣ.—  
Снаружи отваръ служитъ полосканьемъ и омываньемъ; свѣжіе  
листы служатъ для катаплазмы, или припарки; высушенные для  
присыпки.

\* *Scutellaria galericulata* L. (Шлемовникъ обыкновенный;  
щитовка.—*Helmkraut*.—*Casside; Centaurée bleue; tertianai-*

re; la tanque casside). Растетъ по влажнымъ листовнымъ гнсамъ, рвамъ, болотамъ и берегамъ рѣкъ. Поселяне нѣкоторыхъ изъ подмосковныхъ селеній, употребляютъ водяную наливку щитовки противъ простуднаго озноба. Съ этою цѣлю, они пьютъ ее на ночь по кружкѣ и болѣе; а нѣкоторые вмѣсто водяной наливки пьютъ молочный отваръ травы ея.

\* *Secale cornutum* L. (Спорынья. — Mutterkorn. — Ergot)

Спорынями называютъ особенные рога-или шпоровидные наросты, которые выступаютъ между цвѣточными створками многихъ злаковъ, особенно ржи, жита, также пшеницы, длиною отъ  $\frac{1}{2}$ —1 дюйма, толщиною не болѣе двухъ линій, довольно твердыя, грязно фиолетоваго или буроватаго цвѣта съ продольными бороздами, и отвратительнаго, нѣсколько остраго вкуса. Образование спорыней кажется еще не совсѣмъ объяснено. Иные почитаютъ ихъ за чужеродные грибы (*Sclerotium* s. *Spermoidia*, *Clavus*, *Sphacelia segetum*, *Ergotatia abortifaciens*), сходные съ такъ наз. хлѣбною рожью и которые развиваются въ ячичникъ плодовъ, другіе предполагаютъ что спорыни суть уродливые выродки или ложное гипертрофическое развитіе ячичника или самаго сѣмяни, вслѣдствіе присутствія чужероднаго гриба, а на нихъ могутъ впоследствии развиваться грибовидные наросты, какъ: *Sclerotium*, *Clavus*, третьи думаютъ что спорыни ни то ни другое, а выродившіяся стебельки, къ которому прирѣплено зерно, отчего питаніе зерна или его оболочекъ совершается не вполне достаточно, онѣ желтѣютъ, размягчаются; въ нихъ какъ и въ сѣмянной кожцѣ происходитъ родъ броженія, а между зерномъ и стебелькомъ выпотѣваетъ липкое вещество, которое отдѣляетъ испорченный плодъ отъ стебелька, и, увеличиваясь внизу все болѣе и болѣе, наконецъ образуетъ спорыню. Какъ бы то ни было, спорыни развиваются всего болѣе въ холодныя, дождливыя годы, особенно на краяхъ пашень въ сѣверныхъ странахъ, и онѣ созрѣваютъ раньше ржи, значить ихъ надобно собирать до жатвы съ зеленыхъ еще колосьевъ. Онѣ, говорятъ, ядовиты не въ первые періоды образованія, а только послѣ совершеннаго созрѣванія; тогда онѣ болѣе коричневы и пахнутъ отвратительно. Въ очень сырыя годы спорыни говорятъ, также не приобретаютъ особенной дѣйствительности, и онѣ теряютъ ее отъ долгаго храненія, развѣданія наѣкомыми; такъ старыя толченныя спорыни не производятъ почти никакого дѣйствія. Напротивъ и совсѣмъ свѣжія часто менѣе дѣйствительны, нежели пролежавшія нѣсколько времени. Пердю говоритъ, что лучшія спорыни растутъ на сухихъ, возвышенныхъ мѣстахъ, на песчаной и извѣстковой почвѣ; она хорошо сохраняется въ сахарѣ.



*Составныя части спорынья* суть: вытяжное вещество или *эрготинъ*,—химически индифферентное, краснобурое, порошкообразное вещество съ особеннымъ запахомъ и вкусомъ, растворимо въ спиртѣ, но не въ водѣ; далѣе жирное, довольно острое масло, извлекается ээиромъ, съ фунгиномъ, смолою, камедью, бѣдкомъ и пр.

Эрготинъ ли, или жирное масло, или другое вещество представляетъ самую дѣйствительную составную часть, это еще не рѣшено; но во всякомъ случаѣ эта часть, вещество которое почти совсѣмъ улетучивается или разлагается вареніемъ въ водѣ или броженіемъ хлѣбнаго тѣста, такъ какъ послѣ этихъ процессовъ спорынья мало или вовсе не дѣйствуетъ. *Жирное масло*, спорынья совершенно свободное отъ эрготина, не дѣйствительно. Спорынья не дѣйствуетъ какъ явный сильный ядъ, напротивъ, для произведенія опасныхъ дѣйствій нужны или большіе приемы или продолжительное употребленіе, и даже въ такомъ случаѣ—по крайней мѣрѣ у человѣка—обыкновенно должны содѣйствовать еще другія благопріятныя обстоятельства.

На животныхъ большіе приемы ея, дѣйствуютъ какъ остро-наркотическія вещества. Является слюнотеченіе, душеніе и рвота, собаки кричатъ; потомъ происходитъ совершенное спокойствіе, значительная слабость, дрожаніе мышцъ, оглушеніе съ расширеніемъ зрачка. Наконецъ могутъ наступить судороги или животныя вертятся въ одну сторону, или они просто оглушенные падаютъ, заднія конечности ихъ нѣмѣютъ, и наконецъ происходитъ смерть, обыкновенно черезъ нѣсколько дней.

Если спорынью проглатываетъ *человѣкъ* немногими, но большими приемами то она, кажется, можетъ производить дѣйствія—хотя не всегда и не у всякаго, которыя очень походятъ на толь-ко что описанныя: отрыжку, слюнотеченіе, тошноту, душеніе и рвоту, шевотаніе въ горлѣ, жажду, рѣзь, поносъ. Къ этому присоединятся расстройство въ мозгу, тяжесть головы, головокруженіе, расширеніе зрачка съ онѣмѣніемъ членовъ. Кровообращеніе замедляется, пульсъ обыкновенно становится слабымъ и рѣдкимъ, наконецъ можетъ послѣдовать даже бредъ или оглушеніе и сонливость. Иногда замѣчали сильную боль въ пальцахъ, или сильный зудъ кожи, опуханіе отдѣльныхъ лимфатическихъ желѣзъ. Впрочемъ такіе случаи отравленія чрезвычайно рѣдки, во всякомъ случаѣ они исключеніе изъ правила, и вѣроятно происходятъ только при особенной чувствительности и т. д.

Въ случаѣ *отравленія* спорыньей слѣдуетъ поступать, какъ при отравленіи наркотическими веществами, такимъ образомъ даютъ рвотныя и т. д.

Если спорынья употребляются *домо*, т. е. когда она употреб-

ляются въ пищу (напр. въ печеномъ хлѣбѣ), то могутъ про-  
изойти совершенно другія дѣйствія. Но и въ этомъ отношеніи  
еще мало объяснено, и съ достовѣрностью извѣстно только,  
что къ появленію дѣйствій, которыя приписываютъ спорыньямъ,  
содѣйствуютъ еще другія обстоятельства, скудный образъ жизни  
и бѣдность, привычное употребленіе водки, нездоровое жилище,  
нечистота и пр. Но люди и животныя часто употребляютъ  
спорыньи, послѣднія даже въ большомъ количествѣ, фунтами,  
безъ всякихъ опасныхъ послѣдствій, съ другой же стороны ви-  
дѣли, что болѣзни, какія приписываютъ дѣйствію спорыньи,  
господствовали эпидемически (напр. такъ назыв. *astrodunie* въ  
Парижѣ въ 1828 и 29 годахъ), между тѣмъ какъ нельзя было  
доказать, что онѣ произошли отъ употребленія этого вещества.  
Такимъ образомъ вѣроятнo, что въ прежнія времена и еще те-  
перь замѣчали иногда въ несчастливыхъ странахъ, какъ Ирландія  
и др., у многихъ людей особенное болѣзненное состояніе, выра-  
жающееся преимущественно нѣкоторыми разстройствами въ нерв-  
ной жизни, иногда даже мѣстнымъ помертвѣніемъ членовъ, и что  
эти припадки иные наблюдатели приводили въ связь съ употреб-  
леніемъ спорыньи.

Спорыньи давно уже почитаются во всѣхъ странахъ за сред-  
ство, которое можетъ дѣйствовать особенно на двигательные  
нервы и мышечное существо беременной матки. Потому ими  
пользовались, когда желали усилить сокращенія матки, потуги.  
Кромѣ того употребляли ихъ по дѣйствію на черепной и спинной  
мозгъ при нѣкоторыхъ разстройствѣхъ его, особенно при па-  
раличѣ спиннаго мозга, также какъ успокоительное средство для  
кровообращенія и сердца при кровотеченияхъ.

Если у рождающей женщины прекратились потуги, то отъ  
порядочнаго приѣма этого хорошосохраненнаго, дѣйствующаго пре-  
парата появляются часто уже черезъ 10—20 минутъ сильная боль  
въ родѣ потуговъ, и она большею частію болѣзненнѣе, чѣмъ при  
обыкновенныхъ потугахъ; сокращенія матки становятся сильны-  
ми и частыми и обыкновенно не прекращаются, покуда не вый-  
детъ ребенокъ и вскорѣ послѣ того послѣдъ.

Спорынью давали и даютъ въ особенности въ слѣдующихъ  
случаяхъ:

1. Какъ плодогонное средство при совершенной или относитель-  
ной недѣятельности матки во время и особенно подъ конецъ ро-  
довъ, при замедленіи родовъ отъ слабости или совершеннаго  
прекращенія потуговъ, такъ что нельзя надѣяться на изгнаніе  
ребенка обыкновеннымъ образомъ. Если замедленіе родовъ про-  
изошло отъ недостаточной силы матки и всѣхъ содѣйствующихъ  
мышцъ, то послѣ нѣсколькихъ приѣмовъ спорыней роды часто  
оканчиваются. Тоже бываетъ, когда отъ подобныхъ же причинъ

\*

\*

не могутъ выйти изъ матки другія содержимыя, послѣдъ, ложный плодъ (mola), полипы, гидатиды; и они могутъ тогда быть вытѣснены пробудившимися сильными сокращеніями матки и брюшнымъ прессомъ.—Но если замедленіе родовъ происходитъ отъ механической несоразмѣрности между ребенкомъ и тазомъ матери, неправильнаго положенія младенца (косаго, поперечнаго) или относительной неуступчивости маточнаго рыльца, рукава, заднепроходной промежности и т. д. (какъ напр. часто при первыхъ родахъ), словомъ, если роды замедляются обстоятельствами, которыхъ не можетъ преодолевать простое усиленіе потуговъ безъ опасности, то это составляетъ противопоказаніе къ употребленію спорыней. Тоже самое бываетъ при воспolenіи матки и другихъ болѣе значительныхъ пораженіяхъ органовъ рожденія, или когда у особенно расположенныхъ сокращеніе матки отъ дѣйствія спорыней могутъ имѣть опасныя послѣдствія, какъ напр. при аневризмахъ, легочныхъ болѣзняхъ и расположеніи къ удару мозга. Не должно также забывать о возможности разрыва, особенно при атрофіи, ненормальномъ утонченіи стѣнокъ матки, или при слишкомъ сильныхъ, продолжительныхъ потугахъ, и вообще вѣрное употребленіе этого средства, какъ и вездѣ требуетъ надлежащаго опредѣленія отдѣльнаго случая.—Конечно при обстоятельствахъ, спорыньи могутъ расширить маточное рыльцо въ случаяхъ, гдѣ оно мало или вовсе не раскрыто, и ускорить роды; послѣ ихъ употребленія видѣли довольно часто у беременныхъ даже выкидышъ (казавшійся нужнымъ, какъ при узкости таза, опасныхъ кровотеченіяхъ и т. д.). Но спорыньями можно обыкновенно пользоваться съ увѣренностью, только тогда когда прорвана зародышевая плева и головка ребенка уже въ маломъ тазѣ. Кромѣ того онѣ не всегда безопасны для очень раздражительныхъ, также для сильныхъ и полнобровныхъ женщинъ, и особенно для рождающихся въ первый разъ.

Наконецъ слѣдовало бы употреблять спорыньи съ осторожностью въ случаяхъ, гдѣ по обстоятельствамъ надобно сколько возможно ускорить роды, а потуги (которые сами по себѣ могутъ быть уже не слишкомъ слабы) для этого недостаточны; напр. при болѣе сильныхъ кровотеченіяхъ, предлагаемомъ дѣтскому мѣстѣ (Placenta praevia) и судорогахъ. Въ этихъ случаяхъ голова ребенка часто уже въ маломъ тазѣ, и обстоятельства такія, что нельзя пользоваться съ вѣрнымъ успѣхомъ ни щипцами, ни поворотомъ, между тѣмъ какъ отъ дѣйствія спорыней выдвигается головка, такъ что ее можно охватить щипцами. Однако тутъ, какъ и вездѣ должно держаться правила, что если возможно пользоваться руками или инструментами съ успѣхомъ, то не слѣдуетъ терять вообще времени на употребленіе лекарствъ.—При замед-

деня послѣродовыхъ процессовъ, дѣйствіе спорыней кажется еще менѣе надежно и вѣрно.

Главный недостатокъ спорыней при употребленіи ихъ для рождающихся тотъ же, какъ и у всѣхъ лекарствъ, — что онѣ часто не дѣйствуютъ и не производятъ потуговъ.

Въ употребленіи спорыней находили еще тотъ недостатокъ, что онѣ производятъ вредное, если не смертоносное вліяніе на младенца во время родовъ, отчасти отравленіемъ посредствомъ крови матери, отчасти сильными, иногда даже тетаническими сокращеніями матки.

Спорынями приписываютъ также свойство уменьшать наклонность къ маточнымъ кровотечениямъ послѣ родовъ и къ послѣродовому отдѣленію. Но понятно, что такое дѣйствіе трудно подтвердить опытами, и хотя мы въ этомъ отношеніи богаты мнѣніями, но бѣдны доказательствами

2. При *кровотеченіяхъ матки* во время и послѣ родовъ спорыньи можно давать съ нѣкоторою вѣрностью, только когда происходящія оттого сокращенія матки вмѣстѣ съ замедленіемъ обращенія соковъ (что во всякомъ случаѣ незначительно и непостоянно) могутъ остановить кровотеченіе. Потому прежде всего надо узнать причины и дѣйствовать сообразно этому. Если оно происходитъ отъ ослабленія и недостаточнаго сокращенія матки, если оттого въ ней остается дѣтское мѣсто, то это средство можно употреблять иногда съ пользою, и чѣмъ раньше, тѣмъ вѣрнѣе, если только случай не настоящий и кровотеченіе не грозитъ скорою опасностью. Въ послѣднемъ же случаѣ ручное, вообще мѣстное и прямое пособіе незамѣнимо никакимъ другимъ средствомъ, и всего менѣе слѣдуетъ терять время на употребленіе столь невѣрно дѣйствующихъ средствъ, какъ спорыньи.

3. Спорынью употребляютъ также противъ кровотеченія другихъ частей, напр. при упорномъ кровотеченіи изъ носу, кровавомъ кашлѣ, кровавой рвотѣ и кровавомъ мочеиспращеніи и противъ *бленоройныхъ состояній*, хроническаго перелоа, слизотеченія изъ рукава или матки, хроническаго воспаленія дыхательныхъ вѣтвей, слизетеченія изъ нихъ. Говорятъ, что онѣ полезны даже при изъязвленіи и незначительной гипертрофіи матки, также при сметеченіи, холодномъ нарывѣ и чрезвѣрномъ нагноеніи.

4. Наконецъ предполагаемое дѣйствіе этого вещества на нервную жизнь и особенно спинной мозгъ подало поводъ къ употребленію спорыней противъ *паралича* особенно нижнихъ конечностей, при параплегіи, если они не происходятъ отъ неизлечимыхъ измѣненій спиннаго мозга; также при параличѣ мочеваго пузыря и при недержаніи или задержаніи мочи у старцевъ и дѣтей, какъ и при параличѣ прямой кишки.

Спорыньи дѣйствуютъ всего лучше въ порошокъ, кото-

рый дѣйствительнѣе всѣхъ препаратовъ ихъ. Чтобы произвести скоро и вѣрно потуги, вообще дѣйствіе на матку и т. д., даютъ на приемъ по 10—20 грановъ смотря по обстоятельствамъ, каждые  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$  часа или рѣже, до появленія потуговъ; въ другихъ, менѣе настоятельныхъ случаяхъ можно брать приемы вполнину меньше, между тѣмъ какъ въ случаѣ нужды (кровотеченія изъ матки) можно увеличить ихъ вдвое, втрое. При такихъ обстоятельствахъ употребляли спорыньи также въ влистірахъ. Всего лучше давать это средство въ видѣ порошка съ ароматическимъ чаемъ или ароматическою водою.

Но напр. въ хроническихъ случаяхъ можно давать спорыньи также въ видѣ пилюль, болусовъ или лепешекъ. Или назначаютъ вскипъ или наливочный отваръ съ приличнымъ прибавленіемъ корицы и другихъ пряностей.

Изъ спорыньи готовятъ *жирное масло (Oleum Ergotae)* (вытягиваемъ посредствомъ эфира), которое содержитъ самыя дѣйствительныя составныя части спорыней. Его давали для произведенія потуговъ по 15—30 капель и больше, съ виномъ, чайною наливкою, или въ видѣ эмульсіи и т. д. Иные пользовались подобными же приемами эфирнаго и спиртнаго экстракта, эфирной *Tinctura Ergotae s. Secal. cornuti* (которые содержатъ преимущественно это жирное масло и эрготинъ). *Extr. Secalis cornuti s. Ergotae-эрготинъ* или водяная вытяжка порошка спорыней съ прибавленіемъ спирта, отчего осаждается камедь, бѣлковъ и соли. Не содержитъ жирнаго масла, цвѣтъ его краснобурый, мягкой вытяжной консистенціи, пахнетъ жаренымъ мясомъ, вкусъ терпкій и горьковатый, растворяется въ водѣ, еще легче въ спиртѣ, принимая красноватый цвѣтъ. Часто этотъ эстрактъ содержитъ масло, воскъ и проч.

Вытяжка, употребленная *снаружи*, также можетъ остановить кровотеченіе, даже изъ артерій, если напр. не возможно пользоваться давленіемъ, или наложеніемъ лигатуры. Для этого растворяютъ 1 ч. вытяжки въ 3—4 ч. воды и прикладываютъ напитанную ею и всегда вновь намачиваемую корпию на осушенную предварительно рану и т. д., укрѣпляетъ ее рукою, полосками липкаго пластыря и т. д. Такіе же растворы употребляютъ, для вырискиваній и примочекъ.

\* *Sedum Telephium* L. (*Молодиль сайгачій; заячья капуста; толстолистная капуста; скривунъ. — Knollige Fetthenne. — Reprise; grassette; joubarbe des vignes; herbe à la coupure; Sedum orpin*). Растетъ по сухимъ лугамъ и каменистымъ полямъ.

Корень и трава Молодила запаху не имѣютъ; вкусъ: ихъ клейковатый, и нѣсколько кислый; дѣйствіе ихъ преимущественно равнодѣлительное.

Употребляется въ цынгѣ, сильныхъ мѣсячныхъ и почечуйныхъ кровотеченіяхъ, поносахъ и отъ глисть. Снаружи прикладываются коренные толченныя листы къ воспалительнымъ ранамъ, ноготкамъ и къ болящимъ почечуйнымъ шишкамъ; а также къ мозолямъ при продолжительномъ прикладываніи этихъ листьевъ мозоль блѣдетъ, теряетъ чувствительность и наконецъ отпадаетъ. Въ ожогахъ прикладываютъ свѣжіе истолченные листы.

Выжатый изъ всего растенія сокъ даютъ: по 1 унціи и больше съ сывороткою, или въ другихъ приличныхъ питьяхъ; толченныя листы и умягченные вареніемъ корни прикладываются снаружи въ видѣ катаплазмы.

Молодые листы и стебли наливають горячею водою, чтобы отнять у нихъ горечь, и сливъ первую воду, варятъ въ супахъ вмѣсто прохладительной зелени, которая, съ прибавленіемъ уксуса и масла, служитъ приятнымъ кушаньемъ.

\* *Sedum acre* L. (*Молодикъ остросочный; мотодикъ; pepper d'ukii*. — *Scharfe Fetthenne*. — *Sedum brulant; vermiculaire; pain d'oiseau; orpin brulant; trique-madame; poivre de muraille*). Растетъ по сухимъ, песчанымъ и каменистымъ мѣстамъ.

Свѣжая трава этого вида запаху не имѣетъ; вкусъ: весьма острый, вякій; сухая трава не имѣетъ остроты.

Дѣйствіе его раздражающе рвотное мочегонное и воспаляющее кожу.

Употребленіе его полезно: въ цынгѣ и упорныхъ 4-дневныхъ лихорадкахъ, оканчивающихся не рѣдко водяною болѣзною. Снаружи, свѣжая толченая трава прикладывается къ гнилымъ цынготнымъ и раковымъ язвамъ, злокачественному вреду, антонову огню и головнымъ шолудямъ. Толченныя листья съ успѣхомъ прикладываютъ къ ножнымъ мозолямъ.

Для отвара: горсть свѣжей травы кладется на фунтъ молока или шва, которыя кипятятъ въ покрытомъ сосудѣ до тѣхъ поръ, пока останется половина жидкости и процѣдивъ, принимаютъ по небольшой чайной чашкѣ, 2 или 3 раза въ день; въ порошокъ дается, какъ сказано выше. Выжатый свѣжий сокъ, смѣшанный съ 1 унц. уксомеда дается по столовой ложкѣ съ пользою въ брюшныхъ завалахъ, желтухѣ, и въ началѣ водяной болѣзни. — Снаружи: въ видѣ катаплазмы, вареная съ пивомъ трава, служитъ припаркою, разводящею цынготныя свѣдѣнія составовъ; — свѣжая толченая трава прикладывается вышеупомянутымъ образомъ; выжатый сокъ, смѣшанный по равной части съ виннымъ спиртомъ, очень хорошо укрощаетъ антоновъ огонь и очищаетъ гнилыя ху-досочныя язвы.

Свѣжая толченая трава, прикладываемая къ раковымъ и дру-

гимъ злокачественнымъ язвѣмъ, можетъ замѣнять: дикій американскій виноградъ—(*Phytolacca decandra* L.).—Деревенскіе жители, растерши съ коровьимъ свѣжимъ масломъ, или съ постнымъ, прикладываютъ для очищенія шолудивыхъ струповъ или паршей на головѣ.

\* *Sempervivum tectorum* L. (*Молодилъ большой; дикій чеснокъ; живучка кровельная; очитокъ; дикіе артишоки. — Gemeine Haus - Wurz. — Joubarbe des tois*).

Растетъ у старыхъ стѣнъ, между камнями и по невоздѣланнымъ мѣстамъ.

Свѣжая трава очитка запаху не имѣетъ; вкусъ: кислотовато-вяжущій солодковатый.

Дѣйствіе его холодительное, мочегонное, слегка вяжущее, очищающее.

Выжатый изъ очитка сокъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ принимаютъ въ желчно-гнилыхъ горячкахъ. Смѣшавъ его съ медомъ, имъ мажутъ въ роту: молодницу, трещины на языкѣ, и воспаление десенъ у дѣтей. Этимъ же сокомъ полезно примачивать трещины на сосцахъ и воспалительную грудницу, угрожающую ракомъ, также ожоги и мокнущія язвы. Нѣкоторые врачи совѣтуютъ примѣшивать его къ питью: въ воспаленіи кишекъ, кровавомъ поносѣ, мочервзѣ и столовомъ теченіи. Сокъ, смѣшанный съ равной частью виннаго спирта, дается съ пользою въ хроническихкихъ конвульсіяхъ, и падучей болѣзни. Имъ же примачиваютъ рожу, превратившуюся въ язвы, нагтофду, и притираютъ лицо для истребленія веснушекъ, — толченые листья, смоченные уксуомъ, прикладываются для смягченія ножныхъ мозолей, — которые отъ ихъ дѣйствія отдѣляются очень легко.—Растертые листья со сливками, прикладываются къ воспалительной грудницѣ и болящимъ трещинамъ сосцовъ.

Выжатый сокъ дается внутрь по 1 унціи, нѣсколько разъ въ день; снаружи толченые листья прикладываются въ видѣ катапламы, или примочки, какъ сказано выше.

\* *Senecio vulgaris* L. (*Крестовникъ дикій; старина. — Gemeines Kreuzkraut. — Herbe au charpentier*). Растетъ на обработанныхъ поляхъ.

Трава этого растенія запаху не имѣетъ; вкусъ ея горьковатосолёный, травяной.

Дѣйствіе крестовника мягчительное, противуглистное, разводящее.

Его рекомендуютъ какъ средство противъ глистовъ, особенно круглыхъ, колики въ животѣ, желтухи, простуды, кровохарканія, мочервза и теченія женскихъ бѣлей. Снаружи въ видѣ мягчитель-

ной припарки, употребляется при грудницѣ отъ сгущенія молока, и другихъ твердыхъ опухоляхъ, а въ видѣ клистира, въ брюшныхъ завалахъ.

Внутрь даютъ выжатый сокъ по 1 или 2 унціи для промывательнаго, горсть травы кладутъ на фунтъ воды; толченая трава служитъ хорошею умягчающею и ранозлѣвительною катоплазмой.

Дѣтямъ прикладываютъ толченое свѣжее растение къ пупку отъ глистовъ, и для укрошенія судорожной колики.

*Sesamum orientale* L. (*Кунжутъ; кунчукъ. — Sesamkraut. — Sésame d'Orient*). Разводится около Одессы.

Сѣмяна кунжута пріятно-масляныя. — Дѣйствіе его — смягчительное, питательное.

Получаемое изъ этихъ сѣмянъ масло, по своему пріятному вкусу, не уступаетъ прованскому. Оно лучше всякаго другаго постнаго масла для приправы разныхъ кушаньевъ и салатовъ. Кунжутное масло годно также и для лампъ. — Во врачебномъ отношеніи оно полезно: для утоленія болей, зуда, сильнаго воспаления и отъ чихлости. Азіатскіе врачи съ успѣхомъ употребляютъ его въ эпидемическихъ поносахъ, соединенныхъ съ кровохарваніемъ и кашлемъ. При втираніи въ животъ кунжутное масло облегчаетъ колику и рѣзъ въ кишкахъ; особенно же полезно, при воспаленіи кишекъ и сильнѣйшемъ запорѣ. Кромѣ того оно приноситъ пользу въ воспаленіи почекъ, въ припадкахъ каменной болѣзни, кровавомъ мочерѣзѣ; внутреннихъ кровоизліяніяхъ, кровавомъ кашлѣ и повальной ломотѣ. Въ воспаленіи грудной плевы — (pleuritis) совѣтуютъ втирать это масло въ бока и грудь; но предварительно пускаютъ больному кровь. — Способъ этотъ полезенъ и въ другихъ грудныхъ воспаленіяхъ. — Снаружи, имъ натираютъ ожоги и мѣстныя воспаленія; въ клистирахъ оно умягчаетъ спазмы и облегчаетъ мѣсячное кровотеченіе

Свѣжее масло, принимаютъ по 1 унціи. Въ грудномъ колотѣ, пріемъ увеличиваютъ до 6 унцій. Снаружи въ видѣ мази: оно хорошо для смягченія твердыхъ опухолей, членовныхъ болей и мышечныхъ судорогъ. Масло кунжутное, втираемое въ десны, облегчаетъ зубную боль, умягчаетъ боль почечуныхъ шпшекъ; смѣшанное съ яичнымъ бѣлкомъ, уничтожаетъ воспаленіе заднепроходной кишки и ожоги. Свѣжіе листы прикладываются къ воспаленнымъ частямъ и рождъ; въ видѣ теплой катоплазмы, истолченные и подогрѣтые листы утоляютъ боли въ животѣ, также подагру, хирагру и глазныя воспаленія; вареные въ молокѣ, составляютъ катоплазму для заживленія ранъ послѣ шпанскихъ мухъ. — Размоченныя или растертые въ уксусѣ, истребляютъ лишай, чесотку и головныя шолуды.

Кунжутное масло имѣетъ свойства сходныя съ льнянымъ; а



потому для составленія мазей, пластырей и смягчительныхъ каттаплазмъ, это послѣднее можно замѣнить первымъ.

Отъ насмарку можно употреблять, слѣдующіе домашніе лекарства: ввечеру, вмѣсто всякой пищи, даютъ нѣсколько дней хлѣбъ, изрѣзанный ломтиками, поджаренный въ кунжутномъ, или постномъ маслѣ.

Въ Египтѣ кунжутное масло пьютъ женщины послѣ бани, для утучненія тѣла, доставленія кожѣ нѣжной мягкости, отъ зуда, груднаго волотья, одышки, болей желудка и кишекъ и въ маточныхъ припадкахъ натираютъ имъ животъ.

\* *Sinapis nigra* L. (Горчица черная. — *Schwarzer Senf*. — *La moutarde noire*). Растеніе воздѣлываемое и встрѣчаемое по полямъ.

Въ этомъ растеніи содержится: жирное и острое эфирное масло, горчичное масло (послѣднее впрочемъ не находится готовымъ въ сѣменахъ, но образуется только при смѣшеніи горчичнаго порошка съ водою), бѣлокъ (мирозинъ, эмульсианъ), слизь, горчичная кислота и кристаллизующееся, жирное вещество (*синапизинъ*, *синапизинъ*), которое содержитъ сѣру и азотъ, и при благопріятныхъ обстоятельствахъ превращается броженіемъ и помощью бѣлка въ сѣрнистую синильную кислоту и эфирное горчичное масло. Тоже самое вещество находится въ сѣменахъ большей части крестоцвѣтныхъ растеній (*cruciferae*), какъ въ чеснокъ, лукъ и пр.

Порошокъ горчицы дѣйствуетъ какъ острое, возбуждающее вещество, напротивъ, цѣльные сѣмена, даже въ большихъ приемахъ (напр. полная столовая ложка), обыкновенно только слабить немного низомъ. Горчицу даютъ внутрь рѣдко, — при катаррѣ, недѣятельности желудка, слабости пищеваренія съ труднымъ испраженіемъ, изрѣдка также какъ рвотное въ случаяхъ, гдѣ ослабляющее дѣйствіе другихъ веществъ опасно, или по большей слабости недостаточно (какъ при наркотизаціи, параличѣ и холерѣ). Давали ее также при хроническомъ катаррѣ, слизистодѣленіи дыхательныхъ вѣтвей, тахъ называемой слизистой чахоткѣ и т. п., при одышкѣ, коклюшѣ, ревматизмѣ: наконецъ, какъ мочегонное при водянкѣ.

Противъ водянки, и особенно послѣ перемеж. лихорадки даютъ порошокъ горчицы, отваренный въ закрытомъ сосудѣ съ 1 фунтомъ пива, или сыворотки, по стакану въ теченіе 1—2 дней. Прежде употребляли горчицу и противъ самой перемеж. лихорадки, одну или съ хинною корою; а также противъ цынги, въ порошокъ или въ видѣ спиртной наливки.

Всего лучше принимать цѣльные сѣмена чайными ложечками, (иногда гораздо больше, напр. для рвотнаго одну столовую ложку въ чашкѣ воды). Рѣже дается горчица въ видѣ порошка или теплой наливки: напр. для рвотнаго.

Снаружи горчица, какъ извѣстно, употребляется весьма часто для такъ называемыхъ *горчичниковъ* (sinapismus), вездѣ, гдѣ желаютъ сильно и скоро раздражить кожу, чтобы произвести «отвлекающее или возбуждающее дѣйствіе»: какъ при болѣзненныхъ и судорожныхъ страданіяхъ, при эклампсiи, конвульсiи, астматическихъ припадкахъ, высокой степени слабости и обморокѣ; при недостаточномъ отдѣленіи мѣсячныхъ кровей; дажѣ при различныхъ болѣзняхъ внутреннихъ органовъ (особенно грудныхъ, мозга, двигательныхъ аппаратовъ), являются ли они по себѣ или при другихъ болѣзняхъ, при крупѣ, тифѣ, кровавомъ поносѣ, холерѣ (тутъ особенно часто прикладываютъ большіе горчичники ко всему животу) и т. д. Въ другихъ случаяхъ такимъ образомъ желаютъ дѣйствовать на самую кожу, напр. при хроническихъ страданіяхъ кожи, чешуйчатой сыпи (psoriasis), лишаяхъ (lichen), также рожѣ и др. Часто горчица употребляется также для полосканія при хронической жабѣ (angina), катаррѣ дыхательныхъ вѣтвей и гортани (часто съ прибавленіемъ меда).

Горчичники бываютъ дѣйствительнѣе и острѣе, когда (не слишкомъ старый) горчичный порошокъ смѣшивается съ теплою водою. Прикладываютъ ее намазанную на холстину, рѣже на кожу. Холодная и кипящая вода, также уксусъ, напротивъ, затрудняютъ болѣе или менѣе образованіе остраго эфирнаго масла, и потому горчичники, приготовленные такимъ образомъ, дѣйствуютъ менѣе остро. Часто усиливаютъ дѣйствіе горчичниковъ прибавленіемъ большаго или меньшаго количества чернаго или испанскаго перца. Въ обыкновенныхъ случаяхъ, однако, когда не желаютъ такъ сильно раздражать кожи; тогда къ порошку горчицы можно прибавлять половину или равный вѣсъ ржаной муки, кислаго тѣста, муки изъ льнянаго сѣмени, хлѣбнаго мякиша и т. д., и смѣшивать съ водою или уксусомъ. Въ другихъ случаяхъ прибавляютъ хрѣвъ, поваренную соль и т. п. Чтобы больше защищать кожу, часто подкладываютъ подъ горчичникъ кусокъ фелера, неклеенной бумаги и т. п.

Вообще должно удалить горчичникъ, какъ скоро произошло на кожѣ сильное жженіе, значительная краснота и т. д.; потому ихъ слѣдуетъ оставлять на кожѣ не болѣе  $\frac{1}{2}$  часа, много 1 часъ, и на нѣжной кожѣ или на дѣтяхъ только 5—10—20 минутъ, не то легко происходитъ чрезвычайно болѣзненное воспаленіе, пузыри и даже поверхностное помертвѣніе. На это нужно обращать вниманіе особенно при потерѣ сознанія, нечувствительности (напр. на парализованныхъ частяхъ), вообще когда больной не чувствуетъ или не можетъ обнаруживать чувства боли. Если же долго послѣ того остается слишкомъ сильная боль, то можно прибѣгать къ холоднымъ примочкамъ, свинцовымъ препаратамъ и нарботи-

чесныиъ веществамъ, какъ въ сонной одурѣ и бѣленѣ (belladonna, hyoscyamus) въ видѣ припарокъ, примочекъ или мази.

Когда назначаютъ горчицу для острыхъ (отыскающихъ) ножныхъ или ручныхъ ваннъ, для примочекъ, впрыскиваній, то наливаютъ ее умѣренно горячею (не кипячею) водою, на ванну по 6—24 золотниковъ.

Горчицныя ванны употребляли противъ холеры, около фунта порошка горчицы на ванну, часто съ 9 — 12 золотниками вазелина, потомъ втираніе летучимъ линиментомъ, фосфорною мазью и т. п., особенно въ животѣ. Далѣе для ножныхъ ваннъ при недостаткѣ мѣсячнаго отдѣленія, при головныхъ, грудныхъ и другихъ страданіяхъ.

Изъ горчицы приготовляются:

*Эфирное горчичное масло (Oleum Sinapis aetherium)* оно безцвѣтно, прозрачно и легко растворяется въ винномъ спиртѣ и эфирѣ. Это масло—дѣйствующая составная часть горчицы—дѣйствуетъ какъ весьма раздражительное, даже карывное средство. По опытамъ Мичерлиха оно всасывается и выдѣляется опять легкими и кожей, вродѣи погибаютъ отъ большихъ приѣмовъ при судорогахъ.

Его употребляютъ въ тѣхъ же случаяхъ, какъ горчицу, внутрь и особенно снаружипри бедренной и зубной боли, невралгіяхъ и т. п., при параличахъ, холерѣ, гибельной перемеж. лихорадкѣ и т. д.). Но какъ хорошій горчичный порошокъ рѣдко оказываетъ слабое дѣйствіе, то это масло довольно излишне.

2. *Горчичная сыворотка—(serum lactis sinapinum)*, которая полезна: въ астенической ломотѣ, расслабленности нервной системы, параличѣ и въ чревныхъ мокротныхъ болѣзняхъ. Принимаютъ на ночь по 6 унцій.

3. *Противуцѣлительное горчичное пиво—(cerevisia anticorbutica)*, употребляемое съ пользою: въ скорбутѣ, параличѣ и водяной болѣзни, отъ половины до одного фунта въ день.

4. *Горчичное полосканье—(gargarisma sinapinum)*, которое въ мокротной жабѣ—расслабленіи гортаннаго языка и параличѣ языка, оказываетъ полезное дѣйствіе.

\* *Sinapis arvensis L.* (Горчица полевая; свербилюзка пашенная. — *Feld-Senf.* — *La moutarde des champs*). Растетъ по полямъ и пашнямъ.

Свойства полевой горчицы сходны съ обыкновенною горчицею, но нѣсколько слабѣе оной.

Толченое сѣмя, смѣшанное съ уксусомъ полезно употреблять въ пищу цынготнымъ больнымъ. Свѣжіе ея листья весною можно варить во щахъ вмѣсто капусты, и въ случаѣ нужды, посоливъ заготовлять въ прокъ. Изъ сѣмянъ выжимаютъ масло, год-

ное для домашняго употребленія, которое можетъ совершенно замѣнить деревянное и кунжутное масло 100 фунтовъ этихъ съюмянь дають 30 ф: масла.

\* *Sinapis alba* L. (*Горчица бѣлая*;—*Weisser Senf.*—*La moutarde blanche*). Растетъ по полямъ и лугамъ.

Съиена ея бѣлаго цвѣта, величиною больше черной горчицы; они содержатъ: синапинъ, мирозинъ, жирное масло и т. д., и при перегонкѣ дають мало эфирнаго масла, которое однако можетъ развиваться превращеніемъ синапина (но оно не дѣйствуетъ такъ остро, какъ маело черной горчицы).

Дѣйствія бѣлой горчицы по видимому такія, какъ у черной, только онѣ слабѣе. Въ большихъ приѣмахъ она оказываетъ весьма легкое слабительное дѣйствіе безъ боли. — Пользуются ею внутрь больше, какъ діететическимъ или домашнимъ средствомъ при хроническомъ разстройствѣ пищеваренія, недостаткѣ аппетита, нечистомъ языкѣ и затруднительномъ испражненіи; далѣе она употребляется—въ несчастью большею частью шарлатанамъ—какъ мнимое, кровоочистительное средство противъ хроническихъ страданій кожи, слезотдѣленій, хроническаго ревматизма и т. д.

При разстройствѣ пищеваренія, судорогахъ желудка, затрудненномъ испражненіи и скопленіи вѣтровъ, бѣлая горчица на самомъ дѣлѣ нерѣдко полезна въ некоторыхъ другихъ лекарствъ, особенно для чувствительныхъ, раздражительныхъ, хлоротическихъ и др. лицъ,

Всего лучше давать ее цѣльными зернами, чайными ложками, утромъ и вечеромъ, при чемъ всегда должно заботиться о надежащей діетѣ и испражненіи. Снаружи ее также употребляютъ для горчичниковъ, припарокъ и т. п. часто вмѣстѣ съ черною горчицею.

\* *Sisymbrium nasturtium* L. (*Жеруха*; *рѣжуха*; *кресъ водяной*;—*Wilde Brunnenkresse.*—*Cresson de fontaine*). Растетъ около дорогъ, заборовъ и по полямъ.

Запахъ растертой травы: летучій, характеристическій. Вкусъ ея горьковатый, нѣсколько острый; дѣйствіе разводящее, мочегонное, противуцынготное.

Употребляется жеруха въ цынгѣ, брюшныхъ мокротныхъ завалахъ упорномъ кашлѣ, гнойной чахоткѣ, сонливой лихорадкѣ; и ваменной болѣзни. Весною жеруху ѣдятъ вмѣсто салата; выжатого соку принимаютъ по 2 унціи съ сывороткою, или кислотатыми минеральнымъ водами, какъ-то: съ зельцерскою, кавказею и кою другими тому подобными.—Пиво; настоянное съ жерухою и горчицею, весьма полезно давать цынготнымъ: отъ половины

до одного фунта ежедневно.—Фназ Свитенъ совѣтуетъ прибавлять къ нему красную капусту.—Изъ этого растенія приготовляются:

*Противуцынготные соки*—въ составъ коихъ входятъ соки: жерухи, ложечной травы, ибунки, дымницы, и щавеля, которыя своимъ дѣйствіемъ слегка возбуждаютъ ослабѣвшіе органы, гоняютъ мочу, отвращаютъ запоры, уничтожаютъ цынгу.—Принимаютъ ихъ отъ 1—2 и 4 унцій, два или три раза въ день: отъ упорнаго кашля, одышки и брюшныхъ цынготныхъ заваловъ.—Къ нимъ совѣтуютъ прибавлять равное количество свѣжей травы вахты, или водянаго трилистника.—Ежели отъ цынготной порчи пухнуть, трескаются десны и изъ нихъ открывается кровотечение: то при употребленіи внутрь упомянутыхъ соковъ, должно мазать чаще десны свѣжо выжатымъ сокомъ изъ жерухи, прибавляя немного квасцовъ и меда, и послѣ этаго выполаскивать ротъ медовою сытою, смѣшанною съ клюквеннымъ сокомъ, или съ укусомъ.

\* *Sisymbrium Sophia* L. (*Жеруха струйчатая; гулявникъ, мудрость лекарская.*—*Feinblättrige Rauke.*—*Sagesse des chirurgiens*). Растетъ по сухимъ полямъ, дорогамъ и у заборовъ.

Трава и сѣмяна вкусъ имѣютъ острый, жгучій подобный вкусу горчицы. Дѣйствіе ихъ возбуждающее, противуглистное, очищающее мочегонное.

Внутрь употребляется въ истерическихъ припадкахъ, поносахъ, кровохарканіи, маточномъ кровотеченіи, бѣляхъ; ваненной болѣзни, водяной, и отъ глистовъ.

Снаружи, прикладывается толченная трава къ цынготнымъ и другимъ нечистымъ язвамъ, которыя она очищаетъ и заживляетъ.

Толченое сѣмя дается по драхмѣ, чрезъ 2 часа съ водою; или въ видѣ горячей наливки съ медомъ, предъ приступомъ лихорадки.

*Sium sisarum* L. (*Сiumъ водяной.*—*Wassermerk.*—*Berle chervi; chervi*). Это растеніе, какъ полагаютъ вывезено въ Европу изъ Индіи, и извѣстно давно уже по питательнымъ свойствамъ его корней, составлявшихъ уже во времена императора Тиверія одно изъ самыхъ лакомыхъ блюдъ. Эти корни доставляютъ чрезвычайно бѣлый крахмалъ; изъ котораго постредствомъ броженія можетъ быть получаемъ алкоголь. Боергавъ приписываетъ корнямъ водянаго Сіума силу изцѣлять катарръ легкихъ, кровохарканіе и теченіе крови изъ мочевыхъ органовъ. Эти корни имѣютъ ароматическій запахъ, вкусъ сладкій.

\* *Sium latifolium* et s. *angustifolium* L. (*Сiumъ широколистный и узколистный.*—*Berle.*—*La berle à feuilles étroites*). Растетъ

въ стоячихъ и тихотекучихъ водахъ. Этимъ видамъ приписываютъ сверхъ принадлежащихъ предыдущей породѣ качествъ антискорбутное дѣйствіе. По замѣчанію Гесера, они вредны для животныхъ, въ особенности для воловъ и коровъ, у которыхъ они производятъ родъ опьяненія и бѣшенства.

*Smilax aspera* L. (*Сарсапариль европейская*. — *Smilax*. — *Salsaparille d'Europe*; *liseron epineux*; *liset piquant*). Растетъ въ южной Россіи по бесплоднымъ мѣстамъ, между кустарниками, и въ особенности часто встрѣчаются по бесплоднымъ морскимъ берегамъ. Корень этого растенія несомнѣнно обладаетъ потогонными свойствами и по своему дѣйствию сходенъ съ корнемъ привозной сарсапарили, принадлежащей къ одному роду, отличаясь отъ этой послѣдней только слабѣйшею силою, дѣлающею необходимыми увеличенныя приемы его. Его можно принимать такъ-же какъ и сарсапариль въ видѣ виннаго или водянаго decocta, употребляя для приготовленія онаго удвоенное или даже утроенное количество корня.

*Solanum Dulcamara* L. (*Сладкогорькое*; *сорочья ягода* — *Bittersüsser Nachtschatten*. — *Vigne vierge*; *Vigne de Judée*; *loque*). Растетъ подъ кустарниками и около береговъ.

Сладкогорькое содержитъ въ себѣ: горькосладкое вытяжное вещество (пикроглиціонъ, дулкамаринъ), кристаллизующееся, алкалоидное вещество (*соланинъ*), смолу, камедь; крахмалъ.

Дѣйствіе горькосладкаго паслена еще неизвѣстны съ точностью. Въ малыхъ приемахъ, говорятъ, онъ, подобно предыдущимъ, способствуетъ къ потѣнью, къ отдѣленію мочи и выхаркиванію, что при обстоятельствахъ довольно возможно. Но что онъ въ большихъ приемахъ оглушаетъ и вообще дѣйствуетъ подобно наркотическимъ веществамъ, какъ многіе увѣряютъ, это по многимъ наблюденіямъ весьма сомнительно.

Какъ цѣлебное вещество горькосладкій пасленъ представляетъ весьма незначительное средство. Однако его хвалятъ:

1. Особенно по его потогоннымъ и мочегоннымъ свойствамъ — противъ золотушныхъ (туберкулезныхъ), ревматическихъ, артритическихъ и спилитическихъ страданій, противъ хроническихъ болѣзней кожи, также противъ меркуріальной дискразіи.

2. по дѣйствию на слизистыя оболочки — противъ катарра и слизееотдѣленія дыхательныхъ вѣтвей; даже противъ легочной чахотки, коклюша, чтобы способствовать къ выхаркиванію.

Даютъ его въ отварѣ, въ произвольномъ количествѣ, по большей части вмѣстѣ съ другими травами и корнями, какъ съ травой трицветной фиалки (Нв. Жасас), сарсапарилью, сенегою, гваяномъ и др. Другой видъ этого рода. \* *Пасленъ черный*. (*Solanum Nig-*

*rum L.*). Растетъ почти повсѣмѣстно. Вкусъ его травянистый, запахъ непріятный наркватическій. Ягоды его дѣйствуютъ довольно ядовито. Последнѣ черныя содержатъ въ себѣ: особое вещество *солонинъ*, яблочную кислоту и *пасленовую кислоту*. Дѣйствіе его успокоивающее и болеутоляющее.

\* *Solidago-Virga-aurea L.* (*Золотушникъ; золотая розга; золотень*.—*Gemeine Goldruthе*.—*Verge d'or*): Растетъ по лѣсамъ;

Трава золотой розги имѣетъ запахъ слабо-ароматный; вкусъ горько-вяжущій и слегка пріятный.

Дѣйствіе ея укрѣпляющее, мочегонное, раноздѣлительное.

Употребляется съ пользою въ каменной болѣзни почекъ и мочевого пузыря, загноеніи этихъ внутренностей, чахоточной лихорадкѣ, кровавомъ мочеспрощеніи, водяной болѣзни, гортанныхъ ранахъ, и язвахъ какъ внутреннихъ, такъ и вѣшнихъ; а также при поврежденіи дѣтородныхъ частей, трудныхъ родахъ, и въ другихъ насильственныхъ разрывахъ мягкихъ частей.

Для наливки 1 или 2 щепоти травы наливаютъ 8 унц. горячей воды; или 2 или 3 драхмы сухой травы, наливаются бѣлымъ виномъ; эту наливку даютъ каждый часъ по столовой ложкѣ, въ каменной болѣзни; въ порошокъ дается 1 драхма, три раза въ день,—снаружи, употребляется въ видѣ полосканья, впрыскиваній и примочекъ. *Порнъ* особенно рекомендуетъ экстрактъ этого растенія: въ каменномъ мочервѣзѣ, и въ кровавомъ мочеспрощеніи отъ язвъ, находящихся въ почкахъ, или въ мочевомъ пузырьѣ; онъ дается на приемъ: отъ 2—5 и 10 гранъ. Въ расслабленіи кишекъ, задняго прохода, и маточнаго рукава, отваръ служитъ полезнымъ влиститромъ. *Снаружи* прикладываемая толченая трава хорошо очищаетъ цынготныя и другія гнилыя язвы; для сбереженія отъ цынготной гнилости десенъ, и для укрѣпленія шатающихся зубовъ, тоже полезно жевать свѣжую траву этого растенія или полоскать ротъ его отваромъ.

\* *Sonchus oleraceus L.* (*Осока; заячья капуста*.—*Gemüss-Gänsedestel*.—*Laitron commun; laceron*). Растетъ въ садахъ, по обработаннымъ и мусорнымъ мѣстамъ.

Свѣжая трава осота *занаху* не имѣетъ; *вкусъ* ея горьковатый, млечно-сочный, зависящій отъ смолистаго вещества. Дѣйствіе прохладительное, разводящее, укрѣпляющее.

Сокъ выжатый изъ всего растенія, одобряется въ завалахъ брюшныхъ внутренностей, желтухѣ, гипохондрическихъ и печечуйныхъ припадкахъ; грудномъ колотѣѣ (*pleuritis*), и воспаленіяхъ груди, печени и вѣшокъ желчнаго свойства. Молодыя листья смѣшанные съ другою зеленью, варятъ въ похлебкахъ и другихъ кушаньяхъ употребляютъ и въ салатахъ.—Снаружи, толченая

свѣжая и вареная трава прикладывается въ припаркахъ, къ твердымъ болящимъ опухолямъ.

Свѣжо-выжатый сокъ дается отъ 1—3 унцій съ сывороткою; или горсть свѣжей травы варятъ въ 1 фунтъ мясной похлебки.

\* *Spiraea ulmaria* L. (*Батеръ; медуничникъ; бѣлоголовецъ; топырка; ивановъ; чертъ; шламда; лабазникъ.*—*Sumpf-Spiers-taude.—Reine des prés*). Растетъ по влажнымъ мѣстамъ рва чь. Корка и корни медуничника, называемого въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ *раповникомъ* и *дикою рябинкою* имѣютъ свойство вяжущія и потому ихъ можно употреблять подобно дубовой корѣ; какъ во врачебномъ отношеніи, такъ и для дубленія кожъ. Порошокъ сушеныхъ цвѣтовъ раповника, въ нѣкоторыхъ пунктахъ Россіи, (напр. Саратовской губ.) даютъ подвергшимся укушенію бѣшеныхъ собакъ, посыпая имъ хлѣбъ.

\* *Spiraea filipendula* L. (*Тавола нитковинная; трясушка.*—*Knollige Spierstaude:—la jolie filipendule*). Растетъ по лугамъ и холмамъ. Этому виду приписываются тѣ же свойства, какъ и предыдущему. Корневая шишка его доставляетъ крахмалистую, очень здоровую и питательную муку.

*Stachys sylvatica* L. (*Колосница лѣсная; лѣсная буквица; змѣиная трава; змѣевникъ.*—*Wald Ziest.—Ortie puante*). Растетъ по влажнымъ мѣстамъ.

Трава колосницы имѣетъ запахъ противный, вонючій, вкусъ—горьковатый.

Дѣйствіе ея усыпительное, мочегонное, раноздѣлительное.

Употребленіе ея полезно: въ падучей болѣзни, запорѣ мѣсячныхъ и родовыхъ кровей, обморокахъ и гистерическихъ припадкахъ.—Снаружи, толченая трава прикладывается къ гнилымъ ранамъ, или язвамъ, для очищенія и оживленія ихъ; растерая съ оливю, или постнымъ масломъ, полезна отъ обжоги; вареная съ мыломъ и молокомъ, служитъ хорошею разводящею припаркою въ женской грудницѣ, затвердѣлыхъ паховикахъ и въ другихъ твердыхъ опухоляхъ; полезна также для утоленія боли и боли въ животѣ, бывающей при наступленіи мѣсячнаго очищенія, и послѣ родовъ.

Для наливки: 1 драхма травы съ цвѣтными верхушками наливается 4 унц. горячей воды, или бѣлаго вина. Въ порошокъ даютъ 20 гранъ, 3 или 4 раза въ день. Снаружи все растеніе прикладывается въ видѣ разбивающей припарки.

Изъ отцвѣтшей травы колосницы вывариваютъ желтую краску, для льняныхъ, шерстяныхъ матерій.

\* *Stachys annua* L. (*Колосница годовая.*—*Jähriger Ziest.*—



*Le stachys annuel*). Растетъ по лѣсамъ и каменистымъ мѣстамъ. Трава этого вида имѣетъ вязущій вкусъ, дѣйствіе ея тоже вязущее.

Употребляется для излеченія ранъ подобно описанному выше.

*Stachys germanica* L. (*Колосница нѣмецкая, конскій полей*.—*Deutscher Ziest*.—*L'épi fleuri; le stachys d'Allemagne*).

Растетъ по бѣрегамъ рѣкъ, преимущественно на хорошей почвѣ. Дѣйствіе и свойства этого растенія сходны съ дѣйствіемъ и свойствами *Stachys sylvatica*, почему его употребляютъ такъ-же, какъ эту послѣднюю и особенно въ запорѣ мѣсячныхъ кровей, падучей болѣзни и цынги.

\* *Symphitum officinale* L. (*Живокость; салыникъ*.—*Gebäuchlicher Beinwell*.—*La consoude officinale*). Растетъ по влажнымъ лугамъ и бѣрегамъ. Молодые листья салыника доставляютъ клей, употребляемый при пряденіи шерсти, смѣшанной съ козыимъ пухомъ, плущей на выдѣлку особой ткани, извѣстной подъ именемъ *пуаль-дю-шеврѣ*. Вытяжка изъ корня даетъ предкрасную, не уступающую своимъ колеромъ кармину красную краску. Вкусъ корней слизистый, липкій, запаха они не имѣютъ. Въ нихъ содержится весьма много слизи, соединенной съ вязущимъ началомъ. По своему мягчительному дѣйствію корень салыника, принимаемый въ формѣ наливки, сиропа или эттракта оказываетъ весьма значительную пользу въ кровохарканіи.

\* *Syringa vilgaris* L. (*Сирень*.—*Spanischer Flieder; Gemeine Syreenen*.—*Le lilas commun*). Растетъ аклиматизированная въ паркахъ и садахъ. Всѣ части отличаются чрезвычайно горькимъ вкусомъ, зависящимъ отъ присутствія въ нихъ особой щелочи: *Сиринина*. На ней встрѣчаются весьма часто, кромѣ *шпанскихъ мухъ* (*Lytta vesicatoria*), нападающихъ на ея листья личинки: *Sphinx ligustri* L, *phalaena vernaria* L, *ph. syringaria* L, и *scarabaeus fasciculatus* L. Крумелье хвалитъ экстрактъ сирени въ приемахъ, по одной драхмѣ въ перемежающихся лихорадкахъ. Незрѣлыя коробочки этого растенія содержатъ въ себѣ большое количество яблочной кислоты.

Т.

• *Tanacetum vulgare* L. (*Десятимильникъ дикій, десятицильникъ; пижма.*—*Gemeiner Rheinfarn—Barbotine*). Растетъ около дорогъ, по необработаннымъ мѣстамъ и близъ береговъ.

Все растеніе издаетъ особый, чрезвычайно прониптательный, ароматическій, довольно тяжелый запахъ. Вкусъ его горькій; свойства пижмы тоническія, возбуждающія. Она содержитъ въ себѣ острое, желтоватое, летуче масло, выдѣляемое водою и алкоголемъ. Въ Лапландіи, женщины, по свидѣтельству Линнея, пьются пижмою въ баняхъ для сообщенія половымъ органамъ большей растяжимости и облегченія черезъ это родовъ. Въ Финляндіи изъ пижмы, поселяне приготовляютъ зеленую краску для крашенія шерсти.

Пижма употребляется особенно въ народѣ какъ противуглистное средство (преимущественно цвѣты, рѣже сѣмена), и по видимому изгоняетъ круглыхъ глистовъ довольно вѣрно, однако цытварное сѣмя вытѣснило ее. Прежде пользовались ею также при растройствахъ пищеваженія, особенно артритическомъ, даже при блѣдной немочи, перемежающейся лихорадкѣ, водянкѣ и т. д. Даютъ ее въ порошокъ, также въ видѣ кашки, наливки и вообще какъ цытварное сѣмя. Наливка употребляется также для промывательныхъ.

*Масло пижмы.*—(*Oleum Tanacetii aethereum*). Можно давать внутрь по 3—6 капель на сахаръ или съ нѣфтями, но преимущественно оно употребляется, какъ противуглистное средство только снаружи, для втиранія въ животъ. Спиртныя и эфирныя вытяжки могли бы оказать ту же самую пользу, какъ цытварное сѣмя.

*Tanacetum balsamita* L. (*Калуферъ.*—*Aromatischer Rheinfarn.*—*Menthe coq; coq des jardins; la tanaïsie balsamite*). Разводится въ садахъ и огородахъ, какъ ароматическое растеніе. Запахъ его листьевъ бальзамическій, вкусъ горькій. Калуферу приписываются весьма многими ранопѣлительныя и укрѣпляющія желудокъ качества. Въ виду послѣдняго изъ этихъ свойствъ, нѣкоторые пользуются отъ растройства желудка препаратами изъ вареныхъ листьевъ калуфера, прикладываемыми на животъ, ваннами изъ нихъ и наконецъ употребленіемъ водки настоянной тѣми же листьями. Изъ этихъ средствъ наиболѣе вѣры заслуживаетъ конечно послѣднее. Калуферъ употребляется между прочимъ для настоя уксуса, въ который онъ вкладается вмѣстѣ съ эстрагономъ.

\*

**Teucrium chamaeritys L.** (*Дубровка трилистная; кадило; паклуыз; параличная трава.*—*Dreiblättriger Gamander.*—*Petite wette*). Запахъ травы благовонный, бальзамный; вкусъ пряный, горьковатый, зависящій отъ летучаго масла. Дѣйствіе ея укрѣпляющее, возбуждающее, мѣсячногонное и разбивающее.

Рекомендуется въ тѣхъ же болѣзняхъ, какъ упомянутая ниже *Teucrium chamaedrys*. Парижскіе врачи съ успѣхомъ употребляли это растеніе противъ простуднаго ревматизма и членовыхъ болей. Многіе, долговременнымъ употребленіемъ внутрь и снаружи трилистной дубровки, излечивались отъ начальной подагры и вертлужной ломоты.

Для наливки кладутъ: 2 или 3 драхмы травы на фунтъ горячей воды; снаружи она употребляется въ видѣ припарки или ванны.

Трава этого растенія входитъ въ составъ противуломотнаго порошка, одобряемаго въ подагрѣ, который состоитъ изъ равныхъ частей: дубровка трилистная, золототысячника и корня горечавки желтой.—Принимаютъ этотъ порошокъ: по 1 драмѣ по утру и въ вечеру, въ продолженіе 3 мѣсяцевъ, а въ слѣдующіе за тѣмъ 3 мѣсяца его принимаютъ по 2 скрупула, и черезъ это освобождаются отъ жестокихъ паразизмовъ, мучительной астенической подагры. *Везикулярный*.

**Teucrium marum L.** (*Майоранъ кошачій, кошачья трава:—Gamander.*—*Germandrée des chats*). Растетъ на югѣ Россіи, по морскимъ берегамъ. Вкусъ кошачьей травы острый; жгучій и горькій; она издаетъ: въ особенности при растираніи между пальцами ароматическій камѣарный запахъ до того сильный, что онъ возбуждаетъ чиханіе.

Дѣйствіе ея возбуждающее, противусудорожное, укрѣпляющее мочу, гонящее мѣсячныя крови, разводящее и возбуждающее чихоту.

Употребляется въ слабости нервной системы, спазмахъ, истерикѣ, ипохондріи, удушья, упорномъ кашлѣ, грудной водяной болѣзни, худосочиі, запорѣ кровей, водяной болѣзни, нервной горячкѣ (*turphus*), боли головы, мокротныхъ завалахъ внутренностей и железъ, сывороточномъ пострѣлѣ и ударѣ астеническаго свойства. Внюхиваніе порошка этого растенія отвращаетъ долговременный насморкъ, и возстановляетъ обонаніе.

Для водяной или винной наливки, полагается 1—2 драхмы на 6 унц. жидкости, въ порошокъ дается внутрь: отъ 20—30 гранъ, 3 или 4 раза въ день съ виномъ, или съ медомъ въ видѣ каши.—Снаружи, употребляется какъ выше сказано, также въ видѣ разводящихъ припарокъ и укрѣпляющихъ ваннъ.

**Teucrium polium L.** (*Дубровка бѣлая.*—*Weisser Gamander*).

—*Le teucrium polium*). Растетъ по бесплоднымъ, солнечнымъ мѣстамъ и каменистымъ холмамъ, по близости морскихъ береговъ.

Вкусъ травы съ цвѣтными верхушками острый, горькій. Дѣйствіе ея возбуждающѣ мочегонное.

Цвѣтныя верхушки употребляютъ вмѣсто чая: въ мокротныхъ завалахъ внутренностей, задержаніи мочи и неправильности мѣсячныхъ кровей; снаружи свѣжую точенную траву прикладываютъ для заживленія язвъ.

Для наливки: 2 или 3 драхмы верхушекъ наливается 12 унціями горячей воды.

*Teucrium chamaedrys* L. (*Дубровка; очанка; ростропъ. — Gemeiner Gamander. — Le Teucrium Chamaedrys*). Растетъ въ умеренной полосѣ Россіи, по гористымъ лѣсамъ. Этотъ видъ дубровки содержитъ въ себѣ между прочимъ: горькое желто-коричневаго цвѣта, смолистое, кристаллическое, щелочное начало, нерастворимое въ водѣ и растворяющееся въ алкогольъ и эфиръ.

Запахъ травы нѣсколько благовонный; вкусъ горько-пряный, зависящій отъ камедно-смолистаго начала и летучаго масла. Дѣйствіе ея возбуждающѣ, потогонное, очищающѣ и укрѣпляющѣ.

Употребляется въ худосочіи, блѣдной немочи, запорѣ кровей, ипохондрическихъ завалахъ внутренностей, застарѣломъ кашлѣ, мокротной одышкѣ, кровохарканіи, лихорадкахъ, ломотѣ и поногрѣ: снаружи въ видѣ катаплазмы или припарки, ея пользуютъ для разведенія водяныхъ опухолей и очищенія язвъ.

Для наливки: 1 или 2 драхмы сухой травы наливается 6 унціями горячей воды; снаружи прикладывается свѣжая трава.

Въ соединеніи съ золототысячникомъ и римскою ромашкою, трава очанки дѣйствуетъ вѣрнѣе противъ весеннихъ перемежающихся лихорадокъ и другихъ астеническихъ болѣзней.

*Teucrium scordium* L. (*Майоранъ лошадиный; конскій чеснокъ; дубовка. — Koblauch-Gamander. — Germandrée aquatique*). Растетъ по влажнымъ мѣстамъ въ средней Россіи.

Трава имѣетъ запахъ: чесночный, тяжелый; вкусъ: пряно-горькій, острый, зависящій отъ летучаго масла и горькаго начала. Дѣйствіе ея укрѣпляющѣ, противуглистное, противуглистное, разбивающѣ, моче и потогонное.

Ее хвалятъ противъ слабости желудка, гнилыхъ злокачественныхъ горячекъ брюшныхъ завалахъ; запора кровей, водяной застойной болѣзни—глисть; ревматизма и другихъ простудныхъ ломотахъ, кожныхъ болѣзняхъ, лишаевъ, нечистыхъ и гнилыхъ язвахъ: багровыхъ ушибовъ и антонова огня.

Для наливки: кладутъ 1 или 2 щепотки травы на 6 унцій кипячей воды или вина, и принимаютъ эту наливку по 2 или

3 унціи каждыи два часа, — Употребляемая внутрь вмѣсто чаю п снаружи въ видѣ припарки, она приноситъ пользу въ ломотныхъ болѣзняхъ.

Снаружи, въ видѣ катаплазмы, укрощающей гнилость прикладывается варенная съ виномъ трава, порошокъ сухой травы съ успѣхомъ присыпаются гнилыя язвы; укусуная припарка хорошо разводитъ ушибы п багровыя подкожныя кровоизліянія. Винную настойку свѣжаго п сухаго растенія, даютъ отъ укушенія идовитыхъ п бѣззненныхъ животныхъ и въ злокачественныхъ лихорадкахъ. Для этой настойки 2 горсти цвѣтущей травы кладутся на бутылку вина.

\* *Thalictrum flavum* L. (*Золотуха желтая; замлица; луговая рута; золотень; живительная трава; матренка; василисникъ.* — *Gelbe Wiesenraute.* — *Rue des pres; fausse rhubarbe*). Растетъ по влажнымъ лугамъ. — Василисникъ содержитъ въ себѣ особое вещество *таликтринъ*, получаемый при обработкѣ онаго выпящимъ алкоголемъ въ видѣ неправильныхъ кристалловъ или чаще желто-оранжеваго порошка. Горечь таликтрина чрезвычайная; онъ дѣйствуетъ очень хорошо въ лихорадкахъ (по 10 п 16 грановъ въ пилюляхъ).

Корень василисника желтый, вкусъ его сладко-горьковатый п слегка вяжущій. Дѣйствіе его слабительное подобное дѣйствію ревеня; но онъ требуетъ приемовъ втрое большихъ чѣмъ послѣдній.

Этотъ корень совѣтуютъ употреблять отъ запоровъ, заваловъ п желтухи. Листья василисника полезны въ кровохарканіи, теченіи бѣлей, п въ другихъ женскихъ астенпческихъ болѣзняхъ. Вяжатыи изъ цвѣтной травы, сохъ въ приѣмѣ отъ 1—2 унцій, служатъ хорошимъ вяжущимъ средствомъ. Снаружи, отваромъ травы промываютъ цынготныя раны, гнилыя язвы, чесотку, п другія нечистыя накожныя сыпи. — Порошокъ корня, или смянъ хорошъ для присыпки астенпческихъ язвъ.

Какъ слабительное, корень дается въ порошокъ отъ 2—3 золотниковъ; для разводящаго дѣйствія, отъ  $\frac{1}{2}$  до 1 золотника. Для отвара кладется травы 1 унц. на фунтъ воды. Одна горсть листовъ налита тѣмъ же количествомъ горячей сыворотки, служитъ слабительнымъ питьемъ.

\* *Thlaspi rudérale* L. (*Ярутка стѣнная.* — *Tüschelkraut.* — *Teraspic*). см. *Lepidium rudérale*.

*Thuja articulata* L. (*Немнѣючка; каменная можжевуха. Thuja.* — *Le thuja articulè*). Встрѣчается въ садахъ на кавказѣ п югѣ Россіи. Изъ этой породы истекаетъ смолистое вещество, извест-

ное подъ пнемемъ *Сандарака* (*Sandaracha resina*). Ее листьямъ приписываются обитателями Кавказа потогонныя свойства, ради которыхъ отваръ ихъ они пьютъ противъ простудныхъ болѣзней.

\* *Thymus serpyllum* L. (*Черная мелисса; ползучий тимьянъ; Гиминъ чабрецъ; Чайбуръ; богородская трава.—Quendel.—Thym batard; Serpolet.*) Растетъ по песчанымъ полямъ, холмамъ и краямъ дорогъ. Это растение служитъ, можно такъ сказать указателемъ самой дурной почвы. Запахъ его сильно-ароматическій; свойства тоническія. Снаружи употребляется въ видѣ припарокъ и сухимъ въ мѣшечкахъ, какъ средство разбивающее атоническія опухоли.

\* *Tilia europaea* L. (*Липа.—Linde.—Tilleul*). Растетъ въ лѣсахъ.

„Цвѣты липы имѣютъ запахъ благовонный, утрачиваемый ими при сушеніи; вкусъ: сладко-клейковатый; съмянъ и плодовъ вяжущій.—Свѣжіе цвѣты налитые горячею водою даютъ большое количество слизи. Дѣйствіе цвѣтовъ притупляющее, болеутолятельное, противусудорожное и потогонное.“

„Въ видѣ наливки, или перегнанной воды—ихъ одобряютъ въ грудныхъ припадкахъ, спазмахъ, боляхъ головы, обморокахъ и судорожныхъ болѣзняхъ. Липовый чай полезенъ также для прохондриковъ и людей склонныхъ къ удару. Наливкою этихъ цвѣтовъ, вылечивали застарѣлую паучью болѣзнь. Средняя липовая корка разваренная въ водѣ, до тѣхъ поръ пока превратится въ слизь употребляется для примачиванія ожогъ, подагрическихъ комотныхъ опухолей, сопровождаемыхъ сильною болью, эта слизь прикладывается такъ же къ болящимъ геморройнымъ шишкамъ, для утоленія боли. Смѣшавная съ порошкомъ жженой пробки наподобіе мази, она служитъ болеутолятельнымъ и разводящимъ средствомъ. Кашинскій смѣшивая ее съ чистою сажею, прикладывалъ къ лишаямъ и остросочнымъ язвамъ, и втиралъ въ золотушные опухоли железъ, молочные струпы, и давалъ внутрь дѣтямъ, страждущимъ золотухою и англійскою болѣзнию—въ видѣ лепешекъ, состоящихъ изъ: 1 золотника чистой сажы, такого же количества бодяги—(*spongia fluviatilis*,) истертой въ порошокъ, и нужнаго количества липовой слизи въ приемахъ: отъ 10—20 гранъ, по утру и въ вечеру. Ранозлѣтельную воду для золотушныхъ язвъ составляютъ: изъ 2 унцій липовой заболони, 1 унціи жженой лавести и такого же количества чистой сажы, которая наливъ 1 фунтомъ воды, варятъ  $\frac{1}{4}$  часа; потомъ, къ отстоявшейся и процеженной жидкости прибавляютъ равное количество свѣжо-выжатаго сока изъ чистотѣла большого (*chelidon. majus*) иногда еще и

1—2 унціи сотоваго меду. Толченныя листы липы съ пользою прикладываются: на обжоги воспалительныя опухоли, женскую грудь и къ ножнымъ язвамъ. Слизистый отваръ листьевъ употребляютъ при трудномъ кровоочищеніи, мочеръзвѣ и для полосканія рта отъ язвъ. Сѣмяна истертыя въ порошокъ, и вьюхаемыя мѣсколко разъ въ день по вяжущему своему свойству, унимають носовое кровотеченіе *(Козлобородникъ)*.

Для наливки: полунціи цвѣтовъ наливають 6 унціями кипячей воды, пьютъ эту наливку съ медомъ или сахаромъ вмѣсто чаю. Для отвара свѣжей корки, тоже количество ея варятъ въ 8 унціяхъ воды, или вина, пока останется 6 унцій отвара. Снаружи они употребляются въ видѣ катаплазмы и припарки, какъ сказано выше.—Чай изъ липовыхъ цвѣтовъ и мелиссы въ упомянутыхъ болѣзняхъ приноситъ еще болѣе пользы.

\* *Tormentilla erecta* L, (*Заязникъ стоячій; узикъ. — Aufrechte Tormentille. — La tormentille droite*). Растетъ по лѣсамъ и болотистымъ лугамъ. Узикъ содержитъ въ себѣ дубильное вещество съ крахмаломъ и смолою. Дѣйствуетъ одинаково съ ратаніевымъ корнемъ, и подобно ему употреблялся прежде; можетъ быть заслуживаетъ преимущества уже какъ отечественное средство. Его даютъ въ видѣ отвара.—При вымачиваніи коры виннымъ спиртомъ можетъ растворяться не только дубильное вещество, но и красное начало завязнаго корня.

Свѣжій и сухой корень этого растенія запаху не имѣетъ; вкусъ: его вяжущій, горьковатый; дѣйствіе укрѣпляющее, вяжущее.

Отваръ этого корня полезенъ во всѣхъ болѣзняхъ, требующихъ сильнѣйшихъ вяжущихъ средствъ, какъ-то: въ сильныхъ мѣсячныхъ кровотеченіяхъ, поносахъ, и лихорадкахъ. Снаружи въ видѣ полосканья и примочки, его рекомендуютъ: въ цынготной разслабленности десенъ и шатавіи зубовъ, опаденіи и мокротной опухоли гортаннаго язычка,—слабости членосоединеній, выпаденія внутренностей и дѣтскихъ грыжахъ; а также для промыванія мокнущихъ и вялыхъ язвъ.

Для отвара 3 драхмы его владется на 6 унц. воды. Этотъ отваръ большею частію служитъ для наружнаго употребленія; въ порошокъ корень узика дается внутрь отъ 20—40 гранъ съ горечавкою, или горькимъ экстрактомъ въ пилюляхъ. Въ видѣ каши, замѣняющей хину и составляемой изъ порошка завязнаго корня и цвѣтовъ Римской ромашки, взятыхъ по 1 лоту, ирнаго корня и мауна, каждаго по 2 золотника съ медомъ даютъ больнымъ въ нелихорадочныя дни каждыя 2 часа по десертной ложкѣ.

\* *Tragopogon pratensis* L (*Козлобородникъ; Чортова боро-*

да. — *Wiesen Bocksbart*. — *Le Salsifis des pres*). Растетъ поугамъ и краямъ каналовъ.

Отваръ этого корня одобряютъ въ кашлѣ, мочеръзѣ; припадкахъ каменной болѣзни, кожныхъ сыпяхъ, свербѣжѣ всего тѣла и золотухѣ. Снаружи, совѣтуютъ толченую траву прикладывать на цынготныя и другія раны, которыя она заживляетъ; въ видѣ припарки, она умягчаетъ затвердѣлыя опухоли.



*Symphytum officinale* L. Сальникъ (къ стр. 242).

Веретено-образный свѣжій корень этого растенія въ разрѣзѣ выпускаетъ бѣлый молочный сокъ, который имѣетъ ранозѣлительное свойство; какъ равно и все свѣжее растеніе, которое истолковавши прикладываютъ для очищенія и заживленія язвъ.

\* *Tapa natans* L. (Водяные орехи; Водянойодникъ. — *Gemeine Wassernuss*. — *Macre; macle; cornnelle; corniole; corniche*;



*châtaigne d'eau; châtaigne cornue; Saligot; echarbot; truffed'eau.*) Растетъ преимущественно въ водахъ стоячихъ. Плоды этого растенія имѣютъ видъ остистыхъ, кожистыхъ орѣховъ. По удаленіи сѣрватой оболочки, представляется величиною съ ядро каштана черный орѣхъ, заключающій въ себѣ бѣлое, мучнистое ядро. Зерна водяныхъ орѣховъ употреблялись въ пищу уже въ глубокой древности. Варенныя или жаренныя подобно коштанамъ они имѣютъ очень пріятный вкусъ. По словамъ Боена, эти ядра весьма здоровы, очень питательны и могутъ быть сохраняемы въ водѣ въ теченіе шести мѣсяцевъ. Незрѣлыя орѣхи безвкусны, не скоро подвергаются порчѣ; перезрѣлыя же падаютъ при первомъ прикосновеніи къ нимъ и потому при сборѣ чрезвычайно важенъ выборъ благопріятнаго для того времени. До сихъ это растеніе еще не включено въ Европѣ въ число воздѣлываемыхъ; не смотря на то, что было бы чрезвычайно выгодно воспользоваться для этой цѣли не приносящими теперь никакой пользы болотами и стоячими водами, и приобрести въ этихъ послѣднихъ такимъ образомъ новый источникъ питанія и защиты противъ бѣдствій голода. Это было-бы тѣмъ удобнѣе что для разведенія водяныхъ орѣховъ нужно только бросить осенью плоды ихъ въ благопріятныя для ихъ развитія воды, каковы напр. свѣтлыя, не слишкомъ глубокия обращенныя на югъ. Китайцы давно уже узнали ихъ пользу и почти всѣ озера, пруды и рѣвки Китая покрыты этимъ растеніемъ, придающимъ не только красивый видъ, но и поглощающимъ еще вредныя миазмы стоячихъ водъ и такимъ образомъ очищающимъ воздухъ отъ заразительныхъ испареній; во врачебномъ отношеніи водяныя орѣхи дѣйствуютъ какъ вяжущее средство; такъ ихъ можно употребить въ видѣ эмульсіи противъ вѣтровъ и гемороа.

*Triticum repens L. (Собацій Зубъ; Пырей. — Quecken Weizen. — Chiendent).* Растетъ по полямъ, садамъ, около дорогъ и заборовъ. Вкусъ пырейныхъ корней сладкій, сахаристый запахъ слабый. Они содержатъ въ себѣ: мучнистое вещество, сахаръ и такъ называемый *Цинодинъ*. Ихъ употребляютъ, какъ значительное средство въ видѣ наливки или экстракта, имѣющаго темно-коричневый цвѣтъ. Пырей, въ отношеніи сельскохозяйственномъ составляетъ одну изъ самыхъ вредныхъ сорныхъ травъ, заглушающихъ посевы и истощающихъ почву.

*Tussilago farfara L. (Бѣлокопытникъ мать; и мачиха; матерникъ; подбѣлъ; двоелистникъ. — Gemeiner Huflattich. — Pas d'âne; Tussilage).* Растетъ по влажнымъ, глинистымъ и известковымъ мѣстамъ.

Всѣ части этого растенія плѣютъ вкусъ блейкій, горьковатый,

и несколько вяжущій; запахъ слабый. Упомянутыя свойства зависятъ отъ содержащагося въ немъ камедьно-смолистаго экстракта. Дѣйствіе его корня—грудное, разводящее очичающее. Сокъ выжимаемый изъ корней и листовъ, весною полезенъ въ золотушныхъ болѣзняхъ. Свѣжая и сухая трава одобряется въ грудныхъ припадкахъ, кашлѣ, мокротной одышкѣ, золотушной чахоткѣ и сухоткѣ. Снаружи прикладываются цѣльные листья Бѣлокопытника на раны и язвы для ихъ заживленія.

Для наливки горсть травы съ цвѣтами наливаютъ 12 унц. горячей воды; для отвара корня 1 унцію его варятъ въ томъ же количествѣ воды. Выжатый сокъ даютъ дѣтямъ по 2 или 3 унц. въ день съ медомъ или сахаромъ. Въ аптекахъ бѣлокопытникъ идетъ для составленія грудныхъ сборовъ (*species pectorales*).

*Tussilago petasites* L. (*Бѣлокопытникъ чумный; чумный корень; девесильный латушникъ.—Grossblättriger Huflattich.—Herbe aux teigneux; Tussilage pétasites.*) Растетъ по берегамъ ручьевъ и на влажныхъ лугахъ.

Корень и листья пахнутъ весьма непріятно; вкусъ горькій, острый; высушенные на огнѣ они издають искры и вспыхиваютъ. Дѣйствіе ихъ—грудное, потогонное, разноцѣлительное.

Употребляются въ простудномъ кашлѣ, удушѣ, бронхитѣ, петерикѣ и падушей болѣзнь. Снаружи толченые листья прикладываются въ видѣ катаплазмы: къ ногамъ, для разведенія водяныхъ отековъ, и въ подагрѣ.

Въ порошокъ даютъ съ медомъ по 1 драхмѣ; но чаще корень пьютъ въ отварѣ съ прибавленіемъ уксуса и меда; для этого отвара 1 унцію корня кладутъ на фунтъ воды.

---

## U.

*Ulmus campestris* L. (*Ильмъ полевой; Вязъ.—Feld Räs-ter.—L'orme*). Растетъ въ лѣсахъ, преимущественно средней и южной Россіи.

Дѣйствіе племя вяжущее, укрѣпляющее, мочегонное, очпщающее.

Отваръ корня этого дерева употребляется въ различныхъ воз-

ныхъ болѣзняхъ; а именно: въ чесоткѣ, лишаяхъ, паршахъ, проказѣ и застарѣлыхъ язвахъ; а также въ упорной ломотѣ, теченіи бѣлей, лихорадкахъ, поносахъ, водяной болѣзни, кожныхъ болѣзняхъ венерическаго свойства для утоленія болей, происходящихъ отъ внутренняго или сокрытаго рака. Порошокъ листовъ полезенъ при внутреннихъ боляхъ, коликахъ и почечныхъ припадкахъ.

Для внутренняго употребленія: 1 или 2 унціи молодой средней корки варятъ въ 2 фунтахъ воды, до тѣхъ поръ пока останется половина жидкости; процеженный отваръ принимаютъ по чайной чашкѣ, продолжая эти приемы нѣсколько времени. Снаружи, употребляется крѣпкій отваръ для омыванія и примочки; для него 4 унц. этой корки владется на 4 фунта воды, увариваемой до половины. — Этимъ отваромъ, также какъ и отваромъ листьевъ назначаютъ переломы костей, для скорѣйшаго ихъ сращенія. — Выжатый изъ свѣжихъ листовъ сокъ, прикладываютъ къ ранамъ, для ихъ заживленія.

Американцы молодою толченою корою присыпаютъ раны и язвы для заживленія ихъ; корка свареная съ молокомъ на подобіе розмашни, производитъ хорошее нагноеніе, и очищаетъ застарѣлыя язвы; и слѣдуетъ вѣстать разъ въ день.

Корку илема должно собирать въ маѣ мѣсяцѣ съ молодыхъ деревьевъ. Свѣжая корка содержитъ много слизи, полезной въ ранахъ, ожогахъ и проч.; сухая и со старыхъ деревьевъ содержитъ больше вяжущаго вещества, годнаго для дубленія кожъ.

Молодые листочки, илема весною можно варить въ кушаньѣ, какъ здоровую зелень.

\* *Urtica dioica* L. (*Крапива большая*. — *Grosse Nessel*. — *L'ortie dioique*). Растетъ по необработаннымъ мѣстамъ и около заборовъ. Листьями крапивы большой питаются чрезвычайно красивыя бабочки, каковы: *papilio urticaia*, *Oculus pavonis*, *Belladonna Sevana* L. Стебли крапивы при помощи обработки подобной обработкѣ льна доставляютъ превосходныя нити, изъ которыхъ можно готовить ткани. Башкиры и калмыки давно уже пользуются этимъ свойствамъ крапивы. Вареная и, растертая крапива составляетъ превосходный кормъ для домашней птицы.

Волоски крапивы, какъ извѣстно, производятъ посредствомъ жидкости, текущей чрезъ ихъ каналъ, сильное жженіе въ кожѣ и сыпь. Въ перегонѣ крапивнаго отвара нашли немного муравьиной кислоты, однако острое дѣйствіе этихъ волосъ, нельзя приписывать этой кислотѣ, потому что даже крѣпкая муравьиная кислота, привитая къ кожѣ, не имѣетъ такихъ дѣйствій и не производитъ сыпи.

Дѣйствіе молодой травы: крапивы разводящее, мочегонное, исправляющее соки—(alterans); сѣмянъ, также мочегонное.

Молодую траву весною варятъ въ кушаньяхъ вмѣсто шпината и другой зелени, и она служитъ кровочистительною пищею; полезною въ особенности для слабогрудныхъ, сухотныхъ и имѣющихъ наклонность къ чахоткѣ больныхъ. Выжатый изъ свѣжей травы сокъ, полезенъ во всѣхъ кровотеченияхъ, а особенно въ кровохарканіи, излишемъ почечуйномъ теченіи, кровавой мочѣ, чахоткѣ, желтухѣ, почечныхъ боляхъ, непостоянной ломотѣ и цынготныхъ кровотеченияхъ. Съѣденіе крапивыю полезно для возбужденія утопшихъ; ибо оно можетъ возстановить движеніе крови. Снаружи: растертые сочные листья крапивы и ихъ сокъ кладутъ въ ноздри, для пріостановки непомѣрнаго носоваго кровотечения. Листья толченныя съ солью прикладываютъ: къ раковымъ и другимъ злокачественнымъ язвамъ. Разваренною крапивыю припариваютъ поясницу отъ почечныхъ болей. *(Кашлевскій)*

Для наливки, кладутъ горсть крапивы на 6 унцій горячей воды, принимаютъ эту наливку по 2 унціи нѣсколько разъ въ день; или тоже количество выжатого сока даютъ по утру и въ вечеру.— Сѣмя, растертое съ водою: отъ  $\frac{1}{2}$ —1 драхмы даютъ въ одышкѣ, и для утоленія каменной боли въ почкахъ.

\* *Urtica urens* L. (*Крапива меньшая; жигучка. — Kleine Nessel. — L' Ortie piquante*). Растетъ по необработаннымъ и воздѣланнымъ мѣстамъ.

Дѣйствіе сѣмянъ этого вида крапивы противуглистное, притупляющее остроту мочи.

Въ отварѣ употребляютъ ихъ отъ глистовъ; застарѣлаго кашля, кровавой мочи, воспалительнаго мочерѣза, и мокротнаго ствоваго теченія. Весною молодая крапива служитъ первою здоровою зеленью для суповъ. Снаружи, свѣжіе толченые листы прикладываются къ язвамъ, бывающимъ около прохода, и на дѣтородныхъ частяхъ, и для очищенія головныхъ паршей.

Для внутренняго употребленія: полуунціи сѣмянъ варятъ въ 1 унціяхъ воды или молока, пока останется 10 унц. жидкости; и пьютъ этотъ отваръ ежедневно въ раздѣленныхъ пріемахъ. Выжатый изъ свѣжихъ листовъ сокъ даютъ отъ 2—5 унцій; сѣмя и корень даютъ въ порошокъ по 1 драхмѣ съ водою или въ горячей наливкѣ: полагая 1 унцію на 6 унцій воды. Эту наливку хвалятъ противъ каменныхъ припадковъ почекъ и мочеваго пузыря; въ чахотномъ кашлѣ и желтухѣ, происходящей отъ завазовъ желчныхъ органовъ.

V.

\* *Vaccinium oxycoccos* L. (*Клюква; Журавлина; Журавника.* — *Sumpf Heidelbeere.* — *L'airelle carneberge; coussinet.*) Растетъ по мшистымъ болотамъ, преимущественно на кочкахъ.

Зрѣлыя ягоды имѣютъ вкусъ очень кислый, мороженыя: кислотаватый, пріятный, зависящій отъ лимонной кислоты. Дѣйствіе ихъ прохладяющее, противуцинготное, укрощающее гнидость.

Употребляются они въ воспалительныхъ лихорадкахъ, желчныхъ и гнилыхъ горячкахъ, а особенно въ цингѣ. Выжатый изъ нихъ сокъ съ водою, служить полезнымъ питьемъ.

Клюквенный сокъ приѣмшиваютъ по 2 унціи на фунтъ воды или ячнага отвара, служащаго обыкновеннымъ питьемъ въ горячкахъ.

1). *Клюквенный медъ* (*Mel oxycocci*,) составляемый изъ 2 фунтовъ выжатаго сока и 1 фунта меда, подваренныхъ до густоты сиропа, весьма полезенъ въ горячкахъ, для прибавленія къ питью по нѣскольку унцій, вмѣсто простаго уксомеда (*oxumel simpl*).

2). *Клюквенный кисель* или варенье (*roob baccar. v. oxycocci*) прибавляется по 1 унціи къ питью и прохладительнымъ микстурамъ

\* *Vaccinium Vitis idaea* L. (*Брусника; брусника.* — *Roths Heidelbeere.* — *L'airelle ponctice*). Растетъ по дѣснымъ прогалинамъ и открытымъ мѣстамъ.

Зрѣлыя свѣжія ягоды брусники имѣютъ пріятно-кислый вкусъ и дѣйствуютъ какъ прохладительное утоляющее жажду, противугниlostное средство. Листьямъ ея приписываютъ такое же дѣйствіе въ каменной болѣзни, какъ и толокнянкѣ (*argutus uva ursi* L.).

Въ горячкахъ и воспалительныхъ лихорадкахъ даютъ выжатый сокъ съ водою вмѣсто питья; а въ цингѣ и гнилыхъ поносахъ помогаетъ брусничное варенье (*roob bacc v. vits idaeae*). Паренныя ягоды въ собственномъ соку, и смѣшанныя съ толокномъ и медомъ, очень полезно употреблять въ чаоткѣ и кровохарканіи. Листья брусники по своему вяжущему свойству, употребляемыя въ отварѣ полезны отъ простаго и кроваваго поноса, а по мнѣнію нѣкоторыхъ и отъ каменной болѣзни.

Для обыкновеннаго питья 2 унціи выжатаго сока смѣшиваютъ съ 2 фунтами холодной воды; такимъ же образомъ даются большыя сиропъ и варенье.—Для отвара: 2 драхмы листьевъ въ порошкѣ владуть на 8 унцій воды и кипятятъ до тѣхъ поръ, пока останется полфунта жидкости. Этотъ отваръ принимаютъ 3 раза въ день по 2 унціи.

Листы могутъ служить вмѣсто чернаго чаю; все растение употребляется для дубленія кожъ.

\* *Valeriana officinalis* L. (*Маунъ; болдырьянъ дикій; земляной ладанъ; очной корень.* — *Gemeiner Baldrian.* — *La valériane officinale*). Растетъ по влажнымъ лугамъ, берегамъ ручьевъ и краямъ каналовъ.

*Составныя части:* эфирное масло, летучая кислота (валеріанная), смола, вытяжное вещество, камедь, крахмалъ и др.

У здоровыхъ буддырьянъ (кромя запаха, вкуса, тошноты) даже въ большихъ приемахъ, по видимому не производятъ замѣтныхъ и постоянныхъ дѣйствій, между тѣмъ какъ уже однимъ запахомъ онъ дѣйствуетъ пзвѣстнымъ образомъ на нервную и мышечную систему кошекъ.

Буддырьянъ по видимому всего полезнѣе еще при загадочныхъ разстройствахъ нервной жизни, состоящихъ въ особенномъ возбужденіи нервной системы, — по терминологіи новѣйшей нервной механики, особенно въ ненормально усиленномъ «рефлекторномъ дѣйствіи спиннаго мозга.» Въ такихъ состояніяхъ онъ по видимому особенно полезенъ для женскаго пола, для истерическихъ и хлоротическихъ лицъ. Такимъ образомъ даютъ валеріану противъ всѣхъ «нервныхъ припадковъ» женщинъ, которые пзвѣстны подъ названіями: истерическихъ судорогъ, боли, тоски (*gareurs*) и т. д. Не хваляли также противъ еродныхъ нервныхъ страданій мужчинъ (напр. при *ипохондріи*) и наконецъ для всѣхъ періодовъ старости обохъ половъ. Однако тутъ валеріана вообще менѣе дѣйствительна, нежели у женщинъ.

И у истерическихъ нашли буддырьянъ полезнымъ только противъ такихъ припадковъ, которые исчезаютъ и сами собою, а напрасно ождали бы отъ него удаленія основнаго страданія, такъ назыв. нервности, раздражительности, слабости и т. д.

Валеріана гораздо менѣе полезна противъ эпилепсіи, пляски Св. Вита, коклюша, одышки, судорогъ желудка, недостаточнаго пищеваренія, паралича, глазнаго туска (*amaurosis*), хотя она, особенно въ прежнія времена, славилась противъ всѣхъ этихъ страданій. Она и въ этихъ случаяхъ оказываетъ кратковременную, палдіативную пользу, развѣ только когда они составляютъ припадки разлчныхъ истерическихъ страданій, какъ эвлампеіи, воллика, боли вообще, грудныя судороги и подобныя припадки.

Какъ подобное облегчительное средство валерьяна часто употребляются противъ нервныхъ припадковъ, которые являются особенно въ познѣйшихъ періодахъ тифа (такъ назыв. *pergosa versatilis*), въ злокачественныхъ случаяхъ острыхъ сыпей, послѣ спльныхъ кровотеченій, и состоятъ въ бьющейся головной боли, сильномъ бреду, большомъ безпокойствѣ и возбужденіи, въ бессонницѣ, подергиваніи сухихъ жлъзъ, даже судорогахъ и др.

Наконецъ валерьяна употребляется какъ легкое противоглистное средство, особенно противъ круглыхъ глистовъ, внутрь какъ и въ клистирахъ, обыкновенно съ цытварнымъ сѣменемъ и подобными веществами.

Въ плотномъ видѣ даютъ по нѣскольку разъ въ день, въ порошокъ и пилюляхъ. Валерьяна дѣйствуетъ всего сильнѣе въ плотномъ состояніи, но для этого требуется хорошій желудокъ. Поэтому валерьяну обыкновенно даютъ въ видѣ наливки. Всего чаще ею пользуются, какъ пзвѣстно, для домашняго употребленія въ видѣ чая. Валерьянную наливку можно также употреблять для промывательныхъ, напр. при истерическихъ припадкахъ, судорожной одышкѣ и рвзу въ кишкахъ.

Изъ валерьяны готовятъ:

1.) *Валеріанное масло*. (*Oleum Valerianae aethereum*). Цвѣтъ зеленовато-желтый, употребляется рѣдко; какъ сильно возбуждающее вещество, оно позволительно развѣ только при чисто нервныхъ страданіяхъ, судорогахъ и т. п., въ приѣмахъ по 3—6 капель, на сахаръ, по себѣ въ видѣ элеосахара или растворенное въ эфирѣ, нефти и сродныхъ веществахъ; часто также для прибавленія къ порошкамъ и пилюлямъ.

2.) *Валеріанная настойка*. (*Tinctura Valerianae (Spiritu s. simplex)*). Также сильнѣе возбуждаетъ, нежели простой буддырьянъ. Дается по 10—20 капель для прибавленія къ микстурамъ.

3.) *Tinctura Valerianae aetherea*. Настой валерьяны съ виннымъ спиртомъ; къ нему относится все, что было сказано о предыдущей, только что эта настойка имѣетъ болѣе возбуждающее и кратковременное дѣйствіе.

4.) *Tinctura Valerianae ammoniata s. volatilis* настой валерьяны со спиртною амміакальною жидкостью, имѣетъ болѣе противосудорожное и потогонное дѣйствіе, нежели валерьяна по себѣ; ее хвалили особенно противъ ревматизма суставовъ и др.

5.) *Экстрактъ валерьяны* (*Extractum Valerianae: (frigide paratum)*), валерьянная выжимка, имѣетъ густоту меда. Его даютъ еще изрѣдка въ пилюляхъ, напр. съ вонючею асою, бобровою струею, порошокомъ валер. корня. Приготовленный съ виннымъ спиртомъ возбуждаетъ спльнѣе.

6). *Валеріанная кислота*. (*Acidum Valerianicum*), получает-ся перегонкою корня валеріаны; употребляютъ нѣкоторыя соли ея, какъ соединенія ея съ хиномъ, овисью цинка и желѣзомъ.

7). *Противуглистная кашка* (*electuarium anthelminticum*), даютъ на приемъ: отъ 2—6 драхмъ въ день отъ глисть всякаго рода. Она состоитъ изъ порошка свѣжо-истертыхъ корней мауна и мужскаго папоротника, травы дикаго аврана и цвѣтовъ римской ромашки, каждаго по 1 драхмѣ, которыя, смѣшавъ съ нужнымъ количествомъ слабительнаго масла, принимаютъ по 1 золотнику, или 3 раза въ теченіи дня, и при каждомъ дѣйствіи на низъ,



*Veronica officinalis*. Вѣ роника аптечная (въ стр. 258).

запиваютъ по чайной чашкѣ крѣпкою наливкою: изъ мауна, пап-ротника и сладковаго корня.

Корень валеріаны должно собирать весной, прежде, нежели она станетъ расти въ стволъ, и высушивъ его въ тѣнистомъ мѣ-стѣ, хранить въ стеклянныхъ хорошо закупоренныхъ сосудахъ охраняя ихъ отъ сырости. Равнымъ образомъ, чтобы онъ не по-терять своего дѣйствія, должно его терѣть въ порошокъ при са-момъ употребленіи.

\* *Verbascum thapsus* L. (*Царскій скипетръ; Медвѣжье ушко; Коровьякъ; вербишникъ бѣлый; Царская свѣча.—Klein-blumiges Wollkraut.—Bouillon blanc; la molène commune*).



Растетъ по каменистымъ мѣстамъ, песчанымъ холмамъ и около заборовъ. Цвѣты содержатъ въ себѣ: лѣтучее, желтоватое масло; жирное, кислое вещество, яблочную и фосфорную кислоты, некристаллизующійся сахаръ, камедь, жирное зеленое вещество, желтое красящее, смолистаго свойства начало и минеральныя соли.

Цвѣты Парсваго скипетра запахъ имѣютъ пріятный; вкусъ медовой. Дѣйствіе какъ травы такъ и цвѣтовъ мягчительное, притупляющее, болеутоляющее.

Отваръ листьевъ и цвѣтовъ хвалятъ въ кашлѣ, грудныхъ простудныхъ припадкахъ, чаоткѣ, кровавомъ паносѣ съ рвзою въ животѣ и для смягченія болящихъ гемороидальныхъ шишекъ. Употребляется также въ видѣ промывательнаго и припарокъ.

Для наливки: 1 унція травы наливается 12 унц. кипячей воды; цвѣтовъ 1 и 2 драхмы для этой же цѣли наливають 4 унц. горячей воды, и принимаютъ эту наливку по чайной чашкѣ нѣсколько разъ въ день. — Снаружи листы и цвѣты, отваренные въ молокѣ, служатъ мягчительною и разводящею припаркою; этотъ же молочный отваръ въ потугахъ употребляется въ видѣ клистира. Къ почечуйнымъ шишкамъ прикладывать свѣжіе толченныя цвѣты.

Въ аптекахъ трава съ цвѣтами вербишнина употребляется для составленія мягчительныхъ сборовъ.

Въ Италіи сѣмяна этого растенія, имѣющія усыпительное свойство употребляются для ловли рыбы руками: ибо брошенные въ воду и съѣденныя рыбою, они приводятъ ее въ одуреніе.

\* *Verbascum nigrum* L. (Вербишникъ черной; черный быковникъ; кошечникъ; царскій скипетръ. — *Schwarzes Wollkraut*. — *La molène noire*). Растетъ по холмамъ, дорогамъ и подъ кустарниками.

Корень этого вида имѣетъ вкусъ клейкій, приторный; трава и цвѣты сходны съ предыдущими; сѣмя усыпляетъ и производитъ одуреніе. Дѣйствіе этого растенія мягчительное.

Трава, цвѣты и корень, въ отварѣ, служатъ мягчительнымъ полосканьемъ, промывательнымъ и припаркою, одобряемою въ ноготьдѣ.

Сѣмя его можетъ служить также для рыбьей ловли.

\* *Veronica officinalis* L. (Вероника аптечная, лежачая. — *Aechter Ehrenpreis*. — *Thé d'Europe*; *Veronique male*). Растетъ въ лѣсахъ, на пашняхъ и поляхъ.

Трава Вероники запаху не имѣетъ; вкусъ ея горьковатый и вяжущій. Дѣйствуетъ какъ грудное, укрѣпляющее, ранозѣлительное средство. Употребленіе ея вмѣсто чаю одобряется: въ

простудномъ кашлѣ, мокротной одышкѣ, чахоткѣ, происходящей отъ поврежденія внутренностей, почечныхъ припадкахъ отъ камня, кровавомъ мочеспрáжненіи; зудѣ и чесоткѣ. Снаружи свѣжая толченая трава прикладывается къ худосочнымъ язвамъ.

Для наливки 3 драхмы сухой травы владется на 8 унцій горячей воды. Выжатый сокъ изъ свѣжей травы дается въ подагрѣ, по 2 унціи въ день.

\* *Veronica beccabunga* L. (Вероника ручейная; ибунка; козий ростъ; козья морда; цынотная трава; поточникъ. — *Guellen Ehrenpreis*. — *Cresson de cheval*; *La veronique beccabunga*.) Растетъ въ стоячихъ и проточныхъ водахъ.

Содержитъ въ себѣ весьма много соку, подобнаго яичному бѣлку, и горькое начало. Вкусъ ея свѣжей травы горьковатый, травяной. Дѣйствіе разводящее, противуцынготное.

Свѣжая трава, въ видѣ салата или выжатый сокъ полезны въ цынгѣ но гораздо большую пользу приносятъ она вмѣстѣ съ ложечною травою или съ вахтою (*menyanthes trifoliata*). — Выжатый изъ этихъ травъ сокъ совѣтуютъ давать цынготнымъ также вмѣстѣ съ сывороткою. Снаружи толченая трава съ усѣхомъ прикладывается къ цынготнымъ ранамъ.



*Vitis Vinifera* L. Виноградъ (къ стр. 262)

Для внутренняго употребленія: 1 или 2 горсти свѣжей травы наливаютъ 12 унц. сыворотки, которую вскипятить и процѣдивъ, даютъ по 2 унціи, нѣсколько разъ въ день. Въ желтухѣ, вожныхъ сыпяхъ и членовыхъ боляхъ употребляютъ также выжатый сокъ отъ 2—3-хъ унц. съ молочной сывороткою.

\* *Viburnum opulus* L. (Калина. — *Gemeiner Schneeball*. —

*Viorne obier*). Растетъ во влажныхъ лѣсахъ и по берегамъ. Культура произвела изъ калины нѣсколько красивыхъ разнообразностей, служащихъ садовыми и комнатными растеніями, таковы напр. извѣстныя подъ именемъ: *буль-де-нейжъ* и *Гельдерской розы*.

Зрѣлыя ягоды калины имѣютъ, вкусъ кислый и сладко горьковатый. Дѣйствіе ихъ, вяжущее, крѣпительное, противугнилотное мочегонное.

Ягоды варенныя съ медомъ, многіе употребляютъ отъ простуднаго кашлю, хрипоты, удушья и поноса; въ простудныхъ лихорадкахъ и водяной болѣзни, они подъ конецъ леченія, могутъ также быть полезны. Отваръ изъ цвѣтовъ и ягодъ этого дерева служитъ хорошимъ полосканьемъ отъ осиплости, жабы и другихъ простудныхъ припадковъ горла. Если ложась спать, ежедневно пить по стакану этого теплаго овара, подслащеннаго мятнымъ сиропомъ, то осиплость проходитъ въ теченіе недѣли.

*Vinca minor* L. (*Монильница малая; барвенника; барвинокъ; гробная трава*. — *Kleines Sinngrün*. — *Violette des sorciers; herbe au riselage; pervenche*). Растетъ въ умѣренной и южной Россіи по лѣсамъ и около изгородей.

Листы или трава барвинка запаху не имѣетъ; вкусъ: горьковатый, непріятный. Дѣйствіе ихъ вяжущее и противулихорадочное.

Одобрѣется въ: слабости легкиихъ, кровохарканіи, маточномъ и почечуйномъ кровотеченіяхъ; а также въ женскихъ бѣляхъ и чахоткѣ.—Водяной отваръ, смѣшанный съ молокомъ полезенъ для полосканья горла въ жабѣ.—Винный отваръ помогаетъ въ гортанныхъ разслабленіяхъ, порчѣ десенъ и шатаніи зубовъ. Свѣжая толченая трава, и въ видѣ примочки унимаетъ наружныя кровотеченія и заживляетъ раны. Припарии разводять, сгустившееся молоко въ грудяхъ.

Для отвара: кладется унція травы: на фунтъ воды. Этотъ отваръ пьютъ по чашкѣ съ прибавленіемъ краснаго вина, нѣсколько разъ въ день. Снаружѣ онъ служитъ полосканьемъ и примочкою.

Сельскіе лекари, отъ кровотеченій, даютъ пить по чайной чашкѣ по утру и въ вечеру отваръ изъ 1 горсти травы барвинка, и 2 корней живокости—(sympht. off.).

\* *Viola odorata* L. (*Фиалка душистая*. — *Wohlriechendes Veilchen*. — *la violette odorante*). Растетъ по полямъ и тѣнистымъ лѣсамъ. Въ корняхъ содержится: *Віолинъ*, получаемый изъ нихъ въ видѣ бѣлаго порошка, малорастворимаго въ водѣ и

растворяющагося въ алкогольъ и образующаго съ кислотами соли. Вкусъ его острый и тошнотворный; дѣйствіе нарывное, воспаляющее. Цвѣты душистой фиалки въ сиропѣ и наливкѣ дѣйствуютъ, какъ грудное средство; водяную наливку ихъ пьютъ какъ чай такъ же при хрипотѣ. Листья имѣютъ кровоочистительное свойство; а корни, принимаемыя въ отварѣ рвотное.

\* *Viola tricolor L.* (*Трѣхцвѣтный цвѣтъ; веселые глазки; анютины глазки.* — *Dreifarbige Veilchen.* — *La violette-pensée; herbe de la trinité*). Растетъ по полямъ и около дорогъ. Цвѣты ея имѣютъ: вкусъ слизистый, запаху не имѣютъ. Корень благовонный. Дѣйствіе цвѣтовъ анютиныхъ глазокъ смягчительное. Ихъ даютъ въ формѣ экстракта и сиропа. Кромѣ того они входятъ въ составъ упомянутого при описаніи черной смородины (*Ribes nigrum*) противузолотушнаго набора.

\* *Viola canina L.* (*Фиалка собачья.* — *Hunds-Veilchen.* — *Violette de chien*). Растетъ по сухимъ мѣстамъ и краямъ лѣсовъ, Этотъ видъ запаха не имѣетъ. Дѣйствіе его корня рвотное, сходное съ дѣйствіемъ ипекакуанги, которую при нуждѣ онъ можетъ замѣнить.

*Viscum album L.* (*Омела; дубовыя ягодки; птичій клей.* — *Weisser Mistel.* — *Le gui à baies blanches*). Растетъ, какъ чужеродное растение на дубахъ, грушахъ, яблоняхъ и липахъ въ южной Россіи. Плоды омелы имѣютъ: вкусъ острый, горькій и сятаются кровоочистительными; въ настоящее время впрочемъ, они въ медицинѣ совершенно оставлены.

Деревянистые свѣжіе стебли омелы съ листьями запахъ имѣютъ: приторный, тошнотворный; вкусъ: вяжущій; сухихъ клейкій. — Они содержатъ въ себѣ: экстрактно-горькое и смолисто-вяжущее вещество. Дѣйствіе ихъ разводящее, укрѣпляющее и притупляющее.

Это растеніе оказываетъ полезное дѣйствіе въ судорожныхъ болѣзняхъ и спазмахъ, какъ-то: въ корчахъ с. Вита или судорожномъ трясеніи, судорожномъ удушьи, истерикѣ, разслабленіи членовъ, кровавомъ поносѣ; астенической ломотѣ, болѣзняхъ пасочной системы, маточныхъ припадкахъ и подагрическихъ боляхъ.

Въ порошокъ омелу даютъ: отъ  $\frac{1}{2}$ —1 драхмы, въ видѣ отвара, принимая, черезъ 2 часа по 2 столовыхъ ложки.

Омела, собираемая съ дубовыхъ деревьевъ предпочитается прочимъ породамъ, но срѣзывать ее должно въ декабрь мѣсяцѣ, и высушивъ, хранить въ стеклянной закупоренной банкѣ, потому что она легко плесневѣетъ и чрезъ то теряетъ свою силу.

Полезная, отъ ломотныхъ, подагрическихъ и параличныхъ

разслабленій членовъ, мазь составляется изъ 3 горстей ягодной омелы, которую изолокши, варять съ 2 фунтами свѣжаго свиного сала  $\frac{1}{4}$  часа, и прожавъ сквозь ветошку, прибавляютъ 8 золотн. воску и 2 золотника камфоры и за тѣмъ сохраняютъ эту мазь въ завязанной говаяжимъ пузыремъ банкѣ. — Ее употребляютъ предварительно, вытерѣвъ страждущія части нагрѣтымъ виномъ до суха и втирая въ составы мазь, растертую между ладоней; послѣ чего надо обернуть натертое его мѣсто теплымъ пологенцемъ или салфеткою.

*Vitis vinifera* L. (*Виноградъ*. — *Weinstock*. — *vigne*). Воздѣлывается въ южной Россіи.

Зрѣлыя ягоды винограда утоляютъ жаръ и жажду, и притупляютъ острогу желчи, кромѣ того они имѣютъ противугниlostное и легко слабѣющее дѣйствіе.

Зрѣлый виноградъ, употребляемый умѣренно, служитъ лучшими осенними плодами, полезными: въ кашлѣ, сухоткѣ, брюшныхъ завалахъ, желтухѣ, желчныхъ горячкахъ, мочерѣзѣ и цынгѣ, въ чахотной лихорадкѣ, соединенной съ упорными запорами и въ злокачественныхъ горячкахъ, а варенныя его ягоды полезны въ поносахъ гнилага свойства. Изюмъ, варенный въ водѣ, хорошо дѣйствуетъ въ грудныхъ мокротныхъ припадкахъ, воспалительныхъ лихорадкахъ. — Виноградные листья одобряются для полосканья въ жабѣ.

Излишнее употребленіе винограда, особенно у непривыкшихъ къ нему производитъ изнурительный поносъ, нерѣдко сопровождаемый рвотою.

---

## X.

*Xanthium strumarium* L. (*Ланушиникъ малый*. — *Gemeine Spitzklette*. — *La lampourde glouteron*; *petite bardane*). Растетъ въ средней Россіи по краямъ дорогъ. Все растеніе, имѣющее неприяtnый запахъ и острый, горькій вкусъ или только съмыана его употребляютъ для излѣченія зоба; при которомъ принимаютъ иногда выжатый изъ этой породы сокъ, въ приѣмахъ по 6 унцій. Простолюдины мѣстностей въ которыхъ развита эта болѣзнь относятся въ этому средству съ особымъ довѣріемъ и предпочитаютъ его всѣмъ другимъ; но медицина пренебрегаетъ имъ.

Z.

**Zea Mais L.** (*Маисъ; кукуруза.—Mais.—Mais*). Растеніе воздѣлываемое, преимущественно въ Украйнѣ. Зерна кукурузы даютъ 96,76% муки; они содержатъ въ себѣ по анализу Бизіо; на сто частей:

Крахмалу . . . . .	80,921
Землю . . . . .	5,758
Экстрактивнаго вещества . . . . .	1,972
Зумину . . . . .	0,945
Камеди . . . . .	2,283
Жирнаго масла . . . . .	0,323
Гордеину . . . . .	7,710
Сахаристыхъ веществъ . . . . .	0,895
Угусной кислоты и утрачиваемыхъ веществъ . . . . .	0,974

*Земль* представляется веществомъ блѣстящаго желтаго цвѣта, приобретающимъ при охлажденіи твердую консистенцію. Вкусъ и запахъ его характеристическій. Превращенный въ пластинки воспламеняется и горитъ яркимъ пламенемъ. Удѣльный вѣсъ его 1,0347. Въ холодной водѣ не растворимъ, въ горячей же размягчается. Въ эфирѣ растворяется весьма мало. При обработкѣ азотною кислотою образуетъ жирный продуктъ. Растворяется въ алкогольѣ и маслахъ.

Кукуруза употребляется, какъ питательное вещество. Изъ нея можно приготовить пиво и спиртъ. Изъ кукурузной муки дѣлаютъ катаплазмы.

Въ наше описаніе цѣлебныхъ растений, мы вопреки принятому обычаю (почти во всѣхъ подобнаго рода сочиненіяхъ), не включили въ него характеристики родовъ и видовъ, потому именно, что считаемъ удобнѣйшимъ отдѣлить эту послѣднюю отъ собственно врачебной части, ибо это даетъ намъ возможность расположить ботаническое описаніе родовъ и видовъ по аналитическому методу, составляющему легчайшій путь къ опредѣленію растений.

Кромѣ того желая доставить нашей книгѣ возможную полноту, мы признали не излишнемъ включить въ нее въ видѣ дополненій: 1) *Свѣденія о главнѣйшихъ лекарственныхъ формахъ.* 2) *Алфавитный списокъ, составныхъ и простыхъ лекарственныхъ растительныхъ средствъ, какъ отечественныхъ, такъ и иноземныхъ.* и 3) *О способахъ леченія, главнѣйшихъ болѣзней.* Наконецъ, имѣя въ виду важное значеніе легочной чахотки и тѣ смутныя понятія, которыя господствуютъ въ обществѣ объ этой болѣзни, мы посвятили ей особое приложеніе, предназначенное не для врачей-спеціалистовъ, но преимущественно для людей, не посвященныхъ въ тайны медицинской науки.

---

**СБОРЪ**  
**И**  
**ОПРЕДЪЛЕНІЕ ЦѢЛЕБНЫХЪ РАСТЕНІЙ.**



# I.

## ОПРЕДѢЛЕНІЕ ЦѢЛЕБНЫХЪ РАСТЕНІЙ

### Объясненія употребительнѣйшихъ техническихъ выраженій.

У всѣхъ сѣмянодольныхъ растений различаютъ въ особенности двѣ части: во первыхъ ту, которая развивается въ направленіи къ верху и вторую, которая стремится внизъ и называется корнемъ. Первая часть состоитъ изъ стебля, листьевъ и цвѣтковъ.

#### I. Корень.

Мы отличаемъ *главный корень* отъ волокна; первый есть та часть растенія, посредствомъ которой оно укрѣплено; *волокна* же суть боковые, тонкіе корни, посредствомъ которыхъ растеніе преимущественно получаетъ питаніе. Главный корень бываетъ: *цилиндрической*, если онъ вездѣ равной толщины; *шарообразный*, если онъ имѣетъ форму шара; *веретенный*, который при началѣ толще и суживается мало по малу въ длинный конецъ; *рыпчатый*, болѣе утолщенъ при своемъ началѣ; *волокнистый*, если главнаго корня нѣтъ, а только боковыя; *отгрызенный*, когда главный корень разрушился и остались только его слѣды; *узловатый*, у котораго небольшія утолщенія; *шишковатый*, когда эти утолщенія значительной величины; *пальчатый*, если утолщенія на брау дѣлятся на нѣсколько пальцеобразныхъ частей; *ползучій* онъ тогда, когда развѣтвленія корни простираются по поверхности почвы.

Иногда отъ корня, или лучше сказать онъ нижняго конца стебля, выходятъ вѣтви, образующія почки, которыя называются *отпрысками*.

## II. Стебель.

а. Относительно растительнаго вещества, стебель бываетъ двойкой: *травянистый*, если онъ мягкій или сочный, и *деревянистый*, если онъ твердъ и болѣе или менѣе сухъ.

б. Относительно формы онъ бываетъ: *цилиндрической*, если онъ вездѣ почти равной толщины и притомъ круглый; *щетинообразный*, если онъ цилиндрической, но тонкій и притомъ довольно твердый; *нитчатый*, если онъ тонкій и вмѣстѣ мягкій; *сжатый*, если онъ сжнутъ; *обоюдострый*, если онъ сжать и съ двумя острыми гранями; *трехъ—многогранный*, если онъ имѣетъ 3—4 и болѣе граней; если на граняхъ стебля находится листообразная перепонка, то стебель называется *крылатымъ*; *узловатый*, если онъ имѣетъ утолщенія, на нѣкоторомъ разстояніи другъ отъ друга; *опухлый*, если утолщенія значительной величины.

с. Относительно поверхности стебель бываетъ: *чешуйчатый*, который покрытъ чешуйками; *волосистый*, *пушистый*, *косматый*, *шерстистый*, если онъ покрытъ волосами (смотри у листьевъ); *щетинистый* покрытъ щетинками; *опыленный* покрытъ тонкою пылью; *мучнистый*, если можно различить отдѣльныя зернышки пыли; *клейкій*, если въ нему прилипаютъ небольшія тѣла.

У нѣкоторыхъ растений нижнія части стебля часто превращаются въ *луковицу*, или стебель находится подъ землею и выпускаетъ часто нѣсколько стебельковъ, послѣднюю форму мы называемъ: *корневище*. Изъ луковицъ или корневища развивается часто родъ стебля, не имѣющаго листьевъ или только немногіе: *стебелекъ* или *стрѣлка*.

д. Относительно направленія стебель бываетъ: *прямой* (*прямо стоящій*), съ начала до основанія перпендикулярный; *всходящій* (*приподнимающійся*), т. е. при основаніи наклоненный, а потомъ во всей длинѣ своей прямой; *волнистый* или *извилистый*, если онъ вогнуть дугою, то туда, то сюда, то сюда; *лежачій*, если онъ во всей своей длинѣ лежитъ на землѣ; *ползучій*, если притомъ изъ нѣкоторыхъ частей его развиваются корешки; если стебель слабъ, то онъ иногда опирается на другія растенія, находящіяся вблизи его—это стебель *лазучій*; когда онъ спирально обвивается около опоры, то это стебель *вьющійся* (повойный).

Обыкновенно стебель дѣлится на нѣсколько частей: <sup>4</sup> *вътзи*; притомъ главная ось стебля (стволь) или продолжается выше мѣста дѣленія или вовсе исчезаетъ; въ послѣднемъ случаѣ онъ или раздѣляется на многія вѣтви: *многораздѣльный* стебель; или

только въ одномъ и томъ же мѣстѣ на двѣ, три: *двурядельный*, *трирядельный* и т. д. стебель.

*Вѣтви.* а) Относительно положенія вѣтви бываютъ: *поперемьные*, если между двумя вѣтвями одной стороны, стоитъ на противоположной только одна вѣтвь; *супротивные*, если двѣ вѣтви развиваются на равной высотѣ, но одна на одной сторонѣ, а другая на противоположной; *кольчатый*, если на равной высотѣ болѣе двухъ вѣтвей; *разсыпанный* или *разсыпанный*, если онѣ неправильно расположены; *двурядный*, если въ двухъ рядахъ; наконецъ *промежуточный*, если выходятъ изъ угла листьевъ, т. е. изъ промежутка между листомъ и стеблемъ.

б) Относительно направленія вѣтви бываютъ: *отстоящая*, образующая съ стеблемъ острый уголъ; *прямоотстоящая*, почти параллельна стеблю; *распростертая*, которая отстоитъ отъ стебля подъ прямымъ угломъ; *распаленная*, образуютъ своею верхнею стороною и стеблемъ тупой уголъ; *отвороченная*, если онѣ образуютъ свою нижнюю стороною и стеблемъ весьма малый острый уголъ; *прижатая*, если онѣ во всей длинѣ прилегаютъ къ стеблю; наконецъ *повислая* и *вислая*, если довольно мягкія вѣтви отъ собственной тяжести склоняются книзу.

### III. Листья.

а) Ихъ можно раздѣлить по развитію на сѣмянные и обыкновенные; *сѣмянные* (всходные) листья (*сѣмянодоли*), которые уже встрѣчаются въ сѣмени, но не въ развитомъ состояніи: они развиваются только во время прозябанія; *обыкновенные*, *простые*, которые развиваются въ послѣдствіи.

б) Относительно мѣста прикрѣпленія листьевъ употребляютъ тѣже выраженія, какъ и при взаимномъ положеніи вѣтвей.

в) Относительно формъ листьевъ они бываютъ цилиндрическіе или плоскіе: *цилиндрическіе*, представляющіе форму палочки; если же цилиндрическій листъ тонокъ и немного жестокъ, то это листъ *щитнообразный*; если притомъ мягкій, то *нитчатый*, а если онъ уже весьма тонокъ, то его называютъ *волосообразнымъ*.

У плоскихъ листьевъ различаешь обыкновенно 2 части: верхняя часть листа образуетъ плоскость: это *пластинка листа*, между тѣмъ какъ нижній конецъ листа (*черешокъ*) суживается болѣе или менѣе. Вообще черешокъ различенъ отъ пластинки или формою или направленіемъ.

1) *Черешокъ*. Онъ обыкновенно прикрѣпленъ на одномъ концѣ пластинки; если же онъ прикрѣпленъ въ серединѣ, то это листъ *щитковидный*.

Черешокъ самъ по себѣ бываетъ: или *круглый* (цилиндрическій)

или *жолобоватый*; въ послѣднемъ случаѣ онъ имѣетъ на одной сторонѣ жолобокъ, болѣе или менѣе глубокой; *крылатый*, если тонкая перепонка тянется по обѣимъ сторонамъ вдоль; *объемный*, если онъ при основаніи расширяется и обхватываетъ стебель; иногда расширяется весь черешокъ и обхватываетъ болѣе или менѣе стебель въ видѣ влагалища или чехла, это черешокъ *влагалищный*; въ послѣднемъ случаѣ часто развивается на верхнемъ концѣ влагалища тонкая, сухая перепонка, обхватывающая также стебель—*кайма*. Когда черешка вовсе нѣтъ, то листъ называется *сидячимъ*, а если въ этомъ случаѣ листъ своимъ основаніемъ обхватываетъ совершенно стебель, то это *листъ объемный*; онъ *полуобъемный*, если онъ обхватываетъ стебель только на половину. Листья, не имѣющіе черешка, или перепонки крылатыхъ черешковъ продолжаютъ иногда внизъ вдоль стебля; такіе листья или черешки называются *спусходящими*.

Иногда встрѣчаются черешки безъ пластинки; часто они удлиняются или утолщаются: *усики*, которые прямы или спирально завиты.

2. *Пластинка* листа. Если она довольно мягкая и толстая, то листъ называется *мясистымъ*, а если тверда—*кожистымъ*; если же пластинка тонка, прозрачна и суха, то листъ *перепончатый*.

д) На пластинкѣ листа различаютъ *жилки*, т. е. пучки волоконъ болѣе или менѣе толстыхъ, выходящихъ изъ черешка или изъ основанія листа. Относительно жилокъ листья бываютъ: *кривожилксты* (параллельно-жилксты) или *угло-жилксты*; у первыхъ жилки скривлены съ самаго основанія пластинки и продолжаютъ между собою почти параллельно вдоль плоскости листа: при концѣ ея онѣ опять сходятся. У *угложилкстныхъ* (*сѣтчато-жилкстныхъ*) одна главная, среднняя жилка продолжается съ основанія до самаго конца листа; отъ главной же жилки отдѣляется болѣе или менѣе прямо-линейныхъ боковыхъ жилокъ, которыя развѣтвляются между собою; бываютъ и угложилкстные листья, у которыхъ нѣсколько главныхъ, прямо-линейныхъ, расходящихся съ самаго основанія жилокъ; отъ этихъ главныхъ жилокъ также отдѣляются боковыя, которыя развѣтвленіемъ образуютъ сѣтку.

е) Листья еще раздѣляются на: *простыя*, у которыхъ одна только пластинка на каждомъ черешкѣ или влагалищѣ; и на *сложныя*, у которыхъ на каждомъ черешкѣ нѣсколько листьевъ (*листочка*; *листки*).

аа) *Пластинка простыхъ листьевъ*. 1) Относительно округности пластинка бываетъ: *округлая*, если она представляетъ вругъ; *круговатая*,—почти какъ кругъ; *эллиптическая*,—длина не превышаетъ болѣе 2 разъ ширину, при томъ она въ серединѣ шире, чѣмъ на обояхъ округленныхъ концахъ; *овальная*, если

оба конца заострены; *яйцевидная*, если пластинка равняется продольному разрыву яйца, т. е. она на нижнем концѣ шире, чѣмъ на другомъ; *обратно-яйцевидная*, если она при концѣ шире, чѣмъ при основаніи; *продолговатая*—длина отъ 2—4 разъ превышаетъ ширину, притомъ пластинка на обоихъ концахъ округленная; *ланцетная*—продолговатая, но съ обоихъ концовъ заостренная; *лопатчатая*, если она при концѣ шире, а нижній конецъ (основаніе) мало по малу суживается; *линейная*, если длина превышаетъ болѣе 4 разъ ширину и притомъ если края параллельны; *мечевидная*, если она линейная или ланцетная, а на краяхъ острая и тоньше чѣмъ въ серединѣ; *сердцевидная*, яйцевидная и при основаніи съ двумя круглыми лопастями; *почкаобразная*, если она при концѣ круглая, а при основаніи съ 2 круглыми лопастями; *стрѣльчатая*, если обѣ лопасти основанія остры и если притомъ продольный разрывъ этихъ лопастей параллеленъ черешку; *неравно-сердцевидная* или *неравно-яйцевидная* значить, что обѣ стороны основанія листа неравной величины.

2) Относительно конца листа мы имѣемъ слѣдующія выраженія: *острый* листъ, оканчивающійся острымъ угломъ и такъ, что края пластинки переходили бы мало по малу въ конецъ; *заостренный*, если острый уголъ удлиняется или стороны его перемѣняютъ вдругъ направление; *тупой*, оканчивающійся округленнымъ концемъ; *усьченный*, если конецъ его срѣзанъ поперекъ; *выемчатый*, при концѣ входящій (тупой или острый) уголъ, или другими словами, *выемка*; *остроконечный*, если тупой или острый листъ при концѣ съ небольшою щетинкою, остреемъ или шипомъ; *остроконечіе* бываетъ или прямое или крючковатое.

3) Если край листьевъ совершенно безъ разрывовъ или выемокъ, то это *цѣльный* листъ; если же выемки или разрывы занимаютъ только незначительную часть пластинки, листъ *нераздельный*; въ послѣднемъ случаѣ край бываетъ: *пильчатый*, если и выемка и вмѣстѣ небольшая лопасти между ними остры; *осубренный*, если выемки остры, а лопасти между ними тупыя и круглыя; *зубчатый*, если выемки тупыя, а лопасти между ними остры; *выемчато-зубчатый*, если и выемки и лопасти между ними круглы, и первыя болѣе или менѣе плоскія. Если разрывы занимаютъ до  $\frac{1}{2}$  и болѣе пространства пластинки, то это *разрывный* листъ, если только разрывы не идутъ далѣе середины пластинки; *раздельный* листъ, если разрывы продолжаютъ почти до главныхъ жилокъ. Говорятъ также: *два-три*— и т. д. *-разрывный* или *-раздельный* листъ, если онъ разрывами дѣлится на 2, 3 или 4 и т. д. лопастей. Если круглый листъ такимъ образомъ раздѣленъ или разрыванъ, то его называютъ: *пальчато-разрывнымъ* или *-раздельнымъ*.

Если продолговатые, овальные, ланцетные или линейные и вообще всё не круглые листья, разрывны съ обоихъ краевъ, то называютъ ихъ *перисто-раздѣльными* или *-разрывными*, смотря по тому, бываетъ ли пластинка раздѣлена почти до основанія главной жилки или нѣтъ; лопасти происходящія отъ этихъ разрывовъ или раздѣловъ называются *боковыми* лопастями. Если окончательная лопасть перисто-разрывнаго листа больше боковыхъ, то листъ *мировидный*; когда же концы боковыхъ лопастей остры и очевидно обращены назадъ, т. е. къ основанію листа, то это листъ *пиловидный*; если боковыя лопасти опять перисто-разрывныя или -раздѣльныя, то говорятъ, что листъ *дуперисто-раздѣльный* или *-разрывный*; подобнымъ образомъ онъ бываетъ *триперисто-разрывный* или *раздѣльный*.

*bb. Сложные листья.* Если у сложныхъ листьевъ листочки прикреплены только къ концу общаго черешка, то ихъ опредѣляютъ по числу, наприм: *тройной листъ*—съ тремя на концѣ черешка стоящими листочками, или если листочки сидятъ по 5 или по 7, то въ этомъ случаѣ листья называютъ 5—7-пальчатыми.

Если у сложнаго листа листочки прикреплены къ обѣимъ сторонамъ черешка, то это *листъ перистый*; если же боковыя листочки опять перистые—*дуперистый*; у *триперистаго* листа это раздѣленіе листочковъ повторяется опять.

Если у перистаго листа нѣтъ окончательнаго (на концѣ черешка) стоящаго листочка, а только боковыя, то его называютъ *парно-перистымъ*, а если есть такой окончательный листочекъ, то *непарно-перистымъ* (нечетно перистый).

*Прилистники.* У многихъ растений встрѣчаются по обѣимъ сторонамъ каждаго листа меньшіе листки, похожіе болѣе или менѣе на собственные листья; они иногда развиваются такъ сильно, что становятся болѣе настоящихъ листьевъ; часто они срастаются съ черешкомъ; по подобію съ листьями ихъ называютъ *прилистниками*.

*Поверхность листьевъ и остальныхъ органовъ.* Поверхность листьевъ, равно какъ и стебля и остальныхъ органовъ бываетъ или покрыта волосами и шипами, или совершенно безъ нихъ, т. е. поверхность бываетъ *голая и не голая*. Если поверхность притомъ совершенно безъ возвышеній и углубленій, то такую часть называемъ *гладкою*; если поверхность удобно отражаетъ свѣтъ, то она *блестящая*; если на ней находятся волоски, то мы ее называемъ *волосистою*, особенно если эти волоски длинныя, мягкіе и не тѣсно сидячіе; если же тѣсно сидячіе, мягкіе и короткіе: *пушистою*; *шелковистою*, если волоски весьма тонкіе и прилежатъ почти совершенно; *бархатною*, если волоски коротки, тѣсно сидячіе и довольно твердые. Кромѣ того поверхность бываетъ; *шерстистая*, если волоски гибкіе, не пря-

мо линейные, тѣсные и немного отстоящіе; — *исключенная*, если волоски весьма тѣсно сидячіе и перепутаны между собою такимъ образомъ, что нельзя отличить отдѣльныхъ волосковъ; *шероховатая*, если волоски жестки и болѣе или менѣе длины; *щетилистая*, если они толстые, длинные и негибкіе; *жельзистая*, если волоски на верхнемъ своемъ концѣ снабжены желѣзками, отдѣляющими особенные соки (*волоски желѣзконосныя*).

Если какой нибудь органъ имѣетъ волоски только па бряхъ, то его называютъ *рѣснитымъ*.

*Шиты* суть болѣе или менѣе отвердѣлые волоски или жилки черешковъ и листьевъ; если они небольшіе и тѣсно-сидячіе, то органъ называется *острымъ*.

### III. Цвѣтокъ.

Цвѣткомъ называется совокупность всѣхъ органовъ, служащихъ къ развитію сѣмени; онъ развивается изъ листьевъ, болѣе или менѣе измѣнившихся и сросшихся между собою. Къ цвѣточнымъ органамъ также причисляются: *донце*, конецъ растенія или вѣтви, на которомъ приврѣшены остальные цвѣточные органы; иногда эта часть расширяется въ видѣ кружка, или она даже углубляется; возвышенные края увеличиваются часто при дальнѣйшемъ развитіи и срастаются, такъ что плодники повидимому заключены въ донцѣ.

#### а. Полные цвѣтки.

На полномъ цвѣткѣ различаютъ: *чашечку*, наружный, обыкновенно зеленый (неовернутый кругъ цвѣточныхъ листочковъ; *вѣнчикъ*, слѣдующій внутри за чашечнымъ кругомъ и состоящій обыкновенно изъ различно-окрашенныхъ и иногда сросшихся между собою листочковъ; *тычинки*, слѣдующія за вѣнчикомъ: онѣ обыкновенно представляютъ кругъ органовъ, важащихся обыкновенно въ видѣ нитей, съ небольшими головками, содержащими цвѣтную пыль: пыльники; наконецъ *пестикъ*, органъ стоящій въ самой срединѣ цвѣтка и представляющійся обыкновенно въ видѣ одного или болѣе внизу утолщенныхъ (плодники), а сверху тонкихъ трубочекъ или полыхъ тѣлъ (столбики).

1) *Чашечка*. Она состоитъ изъ нѣсколькихъ листьевъ, которые иногда срастаются и образуютъ такъ называемую *однолистную чашечку*, если листочки ея совершенно сросшіеся, то эта чашечка *цѣльная*; если же они не сросшіеся вполне, то сросшующая часть называютъ *трубочкою*, а не сросшующая *лопастями*; если лопасти узки, то ихъ называютъ *зубцами*. Иногда сращеніе бываетъ неравное, такъ что два разрѣза продолжаютъ почти до основанія чашечки и образуютъ такимъ образомъ *вертлюжную* и *нижнюю губы* (*чашечка двузубая*).

2) *Вѣнчикъ*. Онъ состоитъ изъ нѣсколькихъ листочковъ (*лепестки*) сросшихся между собою или свободныхъ; въ послѣднемъ

случаѣ они расположены обыкновенно, но не всегда, въ одномъ кругѣ. Относительно формы употребляются тѣже выраженія, какъ и у листьевъ. Когда они сужены при основаніи и расширены при концѣ, то суженную часть называютъ *ноготкомъ*, а расширенную *отгибомъ* (пластинка)

Если листочки вѣнчика сросшіея между собою, то это вѣнчикъ однолистный; суженная нижняя часть называется въ этомъ случаѣ *трубочкою*, а верхняя болѣе расширенная также *отгибомъ*; *зѣвъ*, мѣсто между трубочкою и отгибомъ.

Смотря по формѣ однолистнаго вѣнчика мы различаемъ:

а. *Правильный*, если всѣ лопасти равны: *неправильный*, если нѣкоторыя лопасти болѣе другихъ.

У правильнаго вѣнчика можно различить слѣдующія формы: *колесовидный*—плоскій вѣнчикъ съ распушеннымъ отгибомъ; *трубчатый* если отгибокъ весьма малъ, такъ что вѣнчикъ только одна трубочка; *булавовидный*—трубчатый вѣнчикъ, у котораго трубочка наверху немного расширяется; *воронкообразный*, если трубка внизу узка, а на верху расширяется вдругъ значительно; *кубкообразный*—вѣнчикъ представляетъ широкую и не слишкомъ длинную трубочку; *кувшинообразный* имѣетъ форму кувшина; *кубаровидный*—форму извращеннаго конуса или кубаря; *колокольчатый*—форму подобную колокольчику, обращенному нижнимъ отверстіемъ на верхъ; *шарообразный*, форму шара съ весьма короткимъ отгибомъ; 2—3—4 *раздѣльный или разрывной*, если отгибокъ 2—3—4-разрывной и т. д.; *цѣльный*—лепестки сросшіея между собою до конца; *увѣнчанный*, если у лепестковъ на томъ мѣстѣ, гдѣ ноготь переходитъ въ отгибокъ, находятся небольшія чешуйки.

б. *Неправильный вѣнчикъ бываетъ: языковатый*, если всѣ лопасти срастаются въ одну лопасть, обращенную въ одну сторону; *дегубый* если вѣнчикъ раздѣченъ на 2 части (*верхняя и нижняя губа*); если притомъ зѣвъ открытъ, то это вѣнчикъ *зѣвообразный*; верхняя губа иногда вогнута и называется тогда *шишакомъ*. Неправильный вѣнчикъ также видимъ у семейства *Мотыльковыхъ* (*Papilionaceae*). Иногда вѣнчикъ или одинъ только листокъ имѣетъ сзади пустое продолженіе: *шпорецъ*.

3. *Тычинки*. Каждая вполне развитая тычинка состоитъ изъ узкой, длинной части (*стерженекъ*), и изъ болѣе короткой и толстой (*пыльникъ*).

Пыльникъ 1-2-или *болѣе-пыльцодный*; если стерженковъ вовсе нѣтъ, то пыльникъ *сидячій*. Выраженія его формъ одинаковыя съ плодникомъ.

Стерженекъ представляетъ нить, на которой прикрѣпленъ пыльникъ; иногда встрѣчаются нити безъ пыльниковъ: это *ложныя тычинки*.



4. *Пестикъ*. а. *Плодникъ*. Нижняя утолщенная часть, имѣющая одно или болѣе гнѣздышекъ, называется *плодникомъ*; онъ бываетъ шарообразный, продолговатый, многогранный, круглый, коническій и яйцеобразный и т. д. Кроме того плодникъ образуется изъ одного или болѣе листовъ, т. е. плодникъ имѣетъ 2—3 и т. д. *створокъ*, которыя можно сосчитать по каймамъ, которыми сростаются листочки плодника.

Внутри плодника находится та часть, на которой прикрѣплены сѣмена (*сѣмяносцевъ*); иногда она въ самой серединѣ плодника, въ такомъ случаѣ ее называютъ *сѣмяносцемъ центральнымъ*; если же она расположена по бокамъ—*сѣмяносцемъ стороннимъ или боковымъ*.

Плодникъ или нѣсколько плодниковъ, иногда вмѣстѣ съ донцемъ перемѣняются въ зрѣломъ состояніи болѣе или менѣе и становятся сухимъ или мясистымъ *плодомъ*.

Плоды бываютъ: *стручекъ*: плодникъ длинный открывающійся въ двѣ створки.

*Костянка*: наружный слой мясистъ, а внутренній кожистый, твердый или костяной.

*Орѣхъ*: наружный слой твердъ или костяной.

*Зерновка*: плодникъ съ 1 сѣменемъ, который сростается съ окружающими его листочками.

*Крылатка*: спинки створокъ расширяются въ видѣ крыла.

*Коробочка*: плодникъ одно-многогнѣздный, но короче стручка, и раскрывающійся различнымъ образомъ.

*Сѣмянка*: плодъ не растрескивающійся, одногнѣздный съ 1 сѣменемъ.

*Двусѣмянка*: 2 сѣмянки сросшіяся между собою: продольныя возвышенія называютъ *ребрышками*; мѣста между ребрышками: *жолобокъ*; въ жолобѣ встрѣчаются каналцы, наполненные масломъ: *полоски* (\*).

*Ягода*: плодникъ съ нѣсколькими сѣменами, окруженными мякотью или мясомъ.

*Желудь*: одногнѣздный плодникъ съ однимъ сѣменемъ, имѣющій при основаніи родъ чашечки, состоящей изъ прицвѣтничковъ.

Если столбикъ, тычинки, чашечка или вѣнчикъ прикрѣплены къ верхнему концу плодника, то ихъ называютъ *надплодниковыми*; если же эти цвѣточные части окружаютъ плодникъ, то онъ *подплодниковый*.

б. *Сѣмя*. Въ плодникѣ находятся одно или болѣе тѣлъ различной формы, развивающія въ своей внутренности зародышъ новаго растенія; эти тѣла суть сѣмена. Сѣмя покрыто разными

(\*) *Прим.* П. дося обыкновенно темнѣ остальной поверхности жолобка.

перепонками и заключаетъ вромѣ зародыша часто еще другое вещество — *бълокъ*, который, смотря по сложенію атомовъ или *мучнистый, хрящеватый, роговой* и т. д. Относительно положенія говорятъ, что *зародышъ центральный*, если онъ лежитъ въ самой срединѣ *бѣлка*; *сторонній* или *боковой*, если онъ лежитъ внѣ *бѣлка* и притомъ *окружной*, если онъ окружаетъ *бѣлокъ*.

с. *Столбикъ*. Трубочка оканчивающаяся особеннымъ отверстиемъ (*рыльце*); послѣднее раздѣлено иногда на 2 на 3 и т. д. частей; даже бываетъ, что *столбика* совершенно нѣтъ и тогда говорятъ, что *рыльца сидячія*.

### В. Неполные цвѣтки.

Не всегда развиваются чашечка и вѣнчикъ вмѣстѣ, иногда бываетъ только одинъ кругъ листочковъ и въ этомъ случаѣ говорятъ, что цвѣты безъ вѣнчика и чашечки, а съ *цветнымъ покровомъ*; послѣдній то окрашенный какъ вѣнчикъ, то зеленый какъ листочки чашечки (*пленки*), то сухой какъ перепонка; иногда даже встрѣчаются только щетинки или волоски, окружающіе плодникъ и тычинки.

### С. Прибавочные органы цвѣтка.

1) *Прикрасы (медовники)*. Кромѣ упомянутыхъ цвѣтныхъ органовъ есть еще другіе менѣе важные, въ видѣ желѣзковъ, бугорковъ, прибавковъ или утолщеній и называемыхъ *прикрсами, медовниками* или *нектарниками*; обыкновенно они стоятъ на донцѣ, окружаютъ иногда тычинки и пестикъ, или находятся въ шпорцахъ вѣнчика.

2) *Прицвѣтники*. При основаніи цвѣтковъ или цвѣтныхъ ножекъ находятся обыкновенно небольшіе листочки, формою болѣе или менѣе различныя отъ настоящихъ листьевъ: *прицвѣтники*; если цвѣтки густые, то и прицвѣтники сближаются и образуютъ такъ называемую *обвертку*, особенно если они стоятъ въ одномъ, двухъ или болѣе кругахъ при основаніи цвѣтковъ.

## D. Цвѣторасположеніе.

Цвѣтки или стоятъ по одному на концѣ стебля (*цвѣтки одинокіе*) или ихъ болѣе: при томъ или вѣтви растенія оканчиваются однимъ или болѣе цвѣтками (*цвѣтки окончательныя*), или цвѣтки развиваются въ промежуточныхъ углахъ, т. е. въ промежуткахъ между листьями и стеблевыми органами (*цвѣтки промежуточные*).

Если при томъ болѣе одного цвѣтка на стеблѣ, то всѣ цвѣтки вмѣстѣ взятыя образуютъ или *головку*, когда цвѣтки сидятъ весьма тѣсно на концѣ общей цвѣтной ножки и если они принимаютъ видъ болѣе или менѣе шарообразный; или *колосъ*, если цвѣтки не имѣютъ ножекъ или весьма короткія: ножки же прикрѣплены вдоль и на концѣ вѣтви (оси): ось колоса тонкая и почти сухая; *сережка*: колосъ опадающій по отцвѣтаніи или по зрѣлости плода; *початокъ*: колосъ, у котораго ось толстая и мясистая: иногда онъ окруженъ при основаніи большимъ, часто окрашеннымъ листомъ (*обверточный листъ*); *шишка*: колосъ у котораго прицвѣтники отдѣльныхъ цвѣтковъ твердѣютъ и деревянѣютъ; *зонтикъ*: если цвѣтныя ножки многихъ цвѣтковъ прикрѣплены всѣ къ концу вѣтви; *кисть*: колосъ, у котораго цвѣтки на ножкахъ: ножки эти прикрѣплены вдоль и на концѣ вѣтви и не такъ длинны, чтобы боковыя цвѣтки достигали высоты на вершинѣ стоящаго; *полузонтикъ*: кисть, у которой боковыя цвѣтныя ножки длинны, такъ что боковыя цвѣтки достигаютъ высоты на концѣ стоящаго; *метелка*: кисть, у которой боковыя вѣтви вѣтвистыя; *щитокъ*: полузонтикъ съ вѣтвистыми, боковыми, цвѣтными ножками.

*Прибавленіе*: Если и плодникъ и тычинки развиты въ одномъ и томъ же цвѣтѣ, то это *цвѣтокъ обоюдный*: но встрѣчаются и цвѣтки только съ тычинками (*мужескіе*) и цвѣтки только съ плодникомъ и столбикомъ (*женскіе*). Вообще называютъ ихъ *однодомными*, если женскіе и мужескіе цвѣтки на одномъ и томъ же стеблѣ, а *двудомными*, если женскіе на одномъ стеблѣ, а мужескіе на другомъ. Если же при одномъ и томъ же цвѣторасположеніи находятся женскіе и мужескіе цвѣтки и кромѣ того еще обоюдные, то это цвѣторасположеніе *смѣшанное*.

## Указаніе, какъ употреблять таблицы.

Чтобы опредѣлить какое нибудь растеніе, должно раскрыть таблицу для опредѣленія семействъ. Тутъ мы находимъ собраніе признаковъ растеній, послѣдовательно распределенныхъ по отдѣламъ. Каждые два отдѣла, соединенные скобкою и означенные цифрою по лѣвую сторону таблицы, содержатъ въ себѣ признаки, противоположные другъ другу. Начинать должно всегда съ первыхъ двухъ отдѣловъ. Прочитавъ ихъ внимательно и рѣшивъ, къ которому изъ нихъ подходятъ признаки разсматриваемаго растенія, замѣтимъ себѣ цифру, поставленную по правую сторону этого отдѣла и указывающую на другіе два отдѣла, къ которымъ слѣдуетъ перейти. Отыскавъ эту цифру далѣе по лѣвую сторону таблицы, и прочитавъ принадлежащія къ ней два отдѣла, мы по сравненіи ихъ съ признаками растенія снова избираемъ одинъ изъ нихъ, переходимъ по указанію цифры этого отдѣла къ другимъ двумъ отдѣламъ, и такимъ образомъ находимъ наконецъ означеніе семейства, къ которому принадлежитъ разсматриваемое нами растеніе; при этомъ означенъ и номеръ семейства. Если семейство разсматриваемаго растенія содержитъ въ себѣ нѣсколько родовъ, то родъ, къ которому оно принадлежитъ, отыскивается тѣмъ же способомъ по таблицѣ, слѣдующей непосредственно за характеристикю семейства. Если родъ разсматриваемаго растенія имѣетъ нѣсколько видовъ, то слѣдуетъ таблица для опредѣленія видовъ потому же способу. Чтобы облегчить опредѣленіе вида, самые ясные признаки противоположныхъ двухъ отдѣловъ напечатаны курсивомъ. Если по опредѣленіи семейства окажется, что подлѣ онаго нѣтъ римской цифры, указывающей номеръ подъ которымъ нужно искать семейство, то это означаетъ что въ вашъ травникъ не вошло ни одного рода изъ этого семейства и потому оно не включено въ таблицы для опредѣленія родовъ и видовъ. Точно такъ-же, если признаки указанные въ таблицахъ родовъ или видовъ не будутъ подходить къ найденному роду или онъ то это служитъ снова доказательствомъ того, что оно не включено въ таблицы, въ которыхъ мы ограничили только пѣлѣбными растеніями, встрѣчаемыми почти во всей средней половѣ Россіи и Московской и Петербургской флорахъ. Присоединивъ къ нимъ впрочемъ наиболѣе распространенныя хотя и не пѣлѣбныя роды и виды двухъ послѣднихъ флоръ, что сдѣлано нами въ видахъ большей легкости опредѣленія растеній.

## II.

### ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДѢЛЕНІЯ СЕМЕЙСТВЪ.

- |   |   |                                                                                               |     |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1 | } | Растенія, у которыхъ ясно можно различать или тычинки, или столбикъ, или оба вмѣстѣ . . . . . | 2   |
|   |   | Растенія, у которыхъ нѣтъ ни тычинокъ, ни столбиковъ, вообще никакихъ цвѣточныхъ органовъ     | 143 |

### Явнобрачныя растенія. Phanerogamia.

- |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2 | } | Травы (по крайней мѣрѣ растенія нашей флоры), у которыхъ листья съ параллельными, невѣтвистыми, съ основанія до конца пластинки листа идущими жилками; если же нельзя различать параллельности жилокъ, то (у растеній нашей флоры) вѣнчикъ трилистный; главный общій характеръ тотъ, что онѣ при прозябаніи всходятъ съ однимъ листомъ . . . . .                        | 122 |
|   |   | Травы, деревья или кустарники, у которыхъ листья имѣютъ главные жилки, развѣтвленныя въ видѣ сѣтки и между собою не параллельныя; если же нельзя ясно различить этотъ признакъ, то въ этомъ случаѣ вѣнчикъ (у растеній нашей флоры) не трилистный; главный и общій характеръ этихъ растеній тотъ, что онѣ при прозябаніи всходятъ съ двумя и болѣе листочками . . . . . | 3   |

## I. Двусемяподольныя растенія. Dicotyledones.

	Цвѣтки съ чашечкою и вѣнчикомъ . . . . .	4
3	Цвѣтки, на которыхъ нельзя различить ни вѣнчика, ни чашечки; на мѣстѣ оныхъ находятся одинъ или два круга листочковъ или всѣ окрашенные или сухіе или зеленые (цвѣтной покровъ), или даже и такого покрова вокругъ тычинокъ и столбика вовсе нѣтъ . . . . .	86
4	Вѣнчикъ состоящій изъ нѣсколькихъ листьевъ . . . . .	5

### A. Вѣнчикъ состоитъ изъ нѣсколькихъ листочковъ.

3	Вѣнчикъ неправильный . . . . .	6
6	Многочисленныя тычинки . . . . . <b>Ranunculaceæ</b> (i).	7
7	Тычинокъ 10, или всѣ сросшіяся въ одну трубку, или изъ нихъ одна только свободна и не срослась съ другими . . . . . <b>Papilionaceæ</b> (xx).	8
8	Тычинокъ числомъ 8, сросшихся въ два пучка; плодикъ двугрѣздный, чашечка 5-листная: два внутренніе листочка больше другихъ, расширены въ видѣ крыльевъ и окрашены <b>Polygaleæ</b> (ix).	9
9	Тычинокъ 6, сросшихся въ 2 пучка; чашечка двулистная; вѣнчикъ 4-листный . . . . . <b>Fumariaceæ</b> (v).	10

- 10 } Плодникъ одногѣздный; чашечка 5-листная; каж-  
дый листочекъ съ привѣскою при основаніи; вѣн-  
чикъ пятилистный: нижній листочикъ съ шпор-  
цемъ . . . . . **Violariæ** (vii).
- 10 } Плодникъ пятигѣздный; чашечка трилистная;  
верхній изъ ея листочковъ съ шпорцемъ; вѣн-  
чикъ трилистный . . . . . **Balsamineæ**
- 11 } Вѣнчикъ или чашечка окружаетъ плодникъ или  
плодники . . . . . 12
- 11 } Вѣнчикъ или чашечка прикрѣплены на верхнемъ  
концѣ плодника . . . . . 52
- 12 } Плодниковъ нѣсколько, каждый со столбикомъ;  
иногда они сросшіеся въ сборный плодъ: въ этомъ  
случаѣ каждая часть плода со столбикомъ . . . 13
- 12 } Только 1 плодникъ . . . . . 20
- 13 } Тычинокъ числомъ отъ 3—12 . . . . . 14
- 13 } Тычинокъ болѣе 12 . . . . . 18
- 14 } Растенія съ мясистыми сочными листьями  
**Crassulaceæ** (xxv).
- 14 } Растенія съ немясистыми листьями . . . . . 15
- 15 } Тычинокъ 12 . . . . . **Rosaceæ** (xxii).
- 15 } Тычинокъ 8—10 . . . . . 16
- 16 } Отгибокъ (край) чашечки 4-раздѣльный: тычи-  
нокъ 8; (листья щетинообразные) . **Haloragææ**.
- 16 } Чашечка 5-зубчатая, разрѣзная или раздѣльная;  
тычинокъ 10; (листья плоскіе) . . . . . 17
- 17 } Сборный плодникъ оканчивается двумя кончика-  
ми; тычинки не сросшіеся между собою . . .  
**Saxifragææ** (xxvii).
- 17 } Сборный плодникъ оканчивается 5-ю кончиками;  
стерженки сросшіеся внизу въ короткую трубку  
**Geraniaceæ** (xvi).
- 18 } Чашечка двойная: внутренняя 5-разрѣзная, на-  
ружная 3-листная . . . . . **Malvaceæ** (xii).
- 18 } Чашечка простая или если двойная, то наружная  
4—5 листная . . . . . 19

- Тычинки и вѣнчикъ прикрѣплены къ той части растенія, на которой стоятъ и плодники (донць); листочки чашечки при основаніи не сросшіеся между собою. . . . . **Ranunculaceae** (I).
- 19) Тычинки и вѣнчикъ прикрѣплены къ основанію чашечныхъ листочковъ или лопастей, такъ что послѣдніе могутъ только быть оторваны вмѣстѣ съ тычинками; листочки чашечки болѣе или менѣе сросшіеся между собою. . . . . **Rosaceae** (XXII).
- 20) Чашечка дву-листная или разрывная или раздѣльная . . . . . 21  
Раздѣлы чашечки числомъ болѣе 2 . . . . . 22
- 21) Многочисленные тычинки; вѣнчикъ 4-листный . . . . . **Paraveraceae** (IV).  
(Тычинокъ 3; лепестковъ 3) . . . . . **Elatineae**.
- 22) Лепестки многочисленные . . . . . **Nymphaeaceae** (III).  
Лепестковъ числомъ отъ 3—6 . . . . . 23
- 23) Тычинки въ однихъ цвѣткахъ, а столбики (или рыльца) или плодники въ другихъ . . . . . 24  
Тычинки и столбики (или рыльца) и плодники въ однихъ и тѣхъ же цвѣткахъ. . . . . 25
- 24) Чашечка 3-раздѣльная; вѣнчикъ 3-листный; тычинокъ 3 . . . . . **Empetreae**  
Чашечка мужскаго цвѣтка 5-листная; вѣнчикъ 5-листный; тычинокъ 10. . . . . **Alsineae**  
~~Чашечка 5-зубчатая . . . . . **Syleneae** (X).~~
- 25) Чашечка 6-листная или 12-зубчатая . . . . . 26  
Чашечка 3—5, или 8-зубчатая, разрывная, раздѣльная или листовая . . . . . 27
- 26) Чашечка 6-листная: листочки расположены въ двухъ рядахъ . . . . . **Berberideae** (II).  
Чашечка 12-зубчатая . . . . . **Lithrarieae** (XXIV).
- 27) Чашечка 3-листная или раздѣльная. . . . . **Elatineae**.  
Чашечка 4—5 или 8-листная или раздѣльная или зубчатая . . . . . 28
- 28) Чашечка 4-листная или 4-раздѣльная; вѣнчикъ 4-листный; тычинокъ 6 или 8 или онѣ многочисленные . . . . . 29  
Чашечка 5- или 8-листная, разрывная или зубчатая; вѣнчикъ 5-листный, или если число 4 вствѣ-



28	}	чается при раздѣлахъ чашечки или вѣнчика, то число тычинокъ не 6 или 8 и онѣ не много- численныя . . . . .	32
29		}	Тычинки многочисленныя . . . . . <b>Ranunculaceae</b> (i).
30	}		Тычинокъ 8, всѣ равной длины . . . . .
		Тычинокъ 6, изъ которыхъ 2 значительно короче другихъ . . . . . <b>Cruciferae</b> (vi).	
31	}	(Столбиковъ числомъ отъ 2—3) . . . . . <b>Alsineae.</b>	
		Столбиковъ 4 . . . . . <b>Elatineae.</b>	
32	}	Желтоватыя растенія, имѣющія на мѣстѣ листь- евъ только чешуйки; тычинокъ 10 <b>Monotropeae.</b>	
		Растенія съ листьями . . . . .	33
33	}	Чашечка двойная: вѣшняя трилистная, внутрен- няя же 5-разрѣзная; тычинки многочисленныя, сросшіяся въ трубку . . . . . <b>Malvaceae</b> (xii)	
		Чашка простая . . . . .	34
34	}	Тычинокъ числомъ 4, 5, 8, 10 или 15 . . . . .	38
		Тычинки многочисленныя, числомъ 20 и болѣе . . . . .	35
35	}	Стерженки внизу сросшіяся въ 3—5 пучкахъ; стол- биковъ 3; плодникъ 3-гнѣздный <b>Hypericineae</b> (xiv)	
		Стерженки совершенно свободны; столбикъ 1; плод- никъ много, 5 или 1-гнѣздный . . . . .	36
36	}	Чашечка 5- или 3-листная. въ первомъ случаѣ 2 листочка иногда значительно меньше другихъ; тычинки прикрѣплены къ дову . . . . .	37
		Чашечка 5-зубчатая; тычинки прикрѣплены къ чашечкѣ . . . . . <b>Amygdaleae</b> (xxi)	
37	}	Деревья; всѣ 5 листочковъ чашечки равной вели- чины . . . . . <b>Tiliaceae</b> (xiii)	
		Травянистыя растенія или кустарники; три изъ ли- сточковъ чашечки больше, а два значительно меньше; или чашечка 3-листная . . . . . <b>Cistineae</b>	
38	}	Тычинокъ 10—15 . . . . .	39
		Тычинокъ 4, 5 или 8 . . . . .	46
39	}	Столбикъ 1 . . . . .	40
		Столбиковъ 2—5 . . . . .	41

- 40 { Тычинки прикрѣплены къ подплодниковому кружку; листья не расположены у корня въ видѣ розетки; кустарникъ . . . . . **Ericineae** (xxxv)  
 { Подобнаго плодниковаго кружка нѣтъ; (листья расположены въ розеткѣ у корня); травянистыя растенія . . . . . **Pyrolaceae** (xxxvi)
- 41 { Чашечка однолистная съ зубцами или раздѣлами **Sileneae** (x)  
 { Чашечка 4—5-листная или 4—5-раздѣльная . . . . . 42
- 42 { Столбикъ 2; (тычинокъ 11—15) . . . . . 43  
 { Столбиковъ отъ 3—5; тычинокъ 10 . . . . . 44
- 43 { (Тычинокъ 10) . . . . . **Saxifrageae** (xxvii)  
 { (Тычинокъ 11—15) . . . . . **Rosaceae** (xxii)
- 44 { Плодникъ суживается мало по малу въ верхнемъ своемъ концѣ: притомъ длина его нѣсколько разъ превышаетъ ширину . . . . . **Geraniaceae** (xvi)  
 { Плодникъ на верху болѣе или менѣе округленъ: длина его не превышаетъ значительно ширину . . . . . 45
- 45 { Стерженки до основанія свободныя; листья простые . . . . . **Alsineae**.  
 { Стерженки при основаніи сросшіяся въ короткую трубку; листья тройныя, т. е. по три листочка на одномъ черешкѣ . . . . . **Oxalideae** (xvii)
- 46 { 8, или 4 двураздѣльныхъ тычинокъ . . . . . 47  
 { 4—5 нераздѣльныхъ тычинокъ . . . . . 48
- 47 { Травянистыя растенія, или низкія и небольшія кустарники; (плодникъ 4-гнѣздный) **Ericineae** (xxxv)  
 { Деревья; коробочка двугнѣздная, двулопастная . **Acerineae** (xv)
- 48 { Кустарники или деревья; столбикъ 1 . . . . . 49  
 { Травянистыя растенія; столбиковъ числомъ отъ 2 — 5, или если нѣтъ столбиковъ, то рылецъ отъ 2—5 . . . . . 50
- 49 { Плодь—костянистая ягода; тычинки супротивны лепесткамъ . . . . . **Rhamnaceae** (xix)  
 { Плодь—коробочка; тычинки чередуются съ лепестками . . . . . **Celastrineae** (xviii)

50	Стебелекъ безъ листьевъ или съ однимъ только листомъ; листья расположены у корня	
		<b>Droseraceae</b> (viii)
	Стебель съ листьями . . . . .	51
	Листья безъ прилистниковъ, и притомъ они при основаніи не сросшіеся въ влагалищъ, окружающемъ стебель; плодъ 4, 5 или 8 и 10-гнѣздной . . . . .	<b>Lineae</b> (xi)
51	Листья съ небольшими листиками при своемъ основаніи, или каждые 2 супротивные листа сросшіеся при основаніи между собою образуютъ влагалище, окружающее стебель; плодъ одногнѣздный . . . . .	<b>Alsineae</b>
52	Тычинокъ числомъ 2, 4, 5, 8 или 10 . . . . .	54
	Тычинокъ болѣе 10 . . . . .	53
	Плодникъ 1, 2 — 5-гнѣздный, мясистый; тычинокъ 20 . . . . .	<b>Pomaceae</b> (xxiii)
53	Плодниковъ много (повидимому 1, кувшинообразный: на внутренней сторонѣ этой кувшины находятся много орѣшковъ); или 2 плодника съ двумя столбиками . . . . .	<b>Rosaceae</b> (xxii)
54	Деревья или кустарники . . . . .	55
	Травянистыя растенія . . . . .	56
	Чашечка 4-зубчатая; лепестковъ 4; тычинокъ 4; костянка двугнѣздная . . . . .	<b>Corneae</b>
55	Чашечка 5-раздѣльная; лепестковъ 5; тычинокъ 4; одногнѣздная ягода . . . . .	<b>Grossularieae</b> (xxvi)
	Чашечка 2- или 4-зубчатая, разрѣзная или раздѣльная; лепестковъ числомъ 2—4; столбикъ 1, или его вовсе нѣтъ, а на мѣстѣ его сидячія рыльца . . . . .	57
56	Чашечка 5-зубчатая, разрѣзная или раздѣльная: или чашечка представляется въ видѣ узкаго края; вѣнчикъ 5-листный; столбиковъ 2 . . . . .	60
	Водяныя растенія съ нитчатыми листьями; столбиковъ нѣтъ: рыльца сидячія . . . . .	<b>Haloragaeae</b>
57	Растенія, растущія на сушѣ, съ обыкновенными листьями; столбикъ 1 . . . . .	58
58	Тычинокъ 4 . . . . .	<b>Corneae</b>
	Тычинокъ 2 или 8 . . . . .	59

- Простое, нераздѣльное рыльце; (тычинокъ 8; стебель витчатый, ползучій по землѣ)
- 59 { **Vaccineae** (хххiv)  
Рылецъ 4, которыя болѣе или менѣе отстоятъ другъ отъ друга, или онѣ такъ сросшіяся, что видно, что онѣ состоятъ изъ 4 частей; (стебель ирямостоящій или восходящій); тычинокъ 8; если же простое рыльце, то тычинокъ числомъ 2 . . . . .
- 60 { **Onagrariae**  
Тычинокъ 5; цвѣтки расположены въ зонтикахъ.  
**Umbelliferae** (ххviii)  
Тычинокъ 10; цвѣтки не въ зонтикахъ **Saxifrageae** (ххvii)

**В. Вѣнчикъ однолистный.**

- 61 { Цвѣточные части (вѣнчикъ, чашечка и тычинки) прикрѣплены на плодникѣ . . . . . 62  
Цвѣточные части окружаютъ плодникъ или плодники . . . . . 69
- 62 { Всѣ цвѣтки собраны въ головки и всѣ вмѣстѣ окружены многолистной обверткой . . . . . 63  
Цвѣты не собраны въ такія головки. . . . . 64  
Тычинокъ 4; пыльники не сросшіяся между собою; рыльце простое; чашечка двойная.  
**Dipsaceae** (хххii)
- 63 { Тычинокъ 5; пыльники сросшіяся между собою; столбикъ съ 2 рыльцами; край чашечки перепончатый или сухой, а иногда состоитъ изъ щетинокъ или волосковъ . . . . . **Compositae** (хххiii)
- 64 { Тычинокъ числомъ 1—3 . . . . . **Valerianeae** (ххх)  
Тычинокъ числомъ 4, 5, 8 или 10 . . . . . 65
- 65 { Тычинки прикрѣплены къ трубчкѣ или допастямъ вѣнчика; листья супротивные или нѣсколько въ кольцѣ . . . . . 66  
Тычинки прикрѣплены къ верхней части плодника или къ неплодниковому кружку; листья попеременные . . . . . 67

- 66 { Листья по 2 супротивные; чашечка 2—5 зубчатая или листовая . . . . . **Caprifoliaceae** (ххix)  
 Листьевъ по 4, 6 и болѣе въ кольцо; чашечка неясная . . . . . **Stellatae** (ххх)
- 67 { Тычинокъ 8 или 10, прикрѣпленныхъ къ надплодниковому кружку . . . . . **Vaccineae** (хххiv)  
 Тычинокъ 5, прикрѣпленныхъ къ верхней части плодника . . . . . 68
- 68 { Вѣнчикъ неправильный, расколотый во всей своей длинѣ; пыльники сросшіеся между собою; (водяное растеніе) . . . . . **Lobeliaceae**  
 Вѣнчикъ правильный, не расколотый; пыльники не сросшіеся между собою; растенія, растущія на сушѣ . . . . . **Campanulaceae**
- 69 { Плодниковъ болѣе 4 . . . . . **Crassulaceae** (ххv)  
 Плодники отъ 1—4 . . . . . 70
- 70 { Плодниковъ 4 въ каждомъ цвѣткѣ; 1 столбикъ между ними стоящій . . . . . 71  
 Плодникъ 1 . . . . . 72  
 Тычинокъ 5. . . . . **Boragineae** (xl)
- 71 { Тычинокъ 4, изъ которыхъ 2 значительно длиннѣе, или только 2 тычинки . . . . . **Labiatae** (хлviз)
- 72 { Тычинки 2—3 . . . . . 7з  
 Тычинокъ 4, 5, 7, 8 или 10. . . . . 7
- 73 { Тычинокъ 2; вѣнчикъ 2-губый или 4-разрѣзной, не расколотый во всей длинѣ . . . . . 74  
 Тычинокъ 3; вѣнчикъ расколотъ на одной сторонѣ во всей длинѣ: отгибокъ 5-разрѣзной **Portulacaeae**.
- 74 { Вѣнчикъ 2-губый со шпорцемъ. . . . . **Lentibulariae**.  
 Вѣнчикъ разрѣзной и раздѣльный, или двугубый (и безъ шпорца) . . . . . **Antirrhineae** (хлvi)
- 75 { Растенія съ вьющимися стеблями; тычинокъ 4—5; плодникъ 2—4-гнѣздый **Convolvulaceae**. (хххix)  
 Растенія съ не вьющимися стеблями . . . . . 76
- 76 { Растенія безъ корневыхъ и стеблевыхъ листьевъ: на мѣстѣ ихъ только чешуйки; плодъ одногнѣздный; тычинокъ 4, изъ которыхъ 2 короче . . . . . **Orobanchaeae** (хлiv)

76	{ Растенія съ обыкновенными листьями . . . . .	77
	{ Вьничкъ перепончатый и сухой, 4—5 разръзной или листный; (растенія съ безлистнымъ стебелькомъ, на концѣ котораго находится многоцвѣтной колосъ; листья выходятъ изъ корня.	
77	{ Вьничкъ не перепончатый и не сухой; стебель съ листьями или стебля нѣтъ, а на мѣстѣ его одноцвѣтковая ножка, или эта ножка (стебелекъ) образуетъ на верху зонтикъ съ цвѣтками	78
	{ Стерженки сросшіеся между собою въ трубку, раздѣленную наверху въ 2 части: каждая часть съ 4 пыльниками . . . . .	<b>Polygaleae</b> (ix)
78	{ Стерженки свободны, то есть не сросшіеся между собою . . . . .	79
	{ Тычинокъ 7, 8 и 10 . . . . .	80
79	{ Тычинокъ 4—5 . . . . .	81
	{ Плодникъ многогвѣздный; тычинокъ 8 или 10 всѣ съ пыльниками. . . . .	<b>Ericineae</b> (xxxv)
80	{ (Плодникъ одnogвѣздный; тычинокъ 7 или 10: изъ послѣднихъ 5 безъ пыльниковъ). <b>Primulaceae</b> (xliii)	
	{ Плодникъ 3-гвѣздный; тычинокъ 5; (листья многопарно перистые). . . . .	<b>Polemoniaceae</b>
81	{ Плодникъ дву-или одно-гвѣздный; тычинокъ 4 и 5; (листья не перистые: въ противномъ случаѣ тычинокъ 4). . . . .	82
	{ Изъ тычинокъ 2 длиннѣе другихъ (или 2—3 безъ пыльниковъ) . . . . .	83
82	{ Всѣ тычинки равной длины и всѣ съ пыльниками, . . . . .	84
	{ Стерженки утолщаются противъ верхняго конца: на широкомъ же концѣ пристають пыльники поперегъ или восо; тычинокъ 4—5 . . . . .	<b>Verbasceae</b> (xlii)
83	{ Стерженки на концѣ не шире; тычинокъ 4, или если 5, то 3 изъ нихъ безъ пыльниковъ . . . . .	<b>Antirrhineae</b> , и <b>Rhinanthaceae</b> , (xliii и xlv)
	{ Листья супротивные, или по 3 на одномъ черешкѣ . . . . .	<b>Gentianeae</b> (xxxviii)
84	{ Листья поперемянные или расположены въ видѣ розетки при основаніи стебля . . . . .	85

- Тычинки противустоящія лопастямъ вѣнчика  
**Primulaceae** (хлш)  
 85 { Тычинки чередуются съ лопастями вѣнчика,  
 т. е. онѣ стоятъ у разрѣзовъ вѣнчика . . . . .  
**Solanaceae** (хл)

**С. ЦВѢТЫ СЪ ЦВѢТНЫМЪ ПОКРОВОМЪ.**

- 86 { Цвѣтки расположены въ сережкахъ или въ шиш-  
 кахъ; деревья и кустарники. . . . . 118  
 Цвѣтки въ другомъ цвѣторасположеніи; кустар-  
 ники, деревья или травянистыя растенія . . . . . 87  
 87 { Цвѣтнѣй покровъ окружаетъ 1 или нѣсколько  
 плодниковъ, или если его нѣтъ, то тычинки  
 окружаютъ плодникъ . . . . . 96  
 Цвѣтнѣй покровъ, или если его нѣтъ, то тычин-  
 ки прикрѣплены къ вершинѣ плодника . . . . . 88  
 88 { Тычинокъ 5 или 10 . . . . . 89  
 Тычинокъ 1, 3, 4, 8 или 12 . . . . . 91  
 89 { Столбикъ 1; плодникъ одногнѣздный; цвѣтки безъ  
 ножекъ собраны въ головки, окружены мно-  
 голистною оберткою . . . **Compositae** (хххш)  
 Столбиковъ 2; цвѣтки не собраны въ головки . 90  
 Плодникъ одногнѣздный; цвѣтки въ двураздѣль-  
 ныхъ щиткахъ; листья супротивные . . . . .  
**Scleranthae.**  
 90 { Плодникъ двугнѣздный; цвѣтки въ зонтикахъ,  
 т. е. стебель развѣтвляется въ одномъ мѣстѣ  
 на нѣсколько цвѣтнѣй ножекъ (которыя опять  
 въ одной и той же точкѣ дѣлятся на нѣсколь-  
 ко ножекъ); листья почти всегда попере-  
 мѣнные . . . . . **Umbelliferae.** (хххш)  
 91 { Тычинокъ 3 . . . . . **Valerianaeae.** (хххш)  
 Тычинокъ 1, 4, 8 или 12. . . . . 92  
 92 { Тычинокъ 4, каждая нераздѣльная, или каждая  
 дѣлится на 2, такъ что видимы 8 тычинокъ;  
 или 8 простыхъ тычинокъ. . . . . 93  
 Тычинокъ числомъ 1 или 12 . . . . . 95

- Цвѣтки только съ тычинками или только съ столбиками на одномъ стеблѣ (цвѣтки однодомные); (листья перисто-разрѣзные съ нитчатými или щетинообразными лопастями) . . .
- 93 } **Haloragaeae.**  
 Въ каждомъ цвѣтѣ находятся тычинки и столбикъ; (листья цѣльные, или если они перисто-разрѣзные или раздѣльные, то лопастине нитчатые или щетинообразныя). . . . . 94
- 94 } Листья по 4 и болѣе въ кольцахъ; столбикъ 1, иногда двуразрѣзный. . . . . **Stellatae** (xxx)  
 Листья попеременные, или по 2 супротивные; столбика 2. . . . . **Saxifrageae.** (xxvii)  
 Тычинокъ 12; плодникъ 3—6-гнѣздный; (листья попеременные). . . . . **Aristolochiae** (ii)
- 95 } Тычинка 1; плодникъ одногнѣздный, односѣмянный; (листья по нѣсколькѣ въ кольцахъ). . . . . **Hippurideae.**
- 96 } Деревья или деревянистые кустарники . . . . . 97  
 Травянистыя растенія . . . . . 101
- 97 } Тычинокъ 2; (листья перистые) . . . . . **Oleaceae** (xxxvii)  
 Тычинокъ 3—12; (листья попеременные) . . . . . 98
- 98 } Плодникъ 3 — 6-гнѣздный; тычинокъ 3 или 8; (листья не длиннѣ нѣсколькихъ линий . . . . . 99  
 Плодникъ 1—2-гнѣздный; тычинокъ отъ 4—12; (листья значительно длиннѣ) . . . . . 100
- 99 } (Цвѣтной покровъ 8-раздѣльный или-листный; 4 внутренне и 4 вѣшныя листочки; тычинокъ 7; плодникъ 4-гнѣздный) . . . . . **Ericineae.** (xxxv)  
 Цвѣтной покровъ 6-раздѣльный или-листный; 3 внутренне и 3 вѣшныя листочки; плодникъ 3—6-гнѣздный. . . . . **Empetreeae.**
- 100 } Плодникъ двугнѣздный; тычинокъ 4—12; (листья дупильчатые) . . . . . : **Urticeae** (lvi)  
 Плодникъ одногнѣздный; тычинокъ 8; (цѣльные листья зубчаты только при концѣ, но немного). . . . . **Thymeleae.** (l)
- 101 } Тычинки многочисленныя, числомъ болѣе 16 . . . . . 102  
 Тычинокъ числомъ менѣе 16 . . . . . 103



	Плодникъ одногнѣздный; иногда нѣсколько плодниковъ въ одномъ цвѣткѣ; растенія безъ млечнаго сока; цвѣтной покровъ 4—многогнѣздный . . . . .	<b>Rauunculaceae</b> (I)	
102	Плодникъ дву-или 3-гнѣздный; (растенія съ млечнымъ сокомъ или если онъ безъ такого сока, то цвѣтной покровъ 3-раздѣльный) . . . . .	<b>Euphorbiaceae</b> (LII)	
	Водяныя растенія съ супротивными или въ кольцѣ стоящими, линейными или щетинообразными листьями; тычинокъ 1 или 12—16 . . . . .		104
103	Растенія на сушѣ растущія, если онѣ водяныя, то листья не линейные или щетинообразные; тычинокъ 2—10 . . . . .		105
	Плодникъ 4-гнѣздный; тычинка 1; (листья линейные и нераздѣльные) . . . . .	<b>Callitrichineae</b>	
104	Плодникъ одногнѣздный; тычинокъ 12—16; (каждый листъ дву- или 3-жды двураздѣльный съ нитчатыми лопастями) . . . . .	<b>Ceratophylleae</b>	
	Цвѣтки съ шпорцами . . . . .		106
105	Цвѣтки безъ шпорець . . . . .		107
	Тычинокъ 5 . . . . .	<b>Balsamineae</b>	
106	Тычинокъ 6 . . . . .	<b>Fumariaceae</b> (v)	
	Цвѣтной покровъ 12-зубчатый . . . . .	<b>Lythrarieae</b> (XLIV)	
107	Цвѣтной покровъ 2—8 зубчатый, -разрѣзной, -раздѣльный или-лиственный . . . . .		108
	Цвѣтной покровъ 4-раздѣльный съ 4 очередующими прилистниками (видимо 8-раздѣльный цвѣтной покровъ); столбикъ 1; плодникъ съ 2 сѣменами . . . . .	<b>Sanguisorbeae</b>	
	Цвѣтной покровъ 2—6-раздѣльный . . . . .		109
109	Листья супротивные или въ пучкахъ . . . . .		110
	Листья попеременные . . . . .		114
	Тычинокъ 6 . . . . .	<b>Berberidées</b> (II).	
110	Тычинокъ 2, 4, 5, 10 . . . . .		111
	Тычинокъ 4 . . . . .	<b>Urticeae</b> (LII).	
111	Тычинокъ 2, 5, 20 . . . . .		112
	(Цвѣтной покровъ красноватый) . . . . .	<b>Primulaceae</b> (XLII)	
112	Цвѣтной покровъ зеленый, развѣ только что на краяхъ бѣлый . . . . .		113)

\*

- 113 { При основаніи листьевъ сухіе и перепончатые  
прилистники; плодникъ съ 1 сѣменемъ  
**Poronychia**
- 113 { Прилистниковъ нѣтъ; плодъ съ 6 сѣменами . . .  
**Scleranthea**.
- 114 { При основаніи листьевъ находятся небольшіе  
чехлы, окружающіе стебель. . . **Polygonae** (xlix).  
Такихъ чехловъ нѣтъ . . . . . 115
- 115 { Растенія съ свободными прилистниками; (листья  
весьма шероховатые) . . . . . **Urticae** (lii).  
Растенія безъ прилистниковъ; (листья не шеро-  
ховатые, иногда опыленные) . . . . . 116
- 116 { Плодъ съ двумя кончиками, каждый со столби-  
комъ; тычинокъ 8 . . . . . **Saxifrageae** (xxvii).  
Плодъ на верху округленный; тычинокъ 1—5. 117
- 117 { Плодъ — кругомъ раскрывающаяся коробочка;  
столбиковъ 3; тычинокъ 3. . . . . **Amarantaceae**  
Плодъ не раскрывающійся; столбикъ 1, 1—4-  
раздѣльный: тычинокъ 1 — 5. . . . .  
**Chenopodeae** (xlviii).
- 118 { Деревья или кустарники съ игольчатыми листь-  
ями . . . . . **Coniferae** (lviii).  
Листья не игольчатые, но плоскіе . . . . . 119
- 119 { Цвѣтки однодомные, т. е. тычинки и плод-  
ники не въ одномъ цвѣткѣ, но на одномъ  
стеблѣ. . . . . 120  
Цвѣтки двудомные, т. е. тычинки и плодники  
не въ одномъ цвѣткѣ и на разныхъ сте-  
бляхъ . . . . . 121
- 120 { Цвѣтки со плодниками (женскіе) расположены въ  
сережкѣ; цвѣтной ихъ покровъ приросшіи  
къ плоднику . . . . . **Cupuliferae** (lv).  
Женскіе и мужскіе цвѣтки въ сережкахъ: цвѣт-  
ной покровъ мужскаго цвѣта трилистный или  
4-разрѣзной; у женскихъ цвѣтковъ цвѣтнаго  
покрова нѣтъ . . . . . **Betulinae** (lvi).  
Тычинокъ 4—6; плодникъ односѣмянный . . . . .  
**Myricae** (lvii).
- 121 { Тычинокъ 2—24; плодники многосѣмянные . . . . .  
**Salicinae** (lv).

## II. Одноствянодолѣнные растенія. *Monocotyledones.*

- Можно ясно различить чашечку отъ вѣничка; первая зеленая (3-раздѣльная или 3-листная); вторая окрашенная (трилистная) . . . . . 123
- 122 Чашечки и вѣничка различить нельзя; оба эти круга листочковъ зеленые, или оба окрашены; или наконецъ только одинъ кругъ листочковъ или шестяъ образующихъ цвѣтной покровъ или даже этихъ и нѣтъ . . . . . 125
- 123 Чашечка и вѣничкъ прикрѣплены къ верхнему концу плодника . . . . . **Hydrocharideae**
- Чашечка и вѣничкъ окружаютъ плодники . . . . . 124
- Тычинокъ 9; (листья лпнейные) . . . **Butomeae**
- 124 Тычинокъ 6, или болѣе 9; (листья или яйцевидные, или сердцевидные, или стрѣльчатые) . . . . . **Alismaceae** (LIX).
- На водѣ плавающія растенія, состоящія изъ листа, на нижней сторонѣ котораго выходитъ или 1 корень, или пучки корней; тычинокъ 1—2. . . . . **Lemnaceae**
- 125 Растенія на сушѣ и водѣ растущія другой формы . . . . . 126
- 126 Цвѣтной покровъ окрашенный, и потому похожъ на вѣничкъ . . . . . 127
- Цвѣтной покровъ не окрашенный, или на мѣстѣ его щетники, или его вовсе нѣтъ . . . . . 128
- 127 Обверточный листъ, который можно бы было почесть за цвѣтной покровъ, окружаетъ початокъ, на которомъ сидятъ тычинки и плодники; (этотъ листъ снаружи зеленый, а внутри чисто бѣлый) . . . . . **Aroideae** (LXI).
- Цвѣтной покровъ 4, 5 или 6-разрѣзный или раздѣльный . . . . . 128
- 128 Цвѣтки прикрѣплены къ верхнему концу плодника . . . . . 129
- Цвѣтки окружаютъ 1 или нѣсколько плодниковъ . . . . . 130

- 129 Цвѣтной покровъ правильный; тычинокъ 3, не сросшихся, ни между собою, ни со столбикомъ . . . . . **Irideae** (LXI).
- Цвѣтной покровъ неправильный; тычинокъ числомъ 1—3, сросшихся съ столбикомъ . . . . . **Orchideae** (LXII).
- 130 Цвѣтной покровъ 4-раздѣльный . . . . . **Potameae**.
- Цвѣтной покровъ 6 — 8-раздѣльный или листный . . . . . 131
- 131 Тычинокъ 9 . . . . . **Butomeae**.
- Тычинокъ 4, 6, 8 . . . . . 132
- 132 Плодь сухой, растрескивающейся; (цвѣтки желтые, нечисто-красные или бѣлые; въ послѣднемъ случаѣ листья, покрайней мѣрѣ при своемъ основаніи, цилиндрическіе и трубчатые) . . . . . **Liliaceae** (LXV)
- Плодь не растрескивающейся и сочный; (цвѣты бѣлые или зеленоватые; листья плоскіе). . . . . **Asparageae** (LXIV).
- 133 Нѣсколько цвѣтковъ сидятъ на одномъ мясистомъ и желтомъ початкѣ; окруженномъ при основаніи большимъ обверточнымъ листомъ (который снаружи зеленый, а внутри чисто бѣлый) . . . . . **Aroideae** (LXI).
- Цвѣты расположены иначе, или такого обверточного листа нѣтъ. . . . . 134
- 134 Одинъ изъ листочковъ обертки въ видѣ губы, остальные же 4 — 5 окружаютъ эту губу; тычинки сросшіяся со столбикомъ . . . . . **Orchideae** (LXII).
- Листочки цвѣтнаго покрова симметрическіе, безъ такой губы, или въ видѣ щетинокъ, или наконецъ ихъ вовсе нѣтъ; тычинки свободныя . . . . . 135
- 135 Цвѣтной покровъ состоитъ изъ 4, или 6, или 8 листочковъ . . . . . 136
- На мѣстѣ цвѣтнаго покрова только щетинки или его вовсе нѣтъ, или наконецъ листочки цвѣтнаго покрова въ другомъ числѣ . . . . . 140

- 136 Цвѣтной покровъ 8-раздѣльный: изъ лопастей 4  
внѣшнія и 4 внутреннія; тычинокъ 8; стол-  
биковъ 4 . . . . . **Asparageae** (LXIV).
- 137 Цвѣтной покровъ состоитъ изъ 4 или 7 листоч-  
ковъ; тычинокъ 1—4 или 6 . . . . . 137  
Плодниковъ 3 и болѣе, каждый со столбикомъ  
или рыльцемъ (иногда плодники немного вни-  
зу или во всей длинѣ сросшіся, но тогда ви-  
дно 3 или 6 частей по возвышеніямъ главна-  
го плодника) . . . . . 138  
Плодникъ 1; столбикъ съ 3 рыльцами, или съ  
1 сидячимъ рыльцемъ . . . . . 139
- 138 Тычинокъ 1—4; плодники совершенно свободные.  
**Potameae.**
- 139 Тычинокъ 7; плодники внизу или во всей длинѣ  
сросшіся между собою . . . . . **Juncagineae.**  
Столбикъ съ 1 или 2 рыльцами. . . . . **Juncaceae**
- 140 Цвѣтной покровъ состоитъ изъ 3 и болѣе че-  
шукъ или щетинокъ или листочковъ, или его  
вовсе нѣтъ, или онъ представляетъ перепон-  
чатое влагалище, сидячее въ углахъ листьевъ . 141
- 141 Цвѣтной покровъ состоитъ изъ 1—2 пленокъ . . 142  
(Цвѣтки въ углахъ листьевъ; стебель нитчатый  
членосоставной) . . . . . **Potameae**
- 142 Цвѣтки или собраны въ шарообразный колосъ,  
или въ цилиндрической, мясистый початокъ;  
(стебель не состоитъ изъ членовъ) . **Turpaseae**  
Влагалища листьевъ вдоль расколоты; трубча-  
тый стебель съ узлами; рылецъ 1—2 . . . . .  
**Gramineae** (LXVII).
- 142 Влагалища листьевъ не расколоты вдоль; сте-  
бель обыкновенный безъ узловъ, и почти ни-  
когда не трубчатый; рылецъ 2 — 3 . . . . .  
**Sypergaseae** (LXVII).

## Тайнобрачныя растенія. Cryptogamia.

- 143 { Растенія съ членосоставнымъ, трубчатымъ стеблемъ; на членахъ находятся зубчатая влагалища, иногда членосоставныя вѣтви; плодородныя органы находятся при концѣ стебля въ видѣ колосьевъ . . . . . **Equisetaceae.**
- Растенія другаго устройства . . . . . 144
- 144 { Плодородныя органы находятся на задней сторонѣ и на краяхъ листьевъ и образуютъ пучки или линіи . . . . . **Filices.**
- 144 { Плодородныя органы находятся въ углахъ листьевъ и стебля, или при основаніи листьевъ и черешковъ, или между волокнами корней, или они образуютъ колосъ съ придѣлниками . . . 145
- 145 { Плодородныя органы при основаніи листьевъ и черешковъ, или между волокнами корня; водяныя растенія . . . . . **Marsiliaceae.**
- 145 { Плодородныя органы въ углахъ листьевъ и стебля, или образуютъ колосья; растенія съ ползучимъ стеблемъ съ небольшими, тѣсно-сидячими листиками . . . . . **Lycopodiaceae**

ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДѢЛЕНІЯ РОДОВЪ И ВИДОВЪ РАСТЕНІЙ.

Растенія двусѣмяподольныя; *Dicotyledones*.

A. ложецвѣтныя, (донцепвѣтныя.) *thalamifloræ*.

Семейство I. *Ranunculaceae* Juss. Лютиковыя.

1	}	Въ каждомъ цвѣткѣ одинъ плодникъ съ однимъ столбикомъ . . . . .	2
		Въ каждомъ цвѣткѣ болѣе одного плодника. . . . .	3
2	}	Цвѣтокъ съ шпорцемъ, (синій) . . . <b>Delphinium</b>	
		Цвѣтокъ безъ шпорца, (бѣлый) . . . <b>Actaea</b>	
3	}	Плодниковъ отъ 2—5. . . . .	4
		Плодниковъ болѣе 5 . . . . .	6
4	}	Цвѣты правильныя; каждый листочикъ чашечки имѣеть видъ внутри пустаго рожка; плодниковъ 5 . . . . . <b>Aquilegia</b>	
		Цвѣты неправильныя; одинъ листочикъ или со шпорцемъ или шишакомъ вогнутый . . . . .	5
5	}	Верхній листочикъ цвѣтка со шпорцемъ; плодниковъ числомъ отъ 2—3. . . . . <b>Delphinium</b>	
		Верхній листочикъ цвѣтка вогнутъ шишакомъ; плодниковъ отъ 3—5 . . . . . <b>Aconitum</b>	

6	}	Цвѣты съ чашечкою и вѣнчикомъ . . . . . <b>Ranunculus</b>	
		Цвѣты, у которыхъ нельзя отличить чашечки отъ вѣнчика . . . . .	7
7	}	Стебель безъ листьевъ, кромѣ 3 въ кольцо стоящихъ иногда многораздѣльныхъ обверточныхъ листочковъ . . . . . <b>Anemone</b>	
		Стебель съ листьями . . . . .	8
8	}	Плодники многосѣмянные . . . . .	9
		Плодники односѣмянные . . . . .	10
9	}	Цвѣты безъ медниковъ, окрашенные листочки цвѣта золотого, не трубчатые числомъ 5. <b>Caltha.</b>	
		Цвѣты съ медниками, листочки цвѣта бѣлаго, трубчатые . . . . . <b>Helleborus.</b>	
10	}	Листочки окрашенные, столбика нѣтъ, цвѣта сѣрнаго или бѣловатаго, стебель травяной, не лозной, листья чередные . . . . . <b>Thalictrum</b>	
		Столбикъ есть, листья супротивныя, стебель лозной . . . . . <b>Clematis.</b>	

## I. Thalictrum L. Золотуха, луговая рута.

*Листочки листьевъ обратно яйцевидные, верхніе иногда линейные; корень ползучій; листья въ окружности узко-треугольные, дву или три-перистые; на нижней сторонѣ они блѣдные; главный черешокъ ихъ съ прилистниками; плодники почти шарообразные или продолговатые; лепестки бѣловатые; пыльники желтые. . Th Flavum L.*

## II. Anemone L. Вятренница.

1	}	<i>Листочки обвертки цѣльные, сидячіе, находятся непосредственно подъ цвѣткомъ и видимо образуютъ чашечку, цвѣты голубые, красноватые или бѣлые . . . . . 1) An Hepatica L.</i>	
		<i>Листочки обвертки отдаленные отъ цвѣтковъ и притомъ или пальчато-многораздѣльные или 3—5 лопастные . . . . .</i>	2



- 2 { Листочки обертки многораздѣльные въ видѣ пальцевъ, образуютъ при основаніи чехоль; листочковъ цвѣтка числомъ 6; цвѣты фіолетовые или голубоватые. . . . . 3
- 2 { Листочки обертки 3—4 раздѣльные или разрывные: листочковъ цвѣтка числомъ 5 и болѣе; цвѣты желтые и бѣлые . . . . . 4
- 3 { Цвѣтки прямые; листочки цвѣтка, начиная съ середины, отогнуты и почти вдвое длиннѣе стерженковъ; корневые листья триперисто-раздѣльные съ цѣльными, линейными лопастями; листочки цвѣтка сначала темно-фіолетовые, потомъ синеватые. *Внутренница обыкновенная* 2) **An. Pylsatilla** L.
- 3 { Цвѣтки повислые; листочки цвѣтка только свиты при концѣ и почти равной влины съ тычинками; у насъ они снаружи красноваты. *Внутренница луговая* . . . . . 3) **An. Pratensis**. L.
- 4 { Черешокъ оберточныхъ листочковъ влагалищный, короткій. Листья 3—5 раздѣльные; цвѣты бѣлые, обыкновенно одинакіе; листочковъ цвѣтка обыкновенно по 5, косматыхъ на нижней сторонѣ. *Внутренница степная* . . . . . 4) **An. Sylvestris** L.
- 4 { Черешокъ оберточныхъ листочковъ не влагалищный, только жолобковатый; столбикъ почти длиннѣе плодниковъ; цвѣтущій стебелекъ обыкновенно безъ корневыхъ листьевъ и ниже 1 фута . . . . . 5
- 5 { Цвѣты бѣлые, снаружи иногда розовые, одинокіе; листочковъ цвѣтка по 6, обыкновенно голыхъ на обѣихъ сторонахъ . . . . . 5) **An. Nemorosa** L.
- 5 { Цвѣты желтые, обыкновенно по 2 или по 3 на стебелекъ; листочковъ цвѣтка обыкновенно по 5, пушистыхъ на нижней сторонѣ. *Внутренница желтая* . . . . . **An. Ranunculoides** L.

### III. Ranunculus L. Жабникъ.

- 1 { Цвѣтки бѣлые, водяныя растенія . . . . . 2
- 1 { Цвѣты желтые; растенія не всегда водяныя . . . . . 3

	<i>Весь листья щетинообразные, многораздѣльные, округлые и болѣе или менѣе тугіе, т. е., вынутые изъ воды не перемѣняютъ своего расположенія; лепестки въ <math>1\frac{1}{2}</math> раза длиннѣ чашечки</i>		
2	<i>Листья погруженные мягкіе, волосообразные, и многораздѣльные, вынутые изъ воды сходятся въ клочекъ; верхніе, плавающие на водѣ, щитковые трираздѣльные и озубренные; лепестки въ 2—3 раза длиннѣ чашечки. Жабникъ водяной. . .</i>		
		2) <b>R. Aquatilis L.</b>	
3	<i>Листья щельныя . . . . .</i>		4
	<i>Листья раздѣльные или перистые . . . . .</i>		7
4	<i>Чашечка трилистная; вѣтчикъ 8—10 листный; стебель вѣтвистый, лежачій, при вершинѣ приподнимающійся, съ листьями; листья сердцевидные, черешковые. Чистякъ . 3) <b>R. Ficaria L.</b></i>		
	<i>Чашечка пятилистная . . . . .</i>		5
	<i>Стебель лежачій, приподнимающійся . . . . .</i>		6
5	<i>Стебель прямостоящій, при основаніи съ небольшимъ, въ кольцахъ стоящими отпрысками; плодники съ широкимъ, мечеобразнымъ кончикомъ, гладкіе, ладьеобразные; листья продолговатоланцетные, остры. Жаб. язычный 4) <b>R. Lingua L.</b></i>		
6	<i>Члены стебля прямые; стебель многоцвѣтковый. Жаб. огненный. . . . . 5) <b>R. Flammula L.</b></i>		
	<i>Члены стебля вынуты дугою; вѣтви стебля обыкновенно съ однимъ только цвѣткомъ. Жабникъ малорослый . . . . . 6) <b>R. Reptans L.</b></i>		
7	<i>Донце (мѣсто, на которомъ сидятъ плодники) продолговатое, цилиндрическое. 7) <b>R. Sceleratus L.</b></i>		
	<i>Донце шарообразное . . . . .</i>		8
8	<i>Цвѣтныя ножки не бороздчатыя . . . . .</i>		9
	<i>Цвѣтныя ножки бороздчатыя . . . . .</i>		11
9	<i>Корневые и стеблевые листья пальчато-раздѣльные; нижніе стеблевые съ длиннымъ черешкомъ, 3—5 раздѣльные . . . . . 8) <b>R. Acris L.</b></i>		
	<i>Корневые листья округлые, сердцевидные, нераздѣльные, озубренные, иногда только немного раздѣльные; плодники пушистые . . . . .</i>		10

- Корневыхъ листьевъ числомъ отъ 4—5, почковидныхъ, нераздѣльныхъ или 3—5 раздѣльныхъ, Жабникъ златовласый . . 9) **R. Auricomus L.**
- 10) Только одинъ корневой листъ; притомъ онъ озубренный, нераздѣльный или рѣдко трираздѣльный; черешокъ при основаніи не образуетъ влагалища, но онъ окруженъ влагалищными черешками. Жабникъ касубскій . . . . . 10) **R. Cassubicus L.**
- 11) Чашечка отвороченная, косматая; стебель при основаніи луковичный, косматый, безъ отпрысковъ. 11) **R. Bulbosus L.**
- 12) Чашечка неотвороченная, прилегающая къ стлечку или незначительно отстоящая; корень или нижняя часть стебля не луковичный . . . . . 12
- Стебель безъ отпрысковъ, при основаніи прямой шероховатый. Жабникъ многоцвѣтный . . . . . 12) **R. Polyanthemos L.**
- 12) Стебель при основаніи съ длинными ползучими отпрысками, притомъ онъ безволосенъ или не много только волосистъ. Жабникъ ползучій 13) **R. Repens L.**

#### IV. *Galium L.* Куроелавъ, Вадужница.

Цвѣтныя ножки бороздчатая; стебель съ тупыми гранями, сочный, голый и внутри пустой; корень съ толстыми волокнами 1) **G. Palustris L.**

#### V. *Aquilegia L.* Водосборъ.

Шпорецъ голубой, отогнутъ при вершинѣ внутрь; плоскость лепестковъ тупая; листья по 3 на одномъ черешкѣ: каждый изъ нихъ состоитъ опять изъ 3 листочковъ, озубренныхъ, внизу синевато-зеленыхъ; стеблевая лѣстья сложные; цвѣтныя ножки обыкновенно волосистыя. . . . .

1) **Aq. Vulgaris L.**

## VI. *Delphinium* L. Живокость, Шпора.

Лепестки сросшіеся между собою: стебель съ развилистыми вѣтвями; кисть многоцвѣтная; цвѣтная ножечка длиннѣе своихъ прицвѣтниковъ; плодъ голый; листья пальчато-раздѣльные; цвѣтная ножка, равно какъ и шпорецъ длиннѣе чашечки; цвѣтки голубые, но бываютъ и бѣлые .

1) **D. *Consolida* L.**

## VII. *Aconitum* L. Аконитъ, Лютикъ.

Плодниковъ отъ 3—5, многосѣмянныхъ и голыхъ шишакъ продолговато-коническій; 2 верхніе лепестка прямо-стоящіе съ спиральными шпорцами; корень веретено-вѣтвистый; листья 5 разрѣзные; лопасти трапецидальныя; чашечка опадающая; цвѣты зеленовато-желтые или голубоватые. . . . . 1) **A. *Lycostonum* L.**

## VIII. *Actaea* L. Воронецъ.

Ягода округлая или овальная; лепестки одинаковой длины съ тычинками; кисть въ окружности яйцевидная; корень толщиною въ палецъ, бурый, внутри бѣловато-желтый, съ многими волокнами; стебель совершенно круглый, гладкій и голый, выходитъ изъ пучка чешуегъ, дву или трилистный; нижніе листья большіе, треугольныя, двояко-тройныя; листочки яйцевидныя, разрѣзные или пальчато-зубчатые; цвѣтки бѣлые. .

1) **A. *Spicata* L.**

## IX. *Helleborus* L. Чемерица.

Цвѣтная стрѣлка безъ листьевъ, съ яйцеобразными чешуйками. Цвѣты бѣлые, въ числѣ 1—3. .

1) **H. *Niger* L.**

## X. Clematis. L. Ломонось.

- Стебель лозный.* Листья перистые. Цвѣтныя лепестки бѣлые, съ обѣихъ сторонъ шелковистые. **C. Vitalba L.**
- Стебель вертикальностоящій.* Листья перистые. Цвѣтныя лепестки внутри голые, бѣлые. **C. erecta L.**

## Семейство II Berberideae Vent. Барбарисовыя **Berberis L. Барбарисъ.**

Чашечка 6 листная, подплодниковая; листочки ея расположены въ двухъ рядахъ, изъ которыхъ вѣшніе меньше; вѣнчикъ 6 листный; тычинки прикрѣплены къ основанію лепестковъ; гнѣздышки пыльниковъ раздѣлены другъ отъ друга: вѣшняя половина каждого гнѣздышка отдѣляется въ послѣдствіи, начиная съ основанія столбика нѣтъ; рыльце весьма большое, щитковое; ягода двусѣмянная.

Листья въ пучкахъ, обратно-яйцевидныя и пильчатые, при основаніи съ однимъ главнымъ и двумя побочными шипами; зубцы шипообразныя цвѣтныя кисти висячія многоцвѣтковыя, выходящія изъ середины пучковъ листьевъ; лепестки цѣльные, желтыя неприятнаго запаха . . **B. Vulgaris L.**

## Семейство III Nymphaeaceae D. С. Кувшинковыя:

- { Лепестки въ многихъ рядахъ, бѣлые. **Nymphaea I.**  
{ Лепестки въ 1—2 рядахъ, желтыя . **Nuphar II.**

### I. **Nymphaea L. Нимфея.**

Листья почти совершенно округлыя, глубоко-сердцевидныя и цѣльныя; лопасти при основаніи неровно-яйцевидныя; рыльце съ 5—20 лучами .  
1) **N. Alba L.**

## II. Nuphar Smith: Кувшика, Купавка.

Рыльце съ 10—20 лучами, не доходящихъ до края; листья овалныя на  $\frac{1}{3}$  сердцевидныя; ушки при основаніи подходящія другъ къ другу; пыльники продолговатыя, линейныя. 1) **N. Luteum L.**

## Семейство IV. Papaveraceae D, С. Маковыя.

Коробочка продолговатая, похожая на стручекъ, одногнѣздная съ двумя створками. Растеніе съ желтымъ сокомъ . . . . **Chelidonium II.**

Коробочка шарообразная или булавообразная; внутри съ 4—20 перегородками, не достигающими центра. Растенія съ бѣлымъ сокомъ. **Papaver I.**

## I. Papaver L. Макъ.

*Стебель и листья покрытыя волосками.* Коробочка обратно яйцевидная, внизу округленная, Рыльце съ 7—14 лучами . . . 1) **P. Rhoeas L.**

Листья неровно-зубчатые, объемные, сердцевидныя; *стебель и листья синевато зеленые и безъ волосковъ*; коробочка почти шарообразная, голая; стерженки расширяются къ верху; цвѣтокъ бѣлый лиловый или фиолетовый . . . . . 2) **P. Somniferum L.**

## II. Chelidonium L Чистотѣль.

Листья перисто-разрѣзные: лопасти кругловатыя выемчато-зубчатая и снисходящія по черешку; лепестки цѣльныя: стебель круглый, узловатый волосистый; стерженки сверху расширены . . .

1) **Ch. Majus L.**

Семейство V. *Fumariaceae* D. C. Дымянковыя.

I. *Fumaria* L. Дымянка.

Чашечка двулистная лепестковъ 4: верхній при основаніи со шпорцемъ; тычинки сросшіяся въ два пучка; односѣмянный стручекъ не растрескивается; листья поперемянные, многораздѣльные; красные, а иногда бѣлые цвѣтки съ прицвѣтниками, собраны въ колосья.

Листочки чашечки трижды короче вѣнчика и шире цвѣткой ножки; плодникъ усѣченный, выемчатый и поперегъ шире, чѣмъ вдоль; лопасти перистыхъ листьевъ ланцетныя; колосъ съ отдаленными другъ отъ друга цвѣтками: послѣдніе красные, иногда бѣлые . 1) **F. Officialis** L.

Семейство VI. *Cruciferae* Juss. Крестоцвѣтныя.

1	}	Длина стручка значительно превышаетъ ширину.	2
		Длина стручка не болѣе 3-хъ разъ превышаетъ ширину или не превышаетъ во всё . . . . .	7
2	}	Цвѣты чисто бѣлые или красновато-бѣлые . . . . .	3
		Цвѣты желтые . . . . .	4
3	}	Створки стручка съ продольными жилками (листья расположены розеткою у корня) . . . . .	
		<b>Sisymbrium</b>	
4	}	Стручекъ безъ продольныхъ жилокъ (листья перистые) . . . . .	<b>Cardamine</b>
		Стручекъ съ поперечными гнѣздышками . . . . .	<b>Raphanus</b>
5	}	Стручекъ съ продольными гнѣздышками . . . . .	5
		Стручекъ съ клюковиднымъ продолженіемъ . . . . .	6
6	}	Стручекъ безъ такого продолженія: на немъ сидитъ непосредственно столбикъ . . . . .	7
		(Каждая створка съ одною продольною жилкою; листочки чашечки прижаты къ вѣничку (стеблевые листья съ глубоко-сердцевиднымъ основаніемъ объемные) . . . . .	<b>Brassica</b> .

- 6 } Каждая створка съ 3 — 5 толстыми, продольными  
жилками; листочки чашечки отстоятъ значи-  
тельно отъ вѣнчика . . . . . **Sinapis**
- 7 } Стручекъ плоско-сжатый . . . . . **Draba**  
Стручекъ не плоскій . . . . .
- 8 } Стручекъ съ поперечными гнѣздышками; каж-  
дое гнѣздышко съ 1 сѣмянемъ . . . . . **Bunias**  
Стручекъ съ продольными гнѣздышками каждое  
гнѣздышко съ многими сѣмянами . . . . .  
**Nasturtium**
- 9 } Гнѣздышки 2—многосѣмянныя; (цвѣтки съ вѣн-  
чикомъ) . . . . . **Thlaspi**  
Гнѣздышки съ 1 сѣмянемъ; (цвѣтки у вида вашей  
флоры безъ лепестковъ) . . . . . **Lepidium**

## I. *Nasturtium* Brown. Настурція, Брункрессъ, Жеруха, Рѣжуха.

Лепестки вдвое длиннѣе чашечки; стручекъ линей-  
ный; всѣ листья глубоко-перисторазрѣзные и  
перистые: лопасти или листочки продолговатые  
или ланцетные, и зубчатые. **N. Sylvestre R. Br.**

## II. *Cardamine* L. Сердечникъ.

*Стебель круглый*, при вершинѣ тонко полосатый;  
пыльники желтые, по крайней мѣрѣ передъ  
раскрытіемъ; листочки корневыхъ листьевъ  
округлые или яйцевидные, выемчато зубчатые;  
листочки стеблевыхъ листьевъ линейные, цѣль-  
ные; стерженки въ половину короче вѣнчика;  
цвѣтки розовые, лиловые или бѣлые.

### 1) *C. Pratensis* L.

*Стебель граненый*; пыльники передъ раскрытіемъ  
красные или фіолетовые; листочки нижнихъ  
листьевъ округлы или яйцевидны: стеблевыхъ  
продолговаты, но всѣ неровно-зубчаты: окон-  
чательный листочикъ больше боковыхъ; стер-  
женки почти одной длины съ вѣнчикомъ; цвѣт-  
ки бѣлые. *Сердечникъ горькій* 2) *C. Amara* L.



### III. *Sisymbrium* L. Гулявникъ.

*Листья триперистые:* цвѣты желтые лепестки короче чашечки или почти одной длины съ нею; стручки длинные, узкіе, отстоящіе отъ стебля: листочки перисто-раздѣльные: лопасти линейныя; цвѣтная ножка вдвое длиннѣе чашечки.

1) **S. Sophia** L.

*Листья перисто-раздѣльные или перистые; стручки и ихъ ножки прижатые къ стеблю; лопасти листьевъ продолговатыя и зубчатая: окончателъная лопасть больше боковыхъ; листочки чашечки прямостоящіе, цвѣты желтые* 2) **S. Officinale**.

**Scop.**

### IV. *Brassica* L. Капуста.

Верхніе листья яйцевидные съ глубоко сердцевиднымъ основаніемъ, объемные; открытые цвѣтки выше тѣсно сидячихъ цвѣтныхъ почекъ; чашечка въ послѣдствіи горизонтально распростерта; короткія изъ тычинокъ восходящія. 1) **Br. Rapa** L.

### V. *Sinapis* L. Горчица.

*Все растеніе волосистое; стручекъ отстоящій отъ стебля узловатый и голый; клювовидный кончикъ его одной длины съ самимъ стручкомъ; листья яйцевидные, неправильно-зубчатые съ ушками при основаніи или лировидные . . .*

1) **S. Arvensis** L.

### VI. *Thlaspi* L. Ярутка.

Стеблевые листья продолговатые, сидячіе съ стрѣловиднымъ основаніемъ; гнѣздышки по большей

части съ 6-ю сѣмянами; сѣмяна морщиноватая; стебель при вершинѣ вѣтвистой; стручекъ округлый съ глубокою выемкою: обѣ его лопасти язычковые и тупыя, приближенныя одна къ другой.

1) **Th. Arvense L.**

## VII. *Epidium L.* Крессъ.

Стручекъ отстоящій, овальный: его ножки въ  $1\frac{1}{2}$  до 2 разъ длиннѣ самаго стручка: онъ же при концѣ съ узкимъ, перепончатымъ и выемчатымъ краемъ; листья черешковые, перистые и двуперистые: верхніе сидячіе, линейные и нераздѣльные; тычинки — 2; вѣнчика нѣтъ; цвѣтущая кисть очень длинна . . . . 1) **L. Ruderale L.**

## VIII. *Raphanus L.* Рѣдька.

Стеблевые листья лировидно-раздѣльны; сѣмяна гладки (или только полосаты при сильномъ увеличеніи); корень грушеобразный или толсто-веретенный; цвѣты желтые съ фіолетовыми жилками или струйками, или желтые: въ послѣднемъ случаѣ чашечка прямостоящая . . . .

1) **R. Raphanistrum L.**

## Семейство VII. *Violariae D. C.* Фіалковыя.

### *Viola L.* Фіалка.

Чашечка 5-листная: листочки при основаніи протянуты въ привѣску; лепестки неровные, нижніи сзади со шпорцемъ; стерженки расширенныя, сходятся и образуютъ цилиндрическую форму; коробочка одногнѣздная, тристворчатая. Травянистыя растенія не имѣющія стебля или

съ граненымъ стеблемъ и попеременными, черешковыми простыми листьями; черешекъ желобоватый; цвѣтки одинокіе въ углахъ листьевъ, на граненыхъ ножкахъ: ножка большею частію съ двумя прицвѣтниками.

- 1) *Прилистники* лировидно-разрѣзные: окончательная лопасть озубрена; рыльце кубкообразное, по обѣимъ бокамъ съ кучкою волосъ, ниже ихъ съ язычкомъ; 4 верхніе лепестка приподнимающіеся; листья озубренные: нижніе сердцевидные и яйцевидные. Цвѣты или бѣлые, или синіе съ желтыми пятнами, или желтые, или бѣлые съ желтыми пятнами. . . . . 1) **V. Tricolor L.**
- Отпрыски* длинныя: листья широко-яйцевидные, лѣтнихъ отпрысковъ сердцевидные и почкообразныя; цвѣты душистые; растеніе пушистое; прилистники яйцевидные, ланцетные, острые, бахромчатые: бахромы значительно короче ихъ поперечнаго діаметра; цвѣты фіолетовые; непарный лепестокъ съ темными жилками.

2) **V. Odorata L.**

- 2) *Корень, косое корневище; стебель прямостоящій съ волосами, расположенными въ одномъ ряду; листья широко-сердцевидныя съ короткимъ заостреннымъ концемъ или почти почковидныя и озубренныя; въ началѣ весны стебля нѣтъ: цвѣтки свѣтло-синіе. Фіалка разноцвѣтная . . .*

3) **V. Mirabilis L.**

- Корень ползучій; стебель восходящій; листья продолговато-яйцевидныя, съ сердцевиднымъ основаниемъ, заостренныя, но при концѣ тупыя; черешекъ не крылатый; цвѣты синіе 4) **V. Canina L.***

Семейство VIII. Droseraceae D. C. Росляковья.

- { Четыре рыльца безъ столбиковъ, съ пятью сердцевидными, бархатными прикрасами. **Parnassia** I.  
{ Столбикомъ 3 — 5, каждый до основанія двурядный; прикрасовъ нѣтъ . . . . **Drosera** II.

## I. Parnassia L. Золотничка.

Корневые листья сердцевидные, голые, пальчато-жилстые и черешковые; стебель полосатый, голый, въ срединѣ съ объемнымъ листочкомъ; цвѣтокъ одиночный на вершинѣ стебля; прикрасы съ 9—13 бахрамами . . . 1) **P. Palustris L.**

## II. Drosera L. Росейка; солнечная роса.

*Листья почти округлы . . . 1) D. Rotundifolia L.*  
*Листья линейные клиновидные или обратно яйцевидные . . . . . 2) D. Longifolia L.*

## Семейство IX. Polygaleæ Juss. Пастушья.

### Polygala L. Пастушка.

Чашечка 5-листная; два внутренне большіе листа крылообразны и окрашены; вѣнчикъ 3—5-листный, спаянный въ видѣ трубки съ тычинками; нижній лепестокъ сложенъ въ складку; коробочка обратно сердцевидная и двугнѣздная; сѣмяна при основаніи съ 4-зубчатою кожурою; стерженки сросленные по 4, образуютъ съ 4 сросненными тычинками противоположной стороны трубку, окружающую плодникъ. Низкія полукустарники съ дѣльными, разбросанными по стеблю листьями и цвѣтами, собранными въ окончательныя кисти.

*Прицвѣтники короче почекъ; ножки плодника въ цвѣтушемъ состояніи растенія одной длины съ плодникомъ; корневые листья эллиптическіе, не образующіе розетку. Цвѣты синіе, бѣлые, иногда красныя . . . . . 1) P. Vulgaris L.*

- 3 } *Плодникъ въ цвѣтущемъ состояніи растенія почти безъ ножки; корневыя листья образуютъ розетку. Цвѣты синіе и бѣлые . . . 2) P. Amara L.*

### Сем. X. Sileneae D. C. Силеньковыя.

- |   |   |                                                                                                     |   |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | } | Столбикъ 2 . . . . .                                                                                | 2 |
|   |   | Столбиковъ 3 . . . . .                                                                              | 4 |
| 2 | } | Чашечка при основаніи безъ чешуекъ . . . . .                                                        | 3 |
|   |   | Чашечки при основаніи съ чешуйками . <b>Dianthus</b>                                                |   |
| 3 | } | Чашечка колокольчатая, на $\frac{1}{4}$ и болѣе своей длины 5-разрѣзная . . . . . <b>Gypsophila</b> |   |
|   |   | Чашечка одной ширины при вершинѣ и основаніи (цилиндрическая) . . . . . <b>Saponaria</b>            |   |

### I. Gypsophila L. Алебастреникъ.

*Стебель съ самаго основанія 2—3 раздѣльный, прямостоящій, шероховатый при основаніи; вѣтви раскинутыя и восходящія; чашечка 5-зубчатая, кубковидная; листья линейные, по обоимъ концамъ заостренные; цвѣты бѣлые или розовые*  
 1) **G. Muralis L.**

### II. Dianthus L. Гвоздика.

*Лепестки до середины пальчато-разсѣченные; нераздѣльная часть лепестной плоскости обратно-йцевидная; чешуйки чашечки почти округлыя съ короткимъ, треугольнымъ остроконечіемъ, въ 4 раза короче чашечной трубочки; листья линейные, желобковатыя и длинно-заостренные, почти колючіе, по краямъ рѣзкіе; стебель при основаніи дерновый; зубцы чашечки ланцетные, тонко-рѣснитые; лепестки блѣдно-розовые, при основаніи съ пурпуровыми поперечными полосками . . . 1) **D. Plumarius L.***

### III. Saponaria L. Мыльнянка.

Стебель восходящій съ густыми листьями, голый; листья супротивные, сидячіе, яйцевидно-ланцетные, трижильные, острые; корень ползучій; цвѣты блѣдно-розовые или бѣлые . . . . .

1) **S. Officinalis L.**

### Сем. XI. Linaceae D. С. Ленковыя.

#### Linum L. Лѣнъ.

Чашечка 5-листная; лепестковъ 5; тычинокъ; коробочка 10-гнѣздная; рылецъ или столбиковъ 5. Травянистыя растенія или кустарники, съ прямостоящимъ стеблемъ; листья простые и сидячіе; цвѣтки окончательные и боковые.

*Листья супротивные*: нижніе яйцевидные, верхніе эллиптическо-ланцетные, цвѣтки бѣлые.

1) **L. Catharticum L.**

*Листья поперемяные*, ланцетные, голые, трижильные, развѣ только что нижніе супротивные; цвѣтки синіе, лиловые, бѣлые съ желтымъ дномъ. . . . .

2) **L. Usitatissimum L.**

### Сем. XII. Malvaceae Brown. Мальвовыя.

{ Наружная чашечка изъ 3 отдѣльныхъ листочковъ.

**Malva.**

{ Наружная чашечка однолистная, 6—9разщепленная . . . . .

**Althaea.**

#### I. Althaea L. Проскурнякъ.

Чашечка однолистная, 6—9разщепленная. Листья цѣльные, зазубренные, мягкіе, шелковистые.

Цвѣтоносы въ углахъ листьевъ, многоцвѣтные, болѣе короткія, чѣмъ листья . . . . . 1) **A. officinalis L.**

## II. *Malva L.* Мальва; Просвиричка.

*Лепестки* больше 2—3 раз длиннее чашечки: цвѣтки большіе, ярко-красные; стебель прямостоящій и восходящій . . . . . 1) **M. Sylvestris L.**

## Сем. XIII. *Tiliaceae Juss.* Липовыя.

### *Tilia L.* Липа.

Чашечка 5-лиственная, опадающая; лепестковъ 5; плодникъ 5-гнѣздный; гнѣздышки 2-сѣмянные; столбикъ 1; рылецъ 5; коробочка недоростаніемъ одногнѣздная, 1 — 2 сѣмянная. Деревья съ неровно-сердцевидными, круглыми и длиннозаостренными листьями; главная цвѣтная ножка съ сѣтчато-жиллистымъ, пергаменто-образнымъ прицвѣтникомъ.

Листья по обѣимъ сторонамъ голы, въ углахъ жилы ржавчато-бородасты; лопасти рыльца въ послѣдствіи горизонтально распростертыя; зрѣлая коробочка неясно 4—5 гранная; щитокъ 5—13цвѣтковый . . . . . 1) **T. Parvifolia Ehrh.**

## Сем. XIV. *Purragiineae D. C.* Звѣрбойныя.

### *Purragium L.* Звѣрбой.

Чашечка 4—5-лиственная или-раздѣльная, вѣнчикъ 5 листный; столбиковъ 3; коробочка тригнѣздная; гнѣздышки многосѣмянные; сѣмя продолговатое; тычинки сближенныя въ 2, 3 пучка; лепестки желтые. Травянистыя растенія или небольшіе кустарники съ супротивными листьями; цвѣтки окончательные.

{ Стебель обоюдоострый или двугранный . . . . . 1) **H. Perforatum L.**  
{ Стебель 4-гранный . . . . . 2) **H. Quadrangulare L.**

Сем. XV. Acerinae D. С. Кленовыя.

Acer L. Клёнъ.

Мужескіе цвѣтки смѣшаны съ цвѣтками обоюд-  
наго пола; чашечка 5-раздѣльная; лепестковъ 5;  
тычинокъ обыкновенно 8; въ мужескомъ цвѣткѣ  
онѣ длиннѣе. Листья на длинныхъ черешкахъ,  
пальчато-жильные; цвѣтки расположены въ  
кистяхъ.

Листья 5—7-лопастные; лопасти длинно-заостре-  
ны и выѣмчато-зубчаты съ 3—5 зубцами; эти  
длинны; кисти прямостоящія; крылья горизон-  
тально распростертыя; плодникъ голый; тычин-  
ки мужескаго цвѣтка одной длины съ чашеч-  
кою; молодые листья съ желѣзками; цвѣтки  
желтовато-зеленые . . . . 1) *A. Platanoides* L.

Сем. XVI. Geraniaceae D. С. Журавленниковыя.

*Geranium* L. Алтѣянкъ.

Чашечка и вѣнчикъ пятилистные; тычинокъ 10;  
стерженки при основаніи немного между собою  
сросшіяся, попеременно больше и снабжены при  
основаніи желѣзками; острей плодниковъ съ вну-  
тренней стороны безволосыя; плодники раскры-  
вающіеся съ вѣшной стороны, начиная съ осно-  
ванія, притомъ створки скручиваются. Стебель  
членосоставной, наравнѣ съ вѣтвями двураздѣль-  
ный; листья супротивные, черешковые и округ-  
лые; цвѣтная ножка промежуточная или супро-  
отивная листу, у видовъ нашей флоры съ двумя  
цвѣтками.

*Кистья тройные*, т. е. листья до основанія трираз-  
дѣльны, (средняя лопасть на черешкѣ), или по  
*пяти* на одномъ черешкѣ. Лепестки съ длиннымъ



ногтемъ и длиннѣе чашечки. Стебель прямой; цвѣтки розовые съ тремя бѣлыми жилками; зло-  
вонное растение . . . 1) **G. Robertianum L.**

Семейство XVII. Oxalideae D. С. Кисличныя.

**Oxalis L. Кислица.**

Чашечка 5-листная; лепестковъ 5, сросшихся на  
ногтяхъ; столбиковъ 5; коробочка продолгова-  
тая, 5-гранная, 10-створчатая. Листья тройные,  
обратно-сердцевидные.

Растеніе безъ стебля съ чешуйчатымъ ползучимъ  
корневищемъ; стебелекъ одноцвѣтковый, длин-  
нѣе листьевъ и съ двумя прицвѣтниками въ се-  
рединѣ; лепестки бѣлые, немного только выем-  
чатые, съ багряными жилками и желтымъ пят-  
номъ при основаніи: они же почти въ четверо  
длиннѣе чашечки . . . 1) **O. Acetosella L.**

**B. Calyciflorae; чашецвѣтныя.**

Семейство XVIII. Celastrineae R. Brown. Краснопузырниковыя .

**Evonymus L. Бересклѣдъ, Жигалокъ.**

Чашечка плоская, 4—5 раздѣзная, при основаніи  
покрыта щитообразнымъ кружкомъ; лепестковъ  
4—5, прикрѣпленныхъ къ краю кружка; стол-  
бикъ 1; рыльце 3—5-лопастное; коробочка 3—5-  
гнѣздная и 3—5-гранная, съ перегородкою въ  
серединѣ; сѣмянъ по одному въ каждомъ гнѣз-  
дышкѣ, окружены сочною кожурою, или со всѣмъ  
или только на половину ею покрытыя. Кустар-  
ники съ супротивными листьями и вѣтвями.

Лепестки продолговатые, большею частію по 4;  
вѣтви 4-гранныя и гладкія; тычинокъ 4; листья

ланцетные, зубчатые и гладкіе; коробочка 4-гнѣздная, 4-гранная: грани тупые; кожура покрываетъ всю поверхность сѣмями; цвѣтки свѣтло-розовые; коробочка розовая, кожура желтая, сѣмя бѣлое . . . 1) **E. Europaeus L.**

## Семейство XIX, Rhamnaceae R. Brown. Крушиновыя.

### Rhamnus L. Крушина.

Чашничка 4—5-раздѣльная; лопасти отпадающія послѣ оплодотворенія; трубочка колокольчатая или кубаровидная; отгибокъ распростертый или отогнутый; вѣнчикъ 4 — 5-лиственный; небольшіе лепестки прикрѣплены на краю между лопастями чашечной трубочки; тычинокъ 4—5, прикрѣпленныхъ передъ лепестками и окруженныхъ ими; рылець отъ 2—4; плодь сочная или сухая костянка съ 2—4 сѣмянами: косточки хрящеватая, открывающіяся вдоль длины; сѣмя съ глубокою бороздкою. Цвѣтки зеленѣватые, обоюднаго пола и двудомные, или смѣшанные; расположены въ промежуточныхъ пучкахъ; деревья или кустарники съ супротивными листьями или поперебѣнными и черешковыми.

*Вѣтви супротивныя, тернистыя; лепестковъ 4; тычинокъ 4; цвѣтки двудомные и смѣшанные.*  
1) **R. Catharticus L.**  
*Вѣтви поперебѣнныя, безъ иголъ: лепестковъ 5; тычинокъ 5; цвѣтки обоюднаго пола.*  
2) **R. Frangula L.**

## Семейство XX. Papilionaceae L. Мотыльковыя.

1) *Листья парно-перистыя или тройныя . . .*  
*Листья не парно-перистыя или простыя . . .*

- 2) Листья тройные, два листочка боковыхъ, а третій стоячій на концѣ черешка. Цвѣты въ однобокихъ колосьяхъ; столбикъ нагой. Стручокъ продолговатый или почти шаровидный, немного длиннѣе чашечки, 1—2 сѣмянный. **Melilotus.**
- Листья состоящія изъ 6—7 паръ листочковъ съ однимъ не парнымъ, на концѣ черешка стоящимъ листкомъ. Цвѣты въ угловыхъ колосьяхъ, красноватаго цвѣта . . . . . **Glycirrhiza.**
- 3) Листья мало-парно перистыя, на концѣ черешка листочка нѣтъ, но усикъ или щетинка. Цвѣты въ однобокихъ колосьяхъ кистями или головками, столбикъ, на нижней сторонѣ при концѣ пушистый. Зубцы чашечки расширяются въ видѣ листиковъ. Стручокъ одногнѣздный многосѣмянный **Pisum.**
- Листья не парно-перистыя; вѣтви съ иглами. Цвѣты кистями, бѣлые; чашечка колокольчатая, 4-лопастная. Стручекъ удлиненный, сплюснутый, многосѣмянный . . . . . **Robinia.**
- 4) Листья всѣ или частію простыя, вѣтви безъ иголъ. Цвѣтки желтыя на концѣ вѣтвей; чашечка 5-ти зубчатая (2 зубца въ верху и 3 внизу). Стручекъ продолговатый, сплюснутый, одногнѣздный, одно или многосѣмянный . . . **Genista.**

## I. *Glycirrhiza* L. Солодка.

- { Стручекъ жестскій колючій . . . 1) **G. echinata** L.  
{ Стручекъ гладкій . . . . . 2) **G. glabra** L.

## II. *Genista* L. Дрокъ,

Чашечка пятизубчатая, 2 зубца верхнихъ и 3 нижнихъ. Крылышки лодочки, отъ паруса отвороченныя. Цвѣтныя ножки короче цвѣтовъ; стебель угловатый, стручекъ голый. . . **G. tinctoria** L.

### III. Robinia L. Желтая акация.

Чашечка 4-хъ лопастная; столбикъ съ верхней стороны волосистый. Кисти простые. Стручегъ гладкій . . . . . 1) **R. Pseudo-Acacia L.**

### IV. Melilotus Tournef. Донникъ. Буркунъ.

*Цветки желтые; крылышки и спинная грань лодочки одной длины съ парусомъ; стручки коротко заостренные и пушистые; цвѣтная ножка на половину короче чашечки* 1) **M. Officinales Willd.**

### V. Pisum Kit. Горохъ.

Черешки листьевъ круглые. Прилистники обратно округленные . . . . . 1) **P. Sativum L.**

## Сем. XXI. Amygdaleae Juss. Миндальныя.

### Prunus L. Слива.

}	<i>Цветочки одинокіе или по 2 вмѣстѣ, или если больше цвѣтковъ, то ножки ихъ все выходятъ изъ одной точки . . . . .</i>	2
	1) <i>Цветки въ кистяхъ расположенные; кисти висячіе; плоды безъ шерсти и безъ инея; цвѣтки пахучіе, на длинныхъ ножкахъ; зрѣлый плодъ черенъ, зеленоватъ или красноватъ, имѣетъ вяжущій вкусъ . . . . .</i>	1) <b>P. Padus L.</b>

- Цвѣтки обыкновенно по одному (т. е. изъ каждой почки). Листья пушисты; пушистыя вѣтви оганчиваются шипомъ; плоды шарообразные; цвѣтныя ножки голыя. Слива тернистая . 2) **Spinosa L.**
- 2 Цвѣтки обыкновенно по 2 или болѣе (изъ одной почки): въ послѣднемъ случаѣ они расположены въ видѣ зонтика; листья голыя, гладкіе, кожистые, яйцевидные и двупильчатые. 3) **P. Cerasus L.**

Сем. XXII. Rosaceae Juss. Розовидныя.

- 1 { Чашечка 5-разрѣзная безъ прицвѣтниковъ . . . . . 2  
 Чашечка 4—5-разрѣзная съ столбикми же прицвѣтниками при ея основаніи, или чашечка 8-или 10-разрѣзная . . . . . 5
- 2 { Вокругъ трубки чашечки стоятъ мягкіе шипы; столбиковъ 2 . . . . . **Agrimonia.**  
 Чашечки безъ шиповъ; столбиковъ 4 и болѣе . . . . . 3
- 3 { Донце (часть растенія на которой стоятъ плодники), возвышенное въ родѣ конуса: на немъ многіе односѣмянныя плодники, покрытыя сочною оболочкою . . . . . **Rubus**  
 Донце не возвышенное, но углубленное . . . . . 4
- 4 { Кустарники съ шипами; донце углублено въ видѣ кувшина: на внутренней сторонѣ этого кувшина прикрѣплено множество небольшихъ орѣшковъ . . . . . **Rosa**  
 (Полукустарники) безъ шиповъ; донце только съ небольшимъ углубленіемъ: въ немъ прикрѣплены 1—15 коробочекъ . . . . . **Spiraea**
- 5 { Каждый изъ плодниковъ въ цвѣткѣ съ длиннымъ остреемъ; столбикъ далеко восходящій изъ среды цвѣтка . . . . . **Geum**  
 Плодники безъ такихъ остреевъ . . . . .

- Цвѣтки видовъ нашей флоры, желтые; донце сухое. **Potentilla**
- 6 { Цвѣтки красные или бѣлые; донце ягодовидное, мясистое или сочное . . . . . 7
- 7 { (Чашечка внутри зеленая; цвѣтки бѣлые); донце сочное . . . . . **Fragaria**
- { (Чашечка внутри красноватая; цвѣтки красновато-бурые); донце мясистое . . . . **Comarum**

### I. Spiraea L. Тальвога.

- { Боковые листочки общаго черешка яйцевидны и нераздѣльны . . . . . 1) **Sp. Ulmaria L.**
- { Боковые листочки общаго черешка, перисто-разрѣзные, стоящіе на концѣ черешка, трилопастные: цвѣтки бѣлые, иногда красноватые . . . . . 2) **Sp. Filipendula L.**

### II. Geum L. Гравилать. Бадашъ. Гвоздичникъ.

- { Лепестки обратно-сердцевидны; чашечка пурпуро-бурая; цвѣтки желтые съ красными жилками. . . . . 1) **G. Rivale L.**
- { Лепестки не обратно-сердцевидные; чашечка зеленая; цвѣтки желтые. . . . . 2) **G. Urbanum L.**

### III. Rubus L. Малина.

- 1 { Листья простые; пятилопастные, сердцевидные и почковидные; стебель одноцвѣтковый, прямой и травянистый; цвѣтки двудомные, бѣлые; плоды красные, потомъ желтые . . . . . 1) **R. Chamaemorus L.**
- { Листья тройные или перистые; цвѣтки однодомные; стебель одно или многоцвѣтковый . . . . . 2

- 2 { *Стебель одноцвѣтковый, травянистый, простой, низкій и безъ шиповъ; цвѣты и плоды малиноваго цвѣта; листья тройные. Книжница, хохлянка поляника . . . . . 2) R. Arcticus L.*
- 3 { *Стебель многоцвѣтковый, вѣтвистый или простой; цвѣтки бѣлые или розовые . . . . . 3*
- 3 { *Стебель, носящій цвѣтки или плоды, прямой, не лежащій . . . . . 4*
- 3 { *Стебель, носящій плоды или цвѣтки, лежащій или ползучій . . . . . 5*
- 4 { *Стебель деревянистый и вѣтвистый; цвѣтки расположены въ пучкахъ; цвѣтки бѣлые; плоды красные, неплодоносныхъ стеблей нѣтъ; листья жесткіе отъ прямыхъ щетинъ или шиповъ 3) R. 3) R. Idaeus L.*
- 4 { *Стебель травянистый, простой; цвѣтки въ небольшихъ, верхушечныхъ, прямыхъ, 3—6 цвѣтныхъ зонтикахъ; неплодоносные стебли лежащіе, въ видѣ отпрысковъ; цвѣтки бѣлые; плодъ красный, состоящій только изъ 2—4 зернышекъ. Каменика, костеника . . . 4) R. Saxatilis L.*
- 5 { *Плоды блестящіе черные; чашечка плода часто отворочена и склоненная; неплодородные стебли 5-гранные, молодые же стебли безъ синеватой пыли; цвѣтки бѣлые и красные. . . 5) R. Fruticosus L.*
- 5 { *Плоды опыленные, синевато-черные; чашечка прилегаеть къ плоду: она съ желѣзконосными волосками; неплодоносные стебли цилиндрическіе; молодые стебли съ синеватою пылью. Куманика. 6) R. Caesius L.*

### IV. Fragaria L. Земляника.

*Волоски цвѣтныхъ ножекъ прижатые; чашечки плода отстоящія или отвороченныя. F. Vesca L.*

V. *Potentilla*. L. Могучникъ; Лапчатка.

- |   |   |                                                                                                                                                                                                                     |    |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | } | Чашечка 4-разрѣзная съ 4 прицвѣтниками; вѣнчикъ 4-листный . . . . . 1) <b>P. Tormentilla</b> Sibthorp.                                                                                                              |    |
|   |   | Чашечка 5 разрѣзная съ 5 прицвѣтниками; лепестковъ 5. . . . . 2.                                                                                                                                                    | 2. |
| 2 | } | Листья, по крайней мѣрѣ корневые или средніе стеблевые, перистые, т. е. по обоимъ бокамъ черешка по 2 или болѣе листочковъ . . . . . 3                                                                              | 3  |
|   |   | Черешокъ дѣлится въ одной точкѣ вдругъ въ 3—7 листочковъ . . . . . 5                                                                                                                                                | 5  |
| 3 | } | Вся листья перистые . . . . . 4                                                                                                                                                                                     | 4  |
|   |   | Только корневые и нижніе стеблевые листья перистые: Могучникъ норвежскій 2) <b>P. Norvegica</b> L.                                                                                                                  |    |
| 4 | } | Между отдѣльными боковыми листочками нѣтъ меньшихъ листочковъ. Могучникъ низкій. 3) <b>P. Supina</b> .                                                                                                              |    |
|   |   | Между каждымъ двумя боковыми листочками находятся листочки нѣсколько разъ меньше. 4) <b>P. Anserina</b> L.                                                                                                          |    |
| 5 | } | Стебель ползучій въ видѣ отпрысковъ. Лапчатка ползучая . . . . . 5) <b>P. Reptans</b> L.                                                                                                                            |    |
|   |   | Стебель прямой, или если при основаніи лежацій, то по крайней мѣрѣ цвѣтушіе стебли восходящіе. Край листочковъ свивающійся внизъ: листочки на нижней сторонѣ бѣловато-включенные . . . . . 6) <b>P. Argentea</b> L. |    |

VI. *Agrimonia* L. Рѣвникъ.

Внѣшніе шипы отстоящіе; листочки по обоимъ краямъ съ 6—8 зубцами, на нижней сторонѣ мягко-шерстистые, при основаніи округлые, числомъ отъ 7—9 по обѣимъ сторонамъ черешка; чашечка зрѣлаго плода глубоко-бороздчатая; бороздки доходятъ почти до основанія чашечки.

1) **Eupatorium** L.



## VII. *Rosa* L. Шиповникъ, Роза.

*Шипы серповидные*: тѣ которые стоятъ на вѣтвяхъ обыкновенно по 2, а на стебелькахъ они разсѣянные; листочковъ листьевъ числомъ по 5—7; лопасти чашечки отворочены и почти равной длины съ вѣнчикомъ онѣ отпадаютъ отъ зрѣлаго плода; цвѣтныя ножки въ зрѣломъ состояніи прямыя; плоды эллиптическіе или почти шарообразныя, хрящеватыя; зернышки (орѣшки) плода на ножкахъ: послѣднія въ послѣдствіи мясистыя, красныя равно какъ и плоды 1) **R.**

**G. anina.**

## Семейство XXIII. *Romaseae* Lindl. Яблочныя.

### *Pyrus* L. Яблоня.

Чашечка 5-разрѣзная или 5-раздѣльная, не отпадающая и отвороченная; лепестковъ 5; столбиковъ столько же сколько гнѣздышекъ плодика; яблоко 2—5гнѣздное. Цвѣтки расположенныя въ верхушечныхъ пучкахъ, бѣлыя, иногда красноватыя; дерево или кустарникъ.

Столбики при основаніи сросшены; листья на нижней сторонѣ обыкновенно включенныя, на верхней морщиноватыя, коротко заостренныя, пильчатые; яблоко съ углубленіемъ при своей ножкѣ.

1) **P. Malus** L.

## Семейство XXIV. *Lythariceae* Juss. Дербениковыя.

### *Lythrum* L. Дербеникъ.

Чашечка трубчатая, цилиндрическая и подпloidниковая съ 13-ю зубцами; вѣнчикъ 6-лиственный, при-

крѣпленъ къ вершинѣ чашечной трубки; тычинокъ 6 или 12, прикрѣпленныхъ къ основанію или къ срединѣ чашечной трубки; плодникъ продолговатый; столбикъ отогнутый внизъ. Травянистое растеніе съ 4-гранными вѣтвями, супротивными или кольчатыми, цѣльными, сидячими листьями и промежуточными цвѣтками, образующими прерванный колосъ.

Листья сердцевидно-ланцетные, полуобъемные, нижніе супротивны или кольчатые; внутренніе зубцы чашечки вдвое длиннѣе внѣшнихъ; вѣтви вверхъ отстоящія. . . . 1) **L. Salicaria L.**

## Семейство XXV Crassulaceae. D. C. Толстянковыя.

{ Чашечка 5-раздѣльная . . . . . **Sedum I.**  
{ Чашечка 6—20 раздѣльная . . . . . **Sempervivum II.**

### I. **Sedum L.** Очитокъ.

*Листья почти цилиндрическіе*; кромѣ цвѣтущихъ стеблей выходятъ изъ корня еще стебли безъ цвѣтковъ, листья при концѣ коротко-заостренные, сидячіе съ круглымъ основаніемъ; щитокъ голый; лепестки ланцетные, вдвое длиннѣе чашечки, желтые; на не цвѣтущихъ стебляхъ листья въ 6-ти рядахъ. . . . 1) **S. Acre L.**

### II. **Sempervivum L.** Живучка.

Лепестковъ 12 ланцетовидныхъ, расположенныхъ колесовидно-красныхъ, вдвое длиннѣе чашечки; тычинокъ 24 въ два ряда; плодниковъ 12. 1) **S. tectorum L.**

Семейство XXVI Grossulariaceae D. C. Брыжовничныя.

Ribes L. Смородина.

- 1) *Стебель съ шипами; цвѣтки зелено-желтые; ягода желтовато-бѣлая, иногда красная.* 1) **R. Grossularia L.**
- 2) *Стебель безъ шиповъ; цвѣтныя ножки образуютъ кисточки, при томъ онѣ 2—20-цвѣтковыя . . .* 2
- Прицвѣтникъ, находящійся при основаніи каждой цвѣтной ножечки, длиннѣе этой, ланцетный, рѣснитый съ желѣзконосными волосками; цвѣтки большею частію однодомны; мужскія кисти 20—30цвѣтковыя, желтыя; женскіе красныя или зелено-желтыя; 2—3цвѣтковые: листья пушистыя, внизу безъ точекъ; безвкусная ягода ярко-краснаго цвѣта. Смородина альпійская..*
- 2) **R. Alpinum L.**
- Прицвѣтникъ, находящійся при основаніи каждой цвѣтной ножки короче этой . . . . .* 3
- 3) *Листья внизу съ многими желѣзистыми, свѣтлыми точками; прицвѣтники шилообразные; чашечка пушистая, съ желѣзистыми точками, колокольчатая; лепестки на внутренней своей сторонѣ красны; ягода черновато-бурая или черная, не-пріятнаго запаха . . . . .* 3) **R. Nigrum L.**
- Листья внизу безъ свѣтлыхъ точекъ; прицвѣтники яйцевидныя чашечка голая, шарообразная; цвѣтки зеленовато-желтыя; ягода ярко-красная или желтовато-бѣлая . . . . .* 4) **R. rubrum.**

Семейство XXVII. Saxifrageae Vent. Камнеломковыя.

Saxifraga L. Камнеломка.

Чашечка 5 разрѣзная или 5-раздѣльная, сросшаяся съ плодникомъ или свободная; вѣнчикъ 6-лист-

ный; столбика 2, неотпадающих; тычинокъ 10, стоящихъ на желѣзистомъ кружкѣ; окружающимъ внизу плодники: коробочка съ двумя клювовидными отростками, двугнѣзная и многосѣмянная: между столбиками отверстіе. Травянистое растеніе съ желѣзистыми волосками, часто съ розеткою корневыхъ листьевъ, попеременными или супротивными стеблевыми листьями и верхушечными цвѣтками на ножкахъ. *Цвѣтки желтые*; листья цѣльные, узкіе стебель прямой съ листьями; цвѣтныя ножки съ пурпуровыми волосками . . . . 1) **S. Hirculus. L.**

Семейство XXVIII, Umbelliferae Juss. Зонтичныя.

1	}	При основаніи ни главнаго зонтика ни вторичныхъ зонтичковъ не находятся прицвѣтныя листочки (обертки и оберточки нѣтъ) . . . . .	2
		При основаніи или главныхъ зонтичковъ, или вторичныхъ находятся прицвѣтныя листочки . . . . .	5
2	}	Лепестки желтые . . . . . <b>Pastinaca.</b>	3
		Лепестки бѣлые или красноватые. . . . .	
3	}	Боковые листочки листьевъ снабжены при основаніи парю листиковъ, образующихъ съ нижними другой стороны крестъ . . . . . <b>Carum</b>	4
		Боковые нижніе листочки листьевъ не имѣютъ при основаніи такихъ листиковъ образующихъ кресты. . . . .	
4	}	Черешекъ корневыхъ листьевъ одинъ или нѣсколько разъ трираздѣльный . . . . . <b>Aegopodium</b>	4
		Корневые листья перистые . . . . . <b>Pimpinella</b>	
5	}	Обертка съ немногими только листочками (не болѣе 3), или такихъ листочковъ вовсе нѣтъ; только оберточка состоитъ изъ нѣсколькихъ листочковъ . . . . .	11
		Обертка съ многими листочками (болѣе 3) . . . . .	6
6	}	Оберточка состоитъ изъ 2—4 листочковъ . . . . . <b>Conium</b>	7
		Оберточка состоитъ изъ большаго числа листочковъ . . . . .	

7	} Боковые листочки листьев снабжены при основании парю листиковъ, образующихъ съ нижними другой стороны крестъ . . .	<b>Libanotis</b>	
		Боковые нижніе листочки листьев не имѣютъ при основаніи такимъ листиковъ, образующихъ форму креста . . . . .	8
8	} Листочки обертки перисто-разрѣзные или триразрѣзные . . . . .	<b>Daucus</b>	
		Листочки обертки или обверточки цѣльные . . .	9
9	} Листочки обертки многочисленные. <b>Peucedanum</b> и <b>Thysselinum</b>		
		Листочковъ обертки только 5—6. . . . .	10
10	} Стебель голый. . . . .	<b>Sium</b>	
		Стебель съ отогнутыми щетинами . . . . .	<b>Torilis</b>
11	} Обверточка только съ 3 листочками . . .	<b>Aethusa</b>	
		Обверточка болѣе чѣмъ съ 3 листочками . . .	12
12	} Зонтики супротивные съ листьями . . . . .		13
		} Зонтики промежуточные (между листьями и стеблемъ), или верхушечные. . . . .	14
13	} Черешокъ съ большимъ надутымъ влагалищемъ		<b>Cicuta</b>
		Черешокъ безъ такого надутаго влагалища . . .	<b>Oenanthe</b>
14	} Зубцы чашечки лопастные, листообразные; корень съ поперечными гнѣздышками. . .	<b>Cicuta</b>	
		Зубцы чашечки неясные или шилообразные . . .	15
15	} Стебель съ острыми, перепончатыми, почти крылатыми гранями; перепонка граней волнистая	<b>Selinum</b>	
		Стебель бороздчатый или полосатый или гладкій, но по крайней мѣрѣ нѣтъ такихъ перепончатыхъ граней. . . . .	16
16	} Лепестки желтые, желтовато-зеленые или нечисто-желтые . . . . .		17
		Лепестки бѣлые . . . . .	19
17	} Черешокъ расширяется при основаніи въ широкое, надутое влагалище. . . . .		18
		Черешокъ при основаніи безъ такого надутаго влагалища . . . . .	<b>Silaus</b>

18	}	Стебель голый, красновато-бороздчатый. . . . .	
		<b>Archangelica</b>	
	}	Стебель съ щетинистыми волосами . <b>Heracleum</b>	
19		Стебель голый, развѣ только при суставахъ косматый. . . . .	20
	}	Стебель волосистый или вездѣ, или сверху до середины, или снизу до середины. . . . .	23
20		Стебель при суставахъ только косматый <b>Myrrhis</b>	
	}	Стебель вездѣ голый . . . . .	21
21		Боковые листочки листьевъ на краю отогнуты, съ бѣлымъ концемъ; стебель обыкновенно опыленный . . . . . <b>Conioselinum</b>	
	}	Боковые листочки на краю не отогнуты. . . . .	22
22		Корневые листья 3—4-перистые; лепестки не чисто желтоватые. . . . . <b>Silaus.</b>	
	}	Листья двуперистые; лепестки бѣлые . <b>Cnidium.</b>	
23		Черешокъ расширяется при основаніи въ широкое надутое влагалище . . . . . <b>Angelica</b>	
	}	Влагалище черешка не надутое . . . . .	24
24		Обвертка съ 7—9 ланцетными листочками. . . . . <b>Chaerophyllum.</b>	
	}	Обвертка съ 5—6 яйцевидными листочками . . . . .	
		<b>Anthriscus.</b>	

## I. Cicula L. Болголовъ, Омѣгъ, Бъшенца, Мутанкъ.

Край чашечки 5-зубчатый; зубцы лопастные или листообразные; лепестки обратно-яйцевидные съ загнутымъ кончикомъ; двусѣмянки почти шарообразныя со стороны немного сжатая; каждый изъ плодниковъ съ 5 плоскими ребрышками; жолобокъ съ одною полоскою; сѣмяносецъ двураздѣльный; бѣлокъ въ поперечномъ разрѣзѣ почти круглый. Зонтикъ и зонтички полушарообразные, обыкновенно безъ обвертки; обверточка состоитъ изъ нѣскольکو листочковъ; цвѣтки бѣлые.

Корень толстый съ поперечными гвѣздышками; волокна его нитчатая; листья 2—3-перистые;

листочки ихъ линейно-ланцетные, острые и пильчатые; влагалища листьевъ трубчатая; стебель прямой, двураздѣльный, дутчатый и голый; столбики послѣ цвѣтенія отворочены; зонтики супротивные съ листьями и о многихъ лучахъ; листочки обверточки щетинообразные, длиннѣе зонтика. . . . . 1) *C. Virosa* L.

## II. *Carum* L. Тмиль.

Край чашечки неясный; лепестки обратно-яйцевидные, выемчатые съ загнутымъ кончикомъ; двусѣмянка со стороны сжатая и продолговатая; каждый плодникъ съ 5 нитчатыми, ровными ребрышками; жолобокъ съ одною полоскою; сѣмяносецъ свободный, при вершинѣ бороздчатый; бѣлокъ круглый, на внутренней сторонѣ немного плоскій. Обвертки и обверточки нѣтъ.

Стебель граневый, полосатый; листья двуперистые; листочки ихъ перисто-раздѣльные, линейные; нижнія ихъ пары образуютъ съ нижними парами другой стороны форму креста; корень веретенный, вѣтвистый; зонтики верхушечные; цвѣтки бѣлые, средніе изъ нихъ безъ плодниковъ . . . . . 1) *C. Carvi* L.

## III. *Pimpinella* L. Бедренецъ.

Край чашечки неясный: лепестки обратно-яйцевидные, выемчатые съ загнутымъ кончикомъ; двусѣмянка со стороны сжатая, яйцевидная и носить кружокъ съ отвороченными столбиками; каждый плодникъ съ 5 нитчатыми, ровными ребрышками; жолобокъ съ 3 полосами; сѣмяносецъ свободный и двураздѣльный; бѣлокъ выпуклый; бугорчатый, на внутренней сторонѣ почти плоскій. Обвертки и обверточки нѣтъ; зонтикъ вер-

хушечный; листья перистые; цвѣтки бѣлые или розовые. *Листочки листьевъ тупые, яйцевидные, зубчатые, лопастные или разрѣзные; стебель круглый, тонко полосатый, на верху почти безъ листьевъ.*

*Двусѣмянка яйцевидная . . . 1) P. Saxifraga L.*

#### IV. *Sium* L. Сіумъ.

Чашечка 5-зубчатая, съ малыми зубцами; лепестки обратно-яйцевидные съ загнутымъ кончикомъ; двусѣмянка со стороны сжата и носить кружокъ съ отвороченными столбиками; каждый плодникъ съ 5 равными, нитчатыми; тупыми ребрышками; желобокъ съ 3—5 полосками; сѣмяносецъ двураздѣльный; бѣлокъ на внутренней сторонѣ плоскій. Обертка и обверточка многолистная; зонтики полушарообразные, верхушечные и боковые съ многими лучами; цвѣтки бѣлые. Корень волокнистый съ отпрысками; стебель 5-гранный; листья перистые, листочки ланцетные, при основаніи неровные и остро-пыльчатые; листочки погруженныхъ въ водѣ листьевъ двуперистые и многораздѣльные . . . 1) *S. Latifolium* L.

#### V. *Aethusa* L. Собачница.

Край чашечки неясный; лепестки обратно-яйцевидные, выемчатые съ загнутымъ кончикомъ; плодники съ 5 возвышенными, толстыми, острыми ребрышками; боковые изъ нихъ немного шире и окружены почти крылатымъ краемъ; желобокъ съ одною полоскою; бѣлокъ полушаро-образный: сѣмяносецъ двураздѣльный. Зонтикъ плоскій; обертки обыкновенно нѣтъ; обверточка однобокая, висящая. Листочковъ обверточки по 3, длиннѣ зонтика; внѣшнія цвѣтныя ножки во время зрѣлости вдвое длиннѣ двусѣмянки; ко-



рень вѣтвистый; стебель гладкій, двураздѣльный; листья 2—3-перистые: нижніе боковые листочки на черешкахъ, верхніе сливаются въ одинъ, перисто-разрѣзные: лопасти продолговато-линейныя, цѣльныя или 2—3-разрѣзныя съ зеленымъ остроконечіемъ; зонтики верхушечныя и супротивныя о многихъ лучахъ: лучи на внутренней сторонѣ съ перепончатымъ и пальчатымъ краемъ; цвѣтки бѣлые.

1) *A. Synarium* L.

## VI. *Angelica* L. Дягиль.

Край чашечки неясный; лепестки ланцетныя, цѣльные, заостренныя съ прямымъ или немного-загнутымъ кончикомъ; двусѣмянка со стороны сжата, на краю съ двумя крылышками: каждый плодикъ съ 3 нитчатыми, возвышенными спинными и двумя боковыми крылатыми ребрышками; жолобокъ съ одною полоскою; сѣмяносецъ двураздѣльный; бѣлокъ почти полукруглый. Обвертка съ немногими листьями или ея вовсе не бываетъ; оберточка многолистная; зонтикъ большой выпуклый. Боковые листочки листьевъ по черешку не снисходяще; листья триперистые; зонтики верхушечныя и промежуточныя, съ многими лучами; листочки оберточка шилообразныя; цвѣтки бѣлые . 1) *A. Sylvestris* L.

## VII. *Archangelica* Hoff, Коровникъ.

Чашечка 5-зубчатая; лепестки эллиптическіе, цѣльные и острые; кончикъ загнутый; двусѣмянка со стороны немного сжата, съ каждого края съ двумя крылышками: каждый плодикъ съ толстыми, острыми ребрышками, 3 спинными, возвышенными: боковые шире, крылатые; жоло-

бокъ съ одною полоскою; бѣлокъ не сращенъ съ вѣшною кожицею, но свободный и покрытъ многими полосками; сѣмяносецъ двураздѣльный. Обвертки нѣтъ или она однолистная; обверточка многолистная, находится на вѣшной сторонѣ зонтика; зонтикъ полушаро-образный; цвѣтки зеленоватые. Стебель голый, круглый, полосатый; листья двуперистые, весьма большіе и благовонные. Зонтикъ мучнистый и шероховатый; обверточка совершенно голая, равной длины съ зонтикомъ, и короче 1) **A. Officialis Hoffm.**

### VIII. *Pastinaca* L. Пастернакъ.

Край чашечки неясный или съ весьма малыми зубцами; лепестки почти круглые, дѣльные, завитые внутрь и усѣченные; двусѣмянки овальныя, со спины плоскосжатая съ расширеннымъ плоскимъ краемъ: каждый плодикъ съ весьма тонкими ребрышками, три спинныя на равномъ растояніи; жолобокъ съ одною полоскою; полоски линейныя, острыя, равной длины съ жолобками; бѣлокъ плоскій. Обвертки и обверточки нѣтъ; зонтики плоскіе; цвѣтки желтые. Стебель граничный, желобоватый; листья перистые; на верхней сторонѣ блестящіе, на нижней пушистые; зонтикъ верхушечный съ многими лучами . . .

1) **P. Sativa L.**

### IX. *Pteraclem* L. Борщъ.

Чашечка 5-зубчатая; лепестки обратно-яйцевидныя, выемчатая съ загнутымъ кончикомъ: вѣшніе иногда плоскіе, двураздѣльные; жолобокъ съ одною полоскою: полоски короткія, булавовидныя; двусѣмянки овальныя со спины сжатая съ расширеннымъ плоскимъ краемъ:

каждый плодникъ съ весьма тонкими ребрышками: три спинныя на равныхъ растоянiяхъ, боковыя два замѣтно дальше; бѣлокъ плоскій. Обвертка опадающая съ 1—3 листочками; обверточка многолистная; зонтикъ большой. Листья шероховатые, перистые или глубоко перисто-разрѣзные цвѣтки зеленоватые или желтоватые

1) **H. Spondylium L.**

## X. *Daucus L.* Морковь,

Край чашечки 5-зубчатый; лепестки обратно-яйцевидные, выемчатые съ загнутымъ кончикомъ; вѣнныя плоскіе, глубоко-двуразрѣзные; двусѣмянка со стороны сплюснута въ видѣ чечевицы: каждый плодникъ съ 5 главными, нитчатыми ребрышками, на которыхъ находятся щетинки; 4 ребрышка вторичныхъ, равныхъ, крылатыхъ: крылашки раздѣлены на краю въ шипы; желобокъ подъ вторичными ребрышками съ одною полоскою; бѣлокъ на внутренней сторонѣ плоскій. Обвертки и обверточка многолистная; цвѣтки бѣлые. Стебель съ жесткими волосами; листья 2—3-перистые, не блестящіе; зонтики съ многими лучами, послѣ отцвѣтенія собранными въ видѣ птичьего гвѣзда; срединныя цвѣтки обыкновенно недорастающіе и неплодородные въ видѣ красныхъ пуговокъ. . . . . 1). **D. Carota L.**

## XI. *Chaerophyllum L.* Бутень,

Край чашечки неясный, лепестки обратно-сердцевидные съ загнутымъ кончикомъ; двусѣмянка со стороны сжатая, продолговато-цилиндрическая каждый плодникъ съ 5 тупыми и равными ребрышками; желобокъ съ одною полоскою; стол-

бики нитчатые. Обертка съ немногими листьями или ея вовсе не бываетъ; обверточка многolistная; цвѣты смѣшанные; зонтикъ выпуклый. Листья трижды тройные: стебель при суставахъ немного опухлый, при основаніи равно какъ и черешки немного шероховатый . . . . .

1) **Ch. Aromaticum L.**

## XII. *Conium L.* Омегъ.

Чашечка неясная; лепестки яйцевидные съ короткимъ, немного загнутымъ кончикомъ; двусѣмян-ка со стороны сжатая и яйцевидная: каждый плодикъ съ 5 возвышенными, но внутри не пустыми ребрышками; бѣлокъ на внутренней сторонѣ съ жолобкомъ. Обертка многolistная, обверточка однобокая, 2 — 4-листная; зонтики съ многими лучами; цвѣтки бѣлые. Корень веретенный; стебель дудчатый, на верху вѣтвистый съ красными пятнами; совершенно голый и опыленный; черешокъ дудчатый, желобоватый, нижніе листья триперистые: листочки обертки съ перепончатымъ краемъ. висячіе; листочки обвертки ланцетные, короче зонтика; запахъ неприятный . 1) **C. Maculatum L.**

## Сем. XXIX. *Caprifoliceae Juss.* Жимолостныя.

- |   |                                                                                                                                                                                           |                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | Тычинокъ 4—5; столбиковъ отъ 1 до 3 или столько же сидячихъ рылецъ; чашечка 5-раздѣльная, разрѣзная или зубчатая. Ясно-видимаго столбика нѣтъ; 3 рыльца; (листья 3—5 лопастные) . . . . . | 3                  |
|   |                                                                                                                                                                                           | 2                  |
| 2 | Столбикъ нитчатый; (листья цѣльные) . . . . .                                                                                                                                             | 2                  |
|   | Тычинокъ 5; чашечка 5-зубчатая . . . . .                                                                                                                                                  | <b>Lonicera</b> ш. |
| 3 | Тычинокъ 4; чашечка 5-раздѣльная . . . . .                                                                                                                                                | <b>Linnaea</b> л.  |
|   | Вѣнчикъ колокольчатый, ягода односѣмянная . . . . .                                                                                                                                       | <b>Viburnum</b> п. |
|   | Вѣнчикъ колокольчатый. Ягода 3-сѣмянная                                                                                                                                                   | <b>Sambucus</b> л. |

## I. Sambucus L. Бузина,

- 1 { Цвѣты желтоватые расположенныя яйцевидными  
кистями. Ягоды красныя . . . **S. racemosa L.**
- Цвѣты бѣловатыя, расположенныя зонтикомъ . . . 2  
Зонтикъ о 5 главныхъ вѣтвяхъ. Пыльнички желтыя.  
Растеніе кустарное . . . . . **S. nigra L.**
- 2 { Зонтикъ о 3 вѣтвяхъ. Пыльнички красныя. Сте-  
бель травянистый. Есть большія прилистники.  
**S. Ebulus L.**

## II. Viburnum L. Калина.

Листья при основаніи округленныя, 3—5-лопаст-  
ныя: лопасти заостренны, неровно и грубо-пиль-  
чатыя; черешки голыя, съ большими желѣзками;  
крайніе цвѣтки щитка гораздо больше среднихъ;  
ягода шарообразная, ярко-краснаго цвѣта; цвѣт-  
ки бѣлыя . . . . . 1) **V. Opulus L.**

## III. Lonicera L. Жимолость.

- Цвѣты въ головкахъ; *верхняя пара листьевъ срос-*  
*шаяся* въ круглую, находящуюся непосредствен-  
но подъ цвѣткомъ обертку. **L. Caprifolium L.**
- Цвѣты въ головкахъ, съ черешкомъ, *верхняя пара*  
*листьевъ несросшаяся* . . . **L. Periclymenum L.**

## IV. Linnaea Gronov. Линнея.

Стебель лежачій; листья округлыя, озубренныя,  
черешковые и немного кожистыя; цвѣтки вися-  
чіе; бѣлыя благовонныя, отмѣченныя красными  
точками и красными жилками. 1) **L. Borealis L.**

Сем. XXX. Stellatae L. Звздолистные.

Сѣмена заключены въ ягодъ. Вѣнчикъ 5 раздѣ-  
ленный. . . . . **Rubia**  
Вѣнчикъ колесообразный или плоскій, 4 рѣдко 3  
раздѣленный. Сѣмена покрыты тонкою сухою  
оболочкою. . . . . **Galium**

I. **Rubia L.** Марена.

Цвѣты небольшія, желтоватыя, расположенныя  
угловыми оконечными метелками. Листья сидя-  
чіе, ланцетовидные, отъ 4 — 6 въ каждой мутовкѣ  
1) **R. tinctoria L.**

II. **Galium L.** Подмарѣнникъ.

Цвѣтная ножка нераздѣльная или 2—3 раздѣльная,  
по отцвѣтаніи прямая; вѣнчикъ не шире или уже  
зрѣлаго плода; листья по 6—8 въ кольцо съ  
остроконечіемъ или безъ онаго, на краю и на  
спинной грани съ отвороченными шипами: по-  
верхность ихъ съ щетинобразными волосками;  
узлы стебля косматы или голые. **G. Aparine L.**

Сем. XXXI. Valerianae D. С. Валеріановыя.

**Valeriana L.** Валеріана. Балдырьяпъ. Маугъ.

Чашечка представляетъ только загнутый край; вѣн-  
чикъ съ неровно 5-раздѣльнымъ отгибкомъ,  
трубчатый и съ боковымъ бугоркомъ при осно-  
ваніи; тычинокъ 3, шилообразныхъ; рыльце три-  
раздѣльное; плодъ—сѣмянка съ острыми грани-

ми и съ перообразнымъ хохолкомъ, образующимся изъ края чашечки. Травянистое растеніе .  
 Листья перистые съ 7—10 парами боковыхъ листовъ: цвѣтки обоюднаго пола; сѣмянки голыя; стебель бороздчатый, прямой или восходящій; цвѣтки, бѣлые или свѣтло-красные, въ шишкахъ небольшіе . . . . . 1) **V. Officialis L.**

## Сем. XXXII. Dipsaceae D. С. Ворсянковыя.

Стеблевые листья обыкновенно перисто-разрѣз-  
 ные); внутренняя чашечка (покрыта вѣшнею)  
 съ 8—12 зубцами . . . . . **Knautia I.**  
 (Стеблевые листья цѣльные); внутренняя чашеч-  
 ка 5 зубчатая . . . . . **Succisa II.**

### I. *Knautia* Coult. Короставикъ.

Стеблевые листья перисто разрѣзные: лопасти ихъ отстоящія другъ отъ друга, ланцетныя и цѣль-  
 ныя; окончателъная лопасть больше, заострена  
 и почти зубчатая; корневые листья ланцетные,  
 выемчато-зубчатые или разрѣзные; цвѣтки блѣд-  
 но-красные; листья бывають иногда неразрѣз-  
 ными 1) **K. Arvensis Coult. (Scabiosa arvensis L.)**

### II. *Succisa* M. et. K. Скабіоза.

Головка полушарообразная; вѣшняя чашечка во-  
 лосистая: лопасти яйцевидныя, острыя и съ  
 остроконечіемъ; вѣнчикъ 4-разрѣзной; стебель  
 почти простой; прямой; корневые листья череш-  
 ковыя, овальныя, ланцетвыя, цѣльныя или не  
 много зубчатые: стеблевые ланцетныя, цѣльныя  
 почти сидячія; цвѣтки голубыя, красноватыя или  
 бѣлыя. . 1) **S. Pratensis Moench. (Scabiosa  
 Succisa L.)**

Сем.: XXXIII. Compositae Adans. Сложноцвѣтными или Сроотнопыль-  
никовыя.

- |   |   |                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                               |
|---|---|--------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | } | Вѣнчики всѣхъ цвѣточковъ головки оканчиваются язычкомъ . . . . . 2 | } | Вѣнчики всѣхъ цвѣточковъ головки трубчатые, оканчивающіеся совершенно правильно или почти правильно 4—5-зубчатымъ краемъ: въ окружности головки они иногда воронкообразные, или трубочка крайнихъ цвѣточковъ оканчивается весьма узкимъ линейнымъ листикомъ . . . . . 12 | }                                               | Вѣнчики въ срединѣ кружка стоячіе, трубчатые съ 5 зубцами, но въ окружности его (крайніе) язычковые; язычки распростерты обыкновенно въ видѣ лучей . . . . . 27 |                                                                                 |                                                                                                                                               |
|   |   | 2                                                                  |   | }                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 | Хохолокъ (на верхнемъ концѣ сѣмянки) нѣтъ, или онъ представляетъ только перепончатый цѣльный край . . . . . <b>Lapsana</b>                                      | }                                                                               | Хохолокъ состоитъ или изъ простыхъ волосковъ или изъ волосковъ съ небольшими боковыми волосками (перистые волоски) или изъ чешуекъ. . . . . 3 |
|   |   | 3                                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 | }                                                                                                                                                               |                                                                                 | Хохолокъ состоитъ изъ чешуекъ, которыя короче сѣмянки; (цвѣты голубые) . . . . . <b>Cichorium</b>                                             |
| 4 | } | Хохолокъ съ перистыми волосками . . . . . 5                        | } | Хохолокъ состоитъ изъ простыхъ волосковъ; (такъ какъ хохолокъ при свѣжихъ цвѣткахъ сырой, то боковые волоски прилегаютъ иногда къ главному: ихъ волоски можно весьма ясно видѣть, если станемъ шутить цвѣточекъ на плитѣ) . . . . . 9                                    |                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                                                               |
|   |   | 5                                                                  |   | }                                                                                                                                                                                                                                                                        | Донце съ чешуйками . . . . . <b>Hypochaeris</b> | }                                                                                                                                                               | Донце совершенно голое, или только развѣ что съ короткими волосками . . . . . 6 |                                                                                                                                               |



- Обертка состоитъ изъ 8 листочковъ, расположенныхъ въ одинъ рядъ . . . . . **Tragopogon.**
- 6 { Обертка состоитъ изъ большаго числа листочковъ; они при томъ расположены въ видѣ черепичной кровли (настеляные), или если они однорядные, то при основаніи ихъ еще находятся короткія листочки (внѣшняя чашечка) . . . . . 7
- 7 { Стебель (кромѣ корневыхъ листьевъ) совершенно безлистный, развѣ только прицвѣтники на развѣтвленіяхъ цвѣтныхъ ножекъ: длина этихъ прицвѣтниковъ не превышаетъ нѣсколько линий; листочки обертки неотстоящіе, прижатые. **Leontodon.**
- 8 { Стебель, кромѣ корневыхъ листьевъ, еще съ нѣсколькими листьями . . . . . 8
- 8 { Нижніе листочки или чешуйки обертки отстоящіе; боковые волоски главныхъ волосъ хохолка не перепутанные съ волосками другихъ волосъ хохолка; (корневые листья выемчато-зубчатые). **Picris.**
- 10 { Нижніе листочки или чешуйки обертки прижатые; боковые волоски всѣхъ волосъ перепутаны между собою; (корневые листья совершенно цѣльные) . . . . . **Scorzonera.**
- 9 { Совершенно безлистный, дудчатый, гладкій стебелекъ съ одною цвѣтною головкою **Taraxacum.**
- 9 { Стебель съ листьями, болѣе чѣмъ одною цвѣтною головкою, или если одна головка, то стебелекъ щетинистый . . . . . 1
- 10 { Сѣмянки со стороны сжатия и плоскія; (листья голые, на краю рѣснистые, отъ многихъ шиповъ) **Sonchus.**
- 10 { Сѣмянка почти круглая; такихъ шипообразныхъ рѣсницъ на краю листьевъ нѣтъ . . . . .
- 11 { Листочки обертки расположены въ нѣсколькихъ рядахъ въ видѣ черепичной кровли . . . . . **Hieracium**
- 11 { Листочки обертки однорядные и равной длины; при основаніи ихъ находятся нѣсколько листочковъ меньшей величины (внѣшняя чашечка) . . . . . **Crepis**

- 12 { Листья развиваются послѣ цвѣтковь; стебелекъ съ чешуйками безъ листьевъ: (чешуйки этѣ красноватыя) . . . . . **Petasites**  
 Листья и цвѣтки развиваются вмѣстѣ . . . . . 13
- 13 { Цвѣточки на краю головки значительно больше; притомъ они воронкообразныя и безполые . . . **Centaurea**  
 Цвѣточки на краю головки не больше другихъ, или трубчатые или нитчатые . . . . . 14
- 14 { Хохолокъ съ перистыми или простыми волосками . . . . . 17  
 Хохолка нѣтъ или на его мѣстѣ незубчатый край, или 2—5 длинныхъ зубцовъ . . . . . 15
- 15 { Хохолокъ представляетъ 2—5 зубцовъ (острея): длина ихъ равна длинѣ вѣнчика; (листья и вѣтви супротивныя) . . . . . , **Bidens**  
 Хохолка вовсе нѣтъ или только незубчатый край; (листья попеременные) . . . . . 16
- 16 { Цвѣтныя головки расположены въ щиткахъ на верху плоскихъ (сами головки ярко-желтыя; боковыя листочки листьевъ глубоко-пильчатые). **Tanacetum**  
 Цвѣтныя головки расположены въ метелкахъ т. е. онѣ всѣ не на равной высотѣ: (притомъ онѣ желтоватыя, бѣлыя или красноватыя; боковыя листочки или лопасти листьевъ цѣльныя или почти незамѣтно-зубчатые) . . . **Artemisia**
- 17 { Хохолокъ съ простыми волосками . . . . . 19  
 Хохолокъ съ перистыми волосками . . . . . 18
- 18 { Вѣшнія листочки обертки двуперисто-раздѣльныя; сѣмянки съ волосками . . . . . **Carlina**  
 Листочки обертки цѣльныя; сѣмянки совершенно голыя . . . . . **Cirsium**
- 19 { Листья супротивныя; донце безъ щетинокъ и чешуекъ . . . . . **Eupatorium**  
 Листья попеременные; донце съ щетинками, чешуйками и безъ оныхъ . . . . . 20

- 20 Листочки обертки почти равной длины: при основаніи ихъ находится иногда нѣсколько гораздо меньшихъ; (цвѣтки чисто желтые) . **Senecio**
- 20 Листочки обертки расположены въ видѣ черепичной кровли, т. е. они неравной величины и не въ одномъ ряду; (цвѣтки красные и красновато-бѣлые, или желтовато-бѣлые) . . . . . 21
- 21 Листочки обертки тупые или туповатые, но безъ остроконеція, сухіе, или если зеленые, то они на спинѣ шерстисты . . . . . 22
- 21 Листочки обертки остры или даже съ остроконечіемъ или шипомъ . . . . . 24
- 22 Между листочками обертки нѣтъ выходящихъ цвѣточковъ; цвѣточки въ срединѣ головки 5-зубчатые; донце голое . . . . . 23
- 22 Между листочками обертки выходятъ отдѣльные цвѣточки; цвѣточки въ срединѣ головки 4-зубчатые; донце съ чешуйками . . **Filago**  
(Внѣшніе листочки обертки лимонно-желтаго цвѣта); крайніе нитчатые цвѣточки однорядны .  
**Helichrysum**
- 23 (Внѣшніе листочки обертки красноватые, бѣлые, бурые или зеленоватые); крайніе нитчатые цвѣточки многорядны . . **Gnaphalium**
- 24 Внѣшніе листочки обертки на концѣ крючковатые; хохолокъ короче сѣмянки . . **Lappa**
- 24 Листочки обертки безъ крючка на концѣ; хохолокъ длиннѣе сѣмянки . . . . . 25
- 24 Листочки обертки острые; головка почти цилиндрическая . . . . . 26
- 25 Листочки обертки съ шипомъ; головка въ срединѣ толще . . . . . **Carduus**
- 26 Всѣ цвѣточки трубчатые . . . . . **Serratula**
- 26 Крайніе цвѣточки нитчатые. . . . . **Erigeron**
- 27 Хохолка нѣтъ или только край, или 2—5 остре-  
евъ равной почти длины съ вѣнчикомъ . . . . . 28
- 27 Хохолокъ съ простыми или перистыми волосками . . . . . 33
- 28 Хохолокъ состоитъ изъ 2—5 зубцовъ (острая) .  
**Bidens**
- 28 Хохолка вовсе нѣтъ или только край. . . . . 29

29	}	Листочки обертки двурядные, всѣ почти равной длины; (стебелекъ безлиственный) . . . <b>Bellis</b>	
		Листочки обертки всѣ не равной длины и расположены въ видѣ черепичной кровли или они по крайней мѣрѣ не расположены въ 2-хъ рядахъ; (стебель съ листьями) . . . . .	30
30	}	Донце голое или съ волосками . . . . .	31
		Донце съ чешуйками. . . . .	32
31	}	Донце при перпендикулярномъ разрѣзѣ внутри пустое, цилиндрическое или коническое . . . . .	
		<b>Matricaria</b> Донце внутри не пустое, мякотное, отъ почти плоской до конической формы . . . . .	
32	}	<b>Chrysanthemum</b> Крайнихъ цвѣточковъ (съ язычкомъ) головки числомъ болѣе 12 . . . . . <b>Anthemis</b>	
		Крайнихъ цвѣточковъ головки не болѣе 12 . . . . . <b>Achillea</b>	
33	}	(Безлистный, чешуйками покрытый стебелекъ) . . . . .	34
		(Стебель съ листьями) . . . . .	35
34	}	(Стебелекъ съ одною цвѣтною головкою) <b>Tussilago</b>	
		(Стебелекъ съ многими цвѣтными головками) . . . . . <b>Petasites</b>	
35	}	Листочки обертки расположены въ видѣ черепичной кровли (въ нѣсколькихъ рядахъ и листочки неравной длины) . . . . .	36
		Листочки обертки почти равной длины, иногда съ вѣшною чашечкою, т. е. съ значительно меньшими листиками при основаніи . . . . .	39
36	}	Крайніе цвѣточки (съ язычкомъ) головки фиолетовые, бѣлые или красноватые . . . . .	37
		Крайніе цвѣточки желтые . . . . .	38
37	}	Язычковые цвѣточки въ нѣсколькихъ рядахъ: язычекъ узкій . . . . . <b>Erigeron</b>	
		Язычковые цвѣточки въ одномъ ряду, съ широкимъ язычкомъ . . . . . <b>Aster</b>	
38	}	Крайнихъ (язычковыхъ) цвѣточковъ числомъ 5-10 . . . . . <b>Solidago</b>	
		Крайніе цвѣточки многочисленныя . . . . . <b>Inula</b>	

- 39) Язычекъ крайнихъ цвѣточковъ желтый. . . . . 40  
 Язычекъ крайнихъ цвѣточковъ бѣлый, лиловый  
 или красный. . . . . **Erigeron**  
 40) Обертка при основаніи съ двумя супротивными,  
 удлинненными прицвѣтниками. . . **Ligularia**  
 Обертка при основаніи съ однимъ или нѣсколь-  
 кими чешуйко-образными, небольшими листоч-  
 ками. . . . . **Senecio**

**I. *Wuratorium* L. Конопельникъ. Псковникъ. Благородникъ.  
Посконь.**

Листья на короткихъ черешкахъ, 3 — 5-раздѣль-  
ные: лопасти ихъ пильчатая, ланцетныя, сред-  
нія длиннѣе: верхніе обыкновенно нераздѣль-  
ные; стебель прямой немного бороздчатый, пу-  
шистый, почти 4-гранный, 2 — 6 футовъ выши-  
ны; цвѣтки синеваго-красные или лиловые.

1) **E. Cannabisum** L.

**II. *Tussilago* L. Бѣлокопытникъ.**

Всклоченный стебелекъ съ одною цвѣтною голов-  
кою и съ чешуйками: обыкновенно нѣсколько  
стебельковъ изъ одного корня; листья сердце-  
видные, угловато-зубчатые, внизу пушистые;  
листочки обертки голые. . . 1) **T. Farfara** L.

**III. *Petasites* Gaertn. Чумный корень. Матерникъ.**

*Вѣтчики розовые* съ бѣлымъ краемъ; цвѣтныя го-  
ловки въ кистяхъ; листья сердцевидные на длин-  
ныхъ черешкахъ, внизу всклоченные; лопасти  
при основаніи листьевъ округлыя.

1) **P. Officinalis** Mönch (**Tuss. petasites** L.).

**IV. *Bellis* L. Маргаритка.**

Листочки обертки совершенно тупые; листья ло-  
патчатые, озубренные или зубчатые; стебелекъ

до 5 дюймовъ вышины; срединные цвѣточки желтые, крайніе бѣлые, внизу иногда красноватые.

1) **V. Perennis L.**

## V. *Erigeron L.* Блошница. Мелколествицъ.

*Крайніе цвѣточки лиловые или красноватые:* головки продолговато-яйцевидныя въ щиткъ; листья съ немногими, но жесткими волосками, буроватый стебель вышиною до 2 футовъ; хохолокъ нечисто-бѣлый или рыжій.. 1) **E. Acre L.**

## VI. *Solidago L.* Золотушникъ.

Листья яйцевидно-ланцетные, заостренные, спускающіе въ крылатый черешекъ: стебель наверху болѣе или менѣе пушистый; листочки обертки линейно-ланцетные; крайнихъ, желтыхъ цвѣточковъ около 8; сѣмянки съ тонкими волосками . . . . . 1) **S. Virga Aurea L.**

## VII. *L. Inula* Девясиль.

*Внутренніе листочки обертки яйцевидные,* т. е. длина ихъ превышаетъ не болѣе 3 разъ ширину; сѣмянки безъ волосковъ; корневые листья черешковые, эллиптическіе: стеблевые сердцевидны и яйцевидны, заостренные, объемные: всѣ неровно пильчатые или зубчатые, на нижней стороне въсклоченные; головки весьма большія . . .

1) **I. Helenium L.**

## VIII. *Bidens L.* Двухзубецъ. Череда. Коноплянка.

*Нижнія листья 3—5-раздѣльные или лопастные;* головка на прямыхъ ножкахъ; крайніе цвѣточки безъ язычка; сѣмянки сѣровато-бурыя. . 1) **B. Tripartita L.**

### IX. Gnaphalium L. Змѣвикъ. Сушеница.

Листочки обертки бѣлые или розовые; корневые листья въ розеткѣ, лопатчатые или обратно яйцевидные: всѣ на верхней сторонѣ голые, внизу бѣлые; стебель совершенно простой, вышиною до  $\frac{1}{2}$  фута; съ отпрысками при основаніи; стеблевые листья прилежащія, линейно ланцетные; головки, въ верхушечныхъ щиткахъ, двудомныя; цвѣтки бѣлые или розовые. . . 1) **G. Dioicum L.**

### X. Artemisia L. Чернобыль. Глициникъ.

- 1) *Стебель сѣроватый отъ шелковистыхъ волосковъ.*  
1) **A. Absinthium L.**
- 1) *Стебель голый, красноватый или зеленый; донце голое.* . . . . . 2
- Нижнія листья на черешкахъ, 2—3-перистые.* . . . . . 2)
- 2) *Листья сидячіе, обземные, перисто-разрѣзные: въ метелкахъ, сидячіе; цвѣточки желтые или красноватые* . . . . . 3) **A. Vulgaris L.**

### XI. Tanacetum L. Пижма. Рябинга.

Лопастн листьявъ глубоко-пильчатая; листья дуперисто-раздѣльные, голые съ тонкими точками; листочки обертки голые . . . 1) **T. Vulgare L.**

### XII. Achillea V. Гулявица.

- Листья дуперисто-раздѣльные: крайнихъ язычковыхъ цвѣточковъ числомъ около 5; листочки обертки съ перепончатымъ, бурымъ краемъ; цвѣточки бѣлые или красноватые* . . . 1) **A. Millefolium L.**
- Листья нераздѣльные, только пильчатые; крайнихъ язычковыхъ цвѣточковъ числомъ отъ 8—12; листочки обертки съ перепончатымъ, рѣснистымъ краемъ* . . . . . 2) **A. Ptarmica L.**

### XIII. *Matricaria* L. Ромашка.

Листья двуперистые съ линейными или нитчатыми лопастями; листочки обертки тупые; стебель полосатый, вѣтвистый; крайніе язычковые цвѣточки обыкновенно отогнуты; растеніе имѣеть особенный запахъ . . . 1) *M. Chamomilla* L.

### XIV. *Ghrysanthemum* L. Золотоцвѣтъ. Поповникъ.

Листья неперистые: нижніе на длинныхъ черешкахъ, яйцевидно-лопатчаты, озубрены или зубчаты: верхніе сидячіе и немного объемные, продолговато-линейные, пильчатые: зубцы при основаніи уже и острѣе; стебель прямой, почти простой, съ гранями и однимъ цвѣткомъ; листочки обертки продолговатые съ бурымъ краемъ . . .

1) *G. Leucanthemum* L.

### XV. *Senecio* L. Старина, Крестовникъ.

Внѣшніе листочки при основаніи обертки въ нѣсколько разъ короче внутреннихъ, числомъ около 10; всѣ цвѣточки трубчатые; сѣмянки съ тонкими волосками; стебель прямой, полосатый . . .

1) *S. Vulgaris* L.

### XVI. *Centaurea* L. Василѣкъ. Лоскутница.

*Крайніе цвѣточки чисто синіе, срединные фіолетовые; внѣшніе листочки обертки яйцевидные съ черно-бурымъ краемъ и бахромчатые, внутренніе продолговатые, красноватые . . .*

1) *C. Cyanus* L.

*Крайніе цвѣточки красныя, листочки обертки оканчиваются на верху желтаго или ржаваго цвѣта привѣскою, эти привѣски покрываютъ всю обертку . . . . . 2) *C. Jacea**



### XVII. Cichorium L. Цикорій,

Цвѣты голубые или бѣлые, головки по 2 или болѣе промежуточные, сидячія или на ножкахъ; корневые листья черешковые, стеблевые сидячіе, почти объемные . . . . 1) **C. Intybus L.**

### XVIII. Tragopogon L. Козлобородникъ.

Листочки обертки одной длины съ цвѣточками; носикъ крайнихъ сѣмянокъ одной длины съ сѣмянкою; листья почти похожи на листья злаковъ; цвѣты желтые; стебель совершенно прямой, обыкновенно красноватый и голый 1) **T. Pratense L.**

### XIX. Scorzonera L. Козелецъ.

Цвѣты желтые. Корневые листья продолговато-ланцетные или линейно-ланцетные, черешковые; стеблевые линейные, числомъ отъ 1—4, стебель немного шерстистый съ 1—3 головками; цвѣточки вдвое длиннѣе обертки 1) **S. Humilis L.**

### XX. Taraxacum Juss. Одуванчикъ.

Цвѣты желтыя. Корень веретенный съ 1 или болѣе стебельками; листья продолговатые или линейно-ланцетные, пилообразныя или цѣльные и зубчатые; листочки обертки обыкновенно отворочены: во время зрѣлости хохолки всѣхъ сѣмянокъ образуютъ шаръ. 1) **T. Officinale. Wigg**  
(**Leontodon taraxacum L.**)

### XXI. Sonchus L. Молочай, Осѣтъ.

Цвѣты желтыя стеблевые листья при основаніи съ заостренными хвостиками, объемные, продолговато-ланцетные . . . . **S. Oleraceus L.**

### XIII. Hieracium L. Сокольникъ. Ястребинка.

Стебелекъ съ одною головкою; листья на нижней сторонѣ сѣро- или бѣло-всклоченные, ланцетные, на верхней сторонѣ свѣтло зеленые съ разбросанными щетинками; листочки обертки съ черными и бѣлыми волосками, стебель мохнатый, всклоченный, съ отпрысками; цвѣточки сѣрнаго цвѣта: крайніе на нижней сторонѣ съ красноватою полоскою . . . . . 1) **H. Pilosella L.**

### Семейство XXXIV<sup>o</sup>. Vaccineae D. C. Брусничныя.

#### Vaccinium L. Брусника.

Чашечка 4—5-разрѣзная или зубчатая, иногда почти цѣльная; вѣничекъ 4—5-разрѣзный или 4—5-зубчатый; тычинокъ 8 или 10 ягода шарообразная, 4—5-гнѣздная. Кустарники или полукустарники съ кожистыми цѣльными листьями на короткихъ черешкахъ, и съ верхушечными или промежуточными, обыкновенно отогнутыми цвѣтными ножками: каждая съ 1—3 цвѣтками.

*Стебель нитчатый, ползучій; вѣничекъ почти до основанія 4-раздѣльный: чашечка 4-разрѣзная, фиолетовая; листья яйцевидные, острые; вѣтви стебля пушистые и лежатъ на землѣ; цвѣтки розовые; ягоды красныя. . . . . 1) **V. Oxycoccus L.***

*Стебель прямой или восходящій: вѣничекъ колокольчатый, чашечка 4-зубчатая; вѣничекъ до  $\frac{1}{3}$  длинны, 4-разрѣзный, листья постоянно зеленые, обратно яйцевидные или эллиптическіе, тупые. Кисти цвѣтовъ, вѣтви и черешокъ пушистые; столбикъ длинный, выходящій изъ вѣничика; цвѣтки бѣлые или красноватые; ягоды красныя.*

2) **V. Vitis Idaea L.**

Семейство XXXV. Ericiniæ Desv. Вересковые.

- 1 { Тычинокъ 8; чашечка 4-листная; вѣнчикъ 4-листный. . . . . **Calluna II.**  
Тычинокъ 10; чашечка 5-зубчатая или -разрѣзная, или -раздѣльная. . . . . 2
- 2 { Вѣнчикъ 5-листный, горизонтально распушенный. **Ledum III.**  
Вѣнчикъ однолистный, почти шарообразный съ 5-разрѣзнымъ отгибомъ. (Стебель лежащій; листья съ сѣтчатыми жилками); плодъ — костянка съ 5-косточками. . . . **Arctostaphylos I.**

I. *Arctostaphylos*. Adans. Толокнянка.

Стебель съ восходящими, пушистыми вѣтвями, образуетъ дернъ; листья на короткихъ черешкахъ, продолговато и обратно-яйцевидные, цѣльные, съ сѣтчатыми жилками: молодые по краямъ волосистые; цвѣтки по 6—10 на концахъ вѣтвей, повислые тѣсно-стоящіе, на красныхъ ножкахъ и яйцевидные, бѣлые съ розовыми оттѣнками; ягоды красныя . 1) **A. Officinalis Wim et Gr.** (**Arbutus Uva ursi L.**)

II. *Calluna*. Salisb. Верескъ.

Листья супротивные въ 4-рядахъ сидячіе, рѣснитые, мясистые, трехгранные, длиною до 1 линіи; стебель обыкновенно голый, вѣтвистый; цвѣтки на короткихъ ножкахъ, розовые или бѣлые. 1) **C. Vulgaris Salisb (Erica vulgaris L.)**

### Ш. *Ledum* L. Багуль. Багульникъ.

Листья линейные, на краяхъ свивающіеся, на нижней сторонѣ равно какъ и вѣтви ржаваго цвѣта и включенные; коробочка бурая; стебель до 4-футовъ вышины; вѣнчикъ бѣлый . . . . .

1) *L. Palustre* L.

### Сем. XXXVI. *Rugolaceae*. Lindl. Грушовковыя.

#### *Rugola* L. Грушовка.

Чашечка не опадающая, 5-раздѣльная; вѣнчикъ 5-лиственный, открытый, колокольчатый, или почти шарообразный и закрытый; стерженковъ 10, внизу немного восходящихъ, или въ сторону отогнутыхъ, при концѣ повислыхъ; пыльники растрескивающіеся двумя отверстіями вблизи мѣста прикрѣпленія ихъ къ стерженкамъ; плодникъ почти шарообразный, столбикъ цилиндрическій; рыльце раздѣльное въ 5 лопастей; коробочка тупая, 5-гнѣздная; створокъ 5, съ перегородкою въ серединѣ. Всегда зеленѣющія травянистыя растенія съ ползучимъ корнемъ, кожистыми, озубренными, черепшковыми, сѣтчатожильными корневыми листьями и повислыми цвѣтками въ кистяхъ собранными, или съ одно-цвѣтковымъ стебелькомъ. Стебелекъ со многими цвѣтками, *длина чашечныхъ лопастей значительно превышаетъ ширину*: при томъ онѣ въ половину короче распущеннаго вѣнчика, заострены и при концѣ отогнуты; цвѣтки бѣлые; листья овальные, не глубоко озубренные *стебелекъ съ 5—7 чешуйками*, изъ которыхъ 3 сближены; *кисти съ 3—8 цвѣтками*; столбикъ вдвое длиннѣе вѣнчика. 6) *P. Rotundifolia* L.

**C. Corolliflorae. Вѣнчикоцвѣтныя.**

Сем. XXXVII. Oleaceae. Lindl. Масличныя.

**Fraxinus. L. Ясень.**

Чашечка и вѣнчикъ или 3—4 раздѣльные, или ихъ вовсе нѣтъ; столбикъ 1; рыльце двураздѣльное; плодникъ съ двумя односѣмянными гнѣздышками; плодъ — орѣхъ, односѣмянный, плоскій, при концѣ крылатый. Цвѣтки въ промежуточныхъ пучкахъ; листья супротивные. Листья непарно-перистые съ 3 — 6 парами боковыхъ листочковъ: листочки сидячіе, ланцетно-продолговатые, заостренные, пильчатые, при основаніи клиновидные; орѣхи при вершинѣ съ косыми выемками, почти черные; вѣтви бурыя; стволъ вышиною до 80 футовъ, листья развиваются только послѣ цвѣтковъ. 1) **F. Excelsior L.**

Сем. XXXVIII. Gentianeae Juss. Горчанковыя.

- Лопастн вѣнчика длинныя, бахромчатыя и бородастыя: (листья по 3 на черешкѣ). **Menyanthes I.**
- 1) Лопастн вѣнчика не бахромчатыя и не бородастыя, а гладкія; (листья или сидячіе, или если съ черешкомъ, то по одному на черешкѣ) . . . 2
- 2) (Цвѣтки темно-розовыя); трубка вѣнчика узко-воронкообразная . . . . . **Erythraea III.**
- (Цвѣтки фіолетовыя или синіе); вѣнчикъ воронкообразно-колокольчатый . . . . . **Gentiana II.**

**I. Menyanthes L. Вахта. Трилистникъ.**

Стебель ползучій, членосоставный; листья на длинныхъ черешкахъ, тройные, голые; чере-

шюкъ влагалищный; стебелекъ длинный; съ бѣлыми или блѣдно-розовыми цвѣтками, и красноватыми пыльниками. . . 1) **M. Trifoliata L.**

## II. *Gentiana L.* Горчанка.

*Цвѣтки расположены въ кольцахъ; трубка вѣнчика колокольчатая, булавовидная: отгибокъ 4-разрѣзный. Влагалища нижнихъ листьевъ весьма длинная, на верху широкая; чашечка перепончатая, колокольчатая, стебель простой; цвѣтки голубые съ бѣловатою трубкою и зеленоватыми точками въ зѣвѣ . . . . 1) **G. Cruciata L.***

*Цвѣтки по одиночкѣ въ углахъ листьевъ или они по одному или по два верхушечные; зѣвъ вѣнчика голый; стебель простой, нераздѣльный; вѣнчикъ 5-разрѣзный: трубка его струйчатая и точками отмѣчена, нѣсколько разъ длиннѣе отгибка, чашечка на половину 5-разрѣзная; цвѣтки на ножкахъ, индиговаго цвѣта, внутри съ 5-желтоватыми полосками. . . . 2) **G. Pneumonanthe L.***

## III. *Erythraea R. Richard.* Золототысячникъ.

Стебель простой; листья продолговато-овальные съ остроконечіемъ: корневые больше стеблевыхъ; щитокъ пучковатый, съ цвѣтками почти на равной высотѣ: боковые съ двумя прицвѣтниками; трубка вѣнчика вдвое длиннѣе чашечки: лопасти вѣнчика овальны; цвѣтки розовые, иногда только бѣлые. . . 1) **E. Centaurium. Pers.**

## Семейство XXXIX. *Convolvulaceae Juss.* Вьюнковыя.

### I. *Convolvulus L.* Вьюнокъ.

Чашечка 5-раздѣльная; вѣнчикъ большой воронкообразный или колокольчатый, открытый, угло-

вато 5-лопастный съ 5 складками; тычинки прикрѣплены къ основанію вѣнчика; плодникъ свободный, на подплодниковомъ кружкѣ; рыльцевъ 2; коробочка 1—4-гнѣздная; гнѣздышки двусѣмянныя. Вьющіяся травянистыя растенія, съ черешковыми, копьевидными или стрѣловидными листьями, и промежуточными цвѣтками; у послѣднихъ ножки имѣютъ по два супротивные прицвѣтника.

*Прицвѣтники широкіе расположены непосредственно подъ цвѣткомъ, сердцевидные; цвѣтки бѣлые, иногда розовые . . . . . 1) C. Sépium L.*

*Прицвѣтники сидятъ около середины цвѣтной ножки: при томъ малы; цвѣтки бѣлые и розовы. Вьюнокъ полевой . . . . . 2) C. Arvensis L.*

**Семейство: XL. Boragineae Desvaux. Бурачниковыя.**

- |   |                                                                                                                  |                                                                                                                       |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Зѣвъ (верхнее отверстіе вѣнчика) безъ чешуекъ или привѣсокъ, закрывающихъ или суживающихъ его . . . . .          | 2                                                                                                                     |   |
|   |                                                                                                                  | Зѣвъ вѣнчика болѣе или менѣе закрытъ чешуйками или привѣсками . . . . .                                               | 3 |
| 2 | Чашечка не дальше середины 5-разрѣзная зѣвъ съ 5 пучками волосковъ . . . . . <b>Pulmonaria</b> v.                |                                                                                                                       |   |
|   |                                                                                                                  | Чашечка до основанія 5-раздѣльная; зѣвъ съ 5 волосатыми линиями . . . . . <b>Lithospermum</b> vi.                     |   |
| 3 | Зѣвъ, закрытъ 5-ю чешуйками образующими клапаны . . . . .                                                        | 6                                                                                                                     |   |
|   |                                                                                                                  | Чешуйки не образуютъ клапановъ . . . . .                                                                              | 4 |
| 4 | Цвѣтки кисти направлены всѣ въ одну сторону (однобоки); вѣнчикъ воронкообразный . . . . .                        | 5                                                                                                                     |   |
|   |                                                                                                                  | Цвѣтки кисти направлены во всѣ стороны: отгибокъ вѣнчика плоскій, на подобіе тарелки . . . . .                        |   |
| 5 | Кисти съ прицвѣтниками; столбикъ не сросшійся съ плодниками; зѣвъ совершенно закрытый . . . . . <b>Myosotis.</b> |                                                                                                                       |   |
|   |                                                                                                                  | Кисти безъ прицвѣтниковъ; столбикъ сросшійся съ плодниками; зѣвъ не совсѣмъ закрытый . . . . . <b>Anchusa</b> iii.    |   |
|   |                                                                                                                  | Кисти безъ прицвѣтниковъ; столбикъ сросшійся съ плодниками; зѣвъ не совсѣмъ закрытый . . . . . <b>Cynoglossum</b> ii. |   |

- 6 { Вѣнчикъ колесовидный плоскій. Нити тычинокъ 2  
раздѣльные. Клапаны зѣва по краямъ зазубрен-  
ные . . . . . **Borrago** I.  
Клапаны зѣва шиловидно-заостренные, сближаю-  
щіеся между собою и образующіе надъ зѣвомъ  
конусъ . . . . . **Symphytum** IV.

### I. *Borrago* L. Бурачникъ.

Травянистое растеніе, цвѣты синіе, съ волосисты-  
ми жесткими чашечками . 1) **B. Officinalis** L.

### II. *Cynoglossum* L. Чернокорень. Шелкунъ. Собачникъ.

Стебель прямой: листья тонки съ мягкими вклю-  
ченными волосками, сѣроватые, острые; цвѣтки  
красно-фіолетовые, иногда бѣлые, безъ жилокъ.  
1) **C. Officinale** L.

### III. *Anchusa* L. Воловикъ.

Листья ланцетные съ жесткими волосками; при-  
цвѣтники яйцевидно-ланцетные; лопасти ча-  
шечки острыя, равной длины съ прицвѣтниками,  
или короче; волоски вѣтвей, щитка и чашечки  
отстоящіе; цвѣтки фіолетовые, голубые, или  
мяснато цвѣта или бѣлые . 1) **A. Officinalis** L.

### IV. *Symphytum* L. Живокость. Сальникъ. Окопникъ.

Корень веретенный, вѣтвистый: листья спускаю-  
щіеся: нижніе и коренные на короткихъ череш-  
кахъ; верхніе ланцетные; всѣ зубцы отгиба  
вѣнчика отворочены; пыльникъ въ полтора раза



длиннѣе стерженка; цвѣтки фіолетовые, пурпуровые, мяснаго цвѣта или бѣлые. 1) **S. Officinale L.**

### V. *Pulmonaria L.* Лѣгочница. Медуница.

Вѣшніе листья на цвѣтущихъ стебляхъ, сердцевидные и черешковые: черешокъ узкокрылатый; стеблевые листья лопатчатые, верхніе немного снисходящіе; стебель щетинистый, съ немногими желѣзконосными волосками; цвѣтки красноватые, фіолетовые или бѣлые; листья иногда съ зеленовато-бѣлыми пятнами. 1) **P. Officinalis L.**

### VI. *Lithospermum L.* Воробейникъ.

Листья перисто-жилистые; стебель весьма вѣтвистый; орѣшки блестящіе, гладкіе; листья весьма шероховаты, съ прижатыми, на небольшихъ бугоркахъ сидячими волосками; цвѣтки желтовато бѣлые. . . . . 1) **L. Officinale L.**

### Семейство, XLI. *Solaneae Juss.* Пасленовыя.

- |   |   |                                                                                                                                                                          |   |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | { | Вѣничикъ колокольчатый или воронкообразный . . . . .                                                                                                                     | 2 |
|   |   | Вѣничикъ колесовидный или съ очень короткою трубкою. . . . .                                                                                                             | 5 |
| 2 | { | Вѣничикъ воронообразный; съ прямостоящимъ косымъ и 5 разрѣзнымъ отгибкомъ съ неровными лопастями. Плодъ 2-гнѣздная коробочка съ крышечкою . . . . . <b>Hyoscyamus v.</b> |   |
|   |   | Вѣничикъ не съ косымъ отгибкомъ, лопасти его ровныя . . . . .                                                                                                            | 3 |
| 3 | { | Вѣничикъ со складками колокольчатый. Нити тычинокъ при основаніи снабжены волосками, закрывающими зѣвъ вѣничика. Плодъ ягода. <b>Atropa Kon.</b>                         |   |
|   |   | Вѣничикъ безъ складокъ, воронкообразный. Плодъ четырехъ створчатая коробочка. . . . .                                                                                    | 4 |

- Чашечка не опадающая, рыльце цѣльное. **Nicotiana** IV.
- 4 } Только круглое основаніе чашечки не отпадаетъ и сохраняется подъ плодомъ. Рыльце образованное изъ двухъ частей . . . . . **Datura** III.
- Чашечка при зрѣлости плода раздутая, вмѣщающая ягоду. Пыльники разверзающіеся въ длину. Цвѣтныя пожеки одноцвѣтныя. . . . **Physalis** I.
- 5 } Чашечка неизмѣняющая своей формы при зрѣлости плода. Пыльники образуютъ своимъ сближеніемъ трубку, черезъ которую идетъ столбикъ, разверзаются двумя отверстіями при вершинѣ. **Solanum** VI.

### I. **Physalis** L. Жидовская вишня.

Стебель травянистый, вѣтвистый 1) **Ph. Alkekengi** L.

### II. **Atropa** L. Сонная одурь.

Стебель травянистый, листья яйцевидные съ цѣльнымъ краемъ. . . . . **A. Belladonna** L.

### III. **Datura** L. Дурманъ.

Коробочный плодъ съ шипами. Листья голые, зубчатые. . . . . 1) **D. Stramonium** L.

### IV, **Nicotiana** L. Табакъ.

Листья заостренные. Цвѣты красные. 1) **N. Tabacum** L.  
Листья тупые. Цвѣты желтозеленые. 2) **N. Rustica** L.

## V. *Hyoscyamus* L. Бѣлена.

Нижніе листья черешковые; верхніе полуобъемные. Цвѣты на очень короткихъ ножкахъ. 1) **H. Niger.**

## VI. *Solanum* L. Пасленъ. Цинна.

*Стебель деревянистый, цилиндрической; цвѣтки фиолетовые, съ бѣловатыми краями и съ двумя зелеными пятнами при основаніи лопастей вѣнчика; листья яйцевидные и сердцевидные, верхніе копьевидные. . . . 1) S. Dulcamara L.*  
*Стебель травянистый: вѣтви сжатые; цвѣтки бѣлые съ желтыми пыльниками; листья яйцевидные, почти треугольные, выемчато-зубчатые; равно какъ и стебель волосатые. 2) S. Nigrum L.*

## Семейство XLII. *Verbasceae* Bartl. Корвяковыя.

{ Тычинокъ 5; листья поперебнныя. **Verbasum** I.  
{ Тычинокъ 4; листья супротивныя. **Scrophularia** II.

## I. *Verbasum* L. Корвякъ. Вербинникъ.

*Цвѣтная ножка нѣсколько разъ короче чашечки: каждый листъ спускается до другаго; стерженки желтовато бѣлые; цвѣтки почти сидячіе, желтые.*

1) **V. Thapsus** L.

*Цвѣтная ножка 1—1½ длиннѣе чашечки: листья не спускаются, стерженки всѣ почти равной длины; пурпурово-фіолетовые, косматые. 2) **V. Nigrum** L.*

## II. Scrophularia. L. Норичникъ.

Листья яйцевидные, продолговатые, отчасти сердцевидные, голые, двупильчатые; стебель съ острыми гранями; черешки некрылатые; лопасти чашечки яйцевидныя, тупыя, съ узкими перепончатыми краями; корень узловатый; цвѣтки нечисто желтовато-зеленые, снаружи съ буроватыми отгѣнками: верхняя губа пурпуроваго цвѣта . . . . . 1) **S. nodosa L.**

## Сем. XLIII. Antirrhineae Juss. Жабреевыя.

- Вѣнчикъ съ 4-раздѣльнымъ или лопастнымъ отгибомъ. Тычинокъ 2. . . . . **Veronica** II.
- Вѣнчикъ двугубый. Тычинокъ 2 . . . . **Gratiola** I.

## I. Gratiola L. Авранъ.

Листья сидячіе, супротивныя, ланцетныя, трижильныя, тонко-пильчатые, при основаніи цѣльныя; цвѣтная ножка многоцвѣтная; стебель 4-гранный, голый; корень ползучій, колѣнчатый; трубка вѣнчика желтоватая, отгибокъ красновато-бѣлый . . . . . **G. Officialis L.**

## II. Veronica L. Вероника.

- 1 *Кисти или одинокія цвѣтныя ножки, въ углахъ листьевъ . . . . . 7*
- 1 *Кистью оканчивается стебель: кромѣ этой верхушечной кисти, въ углахъ листьевъ находятся боковыя, или послѣднихъ нѣтъ. . . . . 2*
- 2 *Трубочка вѣнчика длиннѣ поперечнаго ея разрыва; прицвѣтники малые, не похожи на остальные листья . . . . . 3*
- 2 *Трубочка вѣнчика очень коротка; нижніе прицвѣтники похожи на остальные листья . . . . . 4*

- Листья до конца и до основанія пальчатые съ острыми зубцами; коробочка пухлая, кругловатая, при концѣ выемчатая; листья иногда по 3 или 4 въ кольцо; стебель прямой; цвѣтки свѣтло-голубые, иногда немного красноватые . 1) **V. Longifolia L.**
- 3 Листья при концѣ и при основаніи цѣльные: зубцы ихъ тупые (листья озубренно-пильчатые); коробочка кругловатая, при концѣ выемчатая, пухлая; стебель восходящій; цвѣтки бѣлые, голубые, иногда, но рѣдко розовые. *Вероника Андрѣевская, колосовидная* . . . . . 2) **V. Spicata L.**
- 4 Средніе и высшіе стеблевые листья пальчато-раздѣльные, или перисто-раздѣльные; стебель съ желѣзистыми волосками . . . . . 5
- Листья озубренные, пильчатые или совершенно цѣльные; стебель пушистый безъ желѣзистыхъ волосковъ . . . . . 6
- Цвѣтныя ножки короче чашечки; вѣнчикъ не длиннѣе половины чашечки; листья почти сидячіи, нижніе не раздѣльные, средніе перисто-разрѣзные или трираздѣльные, верхніе ланцето-линейны, цѣльные; коробочка при концѣ подѣ прямымъ угломъ выемчатая, рѣснистая, сжатая; стебель и вѣтви могоцвѣтны, кистеобразны или колосовидны; цвѣтки голубоватые съ темными жилками. *Вероника весенняя*. 3) **V. Verna L.**
- 5 Цвѣтныя ножки равной длины съ чашечкою или длиннѣе; вѣнчикъ почти равной длины съ чашечкою; листья, по крайней мѣрѣ нижніе, черешковые, разрѣзные, пальчатые или трилопастные: верхніе сидячіе, 3—5-пальчато-раздѣльные; коробочка немного выемчатая подѣ острымъ угломъ; стебель и вѣтви съ многими, кистеобразными, не тѣсно сидящими цвѣтками; цвѣтки темно-синіе. *Вероника трилистная*. . . . . **V. Triphyllus L.**

- Листья пушистые*: нижние сердцевидные, яйцевидные, озубренные, на коротких черешках, тупые; верхние ланцетные, совершенно пильные; ножка зрѣлаго плода прямо стоячая, короче чашечки; коробочка сжатая, выемчата под острым углом; стебель и вѣтви съ многими в кисти собранными, не тѣсно сидячими цвѣтками: кисть удлинненная, съ листьями; цвѣтки светло голубые съ темными жилками, короче чашечки; сѣмя плоское, щитообразное. *Вероника левая* . . . . . 4) **V. Arvensis L.**
- 6) *Листья голые*, яйцевидные или продолговатые, не много озубренные: нижние меньше другихъ, почти круглые, верхние ланцетные, совершенно пильные; ножка зрѣлаго плода почти одинаковой длины съ чашечкою; цвѣтки бѣловатые съ голубыми жилками, не тѣсно сидячіе въ кистяхъ; кисть сначала продолговатая, а потомъ значительно удлинена; коробочка сжатая: поперечный разрѣзъ длиннѣе продольнаго: выемка не глубокая. *Вероника богородичная*. . . . . 5) **V. Serpyllifolia L.**
- 7) *Одинокіе цвѣтки на длинныхъ ножкахъ*, выходящихъ изъ угловъ листьевъ; ножка почти одинаковой длины съ листомъ, изъ угла котораго выходитъ; при зрѣлости она отогнута . . . . . 8
- Цвѣтки въ промежуточныхъ кистяхъ* . . . . . 10
- 8) *Листья пальчато-раздѣльные*. См. **V. Friphyllus L.**
- Листья нераздѣльные, зубчатые или озубренные*. . . . . 9
- Тычинки прикреплены къ нижнему краю трубочки вѣнчика*; цвѣтки молочнаго цвѣта съ синими жилками: верхнія лопасти съ голубыми или мяснаго цвѣта жилками; листья яйцевидные, почти сердцевидные, пальчато-зубристые, желтоватые; коробочка съ 4—5 сѣменами. *Вероника пашенная* . . . . . 6) **V. Agrestis L.**
- 9) *Тычинки прикрепленные къ звѣу*, т. е. къ верхнему краю трубочки вѣнчика; вѣнчикъ синеватый; листья кругло-яйцевидные, почти сердцевидные, пальчато-озубренные. *Вероника темная*. . . . . 7) **V. Opaca Fries.**

10 { Чашечка 5-раздѣльная: 5-ялопасть меньше другихъ, имѣеть видъ зубца; стебель шероховатый, восходящій; всѣ листья сидячіе и съ болѣе или мене сердцевиднымъ основаніемъ, яйцевидные и пильчатые, или продолговатые, тупо-врѣзанные; иногда перисто-разрѣзные; ножка зрѣлаго плода прямостоячая, цвѣтки голубые съ темными жилками; трубочка внутри закрыта волосками. *Вероника широколистная* . . . . . 8) **V. Latifolia L.**  
Чашечка 4-раздѣльная . . . . . 11

11 { Листья линейные или ланцетно-линейные, т. е. длина ихъ превышаетъ въ 4—8 разъ ширину, сидячіе, тонко и обратно-зубчаты, одножилкостные и безъ боковыхъ жилокъ; ножка зрѣлаго плода отстоящая отъ оси: кисти попеременноныя; цвѣты свѣтло-голубые, съ голубыми жилками. *Вероника щитовая* . . . . . 9) **V. Scutellata L.**

Листья, длина которыхъ превышаетъ только 2—3 раза ширину . . . . . 12

12 { Стебель и остальные части растенія совершенно голы. . . . . 3

Стебель и остальные части растенія болѣе или мене волосаты . . . . . 14

13 { Листья на короткихъ черешкахъ, тупые, озубренно-пильчатые, эллиптическіе; ножка зрѣлаго плода отстоящая отъ оси; кисти супротивныя; стебель лежачій, сочный, совершенно круглый, съ пучками корней; цвѣтки голубые съ темными жилками. . . . . 10) **V. Beccabunga L.**

Листья сидячіе, острые, плоско-пильчатые или цѣльные; ножка зрѣлаго плода отстоящая отъ оси; кисти супротивныя; стебель прямой, довольно толстый, съ пучками корней; цвѣтки блѣдно-голубые или розовые съ темными жилками. *Вероника водяная* . . . . . 11) **V. Anagallis L.**

- 14 } *Волоски расположены вдоль стебля въ двухъ супротивныхъ рядахъ; листья супротивные: нижніе на короткихъ черешкахъ, верхніе сидячіе, грубопильчатые и морщиноватые: зубцы тупые: нижніе листья меньше другихъ; колосъ съ многими, не тѣсно сидячими цвѣтками: послѣдніе большіе, голубые съ темными жилками. Вероника дубровочная. . . . . 12) V. Chamaedrys L.*
- Волоски сидячіе равномерно на стеблѣ, не въ двухъ рядахъ; листья лопатчато-ланцетны, приоснованіи цѣльные, по бокамъ неравные, пильчатые съ острыми зубцами; цвѣтки блѣдно-голубые съ желтыми жилками . . . 13) V. Officinalis L.*

## Сем. XLIV. Orobanchaeae Juss. Заразиховыя.

### *Lathraea* L. Чешуйникъ. Потаеница. Тайникъ.

Чашечка колокольчатая, немного сжатая, 4-разрѣзная; вѣнчикъ съ цѣльнымъ основаніемъ опадающій, зѣвообразный, съ цилиндрическою трубкою, которая при основаніи немного дугобразно выгнута: верхняя губа тупа, нижняя короче, триразрѣзная, отогнута внизъ: средняя ее лапастъ выемчата; пыльники двулопастные; плодникъ яйцевидный, сжатый, спереди съ свободною желѣзкою; столбикъ нитчатый; рыльце толстое, круглое, почти двулопастное; коробочка одноклѣвчатая, многосемянная, двустворчатая съ противоположными сѣмяносцами. Стебель простой безлиственный, покрытый чешуйками: цвѣтки въ длинныхъ кистяхъ односторонне, тѣсно сидячіе, на короткихъ висячихъ ножкахъ, бѣлые, немного окрашенные розовымъ цвѣтомъ; прицвѣтники кругловатые, двойные, настельные; корневище вѣтвистое, съ супротивными мясистыми, сердцевидными, весьма тупыми чешуйками. . . . . 1) L. Squamaria L.



Семейство. XLV. *Rhinanthaceae* D. C. Цытушниковыя.

*Euphrasia* L. Очанка. Очки павлюновы. Очная трава, Очная помощь, Свѣтъ очей. Свѣтильникъ. Глазница.

Чашечка трубчатая или колокольчатая, 4-зубчатая или 4-разрѣзная; вѣничикъ зѣвообразный съ цилиндрическою, немного сжатою трубкою: верхняя губа выгнута и немного сжатая, усѣченная или выемчатая; нижняя губа триразрѣзная почти съ равными лопастями; тычинки прирѣплены къ трубочкѣ и стоятъ подъ верхнею губою; плодникъ многосѣмянный; столбикъ длинный, нитчатый; рыльца круглыя; коробочка сжатая; тупая, цѣльная или выемчатая съ небольшимъ остроковечіемъ; сѣмена съ некрылатыми ребрышками. Травянистое растеніе съ супротивными, иногда, но рѣдко, попеременными листьями, обыкновенно сидячими, отъ яйцевидныхъ до линейныхъ формъ; притомъ они на краяхъ пальчаты или даже цѣльны; цвѣтки промежуточные, расположены въ колосьяхъ. *Цвѣтки большыя или синеватыя*: нижняя губа съ желтыми пятнами, верхняя съ фіолетовыми линиями; пыльники фіолетовыя; листья яйцевидныя, на каждомъ краѣ обыкновенно съ 5 зубцами, пальчато-жилистыя; верхняя губа вѣничика двулопастная, съ отстоящими другъ отъ друга лопастями: лопасти съ 2—3 короткими зубцами.

1) **E. Officinalis** L.

Семейство XLVI. *Labiatae* Juss. Губоцвѣтныя.

1	}	Тычинокъ 2. . . . .	2
		Тычинокъ 4. . . . .	3
2	}	Вѣничикъ почти правильный, трубчатый, 4-раздѣльный, широкая лопасть выемчатая. <b>Lycopus</b>	
		Вѣничикъ зѣвообразный, чашечка двугубая. <b>Salvia</b> .	

	Тычинки и столбикъ замкнуты въ трубкѣ вѣнчика.	4
3	Тычинки и столбикъ, по крайней мѣрѣ послѣдній выдаются изъ зѣва вѣнчика. . . . .	6
4	Чашечка вверху имѣетъ придатокъ. <b>Lavandula.</b>	
	Чашечка придатка или крышечки не имѣетъ . . . . .	5
5	Вѣнчикъ зѣвообразный. Чашечка 2-губая; верхняя губа вѣнчика нераздѣльная. . . . <b>Sideritis.</b>	
	Чашечка трубчатая, 6 или 10-зубчатая, 2-губая. Верхняя губа вѣнчика двураздѣльная. <b>Marrubium.</b>	
6	Чашечка двугубая, т. е. съ каждой стороны чашечки одна вырѣзка продолжается ниже другихъ: или нѣкоторыя лопасти чашечки отдѣляются такъ отъ другихъ, что образуется двѣ губы: . . . . .	7
	Лопастиили зубцы чашечки не образуютъ двѣ губы.	15
7	Верхняя губа чашечки нераздѣльная. . . . .	8
	Верхняя губа чашечки 2—3-зубчатая, нижняя двузубчатая или двуразрѣзная . . . . .	9
8	Нижняя губа чашечки нераздѣльная; верхняя губа вѣнчика 3-раздѣльная, а нижняя нераздѣльна. <b>Scutellaria.</b>	
	Нижняя губа чашечки 2 или 4-зубчатая; верхняя губа вѣнчика двуразрѣзная, а нижняя триразрѣзная . . . . . <b>Dracoscephalum.</b>	
9	Чашечки зѣвъ небородастый . . . . .	01
	Чашечки зѣвъ бородастый . . . . .	11
10	Верхняя губа вѣнчика нераздѣльная . <b>Prunella</b>	
	Верхняя губа вѣнчика двуразрѣзная. <b>Glechoma</b> или <b>Nepeta</b> . . . . .	27
11	Длиныя двѣ тычинки при своемъ концѣ отогнуты другъ отъ друга . . . . .	12
	Всѣ тычинки при своемъ концѣ сближены съ своими пыльниками . . . . .	14
12	Средняя лопасть нижней губы очень широка обратнo сердцевидная. Чашечка 5-зубчатая не двугубая. . . . . <b>Hyssopus.</b>	
	Лопастии нижней губы почти равныя . . . . .	13
13	Чашечки окружены прицвѣтниками, почти правильно 5-зубчатые . . . . . <b>Origanum.</b>	
	Чашечки не покрытыя прицвѣтниками, двугубыя. <b>Thymus.</b>	

- Чашечка двугубая; верхняя губа плоская, боковыя зубчики ея закручены. . . . **Melissa.**
- 14 Чашечка двугубая, трубчатая, цилиндрическая съ волосистымъ звѣномъ, кольцо состоящее изъ отдѣльныхъ цвѣтковъ, окружено оберткою изъ щетиннообразныхъ листочковъ . **Clinopodium.**
- 15 Вѣнчикъ не ясно двугубый. . . . , . . . . 16
- 15 Вѣнчикъ ясно двугубый или почти правильный . . 17
- 16 Верхней губы вѣнчика нѣтъ; вмѣсто ея разрѣзъ изъ котораго выдаются тычинки. **Teucrium.**
- 16 Верхняя губа очень мала, выемчатая. Трубка вѣнчика внутри съ волосками . . . . **Ajuga.**
- 17 Нижняя часть трубочки вѣнчика внутри съ поперечною волосатою линією, или поперечкою, неравно зубчатою перепонкою; снаружи она на этомъ мѣстѣ обыкновенно зашнурована . . . 18
- 17 Трубочка вѣнчика безъ такой линіи или перепонки 22
- 8 Нижняя губа вѣнчика двулопастная съ двумя зубчиками на нижней сторонѣ. . . . **Lamium.**
- 8 Нижняя губа трилопастная или цѣльная . . . 19
- 19 Лопастн нижней губы или острия, или края каждой лопасти завитые внутрь и потому кажутся острыми . . . . . 21
- 19 Лопастн нижней губы тупыя или даже выемчатая. 20
- 20 Двѣ тычинки съ каждой стороны при концѣ своемъ выгнуты дугою къ наружи. . . . **Stachys.**
- 20 Тычинки параллельныя, . . . . : . . . **Ballota.**
- 21 (Цвѣтки бѣловатые или розовые); лопасти нижней губы вѣнчика кажутся острыми, потому что ихъ края завиты внутрь. . . . **Leonurus.**
- 21 (Цвѣтки желтые); лопасти нижней губы вѣнчика острия. . . . ; . . . **Galeobdolon.**
- 22 Вѣнчикъ воронкообразный: отгибокъ 4-разрѣзанный съ почти равными лопастями. . . . **Mentha.**
- 22 Вѣнчикъ зѣвообразный, т. е. раздѣляется на двѣ губы непохожія другъ на друга, . . . . 23
- 23 Нижняя губа съ двумя большими бугорками, внизу пустыми. . . . . **Galeopsis.**
- 23 Нижняя губа безъ такихъ бугорковъ. : . . . 24

- |    |   |                                                                                                                                                           |    |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 24 | } | Звѣвъ чашечки очевидно бородастый; лопасти нижней губы вѣнчика почти равныя . <b>Origanum.</b>                                                            | 25 |
|    |   | Звѣвъ чашечки не бородастый, иногда только что съ немногими и отдѣльными волосами; лопасти нижней губки вѣнчика очевидно неравныя . . .                   |    |
| 25 | } | Верхняя губа вѣнчика цѣльная или немного только выемчатая. . . . .                                                                                        | 26 |
|    |   | Верхняя губа вѣнчика двуразрѣзная. . . . .                                                                                                                |    |
| 26 | } | Нижняя губа вѣнчика 2 или 4 разрѣзная. <b>Lanium.</b>                                                                                                     | 27 |
|    |   | Нижняя губа вѣнчика 3-разрѣзная . <b>Betonica.</b><br>(Цвѣтки фиолетовые); стебель лежачій; два пыльника вблизи лежачіе, образуютъ крестъ <b>Glechoma</b> |    |
| 27 | } | (Цвѣтки бѣлые); стебель прямой; такой формы креста нѣтъ . . . . . <b>Nepeta</b>                                                                           |    |

### I. *Mentha L.* Мята.

- Листья сидячіе*, исключая иногда нижнихъ, которые на весьма короткихъ черешкахъ; цвѣтки малые фиолетовые; или лиловые. 1) **M. Sylvestris L.**
- Листья очевидно черешковые зубцы; чашечки съ широкимъ основаніемъ и длинно-заостренныя: длина ихъ превышаетъ значительно ширину; цвѣтки блѣдно-красные и лиловые* 2) **M. Aquatica L.**

### II. *Lycopus L.* Волконогоъ.

Листья черешковые, яйцевидно-продолговатые, грубо-разрѣзные или зубчатые, съ тонкими волосами; цвѣтки бѣлые, внутри пурпуровыми крапинками отмѣчены; зерновки короче чашечки  
1) **L. Europaeus L.**

### III. *Origanum L.* Душица.

Прицвѣтники на внутренней сторонѣ безъ желѣзокъ; листья яйцевидные, цвѣтки красноватые,

иногда бѣлые, на короткихъ ножкахъ, расположены въ 4-рядные, длинные колосья. 1) **O. Vulgare L.**

#### IV. *Thymus L.* Тиміанъ.

Листья линейные, тупые, съ короткими черешками, плоскіе. голые или волосатые, на заднемъ краѣ рѣснитые, похожи на прицвѣтники; верхняя губа вѣичика яйцевидная, почти 4-угольная; цвѣтки красные или бѣлые. 1) **Th. Serpyllum L.**

#### V. *Clinopodium L.* Постельница. Базилка. Падушка.

Корень ползучій; стебель прямой, косматый; листья яйцевидные, тупые, спереди тупо-пильчатые; прицвѣтники обвѣтки рѣснитые, равной длины съ чашечкою; цвѣтки красные или бѣлые .  
**C. Vulgare L.**

#### VI. *Nepeta L.* Котовикъ.

Листья яйцевидные, острые, глубоко озубренные, пильчатые, при основаніи сердцевидные и на нижней сторонѣ сѣро-всклоченные; тычинки фиолетовыя немного длиннѣе верхней губы; зерновки гладкія и голыя; цвѣтки бѣлые: нижняя губа отмѣчена красными точками; запахъ лимонный.  
1) **N. Cataria L.**

#### VII. *Glechoma L.* Гудра. Будра.

Кольцо съ 6 цвѣтками; чашечные зубцы яйцевидные, удлиненные съ длиннымъ жесткимъ острие-

емъ, въ трое короче чашечки; пыльники бѣлы;  
цвѣтки синіе . . . . 1) **G. Hederacea** L.

### VIII. *Lamium* L. Яснотка, Пчелососка.

*Трубка вѣнчика изогнута: цвѣтки бѣлые; вѣнчикъ зашнурованный, съ колымъ волосатымъ кольцомъ; листья заостренные, неравно-пильчатые, похожіе на листья крапивы; верхняя губа вѣнчика усѣчена, нижняя желтоватая съ зеленоватыми оттѣнками; пыльники черноватые; цвѣтная пыль желтая; цвѣтныя кольца обыкновенно съ 20 цвѣтками; стебель восходящій . . . .*  
1) **L. Album** L.

### IX. *Galeobdolon*. Hud.

Нижняя губа вѣнчика плоско-триразрѣзная, съ острыми лопастями; трубочка вѣнчика зашнурована и внутри съ волосатымъ кольцомъ; щитки промежуточные, сидячіе съ 3—5 цвѣтами-остальное какъ у *Lamium*. Стебель прямой, при основаніи съ отпрысками; корень ползучій; листья отпрысковъ широко яйцевидные, съ длинными черешками, озубренно-зубчатые, стеблевые на черешкахъ, сердцевидные и отъ яйцевидной до ланцетной формы, отдаленно-пильчатые, иногда на верху съ бѣлыми пятнами; цвѣтки желтые, какъ яичный желтокъ, обыкновенно по 6 въ кольцахъ. *Желтая крапива* . . . . 1) **G. uteum** Hudson D.

### X. *Galeopsis* L. Питульникъ. Курятникъ.

*Вѣнчики светло-фіолетовые или бѣлые, трубка вѣнчика почти вдвое длиннѣе чашечки; стебель подъ листьями непухлый: листья узко-ланцетные съ 3—8 зубцами съ каждой стороны, верхніе иногда дѣльные; цвѣтныя кольца всѣ отдалены другъ отъ друга; верхняя губа немного зубча-*

тая нижняя губа съ желтоватымъ пятномъ и красноватыми жилками при основаніи . . . . .

1) **G. Ladanum L.**

### XI. *Stachys L.* Колосница.

1) *Вѣнчикъ желто-бѣлый.* Нижніе листья черешковая, кольца съ 4—6 цвѣтками. Зубцы чашечки съ острейми. Верхняя губа завитая . . . . .

1) **St. annua L.**

*Вѣнчикъ красный или красноватый* . . . . . 2

2) *Кольца съ 6 цвѣтками; вѣнчикъ много длиннѣе чашечки. Листья заостренные. Стебель съ конечнымъ колоскомъ; Запахъ всего растенія противный* . . . . . 2) **St. Sylvatica L.**

*Кольца съ большимъ числомъ (чѣмъ 6) цвѣтковъ; все растеніе покрыто бѣлымъ пухомъ, безъ железъ. Листья яйцевидно-ланцето-видные.* 3) **St. Germanica L.**

### XII. *Ballota L.* Кудреникъ.

Зубцы чашечки яйцевидно-ланцетные съ длинными острейми.  $\frac{1}{3}$  длины трубочки; во время зрѣлости все растеніе фиолетово-черное; цвѣтки блѣдно-розовые; нижняя губа съ бѣлыми жилками. . . . . 1) **B. Nigra L.**

### XIII. *Betonica.* Буковица. Гаспикъ.

Листья яйцевидныя или продолговатыя съ сердцевиднымъ основаніемъ, съ жесткими волосками; чашечка безжилистая; вѣнчикъ съ снаружи пушистый; верхняя губа яйцевидная, дѣльная, озубренная или выемчатая, въ послѣдствіи отворочена; тычинки короче половины верхней губы; стебель голый или волосистый; цвѣтки красныя.

1) **B. Officinalis L.**

**XIV. *Leopigius* L. Львинохвость. Пустырникъ.**

Нижніе листья пальчато 5-разрѣзные или разрѣзно-зубчатые, верхніе три лопастные или цѣльные, при основаніи клиновидные; всѣ шерстисто-всклоченные, внизу сѣрые; чашечка голая; вѣнчикъ пушистый, съ бѣлою трубкою и розовымъ отгибкомъ: вишняя губа съ большимъ желтымъ и малымъ пурпуровымъ пятномъ. 1) *L. Cardiaca* L.

**XV. *Scutellaria* L. Шлемовникъ. Шишакъ.**

Листья съ сердцевиднымъ основаніемъ, продолговато-ланцетные, озубренно-пильчатые: зубы отдаленные: цвѣтки парные; чашечки голыя; трубка вѣнчика при основаніи отворочена почти подъ прямымъ угломъ, нѣсколько разъ длиннѣе чашечки. . . . . 1) *S. Galericulata* L.

**XVI. *Lavandula* L. Лавандула.**

Листья линейно-ланцетовидныя. . 1) *L. Spica* L.

**XVII. *Salvia* L. Шалфей.**

Цвѣтки синія; листья яйцевидно-ланцетовидные, черешковые. . . . . 1) *S. officinalis* L.

**XVIII. *L. Hyssopus* Исопъ.**

Листья цвѣтовъ однобокія. . 1) *H. officinalis* L.

**XIX. *Marrubium* L. Шандра.**

Чашечка съ 10 крючковидными (съ середины), голыми зубцами. Листья пушистые. 1) *M. vulgare* L.



### XX. *Mellissa* L. Мелисса.

Болыца двураздѣльные; цвѣтные ножки простыя.

1) **M. officinalis** L.

### XXI. *Teucrium*. Дубровка.

{ Листья при основаніи суживающіяся въ черешокъ,  
 клиновидные; цвѣты въ углахъ листьевъ или  
 мутовкахъ . . . . . 1) **T. Chamaedrys** L.  
 { Листья сидячіе, нижнія при основаніи округлен-  
 ные, покрыты мягкими короткими волосками.  
 2) **T. Scordium** L.

### XXII. *Ajuga* L. Живучка. Одноубка.

Листья яйцевидные или обратно-яйцевидные, не-  
много озубренные или цѣлые, почти голые, рав-  
но какъ и стебель; послѣдній прямой съ ползу-  
чими отпрысками; каждое цвѣтное кольцо съ  
многими цвѣтками; цвѣтки сидятъ въ углахъ  
даже почти самыхъ нижнихъ листьевъ, синіе,  
иногда лиловые или бѣлые . . . 1) **A. reptans** L.

### XXIII. *Dracoserbolum* L. Драконоголовъ:

Листья линейно-ланцетовидные; цвѣтныя кольца  
образуютъ колосья . . . 1) **Dr. Moldavica** L.

### Сем. XLVII. *Primulaceae* Vent. Первоцвѣтковые.

{ Чашечка 5—6-раздѣльная, разрѣзная или зубча-  
 тая. Вѣнчикъ почти безъ трубочки; (съ цѣль-  
 ными листьями) . . . . . 3  
 1) { Вѣнчикъ съ ясною трубочкою; (стебель или съ греб-  
 невидно-перистыми листьями или безъ листьевъ;  
 въ послѣднемъ случаѣ листья въ розеткѣ при  
 основаніи стебля). Чашечка 5—6-раздѣльная,  
 разрѣзная или зубчатая. . . . . 2

- 2 { Трубочка вѣнчика при зѣвѣ зашнурована, слѣд. яйцевидная; (цвѣты бѣлые) . . . **Androsace**.  
Трубочка вѣнчика при зѣвѣ не зашнурована, сл. цилиндрическая; (цвѣты желтые или фиолетовые) . . . . . **Primula**.
- 3 { Коробочка разверзающаяся, по окружности (съ крышечкою) цвѣты красные или синіе. . **Anagallis**.  
Коробочка разверзающаяся на вершинѣ 5—10-зубчиками. Цвѣты желтыя . . **Lysimachia**.

### I. *Anagallis* L. Куроедльвь.

- Цвѣты красныя. Коробочка почти равная чашечкѣ.  
1) **A. Phoenicea** Lam.  
Цвѣты синія. Коробочка короче чашечки. Листочки чашечки заостренные. 2) **A. Coerulea** Schreb.

### II. *Lisimachia* L. Вербейникъ.

- 1 { *Стебель лежачій, ползучій; цвѣтки по одиночкѣ на каждой цвѣтной ножкѣ: послѣднія по одной изъ угловъ листьевъ и короче ихъ; листья супротивные, сердцевидны и почти круглы. 1) L. Nummularia* L.  
*Между лопастями вѣнчика нѣтъ зубчиковъ: цвѣтки не тѣсно сидячіе въ верхушечной метелкѣ стебель прямой; листья супротивные или въ кольцахъ, продолговато-латцетные или яйцевидные, на нижней сторонѣ почти косматы. . 2) L. Vulgaris* L.

### III. *Primula* L. Первоцвѣтъ. Первника. Скороснѣлка,

*Цвѣты золотисто-желтыя, зонтикомъ, листья на нижней сторонѣ бѣлые; чашечка съ острыми*

гранями, почти одинаковой длины съ трубкою  
вѣнчика . . . 1) **P. Officinalis Encycl (Primula  
veris L).**

**D. Monochlamydeae. одночлотовыя.**

**Сем. XLVIII. Chenopodeae Vent. Маревыя.**

- |   |   |                                                                                                                                                                                                    |    |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | } | Лопастн цвѣтнаго покрыва на спинѣ съ попереч-<br>ною привѣскою, (листья почти цилиндрическіе;<br>мясистые) . . . . . <b>Salsola L.</b>                                                             | 1. |
|   |   | Такой привѣски нѣтъ; (листья плоскіе, не мя-<br>систые) . . . . .                                                                                                                                  | 2  |
| 2 | } | Кромѣ цвѣтныхъ покрывовъ, снабженныхъ ты-<br>чинками и столбикомъ или только тычинками,<br>еще есть двураздѣльные цвѣтные покрывы, за-<br>ключающіе по 1 столбику и плоднику . <b>Atriplex IV.</b> |    |
|   |   | Каждый цвѣтной покровъ имѣеть тычинки, стол-<br>бикъ и плодникъ . . . <b>Chenopodium</b> и <b>Blitum III.</b>                                                                                      |    |

**I. Salsola. L. Солянка.**

Вся поверхность растенія съ короткими, толстыми  
волосками; стебель лежачій, весьма вѣтвистый:  
вѣтви распяленные, жесткія; листья наверху съ  
жолобкомъ и заостренные съ шипомъ; кожа пло-  
да хрящеватая, безжилная. . . 1) **S. Kali L.**

**II. Chenopodium L. Марь. Гусиная лапка.**

- |   |   |                                                                                                                                                                                               |   |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | } | Все растеніе покрыто железистыми клейкими во-<br>лосками. Листья продолговатые, тупо-зубчатые;<br>находящіяся между цвѣтками листья съ цѣль-<br>нымъ краемъ . . . . . 1) <b>Ch. Botrys L.</b> |   |
|   |   | Все растеніе гладкое, голое . . . . .                                                                                                                                                         | 2 |

- 2 } Листья треугольные, края неозубренные. Сѣмяна гладкіе, вертикально стоящія. . . . .  
           2) **Ch. Bonus Henricus L.**
- 3 } Листья сильно озубренные . . . . . 3  
       Боковыя цвѣтки 3-раздѣльные. Сѣмяна вертикально стоящія. Старыя растенія красноватаго цвѣта.  
           3) **Ch. rubrum L.**
- 3 } Сѣмяна горизонтально стоящія. Всѣ цвѣты пяти-раздѣльные. Листья съ 5—9 (не болѣе) острыми зубцами, при основаніи сердцевидные . . .  
           4) **Ch. hybridum L.**

### III. *Blitum*. Жинда.

- 1 } Верхніе цвѣтки образуютъ колосья . . . . .  
           1) **Bl. Capitatum L.**
- 1 } Верхніе цвѣтки въ углахъ листьевъ . . . . .  
           2) **Bl. Virgatum L.**

### IV. *Atriplex* L. Лебеда.

- 1 } *Зубцы своими кончиками направлены къ концу листа; нижніе листья ланцетно-копьевидные или яйцевидно-ланцетные и почти копьевидные, верхніе линейные, дѣльные: всѣ на обѣихъ сторонахъ равнаго цвѣта; цвѣтки расположены въ жесткіе, верхушечные и промежуточные колосья съ прицвѣтниками. Лебеда распростертая . . .*  
           1) **A. Patula L.**
- 1 } *Зубцы прямо отстоящіе отъ листа; нижніе листья треугольные, копьевидные: лопасти цвѣтнаго покрова въ состояніи зрѣлости сердцевидны, треугольны, выемчато зубчаты съ шилообразными зубцами. Лебеда копьевидная . . . . .*  
           2) **A. Hastata L.**

Семейство XLIX. Polygonaceae Juss. Гречишныя.

- Цвѣтной покровъ 6-раздѣльный съ 3 вѣшними и 3 внутренними лопастями; тычинокъ 6. **Rumex**. 1.  
 Цвѣтокъ 4—5-разрѣзанный или-раздѣльный; тычинокъ отъ 5—8. . . . . **Polygonum**. 2.

I. **Rumex** L. Щавель. Кислица.

1 { *Пластинка листа при основаніи уже или округленая или сердцевидная; столбикъ свободный; цвѣтки обыкновенно обоюбогаго пола или смѣшанные* . . . . . 2

{ *Пластинка листа при основаніи копьевидная или стрѣльчатая; цвѣты двудомные* . . . . . 4

2 { *Цвѣтныя кольца, даже и самыя верхнія съ прицветниками, верхнія сближены; листья линейно-ланцетные суживаются въ черешокъ.* . . . . . 1) **R. Maritimus** L.

{ *Цвѣтныя кольца безъ прицветниковъ, по крайней мѣрѣ верхнія; при основаніи отдѣльныхъ колосковъ иногда находится листь* . . . . . 3

3 { *Внутреннія лопасти цвѣтнаго покрова, въ зрѣломъ состояніи, съ яйцевидною и острою мозолью, яйцевидно-треугольныя, при основаніи зубчатая, съ продолговатымъ, тупымъ, цѣльнымъ кончикомъ; нижніе листья тупые, сердцевидные, средніе яйцевидно-ланцетные, острые, верхніе линейно-ланцетные; влагалища листьевъ бурья, перепончатая по краямъ разорванныя; стебель прямой до 3 футовъ вышины, глубоко-полосатый, щетинистый, равно какъ и черешки: иногда стебель голъ; цвѣтныя колосья на верху безъ прицвѣтниковъ* . . . . . 2) **R. Obtusifolium** L.

3 } *Внутреннія лопасти цвѣтнаго покрова постоянно безъ мозолей, сердцевидныя, цѣльныя или немного только зубчатая, безъ продолговатаго кончика, нижніе листья сердцевидныя, острые; верхніе сердцевидно-ланцентныя, самыя высшіе ланцентныя, острые: всѣ на нижней сторонѣ свѣтлѣе; черешки на верху плоскіе съ узкимъ жолобкомъ; стебель до 6 футовъ вышины, съ гранями, бороздчатый, голый; цвѣтныя колосья безъ прицвѣтничковъ . . . . . 3) **R. Aquaticus L.***

4 } *Внѣшнія лопасти цвѣтнаго покрова отворочены; лопасти при основаніи листа имѣютъ направленіе почти параллельное съ черешкомъ, внутреннія лопасти цвѣтнаго покрова при основаніи съ отвороченною чешуйкою; влагалища листьевъ на краяхъ зубчатая и щетинообразныя, перепончатая. . . . . 4) **R. Acetosa L.***

*Внѣшнія лопасти прямостояція и прижаты къ внутреннимъ; лопасти (хвостики) листьевъ направлены къ наружѣ; внутреннія лопасти цвѣтнаго покрова безъ чешуекъ при основаніи. 5) **R. Acetosella L.***

## II. Polygonum L. Гречиха. Горецъ.

1 } *Стебель съ однимъ цвѣтнымъ колосомъ, простой; столбикъ до основанія раздѣльный; недостаетъ иногда одной, а иногда и двухъ тычинокъ; корень ползучій . . . . . 2*

*Стебель съ многими колосьями или отдѣльныя цвѣтки находятся въ углахъ листьевъ . . . . . 3*

2 } *Черешки по обѣимъ сторонамъ съ перепонкою (крылатые); листья продолговато-яйцевидныя, почти сердцевидныя, на краяхъ немного-озубренныя; цвѣтки розовыя; стебель до 2 футовъ вышины. На влажныхъ лугахъ; въ Юльѣ. Гречиха аптечная; сердечный корень: змѣвикъ; ужовникъ; горецъ; черевная трава; макаршникъ . . . . .*

1) **P. Bistorta L.**

- 2 *Черешки не крылатые; листья овальные или ланцетные, свивающиеся на краяхъ, съ прозрачными жилками, которыя противъ края листа толще; цвѣтки бѣлые; нижняя часть колоса (а не стебля) съ небольшими черновато-красными луковичками. На влажныхъ лугахъ; въ Іюнѣ и Іюлѣ. Горецъ живородный. . . 2) **P. Viviparum L.***
- 3 *Листья сердцевидныя или стрѣльчатыя; тычинокъ 8; стебель прямой, не вьющійся; столбика 3 съ толстыми, головчатыми рыльцами; цвѣтки въ окончательныхъ и промежуточныхъ колосьяхъ или кистяхъ; стебель трубчатый, голый блестящій и красноватый; цвѣтки бѣлые или свѣтло-красные, при основаніи зеленоватые. . . 3) **P. Fagopyrum L.***
- 4 *Листья яйцевидныя, эллиптическія или ланцетныя; тычинокъ числомъ отъ 4 до 8 . . . . . 4*
- 4 *Цвѣтки съ 8 тычинками: притомъ они находятся числомъ отъ 1 до 5 пучками въ углахъ листьевъ; влагалища листьевъ двуразрѣзныя съ ланцетными, заостренными лопастями, въ послѣдствіи многоразрѣзныя; листья ланцетные или эллиптическія, жилкостыя, плоскія; стебель лежачій и восходящій; цвѣты зеленовато-бѣлые съ красными краями. . . . . 4) **P. aviculare L.***
- 5 *Цвѣтки съ 6 или 7 тычинками; каждая вътѣвь стебля оканчивается колосомъ; столбикъ на половину дву—триразрѣзный; влагалища листьевъ усѣчены, рѣснисты . . . . . 5*
- 6 *Колосья продолговато-цилиндрическія при основаніи не прерваны, прямые или немного только повислые, съ тѣсно сидячими цвѣтками; листья черешковые, яйцевидныя или линейно-ланцетныя . . . . . 6*
- 5 *Колосъ нитчатый, при основаніи прерванъ, повислый съ нетѣсно сидячими цвѣтками; листья почти сидячіе, волнистыя; цвѣты съ желѣзистыми точками, зеленоватые, бѣлые или красные; стебель до 1-хъ футовъ вышины, прямой или при основаніи лежачій, съ красноватыми узлами; влагалища красныя или бурныя, немного рѣснистыя; всѣ части растенія имѣютъ вкусъ перечный . . . . . 5) **P. Persicaria L.***

- 6) *Цветныя ножки и внишнія лопасти цвѣтнаго по-  
крова съ темно-желтоватыми или бурными, до-  
вольно большими желѣзками; влагалица голыя  
или немного шерстистыя, коротко рѣснистыя;  
стебель трубчатый, при сочлененіяхъ опухлый;  
каждый листъ обыкновенно съ темнымъ пятномъ  
въ видѣ подковы; цвѣтки зеленоватыя, рѣдко  
розовые . . . . . 6) P. **Lapathifolium L.***
- Цветныя ножки и лопасти цвѣтнаго покрова безъ  
желѣзокъ, совершенно голыя; влагалица шеро-  
ховатая съ прижатыми волосками, длинно-рѣ-  
снистыя; цвѣтки обыкновенно красноватыя . . .  
7) P. **Hydropiper L.***

Сем. L. Thymeleae Juss. Ягодковья.

Daphne L. Лавруша. Волчникъ.

Цвѣтной покровъ вѣничкообразный, опадающій: трубка цилиндрическая съ 4-разрѣзнымъ отгибкомъ; тычинокъ 8, прикрѣпленныхъ къ трубчкѣ; плодникъ яйцевидный; столбикъ весьма короткій; рыльце плоско-головчатое; плодъ — костянка съ мягкимъ мясомъ и 1 сѣменемъ. Ядовитый кустарникъ съ разсѣянными или супротивными, простыми; цѣльными листьями и боковыми или верхушечными цвѣтами.

Листья ланцетные, при основаніи клиновидные и голыя; цвѣты сидячіе, пушистыя, обыкновенно по три; лопасти цвѣтнаго покрова яйцевидныя, острыя и отстоящія; листья развиваются по отцвѣтаніи пучками на вершинѣ вѣтвей, цвѣты персикового цвѣта, благовонныя; ягоды шарлахового цвѣта; кора сѣрая, гладкая . . . . .

1) D. **mezereum L.**



Семейство **LI. Aristolochiae Juss. Кирказоновыя.**

Цвѣтной покровъ правильный не опадающій, стоящій надъ плодникомъ 3-разрѣзной. Тычиновъ 12; рыльце звѣздовидное . . . . . **Asarum. I.**

Цвѣтной покровъ не правильный, состоящій изъ одного листка; при основаніи раздутый или почти шаровидный, вверху языкообразный. 6 пыльниковъ прикрѣпленныхъ подъ 6-раздѣльнымъ рыльцемъ. Коробочка 6-гнѣздная многосѣмянная. Плодникъ подъ покрываломъ. . **Aristolochia. II.**

**I. Asarum. Колыбель.**

Листьевъ по 2 на стеблѣ, почковидныхъ, тупыхъ, кожистыхъ; цвѣтной покровъ внутри темнобуро-краснаго цвѣта, снаружи немного зеленый и бурый; цвѣты на промежуточныхъ ножкахъ; корень ползучій; стебель лежащій . . . . .

1) **A. Europaeum L.**

**II. Aristolochia. Кирказонъ.**

Стебель прямо стоящій, листья округло сердцевидные. Цвѣты многочисленныя въ углахъ листьевъ, на одноцвѣтныхъ черешкахъ . . . . .

1) **Ar. Clematidis L.**

Семейство **LII. Euphorbiaceae Juss. Молочайныя.**

Столбикъ короткій; рыльца 2; листья супротивные . . . . . **Mercurialis II.**

Столбикъ триразрѣзный или трираздѣльный; листья попеременные или рассыпанные. . . . . **Euphorbia I.**

I. Euphorbia L. Молочай. Евфорбія. Волчье Молоко. Ёдкомлечникъ.

1 { Каждый из зонтиковъ съ тремя главными лучами:  
лучи эти двураздѣльны . . . 1) **E. Peplus L.**  
Каждый из зонтиковъ съ 5 и болѣе главными  
лучами . . . . . 2

2 { Главныхъ лучей одного зонтика 5: каждый лучъ  
иногда раздѣляется на три вторичные, которые  
опять двураздѣльны . . . 2) **E. Helioscopia L.**  
Главныхъ лучей одного зонтика числомъ болѣе 5;  
стебель на верху вѣтвистый . . . . . 3

3 { Каждый из главныхъ лучей зонтика трираздѣль-  
ный: вторичные лучи иногда двураздѣльные .  
3) **E. Palustris L.**  
Каждый из главныхъ лучей зонтиковъ двураздѣль-  
ный: листочки обвертки при основаніи широ-  
кіе, почти сердцевидные, треугольные, съ остро-  
конечіемъ, цѣльные: листья стеблевые попере-  
мѣнные; коробочка отмѣчена на спинѣ тонки-  
ми точками; сѣмя гладкое . . . . . 4

4 { Верхніе из стеблевыхъ листьевъ шире нижнихъ  
всѣ линейно-ланцетные, совершенно цѣльные:  
начиная съ середины до конца они суживаются  
мало по малу; корень снисходящій съ многими  
волоконками; зонтики иногда съ немногими толь-  
ко кучами . . . . . 4) **E. Virgata W. et K.**  
Всѣ стеблевые листья равные или верхніе не шире  
нижнихъ, ланцетные или линейно-ланцетные,  
всѣ цѣльные при основаніи они суживаются  
мало по малу и нижніе изъ нимъ переходятъ въ  
короткій черешокъ; корень ползучій; стебель вы-  
шиною до 1 фута . . . . . 5) **E. Esula L.**

## II. Mercurialis L. Пролсъникъ.

Стебель простой, на верху съ тѣсно-сидячими листьями; послѣдніе въ родѣ яйцевидныхъ или ланцетныхъ, на длинныхъ черешкахъ, голые, тупые, отдаленные другъ отъ друга, пильчатые; зубцы тупые; женскіе цвѣтки почти сидячіе .

1) **M. Perennis L.**

## Сем. LIII. Urticeae Juss. Крапивныя.

- |   |   |                                                                                                                 |                   |
|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | { | Травянистыя растенія одно или двудомныя . . . . .                                                               | 2                 |
|   |   | Деревя; цвѣты обоюднаго пола . . . . .                                                                          | <b>Ulmus</b> ш.   |
| 2 | { | Стебель прямой или восходящій; мужскіе цвѣт-<br>ные покровы съ 4 тычинками; (листья супро-<br>тивные) . . . . . | <b>Urtica</b> I.  |
|   |   | Стебель повойный; мужскіе цвѣтки съ 5 тычин-<br>ками; (листья поперемянные) . . . . .                           | <b>Humulus</b> п. |

### I. Urtica L. Крапива.

*Листья овальныя; цвѣтная кисть короче черешка того листа, въ углу котораго она прикрѣплена; корень волокнистый; стебель до 1 фута вышины. . . . . 1) U. Urens L.*

*Листья продолговато-сердцевидныя; кисти длиннѣе черешка того же листа, въ углу котораго онѣ прикрѣплены и повислыя; цвѣты двудомныя; корень ползучій; стебель до 4 футовъ вышины. . . . . 2) U. Dioica. L.*

### II. Humulus. L. Хмель,

Стебель съ острыми гранями; листья сердцевидны, 3—5 лопастныя, зубчатые, съ острыми зуб-

пами; мужскіе цвѣты въ метелкахъ, женскіе въ сережкахъ или шишкахъ. . 1) **Н. Lupulus L.**

### III. *Ulmus L.* Вязъ. Илимъ.

- Цвѣты на длинныхъ ножкахъ*, расположены въ короткія кисти, съ 6—8 тычинками; цвѣтной покровъ 6—8 зубчатый; плодъ яйцевидный, почти острый, на краю космато-рѣснистый; выемка при рыльцѣ открытая. . . . 1) **U. Effusa L.**
- Цвѣтки почти сидячіе*, въ пучкахъ; съ 4—5 тычинками; цвѣточной покровъ 4—5 зубчатый; плодъ круглый или эллиптическій, на краю голый, при основаніи выемчатый: выемка при рыльцѣ закрыта концами крыла. . 2) **U. Campestris L.**

### Семейство LIV. *Cupuliferae* Richard Плюсконосныя.

- (Листья шерховаты, пильчаты); женскіе цвѣты съ неотпадающимъ, мясистымъ, лопастнымъ цвѣтнымъ покровомъ; столбика 2. . **Coryllus. п.**
- (Листья голые, по краямъ съ выемками); женскій цвѣтной покровъ нераздѣльный, малый столбикъ 1 съ трираздѣльнымъ рыльцемъ . . **Quercus. л.**

### I. *Quercus L.* Дубъ.

- Листья на черешкахъ, при основаніи выемчатые протянуты въ черешокъ; цвѣтки почти сидячіе.  
1) **Q. Sessiliflora Sm.**
- Листья на короткихъ черешкахъ, или почти сидячіе, при основаніи глубоко-выемчатые; цвѣтки на длинныхъ ножкахъ 2) **Q. Pedunculata Ehrh.**

## II. Corylus. J. Орѣшина Лещина.

Прилистники продолговатые, тупые; обертка въ зрѣлости колокольчатая, при вершинѣ отстоящая, разрывно зубчатая, . . . . 1) **C. Avellana L.**

## Семейство LV. Salicineae Rich. Ивовыя.

}	Цвѣтнаго покрыва нѣтъ; плодородные органы при основаніи съ 1 или 2 желѣзками . . . . <b>Salix.</b> г.	
	Цвѣтной покровъ чашеобразный, лежащій на чешуйкѣ. . . . . <b>Populus.</b> п.	

### I. Salix L. Ива.

1	}	<i>Чешуйки сережекъ при концѣ основанія одинаковаго цвѣта отпадающія до зрѣлости; тычинокъ 2—4; вѣтви очень ломкія; листья ланцетные или эллиптическіе, очевидно заострены, пильчатые, блестящіе, голые или шелковисто-волосатые; высокія деревья. . . . .</i>	2
		<i>Чешуйки сережекъ при концѣ и основаніи одинаковаго цвѣта не отпадающія; тычинокъ 2—3; листья ланцетные или продолговато-ланцетные, заостренные, совершенно голые или шелковидно-волосатые; прилистники полусердцевидные; высокіе кустарники, похожіе иногда на деревья, съ прутикообразными вѣтвями . . . . .</i>	4
2	}	<i>Тычинокъ 2; листья ланцетные, заостренные и пильчатые, голые или шелковидно-волосатые . . . . .</i>	3
		<i>Тычинокъ 5—10; листья пильчатые съ тѣсными и малыми зубцами, яйцевидные или эллиптическіе или яйцевидно-ланцетные, заостренные, совершенно голые. . . . . 1) <b>S. Pentandra L.</b></i>	

- 3) *Прилистники полусердцевидные; коробочка на нож-  
кѣ которая въ 3—4 раза длиннѣе желѣзки; стол-  
бикъ толстый, почти длиннѣе двухъ толстыхъ  
двулопастныхъ рылецъ; листья совершенно го-  
лые или молодые немного шелковистые пальча-  
тые . . . . . 2) S. Fragilis L.*
- Прилистники ланцетные; коробочка въ послѣдст-  
віи на ножкѣ: длина сей послѣдней едва дости-  
гаетъ длины желѣзки; два рыльца толстыя, вы-  
емчатая; листья по обоямъ сторонамъ шелко-  
висто-волосатые (рѣдко совершенно голые), на  
длинныхъ черешкахъ. . . . . 3) S. Alba L.*
- Чешуйки сережекъ при концѣ голыя; ножки на ко-  
торыхъ сидятъ коробочки (плоды) въ 2—3 раза  
длиннѣе желѣзки; листья совершенно голые,  
ланцетные. Ива миндальная . . . . . 4) S. Amygda-  
lina L.*
- 4) *Чешуйки сережекъ включены, при концѣ бородаст-  
тыя или съ жесткими волосками; ножка коро-  
бочки вдвое длиннѣе желѣзки; листья пальча-  
тые съ малыми зубцами, ланцетные, длинно-  
заостренные, пушистые, въ послѣдствіи голые.  
. . . . . 5) S. Undulata Ehrh.*

## II. Populus. L. Тополь.

Листья почти круглые, выемчато-зубчатые по обѣ-  
имъ сторонамъ голые, на нижней сторонѣ блѣд-  
ные или зеленые безъ блеска; женскія чешуй-  
ки пальчато-разрѣзныя, густо-косматая; вѣтви  
выходящія изъ корней и вѣтви молодыхъ деревь  
широховато-волосаты . . . . . 1) P. Tremula L.

### Семейство LVI. Betulineae Rich. Березовыя.

- Чешуйки (прицвѣтники) мужской сережки съ 3  
цвѣтками; тычинокъ 4; чешуйки женской се-  
режки съ двумя цвѣтками . . . . . **Alnus** п.
- Чешуйки мужской сережки съ 1 цвѣткомъ; ты-  
чинокъ 6; чешуйки женской сережки съ 2—3  
цвѣтками . . . . . **Betula** i.

# I. Betula L. Береза.

- Дерева:* листья на нижней сторонѣ съ вѣтвистыми жилками; женскія сережки во время зрѣлости на длинныхъ ножкахъ, висячіе; крылья плода равной длины съ орѣшкомъ или вдвое длиннѣе; листья двупильчатые . . . . . 2
- 1) *Кустарники:* листья на нижней сторонѣ съ сѣтчатыми жилками; женскія сережки во время зрѣлости на короткихъ ножкахъ, прямыя; ширина крыла плода въ половину меньше самаго орѣшка; листья озубрены или озубренно-пильчаты . . . . . 3

*Листья заостренные, треугольно-ромбоидальные, голые; крылья плода вдвое шире самаго орѣшка, и онѣ доходятъ до самаго конца рыльца. .*

1) **B. Alba L.**

- 2) *Листья коротко заострены, яйцевидно-ромбоидальные, на молодыхъ деревьяхъ они пушисты, въ послѣдствіи и на старыхъ деревьяхъ только на нижней сторонѣ въ углахъ жидокъ бородасты; крылья плода равной ширины съ орѣшкомъ, притомъ онѣ доходятъ только до конца плода, а не до конца рыльца. 2) **B. Pubescens Ehrh.***

*Листья почти равно пильчатые съ острыми зубчиками, яйцевидные или кругло-яйцевидные; женскія сережки съ трилопастными чешуйками; кустарникъ вышиною до 6 футовъ. . . . .*

3) **B. Humilis. Sehrk.**

- 3) *Листья озубренные съ округленными зубчиками, почти круглые: ширина превосходитъ немного длину; кустарникъ вышиною до 4 футовъ съ ползучимъ корнемъ и пушистыми молодыми вѣтвями . . . . . 4) **B. Nana L.***

## II. *Alnus Tournef.* О́льха.

*Листья тупы, тупо-озубрены, при концѣ или усѣчены или даже выемчаты, при основаніи клиновидны, клейкіе, голые, на нижней сторонѣ въ углахъ жилокъ бородастые. 1) A. Glutinosa L.*

*Листья остры, остро-двунальчаты, яйцевидны, на нижней сторонѣ сѣровато-зелены и почти всключены, иногда перисто-разрѣзны. . . . .*

2) *A. Incana L.*

Семейство: LVII, *Mugiceae* Richard. Мириковыя.

### *Mugica L.* Мирика.

Чешуйки съ 1 цвѣткомъ; мужскіе цвѣты: тычинокъ 4—6, прикрѣпленныхъ къ основанію чешуйки, или сближенныхъ или сросшихся: цвѣтнаго покрова нѣтъ; женскіе цвѣты: плодникъ 1, сросшійся съ основаніемъ цвѣтнаго покрова, состоящаго изъ 4 чешуекъ: эти послѣднія увеличиваются, срастаются съ плодникомъ и образуютъ такимъ образомъ односѣмянную костянку. Смолистый кустарникъ съ попеременными, ломкими вѣтвями, попеременными листьями и прямыми сережками, образующими сложный колосъ.

*Листья ланцетные, при концѣ немного зубчатые, на верхней сторонѣ блестящіе и отмѣнены точками, на нижней сторонѣ сѣрые, при основаніи клиновидные; чешуйки заострены; цвѣтки темнокрасные, развиваются передъ развитіемъ листьевъ. . . . . 1) M. Gale L.*

Семейство: LVIII. *Coniferae* Juss. Хвойныя или Шишконосныя.

(Листья по 2 или по 1); плодъ—сухая шишка. . . . .

***Pinus* L.**

(Листья по три стоящіе); плодъ — ложная ягода, (въ зрѣломъ состояніи червато-синяя). . . . .

***Juniperus* L.**



## I. Juniperus L. Можжевельникъ. Яловецъ.

Прямой кустарникъ: листья по 3, линейно-шилообразные, отстоящiе, съ шиповиднымъ остроконечiемъ, прямые, на верхней сторонѣ съ небольшимъ желобкомъ, на нижней сторонѣ съ тупою гранью: грань съ углубленною линiею; листья длиннѣе черновато-синей ягоды. 1) **J. Communis L.**

## II. Pinus L. Сосна.

Цвѣтки однодомные; мужской цвѣтъ: пыльниковъ 2, одногнѣздныхъ, сросшихся съ основанiемъ чешуекъ сережки: стерженковъ нѣтъ; женскiй цвѣтъ: сережка или шишка состоящая изъ чешуйкообразныхъ прицвѣтниковъ, носящихъ въ своихъ углахъ особенную, двуцвѣтковую обертку: этѣ обертки увеличиваясь, образуютъ большiя чешуйки зрѣлой шишки: цвѣтной покровъ сначала сросшiйся съ оберткою и покрытъ особенною крыло-образною чешуйкою, отдѣляющеюся во время зрѣлости вмѣстѣ съ орѣшкомъ: рыльце точкообразное; сѣмя—ложный орѣхъ, выпадающiй изъ цвѣтнаго покрова. Всегда зеленые деревья съ игольчатыми листьями.

*Листья по 2 сидячие въ чехлы, жесткiе, почти трехгранные, сѣро-зеленые, до 2 дюймовъ длины; чешуйки шишки съ косо-пирамидальнымъ бугоркомъ на внѣшней сторонѣ: молодыя шишки на крючковатой ножкѣ: ножки притомъ одной длины съ шишкою; мужскiя сережки тѣсно сидячiя подъ верхушечными почками; двулѣтнiя шишки не блестящiя, яйцевидно-коническiя съ тупыми чешуйками; крылья сѣмени втрое длиннѣе зернышка. . . . 1) **P. Sylvestris L.***

*Листья по одиначкѣ, сближенные на верхней сторонѣ вѣтвей, тупые, 4-гранные, темно зеленые,*

длиною до  $\frac{3}{4}$  дюйма; чешуйки шишки гладкія, безъ бугорка на выступающъ концѣ, выгнаны зубчатыя; шишки цилиндрическія, повислыя; крылья сѣмени 2—3-жды длиннѣе зернышка.  
2) **P. Abies L.**

## Monocotyledones. Одноствянодолыныя.

Семейство: LIX. Alismaceae Juss. Частушныя.

Тычинокъ 6; цвѣтки обоюднаго пола; (листья яйцевидныя) . . . . . **Alisma I.**  
Тычинки многочисленныя; цвѣты однодомныя; (листья стрѣльчатые) . . . . . **Sagittaria II.**

### I. Alisma L. Частуха. Пуповникъ.

Листья заострены, сердцевидны, яйцевидны или ланцетны, 5—9-тилисты; плоднички снаружи съ продольнымъ желобкомъ, собранныя въ тупотрегранный плодъ; цвѣты бѣлые или красноватые . . . . . 1) **A. Plantago L.**

### II. Sagittaria L. Стрѣлолистникъ,

Листья стрѣльчатые, на длинныхъ черешкахъ: лопасти при основаніи (хвостики) ланцетныя, цѣльныя; стебелекъ простой: лопастки бѣлыя, съ пурпуровымъ ноготкомъ. . . 1) **S. Sagittifolia L.**

Сем. LX. Lemnaceae Link. Рясковые.

*Lemna* L. Ряска, Чечевица водная.

- 1) *Каждый листъ съ нѣсколькими корнями, въ пучкахъ собранными: они безъ черешка, кругловатые, яйцевидные, по обѣимъ сторонамъ не много выпуклые; плодникъ съ двумя сѣменами . . .*  
 1) **L. Polyrrhiza L.**
- 2) *Каждый листъ съ 1 только корнемъ; плодникъ съ 1 сѣменемъ . . . . .*  
*Листья ланцетные съ горизонтальными черешками*  
 которые соединяютъ ихъ на подобіе креста: они же съ тремя жолобками и плоскіе . . . . .  
 2) **L. Trisulca L.**
- 3) *Листья продолговато-круглые, безъ такихъ черешковъ, по обѣимъ сторонамъ плоскіе . . . . .*  
 3) **L. Minor L.**

Сем. LXI. Aroideae Juss. Ароидные.

- Цвѣты обоюдного пола съ 6-листнымъ цвѣтнымъ покровомъ; (листья мечеобразные) . . . **Acorus**
- Цвѣты одно домные безъ цвѣтнаго покрова; (листья сердцевидные) . . . . . **Calla**

1. *Calla* L. Бѣлокрыльникъ. Хлебница.

Листья сердцевидные, длинно-заостренные, глянцевые, на длинныхъ черешкахъ; цвѣточное влагалище снаружи зеленое, внутри чисто бѣлое, плоское, заостренное; початокъ цилиндрической,

желтый; стебель толстый, голый; корень членосоставной, на членахъ съ воловнистыми корнями; плоды ярко-красные. . 1) **C. Palustris L.**

## II. **Asotus L.** Ирѣ. Косатникъ. Сабельникъ.

Листья мечеобразные, при основаніи трехгранные; конецъ стебелька листообразный; початокъ продолговатый, зеленый . . . 1) **A. Calamus L.**

## Семейство: LXII. **Orchideae Juss.** Ятрышниковыя.

### **Orchis L.** Ятрышникъ.

- |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | } | Всѣ 5 лепестковъ соединяются между собою образуя подобіе шишака. Лепестки красноватаго цвѣта съ зеленоватыми полосками. Медоносная губа 3 лопастная, средняя ея лопасть широкая, выемчатая . . . . . 1) <b>O. Morio L.</b>                                        |  |
|   |   | Два наружные лепестка стоятъ отдѣльно или отогнуты назадъ . . . . . 2                                                                                                                                                                                             |  |
| 2 | } | Шпорецъ обращенъ къ верху, довольно толстъ. Медоносная губа 3 лепестная, средняя лопасть выемчатая. Корневые шишки цѣльныя. Цвѣтки красные, рѣдко бѣлые. Колосья у хорошо развитыхъ экземпляровъ очень длинныя и многоцвѣтныя . . . . . 2) <b>O. Masculula L.</b> |  |
|   |   | Шпорецъ обращенъ къ низу . . . . . 3                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 3 | } | Шпорецъ прямой, толстый, короче плодника. Цвѣты темнокраенныя, стебель полный, корневые шишки глубоко разщепленныя. 3) <b>O. Latifolia L.</b>                                                                                                                     |  |
|   |   | Шпорецъ прямой, толстый, короче плодника стебель неполный. Листья узкія съ пятнами, колосья веглеобразныя . . . . . 4) <b>O. Maculata L.</b>                                                                                                                      |  |

Сем. LXIII. Irideae Juss. Касатиковыя.

Iris L. Косатикъ. Сабельникъ,

Цвѣты неполные; цвѣтной покровъ однолистный, при основаніи трубчатый: отгибокъ глубоко 6-раздѣльный: лопасти отогнуты попеременно внутри и къ наружи; тычинки 3, свободныя; рыльце трираздѣльное, похожее на лепестки; коробочка продолговато-круглая, 3-гнѣздная, многосѣмянная; сѣмена плоскія. Травянистыя растенія съ члено-составнымъ корневищемъ; стебель съ параллельно-жиллистыми, внизу влагалищными листьями.

Листья мечеобразныя, почти равной длины съ многоцвѣтнымъ стеблемъ; цвѣтныя влагалища зеленныя; цвѣтки желтыя 1) I. **Pseud-Acorus L.**

Сем. LXIV. Asparageae Juss. . Спаржевыя или Smilacineae D. C. Сарсапарильныя.

- |   |   |                                                                                     |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | } | Тычинокъ 6; столбикъ 1. Цвѣтной покровъ 8-раздѣльный. . . . . <b>Convallaria</b> п. |
|   |   | Тычинокъ 8; столбика 4. Цвѣтной покровъ 6-раздѣльный . . . . . <b>Paris</b> л.      |

1. Paris L. Одноягодникъ.

Листья эллиптическія по 4 въ кольцо; цвѣтки по одиночкѣ, зеленныя, верхушечныя; ягода черная; внѣшнія лопасти цвѣтнаго покрова ланцетныя: внутреннія уже и короче; иногда случается, что 3—6 листьевъ стоятъ въ кольцо. . 1) **P. Quadrifolia L.**

## II. *Convallaria* L. ландышъ.

- 1) *Растенія только съ корневыми листьями; стебелекъ на которомъ сидятъ цвѣтки, безъ листьевъ; цвѣтки повислые, собранные въ однобокую кисть; цвѣтнѣй покровъ колокольчатый, совершенно бѣлый; прицвѣтники бѣлые; ягоды красныя, яйцевидно-ланцетныя; цвѣты благовоиные . . .*  
1) *C. Majalis* L.
- 2) *Листьевъ нѣсколько на стебелѣхъ, полуобъемныхъ, яйцевидныхъ, тупыхъ, голыхъ, попеременнѣхъ расположенныхъ въ двухъ рядахъ; цвѣтки бѣлые съ зелеными кончиками . . . . .*  
*Стебелъ съ острыми гранями; стерженки голыя, равной длины съ пыльниками; корень тонкій, колѣнчатый съ углубленіями, похожими на печати; цвѣтныя ножки съ 1—2 цвѣтками. : . .*  
2) *C. Polygonatum* L.
- 3) *Стебелъ круглый; стерженки волосатыя, короче пыльниковъ; цвѣтныя ножки съ 2—5 цвѣтами.*  
3) *C. Multiflora* L.

## Сем. LXV. Liliaceae D. С. Лилейныя.

### I. *Allium* L. Лукъ.

Цвѣтнѣй покровъ 6-раздѣльный, колокольчатый или открытый; тычинокъ 6, соединенныхъ болѣе или менѣе съ основаніемъ цвѣтнаго покрова и сращенныхъ при своемъ нижнемъ концѣ, такъ что онѣ образуютъ оболочку; столбикъ 1; нераздѣльный; рыльце тупое; коробочка 3-гнѣздная, 3-створчатая; сѣмя граненое; зонтикъ съ 1—2-листной оберткою при основаніи, которая его совершенно закрываетъ передъ цвѣтеніемъ. Травянистыя растенія съ цвѣтками въ головчатыхъ зонтикахъ; на мѣсто цвѣтнѣй у нихъ развива-

ются иногда только луковки; (у нашихъ видовъ листья цилиндрическіе, трубчатые).

*Стебель до середины съ листьями; одинъ изъ обверточныхъ листьевъ зонтика выше конца зонтика; цвѣты бѣлые или желтоватые съ зелеными или красноватыми жилками; тычинки безъ зубчиковъ, почти равной длины съ цвѣтнымъ покровомъ; зонтикъ съ луковками. . . . 1) **A. Oleraceum L.***

*Стебель голый или только при основаніи съ листьями; обверточные листья зонтика короче сего послѣдняго; тычинки безъ зубчиковъ, значительно короче цвѣтнаго покрова: послѣдній красноватый съ синеватыми жилками и ланцетными, острыми листочками; зонтикъ безъ луковокъ . . . 2) **A. Schoenoprasum L.***

## Сем. LXVI. *Cyperaceae* Juss. Киперовыя или Ситниковыя.

Тычинки и столбикъ въ одномъ и томъ же цвѣтѣ.

Пленки (или чешуйки) расположенныя весьма правильно въ два ряда . . . . . **Cyperus** I.

Тычинки въ особенныхъ цвѣтахъ, а столбики въ другихъ. Каждый цвѣточекъ съ одною пленкою (или чешуйкою) (прицвѣтникомъ). Цвѣточки, съ ихъ лежащими одна на другой черепицеобразно чешуйками образуютъ колоски . . . . **Carex** II.

### I. *Cyperus* L. Тросилкъ.

Корень ползучій. Цвѣтвой покровъ 4—6 листный, очень длинный. Колоски линейновидные, сплюснутые съ острыми чешуйками; рылецъ 3. Стебель съ острыми углами, 1—3 футовъ вышины.

1) **C. Longus L.**

## II. Carex L. Осока,

Колосья состоятъ изъ нѣсколькихъ колосковъ, верхнія изъ коихъ состоятъ изъ мужскихъ, нижнія изъ женскихъ, и среднія въ верхней ихъ части изъ мужскихъ, а въ нижней изъ женскихъ цвѣтковъ. Корень длинный, толстый, ползучій . . .

1) *C. arenaria* L.

## Сем. LXVII. Gramineae. Juss. Злаки.

- Колоски совершенно безъ ножекъ, сидячіе въ небольшихъ вырѣзкахъ стебля. (Общій колосъ не цилиндрической, но одно или двурядный (съ противоположными рядами колосьевъ) . . . . . 2
- 1 } Колоски на ножкахъ иногда очень небольшихъ въ послѣднемъ случаѣ общій колосъ цилиндрической или двурядный; (но два ряда колосковъ на одной сторонѣ стебля) . . . . . 3
- 2 } Колосья расположены въ двухъ противоположныхъ другъ къ другу рядахъ, по одному колоску въ каждой вырѣзкѣ стебля и каждый колосокъ съ двумя противоположными чашечными пленками; узкой стороною колоски обращены къ стеблю . . . . . *Lolium* ш.
- Колоски расположены, такъ же, но они обращены къ стеблю своей широкой стороною. Цвѣтковъ въ каждомъ колоскѣ отъ 4—5 . . . . . *Triticum* п.
- 3 } Метелка съ многими колосками сидящими не въ клубкахъ. Цвѣтная пленка при концѣ съ двумя острями (или зубчиками). Листья плоскія или по краямъ свитые, но не щетинообразныя . *Avena* 1.
- 3 } Метелка такая же; но цвѣтныя пленки безъ остриевъ, на спинѣ круглыя. Цвѣточки продолговатые, тупые: (внѣшняя пленка съ 7 жилками, или тремя; въ послѣднемъ случаѣ кайма продолговатая) . . . . . *Glyceria*



## I. Avena L. Овесь.

Листья довольно широкия. Колоски по окончаніи цвѣтенія повислые: чашечка 3 — 9 жильная; плодникъ волосастый. Ось колосковъ почти голая, иногда только при основаніи волосистая. .

1) **A. Sativa**

## II. Triticum L. Пшеница.

Листья на верхней сторонѣ шероховатые; корень ползучій; ось колоса шероховатая или гладкая; колоски съ 4—5 цвѣточками; чашечныя пленки съ 5 жилками; нижняя цвѣтная пленка съ остриемъ или безъ него; стебель до 3 футовъ вышины.

1) **T. Repens L.**

## III. Lolium L. Плевель.

Цвѣточки короче чашечныхъ пленокъ или равной съ ними длины съ остриями: острее прямое, длиннѣе цвѣтной пленки; стебель на верху шероховатый, а ось колоса съ прямо-стоящими шипками; колоски эллиптическіе съ 5—9 цвѣтками; нижняя цвѣтная пленка яйцевидная съ остриемъ при двуразрѣзномъ концѣ, острее прямое, равной длины съ пленкою или длиннѣе.

1) **L. Temulentum L.**

Семейство: LXVIII. Juncaceae Bartl. Ситниковыя.

I. Juncus L. Ситникъ. Ожика.

Цвѣтной покровъ чашеобразный, не опадающій, 6-лиственный; тычинокъ 6, иногда только 3, прикрѣпленныхъ передъ листочками цвѣтнаго покрова; столбикъ нитчатый, иногда весьма короткій или его нѣтъ; рыльца 3, нитчатая, пушистыя; коробочка 3-гнѣздная, 3-створчатая, многосѣмянная: створки въ срединѣ съ перегородкою. Болотныя травянистыя полузлаки безъ листьевъ или съ цилиндрическими жолобковатыми, а иногда и плоскими листьями; имѣющими при основаніи влагалища; цвѣтки зеленовато-желтые или буроватые, въ верхушечномъ полузонтикѣ; прицвѣтникъ при основаніи цвѣторасположенія иногда сильно развитъ, такъ что онъ кажется продолженіемъ стебля: въ послѣднемъ случаѣ полузонтикъ повидимому выходитъ изъ бока стебля; изъ корня иногда выходятъ безцвѣтковые стебельки, похожіе на листья (но первые тѣмъ можно отличить отъ послѣднихъ, что они при основаніи окружены влагалищами). **Juncus L.**

## II.

# О ГЕРБОРИЗАЦИИ ИЛИ СБОРѢ РАСТЕНИЙ.

## О герборизаціи или сборъ растений.

Для ботаническихъ экскурсій, необходимы слѣдующіе инструменты: садовый ножикъ, для срѣзыванія вѣтвей; небольшая треугольная, желѣзная лопатка для выкапыванія корней и довольно длинная палка съ крючкомъ на концѣ, для того, чтобы доставать съ берега водяныя растенія и нагибать вѣтви деревь. Можно, пожалуйъ захватить докото съ молоткомъ чтобы отдѣлять лишай, растущіе на камняхъ. Сверхъ того, чтобы не таскать растенія въ рукахъ, необходимо имѣть жестяной ящикъ, называемый капсулей. Онъ привѣшивается обыкновенно на ремнѣ черезъ плечо.

Не лишнее такъ же брать съ собой папку, съ нѣсколькими листами протечной бумаги. Ее можно тоже вѣшать черезъ плечо. И папка, и капсуля имѣютъ свои удобства и неудобства. Растенія, положенныя во время экскурсіи въ папку, обыкновенно скоро высыхаютъ и поэтому иногда коробятся; въ капсулѣ же растенія весьма долго остаются влажными. Съ другой стороны, если всѣ растенія и нѣжныя и болѣе грубыя класть въ капсулю, то первыя нерѣдко совершенно обвиваются отъ сосѣдства послѣднихъ. А нѣкоторыя мелкія, какъ напр. мхи, могутъ даже совершенно раструситься. По-

этому лучше брать и папку и капсулю вмѣстѣ и помѣщать въ первую мелкія и болѣе нѣжныя растенія, а въ послѣднюю— всѣ остальные.

По возможности, надо стараться собирать растенія съ корнями, листьями, цвѣтами и даже съ плодами. Послѣдніе необходимы при опредѣленіи растеній нѣкоторыхъ семействъ, какъ напр. зонтичныхъ, крестоцвѣтныхъ и проч. Всякое растеніе нужно брать въ нѣсколькихъ, или по крайней мѣрѣ въ двухъ экземплярахъ: одинъ послужить для засушки, а другіе для опредѣленія и на тотъ случай, если первый испортится. Прежде чѣмъ помѣстить растенія въ капсулю, нужно прополоскать ихъ корни, или, если нѣтъ по близости воды, то просто стряхнуть съ нихъ землю. Растенія, не помѣщающіеся въ капсулю, могутъ быть согнуты въ одинъ или два раза, смотря по надобности. Не лишне класть растенія въ капсулю такъ, чтобы корни лежали въ одной сторонѣ, а цвѣты въ другой. Это особенно важно для сохраненія цвѣтовъ.

У нѣкоторыхъ растеній цвѣты осыпаются чрезвычайно легко, поэтому ихъ всего лучше, тотчасъ же, на мѣстѣ укладывать въ листы бумаги помѣщенные въ папки. Мхи надобно всегда брать кучками, колоніями, разумѣется за исключеніемъ танихъ, которые растутъ одиночно. Земли стряхать съ нихъ неслѣдуетъ. Мхи необходимо тотчасъ укладывать въ папку, во первыхъ для того, чтобы они не распались, а во вторыхъ, для того, чтобы не перемѣшались между собой. Водоросли, въ особенности мелкія, лучше собирать въ небольшую банку съ водой. Иначе онѣ высыхаютъ и дѣлаются хрупкими. Ихъ можно также класть въ гутта-перчевые листы; послѣдніе не даютъ испаряться влажности, вслѣдствіе чего водоросли не засыхаютъ. Лишай слѣдуетъ собирать въ сырую погоду: въ это время они разбухаютъ отъ влажности

и дѣлаются гибкими. Сухіе лишай легко ломаются, и поэтому ихъ слѣдуетъ окунуть нѣсколько разъ въ воду для того, чтобы заставить разбухнуть, и затѣмъ уже класть въ папку или капсулю. Лишай нужно собирать съ кусками коры или камня, на которыхъ они растутъ. Грибы, растущіе на растеніяхъ, слѣдуетъ также брать съ той частью растенія, на которой они растутъ. Если по возвращеніи съ экскурсіи нѣтъ времени для разборки собранныхъ растеній, то ихъ можно на нѣсколько дней оставить въ капсулѣ, помѣстивъ послѣднюю въ прохладное мѣсто. Чтобы онѣ не завяли, ихъ надо отъ времени до времени слегка спрыскивать водой. Мхи, плауны и лишай чрезвычайно удобны въ этомъ отношеніи: ихъ можно оставить очень долгое время въ папкѣ и какъ бы они не высохли, стоитъ только окунуть ихъ въ воду, — они разбухнутъ и примутъ свой первоначальный видъ. Водоросли изъ банки слѣдуетъ перемѣстить въ плоскодонные сосуды съ водой и почаще перемѣнять послѣднюю.

Сушатся и сохраняются растенія обыкновенно въ протечной, наклееной бумагѣ, самое лучшее въ печатной. Впрочемъ нѣжно-окрашенные цвѣты лучше перекладывать кусочками писчей или почтовой бумаги. Помѣстивъ растеніе въ листъ бумаги, его расправляютъ такъ, чтобы всѣ части его можно было ясно видѣть и легко узнать. У слишкомъ густыхъ растеній можно обрѣзать нѣкоторые листья и цвѣты. Такъ такъ послѣдніе особенно важны при опредѣленіи растеній, то нужно стараться, чтобы они по возможности сохранили окраску, форму и положеніе. Горизонтально лежащія лепестки такъ и расправляются. Если у цвѣтка лепестки прямостоячіе или на половину отогнуты, то въ первомъ случаѣ они не засушиваются въ прежнемъ положеніи. Во второмъ случаѣ, изъ 4, 6 или большаго числа отогнутыхъ лепестковъ, 2, 3 или большее число лепестковъ загибается на

столько, на сколько они отогнуты въ живомъ цвѣткѣ. Если вѣнчикъ сростнолепестной съ нѣсколькими вырѣзами, какъ напр. у первоцвѣта, то половина или нѣсколько изъ послѣднихъ загибается. Цвѣты губоцвѣтныхъ растений кладутся бокомъ, для того, чтобы яснѣе видѣть ихъ отличительныя черты, т. е. часть вѣнчика и его нижнюю и верхнюю губы.

Мотыльковые вѣнчики расправляются тоже бокомъ; лодочка и крылья остаются въ своемъ естественномъ положеніи. Сложенный или отогнутый парусъ не долженъ быть расправляемъ. Нѣкоторые цвѣты до того хрупки что неминуемо ломаются при расправкѣ. Такія нужно расправлять тогда, когда они нѣсколько завянутъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлаются достаточно гибкими. Нѣкоторые цвѣты, имѣя способность свертываться при засушкѣ, черезъ это измѣняютъ свой видъ. У подобныхъ растений, каждый отдѣльный цвѣтокъ нужно положить между небольшими листочками бумаги, и снять послѣдніе, только тогда когда цвѣтки совершенно высохнутъ. При расправкѣ надобно обращать вниманіе на то, чтобы отдѣльныя части растенія не лежали другъ на другѣ, — отъ этого онѣ легко прѣютъ, загниваютъ и теряютъ свой цвѣтъ. Поэтому, чтобы у мохровыхъ цвѣтковь (какъ напр. у бѣлой кувшинки) лепестки не налегали непосредственно другъ на друга, ихъ можно переложить кусочками писчей бумаги. Въ слишкомъ густыхъ цвѣторасположеніяхъ, можно срѣзать часть цвѣтковь; но такъ какъ отъ этого нерѣдко страдаетъ общій видъ растенія, то отдѣльные цвѣтки, вмѣсто того, чтобы срѣзать, можно тоже переложить бумажками. У нѣкоторыхъ растений, нижняя часть листа часто отличается цвѣтомъ и другими особенностями отъ верхней, поэтому при расправкѣ не дурно перевернуть нѣкоторые листья. Иногда стебель бываетъ такъ толстъ, что можетъ мѣшати при расправкѣ. Въ такомъ случаѣ, его можно расколоть

на двое, стараясь не повредить листьевъ. Расколотый стебель, кладется разрѣзомъ къ листу.

Весьма часто бываетъ, что растеніе длиннѣе листа бумаги, въ такомъ случаѣ, его можно разрѣзать на нѣсколько частей, и съ каждой отдѣльной частью обходиться какъ съ цѣлымъ растеніемъ. Чтобы не попортить цвѣторасположенія, дѣленіе лучше начать сверху. Если же растеніе не цвѣтисто, и не толсто, а только имѣетъ длинный стебель, какъ напр. многіе злаки; то его даже не слѣдуетъ и разрѣзать, а просто согнуть въ двое или въ трое и такъ расправить на листѣ.

У растеній съ ползучимъ стеблемъ, и вверхъ торчащими вѣтвями, эти послѣднія не нужно расправлять на обѣ стороны стебля, какъ у обыкновенныхъ растеній, а слѣдуетъ положить всѣ въ одну сторону отъ стебля. Толстые корни и плоды разрѣзываются пополамъ, также какъ и стебли. Клубни и луковицы точно также должны быть разрѣзаны.

Встрѣчаются растенія, выдѣляющія на своей поверхности клейкій сокъ, посредствомъ котораго онѣ приклеиваются къ бумагѣ, такъ что иногда трудно бываетъ отдѣлить ихъ. Подобныя растенія можно расправлять въ бумагѣ, напитанной масломъ или воскомъ. Растенія съ мясистыми и сочными цвѣтами и листьями, вянутъ чрезмѣрно долго и при этомъ совершенно измѣняютъ свой видъ; когда наконецъ онѣ засохнутъ, то цвѣты и листья ихъ обваливаются. Чтобы избѣжать такой неудачи, эти растенія, до расправки, на мгновеніе окунаютъ нѣсколько разъ въ кипящую воду, но такъ, чтобы не замочить цвѣтовъ. Послѣ этого, ихъ расправляютъ въ бумагѣ и слегка прессуютъ. Подъ настоящій прессъ, вмѣстѣ съ другими растеніями, ихъ можно положить только тогда, когда они порядочно подсохнутъ. Водя-

\*



ныя растенія нужно сначала хорошенько обтерѣть протечной бумагой, и уже затѣмъ расправлять ихъ.

Нѣкоторые изъ споровыхъ растеній, какъ напр. папоротники, сушатся также какъ и сѣмянные. Чтобы расправить высохшій мохъ, его сначала, какъ мы выше замѣтили, бросаютъ въ воду, вслѣдствіе чего, онъ становится опять гибкимъ. Послѣ этого, мохъ кладутъ въ листъ вмѣстѣ съ землей и расправляютъ. Землю разрѣзаютъ на тонкіе пластинки. Такъ какъ мхи довольно малы для обыкновеннаго формата бумаги, то ихъ кладутъ по нѣскольку видовъ въ одинъ листъ. Но чтобы они не перемѣшались, ихъ приклеиваютъ растворомъ камеди. Легко отпадающіе плоды мховъ, собираютъ и приклеиваютъ рядомъ съ растеніями, которымъ они принадлежатъ. Чтобы расправить водоросли, для этого въ сосудъ, въ которомъ онѣ плаваютъ, погружаютъ тоненькую дощечку съ листомъ бумаги. Бумага предварительно должна быть смочена, для того, чтобъ она крѣпко пристала къ дощечкѣ, и не всплыла на верхъ, при погруженіи послѣдней въ воду. Дощечку подводятъ подъ растеніице, и затѣмъ приподнимаютъ такъ, чтобы вода сбѣжала съ нее, а водоросль осталась на бумагѣ. Когда бумага высохнетъ, то водоросли пристанутъ къ ней, какъ приклеенныя. Засохнувшіе лишай, тоже разбухаютъ въ водѣ. Сохраняютъ ихъ въ бумагѣ вмѣстѣ съ тоненькими пластинками горы, на которой они живутъ. Растущіе же на камняхъ сохраняются вмѣстѣ съ послѣдними въ ящикахъ или шкапахъ.

Шляпные грибы, не могутъ быть засушены цѣликомъ. Ихъ готовятъ для гербарія слѣдующимъ образомъ: грибъ разрѣзаютъ по длинѣ на двѣ половинки; затѣмъ, съ одной изъ половинокъ срѣзаютъ тонкую пластинку шляпки и корешка. Пластинку эту засушиваютъ обыкновеннымъ образомъ, и наклеиваютъ на бумагу. Но по ней можно за-

включить только о величинѣ и внутреннемъ строеніи гриба. Чтобы имѣть наружный видъ гриба,—съ половинки шляпки и корешка срѣзаютъ тонкій слой верхней кожицы и наклеиваютъ ее въ надлежащемъ положеніи на бумагу.

Для полноты гербаріума, можно собирать также сѣмяна и плоды растений. Изъ толстыхъ плодовъ, можно дѣлать такіе же разрѣзы, какъ и изъ грибовъ и засушивать ихъ рядомъ съ растеніемъ, которому они принадлежатъ. Сѣмяна сохраняютъ въ свернутыхъ бумажкахъ, которыя можно приклеивать тоже рядомъ съ растеніемъ. Въ нѣкоторыхъ семействахъ растений, сѣмяна положительно необходимы для опредѣленія.

Немѣшаетъ также имѣть молодые ростки различныхъ растений, такъ какъ на нихъ характеръ листорасположенія гораздо яснѣ видѣнъ, чѣмъ на старыхъ.

Не дурно имѣть продольные и поперечные разрѣзы деревьевъ и кустарниковъ, чтобы видѣть строеніе древесины, а также образчики коры.

Для того, чтобы имѣть возможность даже и зимою опредѣлять деревья и кустарники, необходимо имѣть собраніе вѣтокъ съ листовыми и цвѣточными почками.

Листы съ расправленными растеніями раскладываются обыкновенно такимъ образомъ: сначала кладется три или четыре пустыхъ листа; на нихъ накладывается листъ, содержащій растеніе. На этотъ послѣдній снова накладывается три или четыре пустыхъ листа, затѣмъ опять листъ съ растеніемъ и т. д.

Когда составится слой въ 15—20 листовъ, на него, для болѣе равномернаго давленія, можно наложить папку или тонкую дощечку, и затѣмъ снова слой въ 15—20 листовъ и т. д. Винтовой прессъ не годится для прессованія растений, потому что послѣднія легко могутъ попортиться отъ сильна-

го давленія. Лучше положить растенія на столъ, и покрыть сверху толстой доской, нагрузивъ послѣднюю слегка камнями или кирпичами. Но еще лучше употреблять прессъ слѣдующаго устройства. Берутъ двѣ довольно толстыя дощечки. Длина и ширина ихъ должны быть таковы, чтобы онѣ покрывали собою листы бумаги. Въ продольные бока досокъ ввинчиваютъ нѣсколько пробойчиковъ на разстояніи  $1\frac{1}{2}$ —2 вершковъ другъ отъ друга. Листы съ растеніями кладутъ между досками; въ кольца пробойчиковъ продѣваютъ шнуры и стягиваютъ доски. Такимъ образомъ растенія прессуются. Дабы растенія просохли, какъ можно скорѣе, (что необходимо для ихъ сохраненія), въ началѣ нужно перекладывать ихъ каждый день, изъ засырѣвшей бумаги въ сухую. Въ особенности это необходимо для водяныхъ растений. Чтобы избавиться отъ постоянной перекладки, можно употребить другой прессъ, въ которомъ растенія высыхаютъ безъ перекладки. Устройство подобнаго пресса слѣдующее: Берутъ доску мягкаго дерева, величиной немного больше листа бумаги. Она должна быть посрединѣ толще, а къ бокамъ погата. На ней буравятъ сквозныя дирки, и чѣмъ больше послѣднихъ, тѣмъ лучше. Къ продольнымъ бокамъ доски прибавляютъ съ каждой стороны по два ремня съ пряжками. Въ поперечные бока ввинчиваютъ пробойчики.

Верхнюю часть аппарата составляетъ кусокъ крѣпкаго полотна, или еще лучше тикю, сложеннаго вдвое и прошитаго. Въ оба продольные края полотна вшиваются толстыя проволоки. Около проволокъ въ полотнѣ дѣлаютъ отверстія, соотвѣтствующія ремнямъ доски. Въ поперечныхъ краяхъ дѣлаютъ дирки для шнурковъ. Чтобы полотно не рвалось, въ дирочки лучше вставить металлическія кольца. Въ такой прессъ, растенія кладутся между выпуклой стороной доски, и полотномъ, потомъ стягиваются ремнями и шнурами. Весь-

на удобенъ также прессъ слѣдующаго устройства. Берутъ двѣ деревянные рамки и дѣлаютъ на нихъ проволочныя сѣтки. На каждомъ изъ продольныхъ краевъ сдѣлано по двѣ двѣ скобки; на верху ручка, для переноски прессы. Въ соответствующія скобки каждой рамки просовываются ремни. Наполненный прессъ надо выставить въ сухое и вѣтростое мѣсто. Влажность растений испаряется черезъ полотно и дырки доски, уносится вѣтромъ, и растенія скоро высыхаютъ.

Совершенно готовые растенія переносятся въ гербарій. Чтобы растеніе, при разсматриваніи, не вывалилось изъ листа, на него накладываютъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ узенькія, бумажныя полоски, приклеенныя съ обоихъ концовъ къ листу. На каждомъ листѣ наклеивается билетикъ, на которомъ значится: названіе растенія, въ какомъ мѣсяцѣ найдено оно, когда цвѣтеть и приноситъ плодъ, въ какомъ уѣздѣ, гдѣ найдено; т. е. на болотѣ, на берегу рѣки или на дугу и проч., на какой почвѣ и проч. Нѣсколько листовъ съ растеніями, принадлежащими къ одному роду, соединяются вмѣстѣ и кладутся въ одинъ общій листъ, на которомъ приклеены билетикъ съ названіемъ рода. Нѣсколько пачекъ, близкихъ между собою родовъ, соединяются въ большую пачку—семейство. Если семейство велико, то его можно обложить съ обѣихъ сторонъ, папкой и перевязать, а если мало,—то просто вложить въ общій листъ. Въ томъ и другомъ случаѣ долженъ быть ярлычекъ съ названіемъ семейства. Последнія въ свою очередь группируются, также какъ и роды.

Если гербарій великъ, то можетъ представиться затрудненіе при отыскиваніи того или другаго растенія. Для облегченія можно завести извѣстный порядокъ,—ставить на каждомъ листѣ, заключающемъ родъ, номеръ. На листѣ, содержащемъ семейство, выставлять также номеръ, кромѣ того, помѣщать списокъ всѣхъ родовъ этого семейства, и передъ

каждымъ родомъ выставяеть его номеръ. Затѣмъ долженъ быть алфавитный указатель всѣхъ родовъ, заключающихся въ гербаріи, и передъ каждымъ родомъ, долженъ стоять номеръ семейства, къ которому онъ принадлежитъ. При такой системѣ, сейчасъ же можно отыскать растеніе. Положимъ надо найти одуванчикъ. Въ указателѣ подъ лит. О, находите одуванчикъ и передъ нимъ цифру 34. Цифра эта означаетъ номеръ того семейства, къ которому принадлежитъ одуванчикъ. Вы начинаете перебирать пачки семействъ, и находите 34 номеръ,—это семейство сложноцвѣтныхъ.

На общемъ листѣ этого семейства находится списокъ заключающихся въ немъ, родовъ. Въ этомъ списокѣ, вы опять отыскиваете одуванчикъ, и на этотъ разъ видите передъ нимъ положимъ, цифру 9,—это номеръ того рода, къ которому принадлежитъ одуванчикъ. Затѣмъ вы отыскиваете родъ подъ № 9, и въ немъ уже легко находите самый одуванчикъ.!

Гербаріумы, подобно животнымъ, имѣютъ своихъ непріятелей. Особенно нѣкоторыя семейства растеній, какъ напр. сложноцвѣтныя, зонтичныя, бобовыя, крестоцвѣтныя и нѣкоторыя друг. подвержены нападенію насѣкомыхъ. Для отвращенія этого, слѣдуетъ отравлять растенія, погружая ихъ до расправки въ растворъ сулемы въ алкоголь. Грибы, мхи и проч. растенія, которыя приклеиваются на бумагу, слѣдуетъ приклеивать не иначе, какъ отравленнымъ клеемъ.

Въ заключеніе считаемъ не лишнимъ прибавить списокъ, болѣе распространенныхъ растеній, расположенный по времени ихъ цвѣтенія.

## СПИСОКЪ РАСТЕНІЙ,

расположенный по времени ихъ цвѣтенія.

### Апрѣль.

Вѣтреница лѣсная (*Anemone nemorosa*). Мышехвость (*Myosarus minimus*). Курослѣпъ болотный (*Caltha palustris*). Сердечникъ (*Cardamine pratensis*). Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella*). Смородина (*Ribes rubrum*). Мать и мачиха (*Tussilago farfara*). Ясень (*Fraxinus excelsior*). Бѣлогопытникъ (*Tussilago petasites*). Медуница (*Pulmonaria officinalis*). Первоцвѣтъ (*Primula officinalis*). Волчьи ягоды (*Daphne mezereum*). Вязъ (*Ulmus effusa*). Илимъ (*Ulmus campestris*). Орѣшникъ (*Corylus avellana*). Тополь (*Populus tremula*). Береза (*Betula alba*). Ольха (*Alnus glutinosa*). Ива бѣлая (*Salix alba*). Ива хрупкая (*Salix fragilis*).

### Май.

Вѣтреница обыкновенная (*Anem. pulsatilla*). Вѣтреница лѣсная (*Anem. nemorosa*). Мышехвость (*Myosorus minimus*).

Лютикъ ѳдикій [*Ranunculus acris*]. Лютикъ ползучій (*Ran. repens*). Куролѣпъ болотный (*Caltha palustris*). Барбарисъ (*Berberis vulgaris*). Сердечникъ (*Cardamine pratensis*). Сурѣ-пица (*Erysimum cheirantoides*). Капуста (*Brassica rapa*). Ярутка (*Thlaspi ruderale*). Сумка (*Capsella bursa pastoris*). Фіалка душистая (*Viola odorata*). Фіалка троецвѣтная (*V. tricolor*). Кленъ (*Acer platanoides*). Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella*). Берескледъ (*Evonymus europaeus*). Крушина ломкая (*Rhamnus frangula*). Пролѣска (*Mercurialis perennis*). Клеверъ (*Trifolium repens* и *Tr. pratense*). Черемуха (*Prunus padus*). Зерновникъ (*Pr. spinosa*). Малина (*Rubus idaeus*). Костяника (*R. saxatilis*). Земляника (*Fragaria vesca*). Манжетка (*Alchemilla vulgaris*). Боярышникъ (*Crataegus oxiacantha*). Кизильникъ (*Cotoneaster vulgaris*). Яблонь (*Pyrus malus*). Рябина (*Sorbus aucuparia*). Водяная звѣздочка (*Callitrix verna*). Крыжовникъ (*Ribes grossularia*). Смородина (*Rib. rubrum*). Тминъ (*Carum carvi*). Калина (*viburnum opulus*). Жимолость (*Lonicera xylosteum*). Ромашка (*Matricaria chamomilla*). Одуванчикъ (*Leontodon taraxacum*). Ясень (*Fraxinus excelsior*). Медуница (*Pulmonaria officinalis*). Незабудка (*Myosotis palustris*). Вѣлена (*Hyoscyamus niger*). Будра (*Glechoma hederacaea*). Глухая крапива (*Lamium album*). Первоцвѣтъ (*Primula officinalis*). Подорожникъ (*Plantago media*). Щавель (*Rumex acetosa*). Волчьи ягоды (*Daphne mezereum*). Пролѣска (*Mercurialis perennis*). Дубъ (*Quercus pedunculata*). Орѣшникъ (*Corylus avellana*). Ива пятижужная (*Salix pentandra*). Тополь (*Populus tremula*). Береза (*Bet. alba*). Можжевельникъ (*Juniperus communis*). Сосна (*Pinus abies*). Кукушкины слезы (*Orchis maculata*). Ландышъ (*Convallaria majalis*). Осока (*Carex flava*). Бузина черная и красная (*Sambucus nigra et ebulus*). Крестовникъ (*Senecio vulgare*). Сирень (*Syringa vulgaris*). Липа (*Tilia europaea*).

Клюква (*Vaccinium oxycoccos*). Вероника (*Veronica offic. et beccabunga*). Фиалка собачья (*Viola canina*). Омела (*Viscum album*).

### Июнь.

Лютикъ ѳдкій и лютикъ ползучій (*Ran. acris et. R. repens*). Сапожки (*Aquilegia vulgaris*). Барбарисъ (*Ber. vulgaris*). Кувшинка (*Nuphar luteum*). Макъ свотворный (*Papaver somniferum*). Чистотѣль (*Chelidonium majus*). Дымянка (*Fumaria officinalis*). Настурція (*Nasturtium sylvestris*). Сурѣпица (*Erysimum cheiranthoides*). Капуста (*Bras. rapa*). Горчица (*Sinapis arvensis*). Рыжигъ (*Camelina sativa*). Ярутка (*Thlapsi arvense*). Сумка (*Cap. bur. pastoris*). Рѣдька полсвая (*Raphanus raphanistrum*). Фиалка (*V. tricolor*). Куколь (*Agrostemma githago*). Мокрица (*Stellaria media*). Липа (*Tilia europaea*). Герань полевая (*Geranium pratense*). Берескледъ (*Evonymus europaeus*). Крушина ломкая (*Rhamnus frangula*). Астрогалъ (*Astrogalus glycyphilos*). Мышій горошекъ (*Vicia cracca*). Горохъ (*Pisum sativum*). Гравилать (*Geum urbanum*). Малина (*Rub. idaeus*). Земляника (*Frag. vesca*). Могучникъ (*Potentilla argentea*). Шиповникъ (*Rosa canina*). Манжетка (*Alchemilla vulgaris*). Кизильникъ (*Cotoneaster vulgaris*). Капорскій чай (*Epilobium angustifolium*). Водяная звѣздочка (*Callitrix verna*). Молодило (*Sedum acre*). Заячья капуста (*Sedum telephium*). Цикута (*Cicuta virosa*). Тминъ (*Carum carvi*). Морковь (*Daucus carotta*). Калина (*Viburnum opulus*). Валерьянъ (*Valeriana officinalis*). Маргаритка (*Bellis perennis*). Тысячелистникъ (*Achillea millefo-*



lum). Ромашка (*Matricaria chamomilla*). Лопухъ (*Lappa major*). Василекъ (*Centaurea cyanus*). Одуванчикъ (*Léont. taraxacum*). Колокольчикъ (*Campanula glomerata*). Брустника (*Vaccinium vitis idaeae*). Брань-трава (*Polemonium coeruleum*). Незабудка (*Myos. palust*). Бѣлена (*Hyoscyamus niger*). Дикій ленъ (*Linaria vulgaris*). Глухая крапива (*Lam. album*). Подорожникъ (*Plant. media*). Щавель (*Rum. acetosa*). Конопля (*Cannabis sativa*). Крапива двудомная (*Urtica dioica et urens*). Частуха (*Alisma plantago*). Стрѣлистникъ (*Sagittaria sagittaeifolia*). Ситникъ (*Juncus effusus*). Ряска (*Lemna minor*). Бѣлокрыльникъ (*Calla palustris*). Аиръ (*Acorus calamus*). Кукушкины слезки (*Orchis maculata*). Касатикъ (*Iris pseud-acorus*). Ландышъ (*Conval. majalis*). Дикій лукъ (*Allium schoenophrasum*). Осока (*Carex flava*). Тимофеева трава (*Phleum pratense*). Овесъ дикій (*Avena pratensis*). Трясушка (*Briza media*). Мятликъ (*Poa pratensis*). Солянка (*Salsola kali*). Кервель (*Scandix cerefolium*). Козелецъ (*Scorzonera humilis*). Ночничекъ (*Scropularia nodosa*). Горчица, полевая и бѣлая (*Sinapis nigra, arvensis et alba*). Рѣжуха (*Sisymbrium Nasturtium*). Гулявникъ (*Sisymbrium Sophia*). Сладкогорькое (*Solanum Dulcamara*). Осоть (*Sonchus oleraceus*). Сальникъ (*Symphitum officinale*). Дубровка (*Teucrium*). Василисникъ (*Thalictrum flavum*). Богородская трава (*Thymus Serpillum*). Узикъ (*Tormentilla erecta*). Козлобородникъ (*Tragopogon pratensis*). Пырей (*Triticum repens*). Водягонникъ (*Trapa natans*). Клюква (*Vaccinium oxycoccos*). Вероника (*Veronica off. et beccabunga*). Аютины глазки (*Viola tricolor*). Фіалка собачья (*Viola canina*). Лапушникъ малый (*Xanthium strumarium*).

іюль.

Жабникъ водный (*Ranunculus aquatilis*). Сапожки (*Asc. vulgaris*). Нимфея (*Nymph. alba*). Кувшинка (*Nymph. luteum*). Магъ (*Par. somn.*). Чистотѣль (*Chelid. majus*). Дымянка (*Fum. officinalis*). Настурція (*Nasturt. sylvestris*). Сурѣпица (*Er. cheirant.*). Горчица (*Sin. arven.*). Рыжикъ (*Camel. sativa*). Ярутка (*Thlaspi arvense*). Сумка (*Cap. bur. past.*). Рѣдка полевая (*Raph. raphan.*). Фіалка (*V. tricol.*). Вѣлзоръ (*Parnassia palustris*). Росянка круглолистная (*Drosera rotundifolia*). Куколь (*Agros. gith.*). Мокрица (*Stellar media*). Просвирникъ (*Malva rotundifolia*). Ленъ обыкновенный (*Linum usitatissimum*). Звѣробой (*Hypericum perforatum*). Геранъ полевая (*Geranium pratense*). Недотрога (*Impatiens palustris*). Астрогалъ (*Astrog. glycyphilos*). Клеверъ (*Trif. rap. et prat.*). Мышиный горошекъ (*Vicia craca*). Таволга (*Spiraea ulmaria*). Гравилатъ (*Geum urbanum*). Могучникъ (*Potent argentea*). Капорскій чай (*Epilob. angustif*). Перистолистникъ (*Muriophyllum spicatum*). Роголистникъ (*Ceratophyllum demersum*). Водяная звѣздочка (*Callitrix verna*). Водяная сосенка (*Hippuris vulgaris*). Молодило (*Sed. acre*). Цикута (*Cic. virosa*). Пастернакъ (*Pastinaca sativa*). Марковь (*Dauc. carotta*). Омегъ (*Conium maculatum*). Валерьянъ (*Val. offic.*) Маргаритка (*Bellis perennis*). Череда (*Bidens cernua*). Полынь (*Artemisia vulgaris*). Тысячелистникъ (*Achil. millif.*). Лопухъ (*Lappa major*). Василекъ (*Centaurea cyanus*). Цикорій (*Cichorium intybus*). Одуванчикъ (*Leon. tarax*) Колокольчикъ (*Camp. glomerata*). Верескъ (*Calluna vulgaris*). Златотысячникъ (*Erythraea centaurium*). Бранъ-трава (*Polemonium coeruleum*). Повилица (*Cuscuta europaea*). Вьюнокъ (*Convol. arvensis*). Незабудка (*M. palus*). Пасленъ (*Solanum nigrum*).

Вероника (*Veronica officinalis et beccabunga*). Мята (*Mentha sylvestris*). Будра (*Glech. heder*). Глухая крапива (*Lam. album*). Пузырчатка (*Utricularia vulg.*). Подорожникъ (*Plant. med.*). Лебеда (*Atriplex hastata*). Щавель (*Rum. acet.*). Грѣчиха змѣвикъ (*Polygonum bistorta*). Дикій ленъ (*Lin vulg*). Конопля (*Cann. sat.*). Молочай (*Euphor. palus.*). Крапива двудомная и жгучая (*Urt. dioica et urens*). Хмѣль (*Humulus lupulus*). Лягушникъ (*Hydrocharis morsus ranae*). Стрѣлолистникъ (*Sagitt. sagittaeif.*). Сусагъ (*Butomus umbellatus*). Ситникъ (*Juncus effusus*). Рдестъ (*Potamogeton natans*). Ряска (*Let. minor*). Бѣлогрыльникъ (*Calla pallus.*). Аиръ (*Acor. calam.*). Дикій лукъ (*All. schoenophrasum*). Тимофеева трава (*Phleum. pratense*). Овесъ дикій (*Avena pratensis*). Трясушка (*Briza media*). Мятликъ (*Poa. prat.*). Мыльнянка (*Saponaria officinalis*). Камнеломка (*Saxifraga hirculus*). Кервель *Scandix-cerefolium*). Козелецъ (*Scorzoneria humilis*). Норычникъ (*Scrophularia nodosa*). Щитовка (*Scutellaria galericulata*). Живучка (*Sempervivum tectorum*). Крестовникъ (*Senecio vulgaris*). Горчица черная, полевая и бѣлая (*Sinapis nigra, arvensis et alba*). Рѣжуха (*Sisymbrium Nasturtium*). Гулявникъ (*Sisymbrium Sophia*). Сіумъ (*Sium latifolium*). Сладкогорькое (*Solanum Dolcamdra*). Золотая розга (*Solidago virga aurea*). Колосница (*Stachys*). Салькигъ (*Symphitum off.*). Пижма (*Tanacetum vulgare*). Василцникъ (*Thalictrum flavum*). Богородская трава (*Thymus Serpillum*). Гузикъ (*Tormentilla erecta*). Козлобородникъ (*Tragopogon pratensis*). Пырей (*Triticum repens*). Царскій Скипетръ (*Vesbascum Thapsus*). Борвиногъ (*Vinca minor*).

## Августъ.

Жабникъ водный (*Ran. aquat.*). Нимфея (*Nymph. alba*). Сурьпица (*Er. cheirant.*). Сумка (*Cap. bur. past.*). Фиалка (*Viola tricolor*). Бѣлозоръ (*Parnass. palust.*). Росянка круглолистная (*Drosera rotundif.*). Мокрица (*Stell. med.*). Просвирнякъ (*Malva rotundif.*). Ленъ обыкновенный (*Linum usitatiss.*) Звѣрбой (*Hypericum perforatum*). Недотрога (*Impat. nolitang.*). Молочай болотный (*Euph. palust.*). Таволга (*Sp. ulm.*). Перистолистникъ (*Myriophyll. spicat.*). Роголистникъ (*Ceratohhyll. demersum*). Водяная звѣздочка (*Callit. verna*). Водяная сосенка (*Hippuris vulg.*). Цикута (*C. virosa*). Постарнакъ (*Pastin. sativa*). Морковь (*Dauc. car.*). Омегъ (*Conium maculat.*). Скабіоза (*Succisa pratensis*). Маргаритка (*Bell. per.*). Черёда (*Bid. cernua*). Полынь (*Artem. vulg.*). Тысячелистникъ (*Achill. millif.*). Цикорій (*Cicorium intybus*). Одуванчикъ (*Leon. tarax.*). Колокольчикъ (*Camp. glomerata*). Верескъ (*Call. vulg.*). Златотысячникъ (*Erythraea centaaurium*). Повилица (*Cusc. europeae*). Вьюнокъ (*Convolvul. arven.*). Пасленъ (*Solanum nigrum*). Дикій ленъ (*Linar. vulg.*). Вероника (*Ver. spicata*). Мята (*Ment. sylvest.*): Глухая крапива (*Lam. album*). Пузырчатка (*Utricularia vulgaris*). Лебеда (*Atriplex hastata*). Щавель (*Rum. acet.*). Конопля (*Cann. sat.*). Молочай (*Euph. palus.*). Крапива двудомная и жгучая (*Urtica dioica et urens*). Хмѣль (*Hum. lup.*). Тѣлорѣзь или водяной ананасъ (*Stratiotes aloides*). Лягушникъ (*Hydrocharis morsus ranae*). Частуха (*Alisma plantago*). Рдестъ (*Pdtamogeton natans*). Мыльнянка (*Saponaria officinalis*). Камнеломка (*Saxifraga hirculus*). Норычникъ (*Scropularia nodosa*). Щитовка (*Stutellaria galericulata*). Живуч-

ра (*Sempervivum tectorum*). Крестовникъ (*Senecio vulgaris*). Рѣжуха (*Sisymbrium Nasturtium*). Гулявникъ (*Sisymbrium Sophia*). Сіумъ (*Sium latifolia*). Сладкогорькое (*Solanum dulcamara*). Золотая розга (*Solidago virga aurea*). Осоть (*Sonchus oleraceus*). Колосница (*Stachys*). Сальникъ (*Symphitum off.*). Пижма (*Tanacetum vulgare*). Пырей (*Triticum repens*). Валерьянъ (*Valer. off.*). Вербишникъ (*Verbascum nigrum*). Вероника (*Veronica offi*). Барвинокъ (*Vincaminor*).

### Сентябрь.

Скабіоза (*Cuceisa pratensis*). Крестовникъ (*Senecio vulgaris*). Рѣжуха (*Sisymbrium Nasturtium*). Гулявникъ (*Sisymbrium sophia*). Осоть (*Sonchus oleraceus*). Крапива двудомная и жгучая (*Urtica dioica et urens*). Барвинокъ (*Vinca minor*). Анютины глазки (*Viola tricolor*).



# ПРИБАВЛЕНІЕ

БЪ

## ЦЪЛЕБНОМУ ТРАВНИКУ.

- I. Чахотка и ея леченіе.
- II. Свѣдѣнія о леченіи главнѣйшихъ болѣзней.
- III. О формахъ лекарственныхъ веществъ.
- IV. Алфавитный перечень растительныхъ простыхъ и сложныхъ средствъ, какъ отечественныхъ, такъ и иноземныхъ, съ указаніемъ способа ихъ приготовленія и употребленія въ различныхъ болѣзняхъ.

## I.

# ЧАХОТКА И ЕЯ ЛЕЧЕНІЕ.

### 1.

Быть можетъ большинство людей не посвященныхъ въ тайны медицинской науки не подозрѣваетъ того, что дѣйствія болѣзни, извѣстной подъ именемъ чахотки, гораздо важнѣе и опустошительнѣе самой холеры, хотя, не смотря на то, что она не внушаетъ намъ новаго ужаса и что мы почти не обращаемъ на нее вниманія. Эта болѣзнь, въ одной Англїи истребляетъ каждый годъ до шестидесяти тысячъ человѣкъ, а въ Россїи до ста тысячъ и поминутно похищаетъ изъ среды семействъ ихъ опору не щадя ни пола, ни возраста, ни состоянія, но какъ-бы умысленно, избирая жертвы свои то въ цвѣтъ, то въ зрѣлости лѣтъ.

По мнѣнію Сейденгама, жертвою ея бываетъ пятая, а по новѣйшимъ писателямъ, четвертая часть умирающихъ. Лондонскія статистическія таблицы показываютъ среднимъ числомъ на 15,000 умершихъ, 4,500 скончавшихся отъ чахотки, что составляетъ почти  $\frac{1}{3}$  всей годичной смертности.

Для общепонятности нашихъ замѣчаній, мы считаемъ необходимымъ предпослать предварительно краткое описаніе дыхательныхъ органовъ; а затѣмъ уже перейти къ рассмотрѣнію опустошеній, производимыхъ въ нихъ чахоткою, ея вазисовъ и дѣйствія ея на весь организмъ.

Перепончатая перегородка, простирающаяся отъ грудной кости до спиннаго хребта, раздѣляетъ грудь на двѣ части. Въ одной изъ нихъ находится правое легкое, раздѣляющееся на три доли, а въ другой лѣвое, имѣющее только двѣ доли; мѣсто третьей занято сердцемъ. Воздухъ проходитъ въ легкія посредствомъ дыхательнаго горла, состоящаго изъ всегда открытой, колѣнчатой, круглой трубки, которая простирается вдоль передней части шеи. Эта трубка, въ нижней ея части, дѣлится на

двѣ главныя вѣтви. Правая вѣтвь опять раздѣляется на три, а лѣвая на двѣ меньшія вѣточки, соответственно числу самыхъ долей легкихъ. Углубляясь въ эти доли, вѣточки дыхательнаго горла продолжаютъ въ нихъ подраздѣляться на многочисленныя трубки. Достигнувъ чрезвычайной тонкости, трубки эти оканчиваются очень мелкими круглыми пузырьками, или мѣшечками, образованными изъ плевы, столь нѣжной, что воздухъ свободно дѣйствуетъ сквозь нее на кровь, безпрестанно совершающую подъ ними теченіе свое отъ правой стороны сердца; эти пузырьки прикрѣпляются пучечками къ каждой общей или главной трубкѣ, и каждый изъ нихъ соединенъ съ нею отдѣльными тончайшими трубочками, такъ, что если, посредствомъ главной трубки; наполнить всѣ эти трубочки и пузырьки растопленнымъ воскомъ, то они въ разрѣзѣ представляютъ фигуру, довольно схожую съ разсѣченнымъ кочнемъ цвѣтной капусты. Нѣкоторые физиологи прошедшаго столѣтія покушались привести въ извѣстность число этихъ воздухоносныхъ пузырьковъ. Знаменитый математикъ Келль насчиталъ ихъ до 1,744,000,000 въ каждомъ легкомъ, между тѣмъ, какъ Нѣмецкій анатомъ Либеркюнь, вѣроятно съ равною же точностію, нашелъ, что поверхность ихъ равна 1,500 квадратнымъ футамъ. Мы сказали, что пузырьки не имѣютъ непосредственнаго сообщенія между собою, и всѣ посредствомъ весьма тонкихъ трубочекъ примыкаютъ къ одной какой-нибудь общей трубкѣ; по этому, засореніе одной изъ главныхъ трубочекъ должно естественно препятствовать воздуху наполнять многія тысячи пузырьковъ, то есть, значительную часть легкаго. Пузырьки эти облечены отвсюду вѣтчатой плевою, которая наполняетъ все находящееся между ними пустое пространство, связуетъ ихъ между собою, и даетъ легкому наружный видъ его. Въ здоровомъ состояніи, воздухъ не входитъ въ эту плеву; но если пузырьки, отъ излишняго напряженія, жестокой раны или какой другой причины, будутъ разорваны, воздухъ проникаетъ въ нее и скопляясь, производитъ давленіе на ближайшую часть легкаго: отъ этого, пузырьки и трубочки запираются и не могутъ болѣе участвовать въ процессѣ дыханія. Разстройство это бываетъ иногда слѣдствіемъ или сильнаго движенія всѣхъ мускуловъ, сопряженнаго съ продолжительнымъ удерживаніемъ дыханія, или игры на духовомъ инструментѣ, напримѣръ на трубѣ, гдѣ равнымъ образомъ приходится удерживать въ себѣ часть воздуха. Не только люди, но и нѣкоторые животныя, напримѣръ загнанныя лошади, подвергаются подобному поврежденію.

Такъ, легкія суть не что иное, какъ двѣ массы, составленныя изъ воздухоносныхъ трубочекъ и пузырьковъ и связывающей ихъ вѣтчатой плевы, проникнутыя всюду многочисленными, маленькими сосудами, снабженными нервами, помощію которыхъ



отправления ихъ совершаются и всякое происшедшее въ нихъ разстройство сообщается нашимъ чувствамъ; массы облеченныя, каждая, особеннымъ перепончатымъ покровомъ, и имѣющія видъ и величину, въ точности соответствующія виду и величинѣ грудной полости, которую онѣ, совокупно съ сердцемъ, совершенно собою наполняютъ. Цѣль всего этого устройства ихъ заключается въ приведеніи крови въ соприкосновеніе съ воздухомъ; потому что, по совершеніи каждаго кругообращенія въ тѣлѣ, она непременно должна быть возобновляема соприкосновеніемъ съ воздухомъ: тогда черная кровь, возвращающаяся къ сердцу, дѣлается вновь красною и способною къ питанію тѣла. Соприкосновеніе это производится, какъ мы уже сказали, посредствомъ воздухоносныхъ трубочекъ и пузырьковъ, севозъ весьма тонкую плену послѣднихъ, которая какъ бы проѣживаетъ воздухъ. Что она не удерживаетъ его дѣйствія, это, по нашему мнѣнію, не подлежитъ спору; извѣстно, что черная кровь, налитая въ какой нибудь пузырь, дѣлается въ непродолжительномъ времени на поверхности красною — и это доказываетъ, что воздухъ на нее дѣйствуетъ такъ же, какъ бы пузыря вовсе не было. Сверхъ того, дѣйствіе воздуха значительно усиливается въ легкихъ смачиваніемъ воздухоносныхъ пузырьковъ, отдѣляющеюся отъ крови, густою, вязкою влагою, которую называютъ слизью (*mucus*). Въ здоровомъ состояніи тѣла, слизь отдѣляется въ количествѣ, потребной какъ для этой цѣли, такъ и для вознагражденія траты, причиняемой испареніемъ, потому что, при каждомъ выдыханіи воздуха изъ легкихъ, часть этой влаги испаряется. Напротивъ, когда оболочка дыхательнаго горла и вообще воздухоносныхъ трубочекъ; помощью которой совершается отдѣленіе слизи отъ крови, бываетъ воспалена вдыханіемъ вдыхахъ испареній, внезапнымъ измѣненіемъ температуры воздуха, входящаго въ легкія, или другою какою причиною, тогда отдѣленіе слизи, вслѣдствіе усиленнаго прилива крови, увеличивается, и ея излишекъ, не будучи испаряемъ посредствомъ дыханія, образуетъ плотные комочки, скопляющіеся въ воздухоносныхъ трубочкахъ. Такимъ образомъ происходитъ *завалъ* той части легкаго, которая прежде снабжалась воздухомъ посредствомъ запертой впоследствии трубки. Разстройство это ощущаетъ человѣкъ находящимися здѣсь нервами, и онъ старается кашлемъ, то есть внезапнымъ, усиленнымъ сжиманіемъ грудныхъ мышцъ, освободиться отъ беспокоящей его мокроты. Вотъ простое и ясное объясненіе причинъ болѣзни, столь извѣстной подъ именемъ грудной простуды, или кашля.

Въ здоровомъ состояніи тѣла, кровь, какъ мы замѣтили, содержитъ въ себѣ соки, изъ которыхъ составляется слизь; но вслѣдствіе извѣстнаго разстройства, о причинахъ котораго скажемъ мы послѣ, въ ней образуются соки совершенно другихъ

свойствъ, и изъ нихъ-то, вмѣсто полезной для тѣла слизи, отдѣляется матерія, называемая туберкулезною (*materia tuberculosa*), то есть, такая отъ которой происходятъ въ легкихъ *tubercula*, затвердѣлости, узлы. Постепенно скопляясь въ легкихъ, она дѣлаетъ ихъ болѣе или менѣе непроницаемыми для воздуха, производитъ въ нихъ раздраженіе, воспаленіе, и то всеобщее разстройство организма, которое мы называемъ *чахоткою*. Сверхъ того, матерія эта образуетъ массы, размягчающія и разрушающія близлежащія части легкихъ; прорываетъ кровеносные сосуды, причиняя черезъ то кровохарканіе, проникаетъ въ воздухоносныя трубки, производитъ въ нихъ широкія, гнойныя полости, и, совокупностію всѣхъ этихъ припадковъ, истомляющихъ страдающаго, составляетъ губительную болѣзнь, извѣстную подъ именемъ *чахотки съ отвердѣніемъ*, или *узловой чахотки* (*phthisis tuberculosa*); впрочемъ туберкулезная матерія не исключительно находится въ воздухоносныхъ сосудахъ, но столь же часто попадаетъ въ самыхъ легкихъ, и даже въ облекающаго ихъ плеврѣ, то есть, въ частяхъ, лишенныхъ непосредственнаго сообщенія съ горломъ. Въ томъ и другомъ случаѣ очевидно, что, при всемъ раздраженіи легкихъ, страдающій не можетъ посредствомъ кашля освободиться отъ беспокоящей его мокроты; и вотъ причина сухаго, частаго, мучительнаго кашля, столь обыкновеннаго въ началѣ чахотки. При образованіи своемъ, туберкулезная матерія имѣетъ видъ небольшихъ круглыхъ комочковъ желтоватаго или зеленоватаго, полупрозрачнаго, неорганическаго вещества различной плотности, смотря по степени давленія, производимаго на него окружающими частями: въ легкихъ оно болѣею частію походитъ на сырѣ. Обстоятельство это бываетъ впрочемъ подвержено многимъ измѣненіямъ, зависящимъ отъ разныхъ причинъ.

«Нельзя опредѣлить, говоритъ докторъ Карсвелль, въ продолженіе какого времени туберкулезная матерія достигаетъ болѣе своей плотности. Она часто находится въ воздухоносныхъ трубочкахъ и пузырькахъ, въ желчныхъ сосудахъ и въ ихъ разстѣнутыхъ оконечностяхъ, въ брюшной полости, въ фаллопеевыхъ трубахъ и въ нѣкоторыхъ другихъ внутреннихъ частяхъ, и въ первоначальномъ своемъ состояніи имѣетъ сходство, по цвѣту и плотности, съ сыромъ, смѣшаннымъ съ водою. Но если встрѣтитъ прочную преграду, способствующую ея накопленію, какъ напримѣръ въ лимфатическихъ желѣзахъ, или иногда и въ воздухоносныхъ пузырькахъ цѣлой доли легкихъ, то она дѣлается твердою какъ печень или какъ поджелудочная желѣза. Впрочемъ высшая ея плотность зависитъ не только отъ пособія этой преграды, но и отъ утраты ею самою водянистыхъ частей, совершающейся вскорѣ по ея образованіи. Такъ, въ самомъ уже началѣ эта матерія можетъ быть и очень мягкою, и очень твер-

дою. Въ первомъ случаѣ, она слизиста и при трѣнн пальцами нѣсколько зерниста, а въ послѣднемъ какъ-бы мучниста: съ виду всегда она блѣдножелтаго цвѣта и не прозрачна.

Этою выпискою хотѣли мы только усвоить читателю понятіе (которое могъ онъ и самъ собою вывести изъ предыдущаго), о томъ, что туберкулы, или узлы, не ограничиваются одними легкими, и должны также происходить въ другихъ частяхъ тѣла: такъ какъ туберкулезная матерія содержится въ крови, то для образованія узловъ, или затвердѣлостей достаточно, чтобъ матерія эта отъ нея отдѣлялась, а отдѣленіе можетъ производиться не одною слизистой поверхностію легкихъ, но и многими другими органами, и узлы могутъ возникнуть въ мозгѣ, почкахъ, печенѣ, селезенкѣ, желудкѣ, кишкахъ, вѣтчатой плевнѣ, и т. д. Но здѣсь мы исключительно занимаемся образованіемъ ихъ на поверхности и внутри легкихъ.

При вскрытіи трупа человѣка, умершаго въ самомъ началѣ чахотки, обыкновенно находятъ часть одного или обоихъ легкихъ, а иногда и цѣлыя легкія болѣе или менѣе усѣянныя затвердѣлостями, которыя отъ своего объема или отъ своей многочисленности называются *просьяными туберкулами* (*tubercula miliaria*). Если вскрытіе произведено въ позднѣйшемъ періодѣ болѣзни, то вы замѣтите, что эти туберкулы, прежде походившія на зерна проса, значительно увеличались; что нѣкоторые изъ нихъ, скопясь въ комочки величиною съ миндальну, съ грецкій орѣхъ или даже съ куриное яйцо, заняли известную часть легкихъ. Естественно, что начиная съ перваго засоренія одной или нѣсколькихъ воздухоносныхъ трубокъ, по мѣрѣ усугубленія расстройства въ легкихъ, и соотвѣтствующіе ему признаки обнаруживаются яснѣе во всей организаціи страдающаго. Впервые, онъ начинаетъ жаловаться на нѣкоторое стѣсненіе въ груди, и оно возрастаетъ при всякомъ усиленномъ ея движеніи, не позволяя дышать свободно. Потомъ слѣдуетъ сильный, отрывистый кашель, обыкновенно появляющійся зимою, а на лѣтнее время иногда совершенно прекращающійся. Вліяніе холодной и сырой атмосферы чрезвычайно ускоряетъ ходъ болѣзни. Излишній приливъ крови въ легкімъ причиняетъ излишнее отдѣленіе слези, а съ тѣмъ вмѣстѣ возникаютъ и затвердѣлости. Последнія, производя давление на нѣкоторые малые кровеносные сосуды, препятствуютъ движенію въ нихъ крови, которая, разливаясь по легкімъ, извергается вмѣстѣ съ харкотію, состоявшею въ началѣ изъ одной слизи: самыя затвердѣлости не могутъ быть съ нею извергаемы, потому, что они находятся или въ крайнихъ воздухоносныхъ пузырькахъ, или въ самыхъ легкіхъ, и воздухъ, выталкиваемый кашлемъ, не захватываетъ и не увлекаетъ ихъ съ собою. Вся организація, утомленная

усиліями страждущаго, освободиться отъ тягостной для него мокроты, принимаетъ участіе въ болѣзненности одного мѣста. Пульсъ ускоряется до того, что совершаетъ отъ 90 до 100 бѣній въ минуту. Раздражительность увеличивается, и какъ при всякомъ вдыханіи мѣтѣ воздуха входитъ въ легкія, то оно становится чаще, такъ, что человѣкъ, совершавшій въ здоровомъ состояніи пятнадцать или двадцать вдыханій въ минуту, принужденъ бываетъ дѣлать ихъ отъ двадцати-пяти до тридцати; щеки покрываются необыкновеннымъ румянцемъ, въ ладоняхъ и подошвахъ ощущается летучій и безпокоющій жаръ. Поврежденіе одного мѣста предпочтительно обращаетъ на себя дѣятельность цѣлаго организма, и всѣ отправления приходятъ отъ того въ большую или меньшую неправильность. Апетитъ уменьшается, и тѣло, не получая потребнаго количества питательныхъ соковъ, начинаетъ тощать. Кожа отъ недостатка крови холодѣетъ, сохнетъ, стягивается; временемъ однакожъ ощущаете вы преходящій жаръ изнурительной лихорадки, за которымъ слѣдуетъ на кожѣ легкій, но холодный и клейкій потъ. Утвержденные въ ней корни волосъ раздѣляютъ несчастную участь своей почвы: питательные соки доходятъ къ нимъ въ меньшемъ количествѣ, связь ихъ съ организмомъ пресѣвается, волосы наконецъ умираютъ и выпадаютъ. Мягкость въ оконечностяхъ пальцевъ поглощается безъ вознагражденія, и ногти, не находя въ нихъ болѣе опоры — загибаются. При каждомъ усиліи больного вдохнуть въ себя большее количество воздуха онъ чувствуетъ стѣсненіе и боль, въ то самое время, когда воздухъ, наполнивъ всѣ здоровыя части легкіихъ, начинаетъ давить на тѣ, въ которыхъ скопилась туберкулезная матерія. Отъ этого постоянного угнетенія груди, она постепенно суживается, плечи дѣлаются какъ бы острыми и выдаются впередъ; лопатки, какъ крылья, торчатъ сзади. По мѣрѣ отощанія тѣла, слабость умножается, и вскорѣ страждущій дѣлается неспособнымъ къ тѣлеснымъ упражненіямъ и даже къ движенію.

Продолжительность такого состоянія много зависитъ отъ вѣшнихъ причинъ, и въ этомъ-то періодѣ чахотки, перемѣна воздуха и нѣкоторыя другія врачебныя средства могутъ, если не совершенно уничтожить, то по крайней мѣрѣ замедлить ходъ ея. Впрочемъ, рано или поздно, положеніе страждущаго измѣняется чувствительнымъ образомъ. Затвердѣлости, выросшія въ разныхъ частяхъ легкіихъ, размягчаются. По общему мнѣнію, это начинается отъ центра, а по наблюденіямъ доктора Карсвелля, который весьма остроумнымъ образомъ объяснилъ причину, возмевшую многихъ весьма внимательныхъ наблюдателей въ столь странное заблужденіе, отъ поверхности затвердѣлостей. Разширяясь онѣ проникаютъ въ ближайшія воздухоносныя трубочки, и тогда съ кашлемъ соединяется обильное изверженіе

гно<sup>й</sup>ной желтой матеріи. На мѣстѣ, до того занимаемомъ затвердѣлостями, образуется полость, въ которую воздухъ уже безпрепятственно проникаетъ, и, раздражая дѣйствіемъ своимъ обнаженные и изъясненные ея стѣнки, причиняетъ новыя воспаления, новыя приливы крови и новыя скопленія затвердѣлостей. Кашель увеличивается, и припадки его бываютъ особенно сильны, когда больной ложится или встаетъ. Въротно, это происходитъ отъ того, что при всякой пере<sup>мѣнѣ</sup> положенія тѣла и положеніе гнойной матеріи измѣняется, и черезъ то новыя части внутренностей подвергаются раздраженію. Въ случаѣ зараженія только одного изъ легкихъ, больной предпочтительно ложится на тотъ бокъ, въ которомъ оно находится, чтобы здоровое легкое, не стѣвяясь тяжестью тѣла, могло дышать свободно. Но происходящее отъ того облегченіе незначительно и кратковременно; новыя скопленія затвердѣлостей проникаютъ воздухоносныя трубки; раздраженіе усугубляется; во время сна, на головѣ и на груди выступаетъ сильная испарина; чахотка обнаруживается самыми ясными признаками; тѣло худѣетъ и ослабѣваетъ до чрезвычайности; слизистая плева, облегающая снаружи воздухоносные сосуды, толстѣетъ и покрывается гнойными ранами и затвердѣлостями, и кашель дѣлается тогда нестерпимымъ.

Наконецъ, силы желудка упадаютъ, и принятая пища нерѣдко извергается горломъ послѣ сильнаго припадка кашля. Кишки также приходятъ въ расстройство: во внутренней ихъ перепонкѣ обнаруживаются признаки раздраженія и даже изъясвленія. Диаррея перемежается съ усиленнымъ отдѣленіемъ пота, или его сопровождаетъ. Глаза получаютъ какою-то жемчужную бѣлизну; взглядъ дѣлается дикимъ; мозгъ орашаемый испорченною, отъ недостатка воздуха, кровью, растранивается; поврежденіе умственныхъ способностей обнаруживающееся иногда въ началѣ болѣзни, иногда въ концѣ, часто превращается въ совершенное безуміе. Разсудокъ помрачается, и бѣдный страдалецъ, не примѣчая опасности своего положенія, ежечасно ожидаетъ совершеннаго возстановленія здоровья, и нисходитъ въ могилу въ то самое время, вагъ составляя планъ долгой и счастливой жизни.

Не въ одномъ человѣческомъ тѣлѣ находятся затвердѣлости. Большая часть обезьянъ содержащихся въ звѣринцахъ, умираетъ этою ужасною болѣзнію, и по вскрытіи ихъ труповъ часто находятъ легкія, печень, селезенку и нѣкоторыя другія внутренности исполненными затвердѣлостей. Г. Ройе-Колларъ нашелъ ихъ множество въ легкихъ льва, содержавшагося въ Парижскомъ Ботаническомъ Саду. По наблюденіямъ Г. Дююи, онѣ встрѣчаются нерѣдко у лошадей, и еще чаще во внутренностяхъ свиней. Быки подвержены тоже затвердѣлостямъ, и Г. Андраль говоритъ, что однажды получилъ отъ Г. Лари кусокъ мяса, въ

которомъ находилась полость, содержащая туберкулезную массу величиною съ крупную вишню. Многочисленные опыты, произведенные надъ кроликами, доказываютъ, что можно, нѣкоторыми искусственными способами, образовать затвердѣлости даже въ самыхъ здоровыхъ изъ нихъ.

Овцамъ также свойственны чохотные узлы, отъ которыхъ умираетъ также множество попугаевъ, привозимыхъ въ Европу; а въ Альфортскомъ музеумѣ хранится печень индѣйки, покрытая этого рода затвердѣlostями.

Приведенные примѣры животныхъ объясняютъ причины, способствующія образованію узловъ въ человѣкѣ. Животнымъ, страдавшимъ этою болѣзнію, подвергались ей отъ того, что или изъ знойнаго климата были перевозимы въ холодный, и лишены свободы и движенія, какъ обезьяны и попугаи; или содержались въ мѣстахъ сырыхъ, душныхъ и мрачныхъ, какъ часто случается съ рогатымъ скотомъ, свиньями и кроликами; или, наконецъ, претерпѣвали внезапные и частые переходы отъ жаркой температуры къ холодной, и принуждены были дѣлать чрезмѣрные тѣлесныя напряженія, какъ напримѣръ лошади.

Достойно примѣчанія, что не было еще примѣра, чтобъ собака, болѣе прочихъ животныхъ подверженная произволу человѣка и принужденному образу его жизни, страдала чохоткою. Движеніе, свѣжій воздухъ и солнечный свѣтъ, которыми она безпрепятственно можетъ пользоваться, безъ сомнѣнія тому причиною. Прочія домашнія животныя находятся въ большемъ или въ меньшемъ стѣсненіи, въ заперти, въ неволѣ, и отъ этого кровь ихъ портится скорѣе, и дѣлается способною къ образованію затвердѣlostей.

Но человѣкъ страдаетъ не отъ однихъ только тѣхъ вліаній, которыя дѣйствуютъ на животныхъ: кромѣ перемѣнъ климата и температуры, кромѣ сырости, вредной пищи, излишняго и недостаточнаго движенія и т. п., онъ терпитъ еще отъ разныхъ другихъ причинъ, свойственныхъ собственно ему и образу его жизни. Онъ живетъ въ многолюдныхъ городахъ, въ жилищахъ тѣсныхъ, низкихъ и душныхъ; онъ дышитъ атмосферою, наполненною вредными испареніями, дымомъ, пылью и разными посторонними частицами; онъ посѣщаетъ многочисленныя собранія, гдѣ воздухъ отъ столпившагося народа бываетъ раскаленъ и вредоносенъ; онъ напрягаетъ свои дыхательные органы выше ихъ силы; утомленный, облитый сильнымъ потомъ, онъ часто подвергается дѣйствию пронзительнаго вѣтра, дождя, снѣга.

Занятія нѣкоторыми ремеслами и искусствами часто бываютъ также причиною чохотки. Особенно вредны тѣ занятія, при которыхъ ремесленникъ принужденъ вдыхать въ себя тонкую пыль, отдѣляющуюся отъ обрабатываемыхъ матеріаловъ:

пыль эта, лежащая на весьма чувствительную плеву воздухоносныхъ сосудовъ, производитъ въ ней непрестанное раздраженіе. Хлѣбники, фабриканты, приготовляющіе пудру, пуховыя издѣлія и т. п., бывають, большею частію, люди слабыя, блѣдныя, имѣющіе тѣло мягкое и одутлое, склонныя къ короткому, мучительному кашлю; частицы, поднимающіяся на воздухъ при пеленіи камней, будучи чрезвычайно остры и раздражая внутренности гораздо сильнѣе, обнаруживаютъ дѣйствіе свое нагноеніемъ плены, развѣденіемъ маленькихъ сосудовъ, и причиняютъ кровохарканіе. Извѣстно, что обтачиваніе иглъ—ремесло самое пагубное для здоровья: чтобъ уменьшить его вредность, изобрѣли въ Англіи магнитныя пластинки, которыя прикладываются ко рту, и привлекають къ себѣ всѣ металлическія частицы, садящіяся безъ того прямо на легкія. Занятія, сопряженныя съ наклоненіемъ и стѣсненіемъ груди, препятствуя свободному дыханію, должны быть также отнесены къ причинамъ чахотки, и Г. Мерриэ особенно предостерегаетъ дамъ отъ излишняго вязанія чулокъ. Впрочемъ, что касается до женскаго пола, то у него главнѣйшею причиною чахотки бывають слишкомъ легкія, слишкомъ открытыя костюмы, обнажающіе половину тѣла. Посѣщая вечернія собранія наши дамы, утомленныя, и раздраженныя жаромъ, производимымъ многочленною толпою и свѣчами, нерѣдко съ величайшею неосторожностію подвергаютъ себя дѣйствію холоднаго ночнаго вѣтра, и тутъ же получаютъ въ груди зародышъ губительной болѣзни.

Замѣтимъ еще, что свидѣтельство знаменитѣйшихъ медиковъ, заставляетъ выключить въ число этихъ причинъ также близкое обхожденіе съ страждущими чахоткою. Зараза эта сообщается преимущественно отъ одного члена семейства другому: впрочемъ подобные случаи большею частію имѣють мѣсто тогда только, когда спишь въ одной постели съ больнымъ. Докторъ Ломбаръ опровергаетъ мнѣніе о заразительности чахотки, опираясь на то, что ухаживающіе за чахоточными въ Парижскихъ, Стразбургскихъ и Женевскихъ больницахъ, рѣже умирають ею, чѣмъ люди другихъ сословій, но это отнюдь еще не уничтожаетъ предположенія нашего относительно степени близости къ больному, опасной для здороваго. Г. Люисъ, въ небольшомъ разсужденіи о несправедливости всеобщаго вѣрованія въ наследственность чахотки, упоминаетъ однакожъ объ одномъ случаѣ, въ которомъ нѣкто заразился чахоткою единственно отъ того, что во время довольно продолжительнаго пути сидѣлъ въ одной каретѣ съ человѣкомъ, который страдалъ открытымъ нагноеніемъ легкаго.

Представивъ въ общихъ чертахъ картину чахотки мы переходимъ къ подробному описанію ея симптомовъ.

## II.

Существеннѣйшими признаками легочной чахотки служатъ слѣдующія симптомы:

1) *Учащенное дыханіе*, которое замѣчается, хотя и въ различной степени, при всѣхъ формахъ легочной чахотки, и обусловливается различными причинами. Оно соединяется, хотя, впрочемъ, не всегда съ *одышкой*.

Очень часто больные, даже при значительномъ развитіи легочной чахотки, страдаютъ одышкой только по временамъ, именно при такихъ состояніяхъ, при которыхъ потребность дыханія усиливается подъ вліяніемъ усиленнаго объема вещества; между тѣмъ, какъ въ состояніи покоя больной имѣетъ достаточно средствъ, чтобы безъ особыхъ усилій доставлять крови нужное количество кислорода и выдыхать образующуюся въ тѣлѣ углекислоту. Съ другой стороны значительное и продолжительное ускореніе дыханія, сопряженное съ одышкой и, какъ понятно, еще болѣе усиливающееся подъ вліяніемъ упомянутыхъ условій, можетъ составлять одинъ изъ самыхъ тягостныхъ признаковъ легочной чахотки.

Учащенное дыханіе и одышка чахоточныхъ больныхъ зависятъ частью отъ уменьшенія поверхности дыханія, частью отъ катарра, сопутствующаго страданію и съ уживающаго просвѣтъ дыхательныхъ вѣтвей, частью — но только въ рѣдкихъ случаяхъ — отъ боли при дыханіи, частью, наконецъ, и всего болѣе, отъ лихорадочнаго состоянія.

Обыкновенно одышка бываетъ только при одновременномъ дѣйствіи нѣсколькихъ изъ этихъ условій. Такъ, поверхность дыханія можетъ быть чрезвычайно уменьшена, не производя при этомъ одышки и ускоренія дыханія больного въ покойномъ состояніи; подобное явленіе замѣчается, если при этомъ нѣтъ ни значительнаго катарра, ни боли при дыханіи, ни лихорадочнаго состоянія. У многихъ больныхъ, легкія которыхъ уплотнены и разрушены на столь значительномъ протяженіи, что для объема газовъ едва уцѣлѣла половина всѣхъ легочныхъ капилляровъ, замѣчается даже совершенно нормальная частота дыханія, когда они сидятъ покойно или лежатъ въ постели. Это явленіе очень просто объясняется тѣмъ, что здоровые субъекты, при обыкновенныхъ условіяхъ, для удовлетворенія своей потребности дыханія приводятъ въ дѣятельность только весьма



незначительную долю тѣхъ средствъ, которыми они располагаютъ для дыхательнаго акта. При этомъ не должно также упустить изъ виду, что, при уплотненіи и разрушеніи легочной ткани, удѣлившіе и проходимые легочные пузырьки при вдыханіи обыкновенной глубины сильнѣе растягиваются входящею струей воздуха и, соответственно этому, при выдыханіи вытѣсняются болѣе воздуха, нежели пузырьки здороваго легкаго: это въ усиленный обмѣнъ газовъ въ существующихъ пузырькахъ, очевидно, уравниваетъ, по крайней мѣрѣ, въ значительной степени, тотъ ущербъ, который возникаетъ вслѣдствіе отсутствія разрушенныхъ пузырьковъ.

Туберкулезныя грануляціи, присутствіе которыхъ обыкновенно ускользаетъ отъ физическаго изслѣдованія, выполняютъ большое количество легочныхъ пузырьковъ и закупориваютъ множество бронхиальныхъ вѣточекъ: слѣдовательно—значительно уменьшаютъ поверхность дыханія. Поэтому, значительное учащеніе дыханія безъ одновременной тупости звука при постукиваніи и безъ бронхиальнаго дыханія принадлежитъ къ самымъ важнымъ признакамъ туберкулезной чахотки въ болѣе тѣсномъ смыслѣ. Если мы замѣчаемъ, что у больнаго, у котораго уплотненіе и разрушеніе легочной ткани до тѣхъ поръ не вызывали вовсе одышки или обуславливали одышку лишь незначительную, появляется очень учащенное дыханіе и тягостная одышка, между тѣмъ, какъ физическое изслѣдованіе не обнаруживаетъ ни увеличенія уплотненной и разрушенной области легкаго, ни усиленія лихорадочнаго движенія и т. д., — то возникаетъ весьма серьезное опасеніе, что къ существующей чахоткѣ присоединилась бугорчатка. Бываютъ случаи, въ которыхъ одно уже несоотвѣтствіе между незначительнымъ протяженіемъ области тупаго звука и высокою степенью учащеннаго дыханія приводитъ насъ къ заключенію о присоединеніи названнаго осложненія.

Не нужно особенно распространяться о томъ, говоритъ Неймеръ, почему у чахоточныхъ больныхъ частота дыханія увеличивается, какъ вслѣдствіе плейритическихъ болѣй, такъ и вслѣдствіе ожесточенія и распространенія сопровождающаго чахотку бронхиальнаго катарра, вслѣдствіе осложненія плейритическими выпотами, накопленія жидкости или газовъ въ полости груди и т. д.

Столь же понятно, продолжаетъ онъ, и учащеніе дыханія подъ вліяніемъ лихорадки, потому что сущность лихорадки заключается въ болѣзненно-усиленномъ развитіи теплоты, которою организмъ нагрѣвается черезъ мѣру. При лихорадкѣ, какъ при всякомъ тѣсномъ напряженіи, должна усиливаться потребность дыханія, потому что и въ томъ и въ другомъ случаѣ производится больше угольной кислоты и потребляется больше кисло-

рода. При сравненіи скорости дыханія съ температурой тѣла и частотою пульса у чахоточныхъ больныхъ оказывается, что усиленная потребность дыханія отчасти удовлетворяется болѣе значительною глубиною дыхательныхъ движеній, потому что кривизнѣ вривыхъ линій, которая обусловливается болѣею частью очень значительными колебаніями вечерней и утренней температуры, почти никогда не соответствуетъ подобная же кривизна вривыхъ, выражающихъ частоту дыханія. Последняя только въ рѣдкихъ случаяхъ повышается въ вечерніе часы на 6—8 движеній, во многихъ же случаяхъ дыханіе ускоряется только на 3—4 движенія въ минуту; въ нѣкоторыхъ случаяхъ ускоренія въ дыханіи не замѣчается даже вовсе.

2) *Боли въ груди и въ плечахъ* часто отсутствуютъ во все теченіе болѣзни. Вообще онѣ чаще сопровождаютъ процессы пнеймоническіе, нежели туберкулезные. Поэтому въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ мы, вслѣдствіе отрицательнаго результата физическаго изслѣдованія, остаемся въ сомнѣніи, имѣемъ ли мы дѣло съ маленькими разсыянными, пнеймоническими фокусами или съ бугорками, — плейрическія боли могутъ приобрести значеніе для распознаванія и предсказанія, особенно когда рядомъ съ ними отхаркивается окрашенная кровью мокрота.

3) *Кашель и отхаркиванія мокроты въ очень многихъ случаяхъ предшествуютъ легочной чахоткѣ* болѣе или менѣе долго и зависятъ тогда отъ *продромальнаго катарра*, который, распространившись на пузырьки, влечетъ за собою катарральную пнеймонію и, вслѣдствіе творожистаго превращенія и позднѣйшаго распадаенія продукта воспаленія, легочную чахотку. Чрезвычайно важно убѣдиться въ каждомъ данномъ случаѣ, появились ли лихорадка, похуданіе блѣдность, покрововъ лица и т. д. уже послѣ того, какъ больной долгое время кашлялъ и извергалъ обильную мокроту, — или же, наступили ли упомянутыя явленія одновременно съ кашлемъ, одышкой и прежде, чѣмъ мокрота сдѣлалась обильною. Въ первомъ случаѣ, при прочихъ одинаковыхъ условіяхъ вѣроятнѣе, что мы имѣемъ дѣло съ пнеймоническими процессами; въ последнемъ же случаѣ, наоборотъ, вѣроятнѣе, что больной нашъ пораженъ туберкулезной чахоткой.

*Продолжительность* продромальнаго катарра бываетъ различна. Случается, что уже въ теченіи первой или второй недѣли послѣ его появленія выступаютъ ясныя признаки распространенія процесса на пузырьки и начинающейся чахотки. Сюда принадлежатъ не только большинство тѣхъ случаевъ, въ которыхъ чахотка присоединяется непосредственно къ кори и коклюшу, но и многіе изъ тѣхъ случаевъ, въ которыхъ бугорчатка начинается будто подъ видомъ катарральной горячки или гриппа. Съ другой стороны бываетъ и такъ, что катарръ

длится цѣлые мѣсяцы или годы, ухудшаясь зимою и ослабѣвая во время лѣта, пока наконецъ не переходитъ на пузырьки. Въ подобныхъ случаяхъ врачъ часто остается совершенно покойнымъ, потому что, не смотря на кашель и отхаркиваемое, большой не обнаруживаетъ лихорадочныхъ движеній, сохраняетъ свои силы и питаніе его остается въ весьма удовлетворительномъ состояніи. Но вдругъ картина мѣняется и выступаютъ ясные признаки чахотки.

Первоначальное *мѣстопребываніе* катарра, принимающаго столь опасный оборотъ, въ отдѣльныхъ случаяхъ также бываетъ различно. Иногда мы съ самаго уже начала видимъ дѣло съ катарромъ мельчайшихъ бронхиальныхъ вѣточекъ, но нередко однако катарральное пораженіе начинается въ гортани и въ трахѣ и впоследствии уже распространяется на тѣ опасныя области, съ которыхъ процессъ переходитъ уже на легочныя пузырьки.

Нѣкоторую опору для оцѣнки тѣхъ шансовъ, какіе представляются для перехода катарра въ легочную чахотку, даетъ слабость и ранимость (*vulnerabilitas*) больныхъ. Вообще субъекты, которые очень часто страдали катаррами и у которыхъ прежніе катарры затягивались надолго, болѣе подвержены опасности, чѣмъ субъекты, у которыхъ этого не замѣчалось. Тѣмъ не менѣе однако и послѣдніе не находятся совершенно вѣз опасности, не обладаютъ, такъ сказать, полною неранимостью.

4) *Мокрота*, извергаемая больнымъ въ теченіи обыкновеннаго катарра заслуживаетъ величайшаго нашего вниманія. Хотя мы и не видимъ въ тонкихъ, рѣзко очерченныхъ, насыщенно-желтаго цвѣта полоскахъ, находимыхъ въ мокротѣ признака начинающейся бугорчатки, — однако мы считаемъ ихъ за признаки катарра мельчайшихъ бронхиальныхъ вѣточекъ, а мы знаемъ, что такое мѣстопребываніе и такая форма катарра всего болѣе заставляютъ бояться перехода страданія на легочныя пузырьки. Столь же опаснымъ явленіемъ служить и интимная примѣсь крови къ слизистой или слизисто-гношной мокротѣ, потому что она указываетъ обыкновенно на начало пневмоническаго процесса.

5) *Во время теченія самого страданія только въ редкихъ случаяхъ не замѣчается кашля и отхаркиванія мокроты.* Известно, что кашель и мокрота иногда исчезаютъ почти совершенно, если, при одновременно существующей чахоткѣ кишечнаго канала, поносы становятся очень обильными, — явленіе, которое объясняется тѣмъ, что въ этихъ случаяхъ раздраженіе слизистой оболочки дыхательныхъ путей, сравнительно съ раздраженіемъ слизистой оболочки кишекъ, отступаетъ на задній планъ.

Долго продолжающійся мучительный кашель со скуднымъ

изверженіемъ, содержащимъ мало форменныхъ составныхъ частей въ высшей степени подозрителенъ: онъ внушаетъ намъ, опасеніе, что мы имѣемъ дѣло не съ пневмоническими процессами, но съ *булорчаткой* слизистой оболочки дыхательныхъ вѣтвей и пузырьковъ, и изреченіе *Канитатта*, что если мокрота при упорномъ кашлѣ и лихорадкѣ долгое время сохраняетъ свой сырой характеръ, словно она зависитъ отъ острой bronchitis, то она крайне подозрительна и служитъ въ высшей степени вѣроятнымъ признакомъ булорчатки» — вполне сохраняетъ свою силу и въ настоящее время.

Остальные особенности капли и мокроты, которыя считаются писателями характеристичными для булорчатки, хотя мы и можемъ признать за признаки чахотки, но ни въ какомъ случаѣ не можемъ считать за признаки булорчатки. Т. н. *spina globosa fundum retentia* указываютъ на присутствіе круглыхъ пещеръ; примѣшанные къ мокротѣ тѣльца, напоминающія зерна риса—если они только не имѣютъ своимъ источникомъ миндалевидныя железы—указываютъ на дифтеритическое распаденіе въ стѣнкѣ бронха или пещеры: погруженіе мокроты въ воду говоритъ намъ, что она образовалась не въ болѣе крупныхъ бронхахъ, въ которыхъ къ ней обыкновенно бываютъ примѣшаны болѣе значительныя количества воздуха; присутствіе упругихъ волоконъ въ мокротѣ служатъ вѣрнымъ признакомъ разрушительнаго процесса и т. д.,—но для распознаванія булорчатки намъ нужны еще другія явленія. Можно быть увѣреннѣе, что *больной, который, одновременно съ другими признаками легочной чахотки, извергаетъ мокроту, указывающую на обширное разрушеніе легочной ткани, нередко находится въ меньшей опасности, нежели больной, у котораго замѣчается лихорадочное состояніе, который блѣднѣетъ и худѣетъ все болѣе и болѣе, и который извергаетъ упомянутую тягучую, прозрачную мокроту.* Довольно часто удается, перемѣщеніемъ въ болѣе выгодныя условія, продлить на болѣе или менѣе продолжительный срокъ жизнь, укрѣпить силы и увеличить на много фунтовъ въсѣ тѣла такихъ больныхъ, которые извергали громадныя количества упругихъ волоконъ и исхудали до крайности.

6) *Хриплый и беззвучный кашель* принадлежатъ къ самымъ важнымъ признакамъ *туберкулезной* легочной чахотки или, другими словами, *осложненія легочной чахотки, первоначально зависящей отъ разрушительныхъ воспалительныхъ процессовъ, булорчаткой.* Тѣ, въ высшей степени интересные случаи, въ которыхъ у чахоточныхъ больныхъ измѣненіе голоса и звучности капля есть слѣдствіе паралича голосовыхъ связокъ, вызваннаго давленіемъ плейретическихъ рубцовъ на гесигенъ, являются крайнею рѣдкостью сравнительно съ тѣми случаями, въ которыхъ названныя симптомы зависятъ отъ туберкулезныхъ

язвъ слизистой оболочки. Если кашель становится суровымъ и безвучнымъ уже въ периодъ значительнаго развитія чахотки, то это говорить въпользу послѣдовавельной бугорчатки; если же, наоборотъ, онъ имѣетъ этотъ, характеръ уже съ самого начала, и именно въ то время, когда мокрота еще тягуча и прозрачна и физическое изслѣдованіе груди не обнаруживаетъ еще никакихъ грубыхъ измѣненій, — то возникаетъ подозрѣніе о перичной легочной чахоткѣ. Развитіе бугорковъ, какъ мы упомянули выше, начинается нѣрѣдко въ трахѣе и гортани, и въ послѣдствіе уже распространяется на болѣе мелкія дыхательныя вѣтви.

7) *Лихорадка* принадлежитъ къ самымъ постояннымъ признакамъ какъ хронической пневмоніи, такъ и бугорчатка.

*Цимсенъ* показалъ, что у дѣтей переходъ катарра на легочныя пузырьки постоянно сопровождается значительнымъ повышеніемъ температуры и учащеніемъ пульса. То же самое имѣетъ мѣсто и у взрослыхъ при началѣ катарральной пневмоніи. Унѣреніе Луи, что въ большинствѣ случаевъ ( $\frac{4}{5}$ ) лихорадка появляется уже въ болѣе или менѣе позднемъ периодѣ бугорчатки, объясняется тѣмъ, что этотъ изслѣдователь стоялъ на точкѣ зрѣнія *Лэннека* и считалъ поэтому придормальный катарръ уже за слѣдствіе существующей бугорчатки. Точный контроль надъ температурой тѣла и частотой пульса въ каждомъ простомъ катаррѣ, и тщательное пользование каждаго случая, въ которомъ въ теченіи застарѣлаго катарра является лихорадочное состояніе, очень часто въ состояніи предотвратить возникновеніе и дальнѣйшее развитіе легочной чахотки.

Подобно тому какъ появленіе лихорадки служить важнымъ признакомъ перехода катарра: такъ и продолжающееся ея существованіе служить самымъ вѣрнымъ ручательствомъ, что пневмоническіе процессы еще не кончились. Кривая линия, получаемая при графическомъ изображеніи утренней и вечерней температуры чахоточныхъ больныхъ, обыкновенно представляютъ поразительное согласіе между собою, и руководствуясь ими можно почти съ такою же достоверностью заключать о существованіи легочной чахотки, съ какою мы заключаемъ о существованіи брюшнаго тифа и острой кружной пневмоніи. Разница между утреннею и вѣчернею температурой составляетъ обыкновенно 1—1 5°, въ рѣдкихъ случаяхъ она бываетъ меньше, очень часто же она напротивъ знач. тельно превышаетъ эту величину; часто мы замѣчаемъ, что утренняя температура бываетъ приблизительно нормальна, между тѣмъ какъ въ послѣобѣденные и вечерніе часы она поднимается до 39° и даже еще выше. Такой ходъ температуры свойственъ не всѣмъ изнуригельнымъ лихорадкамъ. При сравненіи кривой, выражающей температуры чахоточныхъ, съ кривой, служащей выраженіемъ температуры у страдающихъ продолжительнымъ перичерическимъ нагно-

ниемъ, костоѣдой и т. д. оказывается большое различіе, пменно относительно правильности утреннихъ послабленій и вечернихъ ожесточеній. Предпринятія Нимейеромъ обширныя изслѣдованія относительно гектической лихорадки у чахоточныхъ, именно относительно тѣхъ моментовъ, которые нарушаютъ правильное ея теченіе, не могутъ еще быть названы закончанными; но можно теперь уже высказать то положеніе, что при *туберкулезной чахоткѣ* въ болѣе тѣсномъ смыслѣ и при *осложненіи разрушительной пнеймоніи туберкулезнымъ процессомъ* разницы между утренней и вечерней температурой обыкновенно оказываются сравнительно весьма незначительными. Поэтому, пока лихорадка имѣетъ характеръ лихорадки послабляющей съ почти перемежающимся типомъ, мы, при прочихъ равныхъ условіяхъ дѣлаемъ лучшую prognosticu, нежели тогда, когда она приближается къ *f. continua*.

У больныхъ, у которыхъ творяжистыя массы окружились сумкой или подверглись уже разжиженію и всосались, лихорадка можетъ исчезнуть совершенно и нерѣдко случается, что больные съ обширными пещерами въ верхушкахъ легкихъ совершенно свободны отъ лихорадки. Въ этихъ случаяхъ (въ которыхъ пнеймонія приняла исходъ въ затвердѣніе) физическіе признаки и ежедневно, особенно по утрамъ, извергаемая споканная мокрота иногда рѣзко противорѣчатъ субъективному благополучію больного, его свѣжему и здоровому виду, состоянію его силъ и питанія. Но подобные больные, несмотря на исходъ ихъ прежняго страданія въ относительное выздоровленіе, всетаки находятся въ опасности погибнуть отъ возвратовъ пнеймоническихъ процессовъ или умереть отъ чахотки вслѣдствіе послѣдовательной бугорчатки: къ этому надо прибавить, что практически весьма важно взвѣшивать такихъ больныхъ отъ времени до времени и продолжать у нихъ измѣреніе температуры, чтобы такимъ образомъ быть постоянно на сторожѣ, не возникаетъ ли у нихъ одна изъ выше названныхъ случайностей.

Изъ всего сказаннаго ясно, что для діагностики, prognostici и терапіи легочной чахотки термометрія имѣетъ по меньшей мѣрѣ столь же важное, и даже еще болѣе важное значеніе, нежели при всякой другой болѣзни.

Понятно также, почему объ *обдѣльнѣи кровью и похуданіи* больного,—признакахъ, которымъ чахотка обязана своимъ названіемъ,—мы говоримъ уже послѣ лихорадки: для насъ не можетъ быть никакого сомнѣнія, что самымъ главнымъ источникомъ этихъ явленій служить именно лихорадка. Къ доказательству справедливости теоріи, по которой лихорадочное повышение температуры тѣла зависитъ отъ усиленнаго произведенія теплоты, принадлежитъ быстрое уменьшеніе вѣса тѣла даже тогда, когда лихорадка продолжается очень недолго. Познаніе

того факта, что сплы и составныя части тѣла чахоточныхъ больныхъ всего болѣе истощаются лпхорадкой. имѣеть самое важное значеніе при леченіи легочной чахотки.

Хотя названныя только что процессы и поражаютъ часто одновременно одного и того же субъекта, однако это нисколько не даетъ права утверждать, что это бываетъ необходимо всегда, и даже въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ замѣчается такая комбинація, важно еще разяснить, преобладаетъ ли одна или другая форма разстройства въ питаніи.

Мы знаемъ, что человекъ съ *паралитическою грудью и чахоточнымъ видомъ* можетъ имѣть самыя здоровыя легкія; но мы предполагаемъ у него, какъ мы подробнѣе изложили это уже выше, извѣстную слабость и ранимость, отъ которыхъ зависить, что катарры и другія страданія легко затягиваются и оставляютъ по себѣ творожистые продукты. Понятно само собою, что въ сомнительныхъ случаяхъ моментъ этотъ можетъ имѣть свое значеніе при діагностикѣ. Но такъ какъ предрасположеніе къ заболѣванію съ творожистыми продуктами въ извѣстной степени вмѣщаетъ въ себя и предрасположеніе къ бугорчаткѣ, то у человекъ съ паралитическою грудью, особенно если въ той или другой верхушкѣ легкіхъ оказывается застарѣлое уплотнѣніе, мы должны, при прочихъ равныхъ условіяхъ, болѣе чѣмъ у другаго имѣть въ виду возможность развитія послѣдовательной бугорчатки.

Всѣ физическіе признаки «въ первомъ періодѣ легочной чахотки» зависятъ единственно отъ катарральной припухлости слизистой оболочки дыхательныхъ вѣтвей и отъ присутствія въ нихъ отдѣляемаго. По господствующему ученію, пока единственными физическими явленіями служатъ усиленное или ослабленное везикулярное дыханіе, прерывистое (*saccadites*) дыханіе, удлиненный и приостренный выдыхательный шумъ въ верхушкахъ легкіхъ, — бугорки или сочетанія бугорковъ еще не слились въ обширные, расположенные на периферіи, уплотнѣлые фокусы». При вскрытіяхъ мы гораздо чаще находимъ въ верхушкахъ легкіхъ болѣе или менѣе старыя пнеймоническіе процессы, затвердѣніе и сморщиваніе легочной ткани, каверны, какъ результатъ бронхіектазіи или распадаенія творожистой инфильтраціи, — нежели бугорки, поэтому нельзя не признать, что катарры въ верхушкахъ легкіхъ имѣютъ особенную наклонность распространяться на стѣнки бронхіальныхъ вѣточекъ и на боковыя и концевые ихъ пузырьки. До тѣхъ поръ пока возникшія такимъ образомъ перибронхитическія и пнеймоническія гдѣзда не слились м. с. въ болѣе обширныя уплотненныя отдѣлы, тупость звука и бронхіальнаго дыханія, понятно, не будетъ, и физическое изслѣдованіе, кромѣ симптомовъ катарра, дастъ намъ отрицательные результаты. Поэтому, затяжной ка-

тарръ въ верхушкѣ легкихъ представляетъ очень подозрительное явленіе. Чѣмъ долѣе существуетъ этотъ катарръ, тѣмъ основательнѣе опасеніе, что онъ повлечетъ или уже повлекъ за собою тѣ расстройства питанія, которыя всего чаще лежатъ въ основаніи легочной чахотки. Что переходъ каттарра на бронхіальныя стѣнки и на легочную паренхиму уже послѣдовалъ, мы заключаемъ, преимущественно изъ появленія лихорадки, изъ расстройства общаго состоянія, изъ похуданія и блѣдности крововъ. Но даже и въ такихъ случаяхъ, при тщательномъ леченіи, такъ часто слѣдуетъ наступленіе совершеннаго выздоровленія, что можно считать исходъ такихъ пнеймоническихъ процессовъ въ творожистую инфильтрацію и распаденіе легочной ткани—исходъ, слѣдовательно, въ легочную чахотку—не единственнымъ исходомъ этого страданія. Такимъ образомъ, нельзя считать катарра верхушки легкаго ни вѣрнымъ признакомъ начинающейся легочной *бугорчатки*, ни постояннымъ предвѣстникомъ легочной *чахотки*.—но только *признакомъ того, что больному грозитъ опасность поразиться чахоткой.*

*Тупость звука при постукиваніи, бронхіальное дыханіе и звонкіе хрипы въ верхнихъ отдѣлахъ груди* даже въ глазахъ многихъ слывуть за патогностическіе признаки легочной бугорчатки или легочной чахотки. Большая часть больныхъ, обращаясь за совѣтомъ къ врачу, умѣетъ очень хорошо опредѣлять границы тупаго звука при послѣднемъ изслѣдованіи. Такъ-какъ тупость звука при постукиваніи и бронхіальное дыханіе никогда не обусловливаются однимъ только сліяніемъ бугорковъ или группъ: то эти признаки съ достовѣрностью указываютъ на пнеймоническую инфильтрацію или на ея остатки. Впрочемъ это не доказываетъ того, что больной, у котораго получается тупой звукъ и бронхіальное дыханіе въ верхушкахъ легкихъ, не можетъ быть пораженъ въ тоже время и бугорками. Напротивъ, Нимейеръ указываетъ симптомы, которые даютъ право заключать, что *рядомъ* съ остатками воспалительныхъ процессовъ въ легкихъ существуютъ также и бугорки; но вообще однако можно высказать вмѣстѣ съ нимъ слѣдующее положеніе:

«Если распространеніе тупаго звука и бронхіальнаго дыханія находится въ прямомъ отношеніи къ развитію чахотки, то предсказаніе бываетъ относительно болѣе благопріятнымъ, нежели въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ больной находится въ сильномъ лихорадочномъ состояніи и быстро худѣетъ, безъ того, чтобы распространеніе тупаго звука соответствовало дальнѣйшему развитію остальныхъ болѣзненныхъ явленій.

Въ первой категоріи случаевъ мы видимъ дѣло преимущественно съ пнеймоническими процессами; во второй, вѣроятно, съ новообразованіемъ.



Не притупленный, но *пустой и тимпаническій* звук при постукиваніи принадлежит къ симптомамъ, которые у больного съ очень учащеннымъ дыханіемъ, кашлемъ, незначительнымъ изверженіемъ мокротъ и т. д. возбуждаютъ подозрѣніе, что содержаніе воздуха въ легкихъ уменьшено и легочная паренхима потеряла свою упругость вслѣдствіе туберкулезнаго процесса. Мы должны однако прибавить, что звукъ при постукиваніи можетъ сдѣлаться пустымъ и тимпаническимъ также подъ вліяніемъ маленькихъ пнеймоническихъ гнѣздъ.

*Опаденіе надключичныхъ и подключичныхъ яминъ* на одной или обѣихъ сторонахъ, которое играло до сихъ поръ столь важную роль въ симптоматологіи легочной бугорчатки, равно какъ и *низкій уровень верхней границы легкаго* (Зейтцъ) не свидѣтельствуютъ ни о бугорчаткѣ, ни о творожистой инфильтраціи, ни о распаденіи легочной паренхимы, но указываютъ *всегда и единственно* на уменьшеніе верхушки легкаго вслѣдствіе затвердѣнія и сморщиванія. Правда, что тотъ же самый процессъ, который былъ причиной опаденія грудной кѣтки, могъ повлечь за собою вмѣстѣ съ тѣмъ и образованіе бронхіектатическихъ пещеръ, и что стѣнки послѣднихъ могутъ сдѣлаться мѣстопробываніемъ дифтеритическаго разрушенія; кромѣ того, и въ другихъ отдѣлахъ легкаго творожистыя инфильтраціи могутъ находиться въ состояніи распадѣнія или легочная паренхима можетъ быть пронизана бугорками,—но чтобы считать субъекта съ ввалившимися надъ—и подключичными яминами чахоточнымъ, мы должны еще руководствоваться общимъ состояніемъ его, извергаемой имъ мокротой и другими еще физическими признаками. Если же намъ недостаетъ такихъ точекъ опоры, то этотъ симптомъ, служить даже важнымъ признакомъ одного изъ благопріятнѣйшихъ—исходовъ, относительнаго излеченія тѣхъ процессовъ, которые всего чаще лежатъ въ основаніи чахотки. Это конечно еще не доказываетъ того, что такіе больные уже застрахованы отъ чахотки; напротивъ того, они подвержены—какъ это достаточно видно изъ нашего изложенія—гораздо большей опасности получить чахотку вслѣдствіе новыхъ пнеймоническихъ пораженій или подъ вліяніемъ послѣдовательной бугорчатки, нежели люди, у которыхъ верхушки легкихъ не подверглись сморщиванію и затвердѣнію.

*Ослабленіе дыхательныхъ движеній* въ верхнихъ отдѣлахъ грудной кѣтки, если оно совпадаетъ съ опаденіемъ соответственныхъ частей, имѣетъ такое же значеніе, какое имѣетъ предъидущій признакъ. Въ этихъ случаяхъ, сморщенная и непронимая для воздуха легочная паренхима не въ состояніи слѣдовать за движеніемъ вдыхательныхъ мышцъ, и если мѣста, которые не поднимаются при вдыханіи, имѣютъ свою нормальную выпуклость, но при постукиваніи на нихъ получается ту-

пой звукъ, то мы должны заключать объ обширномъ уплотнѣннй легочной паренхимы и, съ высокою степенью вѣроятности, о пнеймонической инфилтраціи. Ослабленныя дыхательныя движенія на такомъ мѣстѣ, на которомъ постукиваніе не даетъ тупаго звука, но получается звукъ нормальный и нѣсколь-ко пустой и тимпанической, внушаютъ подозрѣніе на присутствіе бугорковъ, но не служатъ однако вѣрнымъ ихъ признакомъ, такъ какъ и маленькія разсѣянныя долчатыя пнеймоніи въ состояніи ослабить дыхательныя движенія, не притупляя звука при постукиваніи.

*Кавернозные шумы*, наконецъ, вмѣстѣ съ довольно частымъ, измѣняющимся дыханіемъ едва ли замѣчаются часто при туберкулезныхъ кавернахъ. Вообще еще недоказано, чтобы обширныя каверны образовались такимъ образомъ, что скученія бугорковъ размягчаются, разжижаются и извергаются наружу, и что этотъ процессъ продолжаетъ повторяться въ стѣнкахъ нервичной пещеры, въ возникающихъ въ послѣднихъ новыхъ бугоркахъ. Во всякомъ случаѣ, большая часть крупныхъ кавернъ въ чахоточныхъ легкихъ частью зависятъ отъ расширенія бронховъ, частью обязаны своимъ происхожденіемъ распаденію творожисто-инфилтрированной ткани. Извѣстное сочетаніе признаковъ, которое слыветъ патогностическимъ для бронхіектатическихъ кавернъ, соотвѣтствуетъ только расширеніямъ бронховъ въ нижнихъ доляхъ легкихъ, которыхъ содержимое съ трудомъ можетъ быть извергнуто и претерпѣваетъ поэтому гнилостное распаденіе. Изъ бронхіектатическихъ же кавернъ въ верхушкахъ легкихъ, которыя наблюдаются гораздо чаще, нежели такія же каверны въ нижнихъ доляхъ, содержимое извергается легко, такъ-что оно рѣдко только подвергается гніенію.

Если мы слышимъ кавернозные шумы въ верхушкѣ легкаго, но не замѣчаемъ при этомъ опаденія над—и подключичной области и слишкомъ значительнаго пониженія верхней границы легкаго, то мы можемъ съ извѣстною вѣроятностью заключать, что каверны произошли вслѣдствіе распаденія легочной ткани. Если же, наоборотъ, рядомъ съ кавернозными шумами существуютъ упомянутые признаки затвердѣнія и сморщиванія легочныхъ верхушекъ, то должно принять, что мы имѣемъ дѣло съ бронхіектатическими полостями. Весьма нерѣдко люди съ только-что упомянутыми явленіями долгое время чувствуютъ себя относительно хорошо, вполне сохраняютъ свои силы, причѣмъ вѣсь ихъ тѣла скорѣе даже увеличивается, нежели уменьшается, пока ихъ не поразитъ новое пнеймоническое страданіе или послѣдовательная бугорчатка, которыя и низводятъ ихъ въ могилу.

Въ заключеніи мы представимъ самыя существенныя черты тѣхъ картинъ болѣзни, которыя представляютъ различныя фор-

мы легочной чахотки. Прежде всего займемся той формой страданія, при которой болѣзненные явленія обуславливаются *едино-ственно пнеймоническими процессами и ихъ исходами*.

Форма эта нерѣдко начинается болѣе или менѣе бурными явленіями подъ видомъ остраго страданія. Сюда принадлежать тѣ случаи, въ которыхъ крупозная пнеймонія, вмѣсто исхода въ разрѣшеніе, влечетъ за собою творожистую инеяльтрацію и легочную чахотку; далѣе тѣ случаи, въ которыхъ кровь, излившись при кровохарканьѣ въ бронхи и пузырьки и свернувшись въ нихъ, вызываетъ сильныя и обширныя пнеймоническія процессы; наконѣцъ такіе случаи, въ которыхъ острый бронхіальный катарръ переходитъ на пузырьки болѣе крупныхъ легочныхъ отдѣловъ.

Исхода—впрочемъ рѣдкаго—крупозной пнеймоніи въ творожистую инфильтрацію и легочную чахотку мы должны опасаться, если къ концу первой или въ началѣ второй недѣли болѣзни лихорадка не прекращается, если она по вечерамъ показываетъ значительныя ожесточенія, а по утрамъ ослабляется при появленіи обильныхъ потовъ, если тупость звука при постукиваніи груди продолжается, если въ области тупаго звука слышатся еще нѣкоторое время влажныя, звенящія хрипы и извергаются болѣе значительныя количества слизисто-гноевой мокроты. Присутствіе въ мокротѣ упругихъ волоконъ и кавернозные шумы не оставляютъ болѣе никакого сомнѣнія, что творожисто инфильтрированная ткань подвергается распаденію. Большая часть больныхъ погибаетъ уже спустя немного недѣль вслѣдствіе сильной лихорадки. Гораздо рѣже случается, что состояніе больного улучшается послѣ того, какъ болѣзненные явленія успѣли уже внушить намъ самыя серьезныя опасенія,—мокрота дѣлается менѣе обильною, больные начинаютъ постепенно поправляться, но тупость звука продолжается, грудь вваливается въ соответствующемъ мѣстѣ все болѣе и болѣе,—и спустя нѣкоторое время выступаютъ рѣзко выраженные признаки затвердѣнія и сморщиванія пораженной части легкаго, и часто также бронхіектатическихъ пещеръ.

Очень много сходства съ только-что описаннымъ теченіемъ представляетъ отчасти теченіе тѣхъ пнеймоническихъ процессовъ, которые непосредственно присоединяются къ кровохарканію или къ легочному кровотеченію и которые, обуславливаются излившееся въ бронхи и пузырьки и свернувшееся въ нихъ кровью. Чѣмъ обширнѣе становится область тупаго звука, которая образуется въ теченіе сопровождаемаго кровохарканіемъ кашля, и чѣмъ долѣе она существуетъ, чѣмъ яснѣе выражены явленія воспаленія плейры, чѣмъ сильнѣе лихорадочное состояніе у больного и чѣмъ долѣе оно продолжается,—тѣмъ болѣе должно опасаться, что задержанная кровь и воспалительная па-

ренхима легких претерпѣли творожистый метаморфозъ и что легкому предстоятъ обширныя разрушенія — Но что и въ такихъ случаяхъ творожистыя массы могутъ подвергаться въ послѣдствіи разжиженію и всосаться, или окружиться сумкой (инкапсулироваться), и что вслѣдствіе обильнаго разрастанія соединительной ткани дѣло можетъ дойти до уплотненія и сморщиванія легкаго, — это фактъ доказанный.

Переходъ остраго катарра на многочисленныя легочныя пузырьки также сопровождается иногда тяжелыми болѣзненными припадками, именно сильной лихорадкой и столь быстрымъ упадкомъ силъ и питанія, что распознаваніе можетъ вначалѣ сдѣлаться затруднительнымъ. Но вскорѣ однако картина болѣзни проясняется. Мокрота отъ времени до времени получаетъ характеристическое для пнеймоническихъ процессовъ окрашиваніе вслѣдствіе интимной примѣси крови, появляются болѣе или менѣе сильныя и болѣе или менѣе распространенныя плеиритическія боли, звукъ при постукиваніи верхнихъ отдѣловъ груди становится пустымъ и тимпаническимъ, а когда первоначально дольчатая гнѣзда сливаются въ обширныя уплотнѣлыя фокусы — тупымъ; при этихъ же условіяхъ неопредѣленные до того времени хрипы дѣлаются звонкими, дыхательный шумъ становится бронхиальнымъ и т. д. — Случается, что эти быстро развившіяся катарральныя инфильтраціи разрѣшаются совершенно; гораздо чаще однако бываетъ, что инфильтрированная ткань претерпѣваетъ творожистый метаморфозъ и въ скоромъ времени распадается. Большинство случаевъ быстротечной чахотки, при которой въ теченіе немногихъ недѣль образуются обширныя разрушенія легкаго и больныя, при явленіяхъ весьма жестокой лихорадки, быстро худѣютъ и погибаютъ, возникаетъ вслѣдствіе перехода остраго катарра на пузырьки болѣе крупныхъ легочныхъ отдѣловъ и можетъ быть названо исходомъ острой или подострой катарральной пнеймоніи въ *phthisis florida*. — Если разсматриваемый процессъ распространяется на цѣлую долю легкаго, то въ рѣдкихъ только случаяхъ въ послѣдствіи наступаетъ всосаніе или инкапсулированіе творожистыхъ массъ, и затвердѣніе и сморщиваніе пораженнаго отдѣла легкаго. Если острая катарральная пнеймонія оставляетъ послѣ себя творожистыя инфильтраціи незначительнаго объема, то исходъ въ затвердѣніе и сморщиваніе случается гораздо чаще.

Опаденіе надъ-и подъяючныхъ яминъ и низкій уровень верхнихъ границъ легкихъ у многихъ субъектовъ могутъ быть приписываемы пораженію острой катарральной пнеймоніей, которая затянулась на болѣе или менѣе долгое время и приняла исходъ въ затвердѣніе и сморщиваніе.

Нерѣдко представляются даже случаи наблюдать больныхъ, которые поражаются этимъ страданіемъ многократно, чрезъ

большіе или меньшіе промежутки времени, переносятъ его каждый разъ благополучно, но послѣ всякаго подобнаго приступа представляютъ большее распространеніе области тупаго звука и объема ввалившагося мѣста груди, пока они наконецъ не умираютъ отъ менѣе благопріятно протекшаго пнеймоического процесса или отъ бугорчатки.

Въ противоположность къ разсмотрѣннымъ до сихъ поръ случаямъ, переходъ катарра съ бронховъ на легочные пузырьки можетъ и не сопровождаться бурными явленіями и проходить даже совершенно скрытно. Очень часто при вскрытіяхъ находятъ въ верхушкахъ легкихъ рубцовыя стягиванія, инкапсулированныя творожистыя гнѣзда, мозолистыя уплотнѣнія, — все слѣды пнеймоическихъ процессовъ, совершенно ускользавшихъ отъ наблюденія. — Подобнымъ же образомъ у многихъ людей замѣчается опаденіе надъ—и подкюичныхъ яминъ и слишкомъ низкое стояніе верхней границы легкаго безъ того однако, чтобы можно было опредѣлить, когда именно и при какихъ явленіяхъ протекло воспаденіе легкаго, которое повлекло за собою затвердѣніе и сморщиваніе его верхушки. — Однако, при сколько нибудь значительномъ распространеніи процесса, и *хроническая* катарральная пнеймонія, повидимому, всегда сопровождается лихорадкой. Это коварное теченіе лихорадки, правда, обыкновенно проглядывается больнымъ, а иногда долгое время также и прачемъ, такъ какъ болѣе грубые субъективныя симптомы — знобъ, чувство жара, усиленная жажда и т. д. — незначительны и отступаютъ на задній планъ въ сравненіи съ послѣдствіями усиленнаго потребленія составныхъ частей тѣла и съ тѣмъ невыгоднымъ вліяніемъ, какое оказываетъ лихорадка на аппетитъ, на пищевареніе, на кровотвореніе и питаніе.

Если больной съ хроническимъ бронхіальнымъ катарромъ, до того времени не оказывавшимъ неблагопріятнаго вліянія ни на его субъективное состояніе, ни на его силы, теряетъ аппетитъ, дѣлается блѣднымъ и худымъ, и замѣчаетъ у себя ясный упадокъ силъ, то возникаетъ подозрѣніе, что катарръ распространился на легочные пузырьки, и является самая настоятельная потребность дознаться помощьюъ точныхъ измѣреній температуры тѣла и неоднократнаго физическаго изслѣдованія груди, не существуетъ ли лихорадочнаго состоянія и нѣтъ ли уплотнѣнія въ легкихъ. — Хронически протекающая форма катарральной пнеймоніи при благопріятныхъ внѣшнихъ условіяхъ обнаруживаетъ положительную наклонность принять исходъ въ затвердѣніе и сморщиваніе; но подъ вліяніемъ вредныхъ условій въ ней замѣтна такая же наклонность къ возвратамъ. Этимъ объясняется, что безчисленное множество больныхъ во время лѣта, не смотря на обширныя мозолистыя уплотнѣнія и на

присутствіе бронхіентатическихъ пещеръ въ верхушкахъ легкихъ, находится въ довольно сносномъ состояніи, между тѣмъ какъ зимою, на оборотъ, особенно если эти больные должны работать и подвергаться простудѣ, у нихъ появляется лихорадка они дѣлаются слабыми, худѣютъ и блѣднѣютъ, и въ легкихъ ихъ образуются новыя уплотнѣнія. Такимъ образомъ часто втеченіи цѣлаго ряда лѣтъ замѣчаются у больнаго подобныя перемежки.

Мы должны постоянно имѣть въ виду возможность *развитія бугорчатки втеченіе легочной чахотки, обусловливаемой пнеймоническими процессами*. Это осложненіе можетъ развиваться во всякомъ періодѣ страданія, и даже при самомъ благоприятномъ теченіи легочной чахотки не должно поступать очень самоувѣренно и дѣлать безусловно благоприятное предсказаніе.

Бугорки могутъ развиваться въ чахоточныхъ легкихъ столь скрытно, что ихъ или вовсе нельзя діагностировать, или нельзя діагностировать съ полною увѣренностью. — Во многихъ другихъ случаяхъ, именно въ такихъ, въ которыхъ въ легкихъ развиваются очень многочисленныя бугорки, и въ которыхъ бугорчатка распространяется и на другіе органы, распознаваніе на оборотъ не представляетъ никакихъ трудностей. — Если мы замѣчаемъ, что у чахоточнаго больнаго появляется очень сильная одышка безъ одновременнаго увеличенія области тупаго звука при постукиваніи груди; если лихорадка, не смотря на всѣ наши усилія, не прекращается и вмѣсто послабляющаго характера принимаетъ характеръ постоянный (f continua); если у больнаго появляются поносы вмѣсто прежней быть можетъ наклонности къ запорамъ; если къ остальнымъ признакамъ присоединяется охриплость и афонія или извѣстныя припадки страданія оболочекъ на основаніи мозга, — то мы должны съ полною увѣренностью принять, что въ данномъ случаѣ къ чахоткѣ присоединилась бугорчатка. У субъектовъ молодыхъ, у которыхъ бугорчатка имѣетъ особенную наклонность поражать мозговья оболочка, надежными точками опоры для распознаванія служатъ мозговья явленія, у людей же болѣе преклонныхъ лѣтъ — болѣзненные явленія со стороны кишечнаго канала и гортани.

Картина болѣзни, наконецъ, какую представляетъ начало и теченіе нервичной туберкулезной чахотки, существенно отличается отъ тѣхъ, которыя мы разсматривали до сихъ поръ и, по большей части, бываетъ такъ характеристична, что распознаваніе этой, не очень частой формы чахотки обыкновенно довольно легко. Прежде всего при ней не замѣчается prodromального катарра. Лихорадка и исхуданіе больнаго наступаютъ здѣсь не тогда, когда больные извергаютъ уже обильныя массы слизистой гнойной мокроты: на оборотъ, самое, такъ сказать, высыпаніе бугорковъ, особенно, если они очень многочисленны,

совершается при значительномъ повышеніи температуры тѣла и при быстромъ изнуреніи больного вслѣдствіе чрезвычайно усиленной продукціи тепла. Если больной намъ говоритъ, что онъ началъ кашлять и отхаркивать мокроту послѣ того уже какъ онъ, въ предшествующія недѣли, въ короткое время быстро похудѣлъ, поблѣднѣлъ и ослабѣлъ,—то должно опасаться, что онъ страдаетъ туберкулезною чахоткой. Это подозрѣніе пріобрѣтаетъ новую силу, когда у больного появляется очень сильная одышка и когда физическое изслѣдованіе груди даетъ сначала отрицательные результаты; впоследствии звукъ при постукиваніи, благодаря послѣдовательнымъ пневмоническимъ процессамъ, можетъ притупиться, дыханіе можетъ сдѣлаться бронхиальнымъ, хрипы звонкими, но только въ рѣдкихъ случаяхъ уплотненіе легкихъ дѣлается столь обширнымъ, какъ при прежде описанныхъ нами формахъ легочной чахотки. Звукъ голоса и кашля здѣсь рано уже дѣлается хриплымъ, и если туберкулезное пораженіе гортани дѣлается значительнымъ и быстро распространяется, то получаютъ извѣстные мучительные признаки гортанной чахотки. Точно также не заставляютъ себя долго ждать и явленія кишечной бугорчатки и туберкулезной внѣшней чахотки. Истощенію больного благоприятствуютъ обильные поносы; животъ становится чувствительнымъ къ давленію и т. д. Рѣдко болѣзнь длится долѣе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. Большая часть больныхъ погибаетъ отъ нея еще ранше-

### III.

Для предотвращенія легочной чахотки задача наша заключается прежде всего въ томъ, чтобы людей, обнаруживающихъ признаки слабаго сложенія и особенно, представляющихъ уже ясно выраженныя явленія значительной ранимости организма и наклонностей къ пораженіямъ съ образованіемъ творожистыхъ продуктовъ, окружить по возможности такими условіями, отъ которыхъ мы можемъ ожидать укрѣпляющаго дѣйствія на организмъ и уничтоженія сказаннаго болѣзненнаго расположенія.

Осторожныя матери, особенно же такія, которыя имѣли уже несчастье потерять дѣтей отъ крупа, отъ воспаленія медьчайшихъ дыхательныхъ вѣточекъ и т. п., и которыя, вслѣдствіе многократнаго заболѣванія оставшихся у нихъ дѣтей, чрезвычайно тревожатся объ ихъ здоровьѣ, для предохраненія отъ простуды обыкновенно *сокращаютъ для нихъ пребываніе на свѣжестъ воздуху*; это дѣлается нерѣдко съ согласія врача и оказываетъ въ высшей степени гибельное вліяніе. Хотя вредъ причиняемый организму постояннымъ пребываніемъ въ комнатѣ; въ настоящее время не усненъ еще надлежащимъ образомъ

однако самый фактъ, что какъ золотуха, такъ и легочная чахотка встрѣчаются гораздо чаще въ воспитательныхъ и сиротскихъ домахъ, въ исправительныхъ заведеніяхъ, въ тюрьмахъ и между фабричными рабочими, проводящими цѣлые дни въ замкнутыхъ пространствахъ, нежели у людей, занятія которыхъ сопряжены съ пребываніемъ на открытомъ воздухѣ,—фактъ этотъ, не нуждается въ дальнѣйшихъ подтвержденіяхъ. Возраженіе, что чистота золотухи и легочной чахотки обусловливается въ этихъ институтахъ иными влияніями, нежели отсутствіемъ свѣжаго воздуха, что она зависитъ именно отъ дурной и недостаточной пищи, не выдерживаетъ критики. Населеніе многихъ бѣдныхъ деревень питается въ среднемъ выводѣ гораздо худшей пищей и подвергается болѣе многочисленнымъ вреднымъ влияніемъ, нежели жители тюремъ и исправительныхъ домовъ,—однако названныя болѣзни замѣчаются у этого населенія далеко не такъ часто. *Эти-то очевидные факты до сихъ поръ слишкомъ мало принимались къ сердцу въ практикѣ.* Врачи отправляютъ ежегодно на нѣсколько недѣль, для пользованія соляными купаньями, безчисленное множество слабыхъ и жалкихъ дѣтей съ запущенными катаррами, хроническими сыпями, опухшими лимфатическими желѣзами и т. д., и допускаютъ, чтобы эти же самыя дѣти,—лишь бы они только усердно пили рыбій жиръ,—втеченіе всего остальнаго года просиживали ежедневно по шести часовъ на школьной свамейкѣ, занимались дома заданными въ школѣ уроками, и брали еще уроки на дому. При такомъ обыкновеніи, нечего удивляться тому, что многія близкія матери не выпускаютъ своихъ дѣтей изъ комнаты въ теченіи всей зимы. Только тамъ, гдѣ вредныя послѣдствія этой системы, по причинѣ продолжительности зимы, выступаютъ особенно рѣзко, какъ напр. въ Россіи, существуетъ довольно общепринятый обычай отправлять на зиму въ южныя страны не только больныхъ съ развитою уже легочною чахоткой, но и такихъ субъектовъ, у которыхъ подозрѣваютъ *расположеніе къ чахоткѣ.* Надо, желать чтобы дѣтямъ запрещали посѣщеніе школъ при первомъ появленіи вредныхъ его послѣдствій, чтобы, гдѣ это позволяютъ обстоятельства, дѣти слабыя, хворыя, расположенныя къ простудѣ и страдающія золотухой до окончателнаго укрѣпленія ихъ здоровья посылались на зиму въ такія страны, гдѣ они могли бы играть цѣлые дни на открытомъ воздухѣ.

Что профилактика легочной чахотки, помимо устраненія тѣхъ вліяній, отъ которыхъ зависитъ частота этого страданія въ тюрьмахъ, сиротскихъ домахъ и т. д., требуетъ и такихъ мѣръ вторыя, особенно при существующемъ расположеніи къ легочной чахоткѣ; по возможности предотвращаютъ развитіе бронхіальныхъ катарровъ и при помощи которыхъ даже незначи-



тельные бронхиальные катарры устраняются скоро и совершенно, — это понятно само собою.

Если острый катарръ переходитъ съ бронховъ на легочные пузырьки, то на течение и исходъ страданія часто оказываетъ рѣшительное влияние то обстоятельство, считаетъ ли врачъ катарральныя явленія въ верхушкахъ легкихъ, лихорадку, сильное разстройство общаго состоянія, быстрый упадокъ силъ и т. д. за вѣрные признаки *бугорчатки*, или же, онъ принимаетъ, что эта группа симптомовъ можетъ зависѣть также отъ самостоятельнаго катарра и отъ процессовъ дольчатой пневмоніи.

Въ первомъ случаѣ, строгія гигиеническія и діететическія мѣры считаются обыкновенно бесполезными и не предписываются больному, — онъ продолжаетъ заниматься своими дѣлами пока все болѣе и болѣе усиливающаяся лихорадка и возрастающая слабость не заставятъ его оставаться дома, или же, пока кровавая мокрота, плейритическія боли, появленіе тупаго звука при постукиваніи груди не заставятъ его заняться леченіемъ.

И въ томъ случаѣ, когда врачъ составляетъ себѣ вѣрное понятіе о природѣ страданія, онъ, конечно, все таки не въ состояніи пресѣчь процессъ, но за то онъ имѣетъ тогда всѣ причины предпринять самыя строгія мѣры, онъ употребитъ всѣ зависящія отъ него средства, чтобъ предохранить больнаго отъ вредныхъ вліяній и окружить его такими условіями, отъ которыхъ можно ожидать, что они въ состояніи остановить развитіе пневмоническаго процесса и предотвратить исходъ его въ творожистую инфильтрацію и въ распаденіе легочной ткани. Попробуйте только строго запрещать больнымъ, у которыхъ замѣчаются мнимые признаки начинающейся легочной бугорчатки, оставлять постель въ теченіи долгаго времени, запрещайте имъ всякіе бесполезные разговоры и кашель, покрывайте грудь ихъ припарками, обращайтесь при первомъ появленіи и при каждомъ возобновленіи плейритическихъ болей къ мѣстному кровопусканію помощью пиявокъ или банокъ, — и вы скорѣе убѣдитесь, что не малое число больныхъ, которыхъ въ прежнее время сочили бы пораженными бугорчаткой и вслѣдствіе этого безнадежно погибшими — выздоравливаютъ.

Означенный способъ леченія требуется самымъ настоятельнымъ образомъ и при ожесточеніяхъ, возникающихъ при болѣе сильныхъ лихорадочныхъ явленіяхъ, во время теченія хронической легочной чахотки. Какъ важно и въ подобныхъ случаяхъ вліяніе леченія, направленаго противъ воспалительнаго пораженія легкаго, — это доказываютъ примѣры приводимые Нимейеромъ. Въ Тюбингенскую клинику, въ которую стекаются болѣе преимущественно изъ окрестныхъ деревень, чахоточные субъекты поступаютъ на нѣкоторое время нѣрѣдко по нѣ-

сколько разъ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, при этомъ оказы-  
вается, что въ теченіи тѣхъ немногихъ недѣль которыя они про-  
водятъ въ клиникѣ и въ продолженіи которыхъ они подвер-  
гаются означенному леченію, лихорадка, слабость, похуданіе,  
которыя при поступленіи часто бывають выражены такъ  
сильно, что внушаютъ самыя серьезныя опасенія, совершенно  
исчезають; и что больные сами желаютъ останити клинику и  
возвратиться къ своимъ занятіямъ. Правда, часто случается,  
что эти больные уже по прошествіи короткаго времени снова  
просятся въ больницу, при чемъ у нихъ снова замѣчается силь-  
ное лихорадочное состояніе, значительная слабость и уменьше-  
ніе вѣса тѣла, доходящее до 8—10 фунтовъ. Тѣмъ не менее  
однако, не только больничные случаи, но и наблюденія въ ча-  
стной практикѣ показали какую великую пользу мы можемъ  
принести, если будемъ считать «гектическую» лихорадку чахо-  
точныхъ за симптомъ хроническаго воспаленія легкаго и если  
высоту ея, подобно высотѣ лихорадки при острой крупозной  
пнеймоніи, будемъ принимать за мѣрило для оцѣнки интензив-  
ности и дальнѣйшаго распространенія пнеймоническаго про-  
цесса.—Можно удостовѣриться почти каждый день, что врачи  
дозволяютъ чахоточнымъ паціентамъ, принадлежащимъ къ со-  
стоятельному классу, заниматься своими дѣлами, продолжать  
свои ходенія въ контору или канцелярію и посѣщать душные  
и переполненные табачнымъ дымомъ клубы и трактиры, даже  
и тогда, когда у нихъ *является по вечерамъ довольно сильное  
лихорадочное состояніе*. Довольно часто распространенію хро-  
ническаго воспалительнаго процесса и исходу его въ распада-  
ніе существенно способствуютъ именно тѣ, въ высшей степени  
вредныя для воспаленнаго легкаго, вліянія, которымъ подвер-  
гаются больные при описанномъ образѣ жизни,—между тѣмъ  
какъ строго предписывая больному тщательно избѣгать всего  
того, что можетъ раздражать его легкія, совѣтуя ему строгій  
покой и пребываніе въ равномерной температурѣ, употребляя  
при этомъ влажную теплоту и т. д.—намъ нѣрѣдко удается  
поразительно быстро остановить процессъ и вызвать улучше-  
ніе въ состояніи больнаго.

Если устраненіе всѣхъ вредныхъ для воспаленнаго легкаго  
вліяній, употребленіе потогонныхъ средствъ въ умѣренной сте-  
пени, прикладываніе влажной теплоты къ груди и т. д. не имѣютъ  
желаемаго успѣха, и если лихорадка держится на скольконибудь  
значительной высотѣ, то должно немедленно обратиться къ  
употребленію *противолихорадочныхъ средствъ*. Эти средства  
столь же мало оказываютъ непосредственное вліяніе на хро-  
ническую пнеймонію чахоточныхъ, какъ и на острую крупоз-  
ную пнеймонію, на тифъ и другіе болѣзненные процессы, про-  
тивъ которыхъ ихъ такъ часто рекомендуютъ и употребляютъ

конечно, безъ яснаго представленія о томъ, какъ собственно они дѣйствуютъ. Убѣдившись однажды навсегда, что потеря слизи и клеточныхъ элементовъ, которая часто бываетъ гораздо обильнѣе при простомъ бронхиальномъ катаррѣ, имѣеть только незначительную долю участія въ истощеніи чахоточныхъ, и что самый лютой врагъ этихъ больныхъ есть лихорадочное состояніе—мы, естественно, должны хлопотать во всѣхъ силъ объ укрощеніи именно этого врага. Между средствами, при помощи которыхъ намъ удастся во многихъ случаяхъ понизить усиленное производство тепла и температуру тѣла, не смотря на продолжающееся существованіе основнаго страданія, всего большею славою по справедливости пользуются *digitalis* и хининъ.

Если намъ не удастся осилить у чахоточныхъ больныхъ лихорадочный процессъ вышеприведеннымъ способомъ, то очень часто употребляютъ наперстянку и хининъ въ формѣ пиллюль, содержащихъ 1 гранъ хинина,  $\frac{1}{2}$  грана *digitalis*,  $\frac{1}{4}$  грана опиума; по 1 пиллюль 4 раза въ день. Употребленіе этихъ пиллюль прекращается, когда наступаетъ ясное уменьшеніе температуры тѣла и частоты пульса, и снова возобновляется коль скоро дѣйствіе ихъ исчезаетъ.

Отъ изложенія противодихорадочнаго способа леченія легочной чахотки мы непосредственно переходимъ къ разсмотрѣнію діеты этихъ больныхъ. Субъектъ, который находится въ лихорадочномъ состояніи и который, вслѣдствіе этого, быстро потребляетъ составныя части своего тѣла, гораздо настоятельнѣе нуждается въ доставленіи новаго питательнаго матеріала, нежели субъектъ, у котораго лихорадки не замѣчается. Больной, страдающій легочной чахоткой, часто находится въ лихорадочномъ состояніи нѣсколько мѣсяцевъ подрядъ: ему грозитъ по этому гораздо большая опасность погибнуть отъ лихорадки, нежели человѣку, пораженному острымъ лихорадочнымъ процессомъ, имѣющимъ только кратковременное теченіе. Отсюда ясно, что мы имѣемъ совершенно особенныя причины вводить въ организмъ чахоточныхъ по возможности обильное количество цѣлесообразнаго питательнаго матеріала. Что введеніе пищи усиливаетъ лихорадочный процессъ—какъ часто утверждаютъ—это рѣшительно еще не доказано; поэтому, не говоря уже о господствующемъ въ Англійи обычаѣ, и у насъ больныхъ подвергаютъ т. н. лихорадочной діетѣ только до тѣхъ поръ, т. е. ихъ только до тѣхъ поръ лишаютъ всякой питательной пищи, пока не замѣчаютъ, что этимъ условливается опасность; въ такомъ случаѣ совершенно игнорируютъ упомянутый, основный будто бы на опытахъ, законъ, или скорѣе дѣйствуютъ даже прямо въ противоположномъ ему смыслѣ. Что касается до выбора приличной для чахоточныхъ пищи, то въ этомъ от-

ношеніи старинныя предписанія, заимствованныя отчасти изъ грубаго наблюденія, совершенно согласны съ физиологическими законами обмѣна вещества и питанія. Пищевыя средства, которыя преимущественно рекомендуются чахоточнымъ, всё содержать большія количества жира или жиροобразователей и содержать относительно мало протеиновыхъ веществъ. Такому выбору вполне соответствуетъ добытый путемъ опытовъ фактъ, что при обильномъ введеніи протеиновыхъ веществъ усиливается продуція мочевины, слѣдовательно обмѣнъ азотистыхъ составныхъ частей, одновременное же обильное введеніе жировъ и жиροобразователей, напротивъ, уменьшаетъ обмѣнъ и потребление органовъ и тканей, имѣющихъ чрезвычайно важное значеніе въ экономіи организма. По этому, чахоточнымъ больнымъ нельзя не совѣтовать самымъ настоятельнымъ образомъ по возможности обильное употребленіе молока (которому дѣти обязаны округлостію своихъ членовъ и котораго не напрасно избѣгаютъ тучные субъекты). Но совершенно излишне и несообразно лишать молоко козеина и употреблять его въ видѣ сыворотки, за исключеніемъ развѣ только тѣхъ, безъ сомнѣнія чрезвычайно рѣдкихъ, случаевъ, въ которыхъ больные хорошо переносятъ сыворотку, но дурно перевариваютъ молоко.—Рыбій жиръ дѣйствуетъ хорошо; но его вполне можно замѣнить гораздо менѣе противными и гораздо менѣе отягчающими желудокъ солодовыми экстрактами, которые, вмѣсто жира, содержатъ жиροобразователи въ очень легко уподобляемой формѣ.—Леченіе виноградомъ также можетъ быть рекомендовано какъ замѣна рыбаго жира. Послѣ ежедневнаго употребленія 3—4 фунтовъ сладкаго винограда въ Vevey, Montreux и т. д. почти всѣ субъекты, по истеченіи немногихъ уже недѣль, поливуютъ и приобрѣтаютъ въ вѣсъ.

Во всемъ остальномъ леченіе легочной чахотки, зависящей отъ пнеймоническихъ процессовъ должно быть основано на *тѣхъ же самыхъ началахъ, которыя руководятъ насъ и при леченіи катарровъ, ограничивающихся слизистой оболочкой дыхательныхъ вѣтвей*. Насъ завело бы слишкомъ далеко, если бы мы хотѣли изложить въ подробности, при какихъ условіяхъ бываетъ показано употребленіе т. н. expectorantia, при какихъ условіяхъ уместны средства смолистыя и бальзамическія или наркотическія, въ какихъ случаяхъ полезно вдыханіе превращенныхъ въ пыль лекарственныхъ веществъ и т. д. Употребленіе щелочно-соляныхъ источниковъ оказываетъ во многихъ случаяхъ дѣйствительно цѣлебное дѣйствіе и при томъ не только на продромальный катарръ, но и на самую легочную чахотку. Больной, у котораго замѣчается сколько нибудь значительное лихорадочное состояніе, непременно долженъ оставаться въ комнатѣ и при томъ—именно въ постели.

Подобно тому какъ при леченіи простыхъ катарровъ избѣжаніе новыхъ вредныхъ вліяній играетъ гораздо важнѣйшую роль, нежели употребленіе медикаментовъ,—такъ и при леченіи легочной чахотки, зависящей отъ катарральной пневмоніи, главную роль играетъ гигиена больного. Большинству чахоточныхъ больныхъ слѣдовало бы совѣтовать самую значительную часть сѣверной зимы оставаться въ комнатѣ и поддерживать въ ней равномерную, по возможности температуру,—если бы эта мѣра не противорѣчила выше изложеннымъ, чрезвычайно важнымъ соображеніямъ. Эта дилемма—вредить больному если не этимъ, такъ другимъ путемъ—всего лучше можетъ быть обойдена, если заставить больного переселиться на зиму въ такую страну, въ которой онъ могъ бы пребывать большую часть дня на открытомъ воздухѣ, безъ опасенія подвергнуться простудѣ, и безъ того, чтобы онъ долженъ былъ дышать при этомъ холоднымъ и сырымъ воздухомъ. Таковъ, единственно вѣрный смыслъ назначенія *перселенія въ здоровый климатъ*. Должно, не откладывая, предложить больному, если это только по его средствамъ, рѣшиться на такое матеріальное пожертвованіе,—но нужно въ то же время и показать ему все въ подлежащимъ свѣтъ, чтобы онъ не вообразилъ, будто воздухъ той мѣстности, куда мы его посылаемъ, содержитъ особенныя цѣлебныя вещества для его больныхъ легкихъ. Только тогда, когда больные знаютъ въ чемъ суть дѣла, они ведутъ себя въ Ниццѣ, Мэнтонѣ, въ По, Пизѣ, а также въ Алжирѣ, Каиро, на Мадейрѣ, такъ осторожно, что можно рассчитывать на благопріятное вліяніе ихъ переселенія. Въ противномъ случаѣ для больного часто было бы гораздо лучше, если бы онъ остался дома. Поступая по изложеннымъ здѣсь правиламъ, какъ понятно само собою, еще до наступленія суровой погоды, осенью, отправляемъ больного въ Содентъ, Баденвейлеръ, Висбаденъ и—главнѣе всего—къ Женевскому озеру, гдѣ онъ можетъ въ то же время пользоваться и виноградомъ, и гдѣ онъ до начала зимы чувствуетъ себя также хорошо, какъ у насъ въ самые теплые лѣтніе мѣсяцы. На зиму же можно посылать въ Ниццу, Мэнтону, Пизу, По и т. д. только очень благоразумныхъ и осторожныхъ больныхъ, на которыхъ можно положиться, что они въ дурную погоду будутъ оставаться дома. Всегда однако лучше больныхъ, которымъ средства это позволяютъ, отправлять на зиму въ Алжиръ, Каиро, на островъ Мадейру. Преимущества, которыми обладаетъ то или другое изъ этихъ мѣстъ сравнительно съ другими, не выяснены еще надлежащимъ образомъ, а формулированіе показаній для Мадейры, Каиро, Алжира, смотря по натурѣ страданія и по различному характеру его теченія, такъ темно и неопредѣленно, что проку отъ нихъ оказывается немного. Во всякомъ случаѣ, центръ тяжести зак-

лючается всегда въ томъ, *чтобы больные, куда бы они ни переселились, жили разумно и находились подъ наблюдениемъ разумнаго и строгаго врача.*

Противъ легочной чахотки, зависящей отъ *первичной бугорчатки*, равно противъ *бугорчатки, развившейся въ теченіи чахотки*, терапия, дѣйствительно, бессильна, и намъ остается здѣсь только бороться палліативными мѣрами съ тягостными симптомами страданія. Замѣчательно что противъ лихорадки, зависящей отъ бугорчатки, антипиретическія средства оказываютъ мало дѣйствительными. Если же мы убѣдились, что чахоточный больной пораженъ бугорчаткой, то не для чего посылать его въ Ниццу или въ Каиро и т. д., — дадимъ ему лучше прожить послѣдніе дни въ кругу родныхъ и умереть въ собственномъ домѣ. — Это можетъ относиться, конечно, только къ тѣмъ случаямъ, въ которыхъ діагностика бугорчатки находится внѣ всякаго сомнѣнія.

Въ заключеніе намъ остается добавить, еще то, что если болѣзнь будетъ захвачена въ своемъ началѣ, когда узлы не успѣли еще вырости, размягчиться и налить своею матеріею воздухоносные сосуды, то можно твердо надѣяться, что при правильномъ и осторожномъ образѣ жизни, при тщательномъ удаленіи всѣхъ раздражающихъ причинъ, при выборѣ климата теплаго и пріятнаго, и при не многихъ, но полезныхъ врачебныхъ средствахъ, въ большей части случаевъ ходъ болѣзни значительно замедлится, а иногда здоровье будетъ и вполнѣ восстановлено. Напротивъ, совсѣмъ иныхъ послѣдствій должно ожидать, когда дѣло дойдетъ до того, что затвердѣлости начнутъ приходить въ нагноеніе и станутъ заваливать воздухоносные сосуды. Тогда трудность излеченія состоитъ въ томъ, что нарывъ, образовавшійся на легкомъ, содержится въ постоянномъ раздраженіи отъ непрерывнаго движенія дыхательнаго органа, котораго нельзя ни остановить въ его дѣйствіи, ни подвергнуть никакому ограниченію. Невозможность эта лишаетъ искуснѣйшихъ врачей всякой надежды на спасеніе страждущаго, и заставляетъ помышлять о томъ только, какъ бы облегчить хотя нѣсколько его мученія.

---

## II.

# Свѣденія о леченіи главнѣйшихъ болѣзней.

### 1. Болѣзни полости рта.

а) Катарръ. Медленно жевать кусочки ревеню, ложась въ постель. На тощахъ бутылку содовой воды. Вяжущія полосканія (квасцы, kali chloricum или hypermanganicum). Если эти средства не помогаютъ, то помазыванія слизистой оболочки растворомъ сулемы или адекаго камня.

б) Катарральныя язвы Kali chloricum въ водномъ растворѣ, помазыванья растворомъ буры въ водѣ или въ глицеринѣ.

в) Цинготное страданіе. Мѣстно: отвары дубовой или хинной коры. Обмыванія рта тепловатымъ уксусомъ съ небольшою примѣсью воды.

г) Водяной ракъ. Внутрь: укрѣпляющую діету, хлорную воду, угольный порошокъ. Мѣстно: прижиганія и удаленіе омертвѣвшихъ частей.

д) Слюнотеченіе. Препращеніе ртутнаго лѣченія. Легкія слабительныя, іодистый калий. Мушки и горчичники на шею и выйную часть. Главное: чистое содержаніе рта и вяжущія полосканія.

### 2. Болѣзни глотки.

При болѣзняхъ глотки вообще: вдыханія опылетворенныхъ растворовъ дубильной кислоты, квасцовъ.

а) Жаба катарральная (Angina catarrhalis). Рвотное. Полосканія изъ квасцовъ. Помазываніе растворомъ адекаго камня.

б) Жаба злокачественная (Ang. maligna). Препараты хлора. Минеральныя кислоты. Поддержаніе силъ. Смазываніе растворомъ адекаго камня или хромовой кислоты.

в) Жаба миндалевидная (Ang. amygdalitis). Полосканье растворомъ квасцовъ и кромѣ того три раза въ день посыпаніе на воспаленныя части порошокомъ изъ тѣхъ-же квасцовъ. Впослѣдствіи arg. nitricum.

### 3. Болѣзни желудка.

а) **Острый катарръ желудка.** Рвотное если причиной пищевая погрѣшность и пища еще въ желудкѣ. По возможности воздержаніе отъ пищи. Жженая магнезія въ формѣ микстуры. При ненормальномъ развитіи кислотъ *natr bicarb.* по gr. vi—x p. d. При сильныхъ поносахъ безъ рвоты, если каломель остается безъ дѣйствія, совѣтуютъ давать *tanninum* соляную кислоту въ слизистомъ питьѣ, *tinct. nuc. vomic.*, креозотъ. При *cholera nostras* и *ch. infantum* противъ сильной рвоты и поноса полезно назначать опій въ видѣ настойки или порошка.

б) **Хроническій катарръ желудка.** Легкая діета; вѣтъ часто, но понемногу. Лѣченіе водами въ Карлсбадѣ или Мариенбадѣ. Противъ почти всегда существующихъ запоровъ *aloe*, *rheum*, *extr. colocynth.*, *extr. rhei comp.*

в) **Хроническая язва желудка.** Лѣченіе водами въ Мариенбадѣ и Карлсбадѣ. *Magist. bismuthi*; *arg. nitricum*. Небольшія приемы нарцеина, *extr. hyosciami*, *extr. belladon.* Противъ упорной рвоты: креозотъ, *tinct. iodi*, лдяныя пилюли.

г) **Ракъ.** Противъ чрезмѣрнаго развитія кислотъ: углекислая щелочи, за каждый ѣдой по пилюль съ креозотомъ. Противъ запора: пилюли изъ сабура и колоквинтъ. Поддерживать питаніе легко-варимой пищей; противъ боли нарцеинъ, морфій, кордеинъ.

д) **Кровотеченія.** Ледъ снаружи и внутрь. *Mixtura sulph. acida* квасцы (*serum lactis aluminatum*). *Plumb. acet.*, *fer. sulph.*, *ergotinum*. Противъ обморока: холодное шампанское. Противъ постоянного позыва на рвоту: вмѣсто наркотическихъ средствъ отъ времени до времени ставятъ горчичники подъ ложечку или же даютъ по щепоткѣ шипучаго порошка. Легкія слабительныя.

е) **Спазмъ желудка.** *Morphium aceticum*, *extr. hyosciami*, *extr. belladon.* *Tinct. asae foetid.* *Bismuth. nitr.* Romberg совѣтуетъ кромѣ того накладывать на желудочную область *empl. belladon* или *empl. de galbano crocat.*

### 4. Болѣзни кишечнаго канала.

а) **Кишечный карръ (*Catarrhus intestinalis*).** Слабительныя: влещевинное масло. Сочетанія ревеня, ялапнаго мыла, сабуру и колоквинтъ. При язвахъ мѣшечковъ въ нижней части толстыхъ кишекъ: промывательныя изъ дубильн. кислоты.

б) **Непроходимость кишечнаго канала.** вслѣдствіе накопившагося кала. Сначала *ol. ricini* нѣсколько стол. лож. или 5 gr. каломеля; если же этого недостаточно, то *ol. ricini* съ *ol. croton.*



в) **Бугорчатка.** Сначала пробуютъ средства вяжущія и горькія, потомъ переходятъ къ опию. Кофе изъ жолудей, чай изъ листьевъ орѣшника, іодистое желѣзо и ванны изъ солода и соли пользуются особенной славой противъ бугорчатки брыжжечныхъ желѣзъ.

г) **Кровотеченія и расширенія сосудовъ.** Геморрой 2—3 раза въ день по чайн. ложкѣ. *Rolv. liquor. comp.* Лѣчение водами въ Мариенбадѣ, Карлсбадѣ, Киссингенѣ, Гомбургѣ, Зондѣ и пр.

д) **Ракъ.** Наркотическія средства (*opium, nuceinum, morphium*); какъ слабит., всего лучше *ol. ricini*.

е) **Perityphlitis.** Пиявки, затѣмъ теплыя припарки. При выбленіи слѣдуетъ тотчасъ-же вскрыть.

ж) **Periproctitis.** Холодъ (какъ разбивающее), затѣмъ припочки, своевременное вскрытіе, если образуется нарывъ.

з) **Глисты** α) **Ascaris lumbricoides;** сантонинъ съ влецевиннымъ масломъ черезъ часъ по чайной ложкѣ. За приемомъ снае должно слѣдовать легкое слабительное.

β) **Oxyuris vermicularis.** Достаточно промывательныхъ изъ холодной воды съ уксусомъ, въ случаяхъ же очень упорныхъ изъ раствора сулемы.

γ) **Botrioccephalus latus (и taenia solium).** *Rad. filicis maris* (особенно противъ *botr. lat.*: въ порошокъ 3 раза въ теченіи утра а нѣсколько часовъ спустя сильное слабительное изъ *gummi gutti, каломеля* или *ol. ricini*). *Extr. fil. mar. aeth.* съ равной ч. *pulv. rad. filicis maris. Cortex rad. punicae granat.* оставляютъ на 24 часа, въ водѣ затѣмъ вывариваютъ до половины и даютъ утромъ въ 3 приема—производитъ сильныя боли въ животѣ). Кусо дается размоченнымъ въ водѣ или въ видѣ кашицы съ медомъ, утромъ въ два приема. Если наступаетъ тошнота, то назначаютъ лимонный сокъ. Если спустя 3 или 4 часа больнаго не прослабитъ, то ему даютъ сабительное (*ol. ricini, elect. lenif.*). *Ol. terebinth* (отвратительнаго вкуса) легко вызываетъ раздраженіе въ мочевыхъ органахъ. Въ видѣ подготовки къ лѣченію всего лучше назначать обильное употребленіе брусники. Полезно также и семя тыевы.

δ) **Trichina spiralis.** Каломель, какъ слабительное.

и) **Клоика.** Промывательныя, слабительныя, теплыя компрессы на животъ. При коликѣ отъ свинца лучшее средство противъ упорнаго запора—опій (3 раза въ день по 12 гр.), кромѣ того смѣсь изъ *ol. croton* и *ol. ricini* черезъ 2 часа по столовой ложкѣ).

### 5. Болѣзни брюшины.

а) *Peritonitis*. Оріум (каждый часъ по  $\frac{1}{2}$ —1 гр.), пивки, холодъ (каждыя 10 минутъ свѣжіе холодныя компрессы на весь животъ). При *peritonit. chron.* внутрь іодистый калий, снаружи помазываніе живота *tinct. jodi*. При значительной синюхѣ и удушья: кровопусканіе. Противъ метеоризма *Vamberger* совѣтуетъ вытягивать воздухъ изъ прямой кишки. Противъ рвоты: небольшіе кусочки льду. Наконецъ впоследствии покажутся *china sulph.* и вино.

б) **Водянка**. если почки здоровы, слабительныя, потогонныя (теплыя водяныя или воздушныя ванны), проколъ.

### 6) Болѣзни печени.

а) **Гиперемія**. Пивки вокругъ задняго прохода. Средня соли. Лѣченіе водою въ Карлсбадѣ, Мариенбадѣ, Гомбургѣ, Блессингенѣ и т. п.

б) *Hepatitis parenchimatosa*. Легкая питательная діета, вино, желѣзо. Нарывы слѣдуетъ вскрывать, какъ можно скорѣе.

в) *Cirrhosis*. См. а. Углекислыя щелочи, желѣзо.

г) **Закручиваніе воротной вены**. Лѣченіе припадочное.

д) **Жирная печень**. Не позволять спиртныхъ напитковъ, кофе или чаю. Лѣченіе водами въ Карлсбадѣ, Мариенбадѣ и пр. Весною: *succi expressi taraxaci, chelidon.* и пр.

е) **Сальная печень**. Продолжительныя втиранія въ область печени мази изъ іодистаго калия. Внутрь *fegum jodatum*. Соляныя ванны.

ж) **Ракъ**. При значительной чувствительности печени: пивки, теплыя припарки, *paracetica*, подкожныя врыскиванія нарцеина или морфия.

з) **Эхинококки**. Смачиванія печеночной области крѣпкимъ растворомъ поваренной соли. Препараты іода, Вскрытіе должно производиться съ крайней осторожностью. *Extr. rhei compositum*.

и) **Застой желчи и желтуха**. Лѣченіе въ Карлсбадѣ. Каломель. Слабительныя. По окончаніи лѣченія мыльныя ванны.

і) **Острая желтая атрофія печени**. Сильныя проносныя (*aloe, extr. colocynth., ol. croton.*). При параличахъ раздражающія средства противъ рвоты кусочки льду,—словомъ припадочное лѣченіе.

### 7. Болѣзни желчныхъ путей.

а) **Катарральная желтуха**. Углекислыя щелочи. Ванны въ Карлсбадѣ или Мариенбадѣ. *Aqua regia* внутрь и снаружи для

ножныхъ ваннъ При запорѣ: kali tartaricum; отваръ тамариндъ съ acid. tartar. и syr. seppae с. manna; infus. seppae compos., elect. e seppa.

б) Желчные камни. Смѣсь Durande'a изъ aeth. sulph. и ol. tereb., утромъ 40—60 кил. Мариенбадъ, Киссингенъ, Виши и пр. При коликъ, вызываемой желчными сростками tinct. opii simpl. по 16 капель каждые 2 часа (или morph. acet.  $\frac{1}{4}$  гр.) до легкой наркотизаціи. Пиявки къ правому подреберью. Если лѣварства, даваемая внутрь, извергаются рвотой, то назначаютъ промывательныя съ опиємъ. Легкія слабительныя Теплыя ванны.

### 8. Болѣзни селезенки.

а) Острая опухоль селезенки. По словамъ Fleury, холодныя души могутъ уменьшать опухоль селезенки на нѣсколько центиметровъ.

б) Хроническая опухоль селезенки. Хининъ (внутри, а еще лучше подъ кожу), холодныя души, мушки, фонтанели каленое желѣзо на область селезенки. Ferrum iodatum и ammonium muriat. ferr. (въ растворѣ 4—10 гр. на приемъ).

в) Сальная (амилоидная) селезенка. Ferrum iodatum.

г) Splenitis. Мѣстныя кровопусканія и припарки противъ болѣи, углекислыя щелочи и наркотическія средства противъ рвоты.

д) Бѣлокровіе. Хининъ, желѣзо, іодъ лѣчение водой.

### 9. Болѣзни почекъ.

а) Почечныя кровотеченія. Пузырь со льдомъ на сторону почекъ, холодныя полуванны, liquor ferri sesquichl., acid. tannicum, sesale cognitum (или эрготинъ).

б) Острая Брайтова болѣзнь. Пиявки или банки въ сторону почекъ. Теплыя ванны. Сильныя слабительныя при запорѣ (кокавинты, ялаша seppa). Для питья какую-нибудь углекислую минеральную воду.

в) Хроническая Брайтова болѣзнь. Хорошая діета (яйца, молоко, жареное мясо, крѣпкое пиво, вино). Хина. Желѣзо. При водянкѣ мочегонныя (cremor tartari, tartar. boraxatus), ванны изъ нагрѣтаго воздуха или теплой воды. Паханье. Elaterium. Отвара кокавинтовъ. Противъ мочеваго зараженія: acidum benzoicum или сильныя слабительныя и прикладываніе льду къ голвѣ.

д) Промежуточное воспаление почекъ. Тоже лѣчение, что въ б.

е) Сальное перерожденіе почекъ. Ferrum iodatum.

ж) Водянка почекъ. Частое введеніе катетра.

з) Воспаленіе почечной лоханки. Приставленіе пивовъ къ сторонѣ почекъ, холодъ. Большое количество воды для питья. Нераздражающія (мало соленныя и безъ приправъ) блюда. Впослѣдствіи теплыя ванны, теплыя припарки. Камфора. При длительномъ нагноеніи: acid. tannicum.

н) Колика отъ почечныхъ камней. Большія приемы опія. Теплыя ванны. Для питья зельтерскую или садовую воду.

#### 10. Болѣзни мочевого пузыря.

а) Катарръ. Въ свѣжихъ случаяхъ пивки къ промежности. Теплыя припарки, теплыя ванны. Зельтерская или садовая вода. Известковая вода съ молокомъ (равн. ч.). sem. lycopodii (каждыя 2 часа по чайной ложкѣ), камфора въ миндальномъ молокѣ, особенно если катарръ развился отъ шпанскихъ мухъ. Когда боли (противъ которыхъ даютъ pulvis Doveri) уменьшаются, а моча содержитъ много слизи и гнойныхъ тѣлецъ, тогда назнач. desocost fol. uv. ursi, дубильную кислоту. При хроническомъ катаррѣ: ol. terebinth., aq. picea, bals. peruvianum, bals. copaivae. Выпрыскиванія тепловатой воды. Если это недостаточно, впрыскиваютъ растворъ lap. infern., acid. tannici, zinci sulphurici или bals. copaiv. въ эмульсіи.

б) Кровотеченіе. Холодныя души. Выпрыскиванія холодной воды или растворовъ zinci sulph. или arg. nitg. Внутрь дубильную кислоту. Подобнымъ же образомъ лѣчатъ и ракъ, не слѣдуетъ только забывать наркот. средствъ.

в) Пузырные камни. Углекислыя щелочи, воды Виши или Карлсбада. Бензойная кислота для растворенія фосфорнокислыхъ солей.

г) Гиперестезія. Холодныя купанья въ морской или рѣчной водѣ, холодныя души, холодныя ванны, подкожныя впрыскиванія нарцеина. Balsamum copaiv.

д) Анестезія. Лѣченіе ночнаго незадержанія мочи должно быть прежде всего психическое.

е) Судороги пузыря. Теплыя ванны, клистиры изъ настоя вадерьяны съ прибавленіемъ опія.

ж) Параличъ пузыря. Холодныя обмыванія, души холодныя промывательныя. Впрыскиванія (постепенно все болѣе и болѣе холодной) воды. Стрихнинъ (черезъ желудокъ или подъ кожу). Восковыя свѣчи въ шейку мочевого пузыря.

## 11. Болѣзни мочевого канала.

б) **Перелой** (трипперъ). Впрыскиванія дубильной кислоты въ растворъ краснаго вина, *arg. nitg.* Если этого недостаточно то кубебы въ смѣси съ садовой водой, *balsam. copaiv.* Противъ вочныхъ эрекцій: камфору, лупулинъ, Довероровъ порошковъ. Противъ перелойнаго воспаления яичка: покойное положеніе поддерживаніе шулять (*suspensorio*), пиявки къ сѣменному канатику, Каломель съ опиумъ.

## 12. Болѣзни женскихъ половыхъ органовъ.

а) **Oophoritis** α) *Острое воспаление*: 10—15 пиявокъ къ паховой области. Припарки. Теплыя ванны. При запорѣ *ol. ricini.*

β) *Хронич. воспаление*: Повторныя извлеченія крову изъ матки, Внутрь іодистый калий. Соляныя ванны.

б) **Hydrops ovarii**. Іодистый калий. Лѣченіе въ Крейдцахъ, Тельцѣ и пр. Проколъ. Впрыскиваніе іодовой настойки. Вырвываніе.

в) **Катарръ матки**. Впрыскиваніе во влагалище тепловатой воды или растворовъ *zinci sulph.*, дубильной кислоты квасцовъ, полуторохлористаго желѣза. Приставленіе пиявокъ къ маточному рыльцу. Прижиганіе влагалищной части и канала шейки адскимъ камнемъ, по меньшей мѣрѣ каждыя 8 дней. Впрыскиванія въ полость самой матки *argenti nitg.* или полуторохлористаго желѣза требуютъ крайней осторожности (лучше вовсе не прибѣгать къ этому средству).

г) **Завалъ матки**. Лѣченіе маріенбадскими франценбадскими, киссингенскими, крейдцахскими, кранкенгейльскими и др. водами. Повторное приставленіе пиявокъ къ влагалищной части. Если болѣзнь тянется долгое время, теплыя души (300 R.), по разу въ день.

д) **Перелойный катарръ влагалища**. Слабительныя, холодныя полуванны, пока не прекратятся воспалительныя явленія. Затѣмъ впрыскиванія растворовъ уксуснокислаго свинца дубильной кислоты квасцовъ; бѣлаго купороса и пр. Въ упорныхъ случаяхъ: прижиганія влагалища адскимъ камнемъ, введеніе во влагалище корпійныхъ тампоновъ, посыпанныхъ квасцами.

е) **Простой катарръ влагалища**. Чистота. Полуванны, слабовяжущія впрыскиванія.

ж) **Растительчьи паразиты**. Смазываніе растворомъ адскаго вамяя.

### 13. Болѣзни головного мозга.

а) **Гиперемія.** α) вслѣдствіе бокового прилива: слабительныя, промывательныя изъ воды съ уксуомъ, а въ случаѣ нужды кровопусканіе (у взрослыхъ) и пиявки къ головѣ (у дѣтей), β) вслѣдствіе злоупотребленія алкоголя или наркотическихъ средствъ, а также отъ дѣйствія солнечныхъ лучей на черепъ: пузырь со льдомъ на голову; γ) вслѣдствіе ненормальной иннервации: раздражающія ножныя ванны, мушки къ выйной части головы, сильныя слабительныя.

б) **Малокровіе.** Железо. Въ пищу сырое мясо, вино и пр. Горизонтальное положеніе. При обморокахъ нюхать eau de Cologne, а внутрь гошманскія капли, эфиръ и пр.

в) **Кровотеченіе.** Ударъ. Кровопусканіе. Если слышится хрипота, біеніе сердца слабо, пульсъ неправиленъ, то назначаютъ: раздражающія средства, вино, эфиръ, мускусъ, горчичники на грудь и на икры, треніе кожи щеткой или рукой, опрыскиваніе груди холодной водой, капанье растопленнымъ сургучемъ. По окончаніи припада, мушки къ задней части шеи, пиявки сзади ушей, пока не прекратится лихорадка. При оставшемся параличѣ больныхъ посылаютъ въ Вильдбахъ, Гапштейнъ, Пфефереръ или пользуютъ прерывистымъ токомъ. Также или почти также лѣчится и

г) **Провотеченіе мозговыхъ оболочекъ,**

д) **Воспаленіе твердой оболочки.** Повторенныя мѣстныя кровопусканія, большія мушки на заднюю часть шеи, сильныя проносныя.

е) **Воспаленіе мягкой оболочки съ гнойноволокнистымъ выпотомъ,** Пиявки къ носу и сзади ушей. Холодныя обертыванія (предварительно обритой) головы, сильныя слабительныя (изъ сладкой ргути съ ялаппой). Въ болѣе позднихъ періодахъ большую мушку на заднюю часть шеи, втираютъ въ кожу головы мази изъ рвотнаго камня, каломель (въ малыхъ приемахъ долгое время), холодныя полуванны. Прежде употреб. ungt. siper. Умѣренное противовоспалительное лѣченіе умѣстно и при

ж) **Повальномъ воспаленіи оболочекъ головного и спинного мозга** (холодъ, слабительныя, опій, морфій, нарцезинъ).

з) **Острая водянка мозга. Прозрачная бугорчатка мягкой оболочки.** Въ началѣ пиявки за уши, прикладываніе льду. слабительныя. Иодистый калий въ большихъ размѣрахъ. Небольшія дозы морфіа ( $\frac{1}{4}$  гр.) или нарцезина.

и) **Воспаленія головного мозга** Приставленіе пиявокъ и холодныя примочки. Иодистый калий.

і) **Опухоли.** Чисто припадочное лѣченіе. Противъ чрезвычайно сильныхъ головныхъ болей: пиявки, холодныя примочки, мушки въ задней части шеи: небольшіе приемы морфія.

к) **Hydrocephalus acquisitus.** См. е.

л) **Hydrocephalus congenitus;** Чисто припадочное лѣченіе.

м) **Атрофія.** Обливанія. Припадочное лѣченіе.

#### 14. Болѣзни спиннаго мозга.

а) **Гиперемія.** Банки вдоль позвоночника; пиявки къ заднему проходу. Средніе соли.

б) **Пзліяніе крови.** Мѣстныя извлеченія крови и холодъ, пока есть воспалительныя явленія. Затѣмъ введеніе катетровъ, хорошее положеніе. Лѣченіе водами въ Вильдбадѣ, Пеззерсѣ, Гаштейнѣ.

в) **Воспаленіе оболочекъ спиннаго мозга.** Въ остромъ періодѣ: Пиявки или банки. Пузырь со льдомъ. Втираніе сѣрой мази. Внутрь сладкую ртуть. Въ хроническомъ же состояніи: летучія мушки (отъ шеи до крестца), холодныя обливанія души, теплыя ванны. Вильдбадѣ, Гаштейнѣ.

г) **Воспаленіе спиннаго мозга.** Какъ при в. Въмѣсто лѣтучихъ мушекъ: моксы или каленое желѣзо вблизи позвоночника.

д) **Сѣрое перерожденіе заднихъ столбовъ.** Возможно покойная жизнь, хорошее питаніе. Ванны съ солью, или съ желѣзистой грязью. Электричество.

#### 15. Болѣзни периферическихъ нервовъ.

а) **Воспаленіе.** Банки и холодныя компрессы вдоль воспаленнаго нерва; если же болѣзнь затянулась, а пораженный нервъ лежитъ недалеко отъ кожи, то втираютъ сѣрую мазь, ставятъ моксу, прижигаютъ каленымъ желѣзомъ. При остающемся разстройствѣ въ отравленіи: фарадизація.

б) **Невралгія.** Электричество, холодъ (привлаживаніе льду, обмываніе эвпромъ или *liquore Hollandico*). Втиранія вератрина или агонитина. *Narcotica* внутрь *подкожныя инъекціи* (нарцеина, морфія атропина, кодеина). Наконецъ вырѣзываніе изъ нерва куска.

в) **Прозопальгія лицевая боль.** *Tic douloureux.*) Какъ б.

г) **Мигрень.** *Solut. arsen. Fowleri* 4—5 капель 3—4 раза въ день *pulsatilla*. Лимоннокислый кофеинъ.

д) **Плечевая боль.** Вырѣзываніе нерва, *cl. terebinth.* внутрь.

е) **Межреберная боль.** Повторныя мушки на такъ назыв. *points douloureux*. Подкожныя впрыскиванія.

ж) **Боль женскихъ грудей (mastodynia).** Прикрывать грудь мѣхомъ, оланелью или Соореговскимъ пластыремъ; пилюли изъ *extr. conii eutr. paraveris*.

з) **Боль сѣдалищнаго нерва (ischias),** Сначала слабительное, мѣстное извлеченіе крови, потомъ летучія мушки, *fetum candens*, моксы, *ol. terebinth*, вератринъ, аконитинъ, морфинъ, нарцеинъ (какъ въ б.).

и) **Анестезія кожныхъ нервовъ.** Спиртныя и эфирныя втиранія, электричество, холодныя души. Гаштейнъ, Вильдбадь.

і) **Параличъ лицеваго нерва.** Только травматическій параличъ уступаетъ приставленію нѣсколькихъ пиявокъ, холоднымъ компрессамъ и втираніямъ сѣрой мази. При Bell'евскомъ параличѣ отъ простуды назначаютъ сначала холодъ, потомъ обмыванія горчичнымъ спиртомъ, горчичники, втиранія кронового масла, мушки. Электричество.

к) **Самостоятельный параличъ у дѣтей.** Теплыя ванны электричество. Въ самомъ же началѣ мѣстное извлеченіе крови вдоль позвоночника, мушки и пр.

л) **Периферическіе параличи.** Теплицъ, Висбаденъ Вильдбадь, Псеферсъ. Раздражающія кожу средства по ходу нерва. Мѣстная сарадизація.

## **16. Нервныя страданія безъ опредѣленной анатомической локализациі.**

а) **Пляска св. Витта.** (Въ большинствѣ случаевъ нужно бываетъ давать саятонинъ или желѣзо). *Flores zinci, Solut. ars. Fowleri* (3 раза въ день по 3—5 кил.). Холодныя обливанія спины. Наркотизація хлороформомъ. Электричество.

б) **Trismus et tetanus. Столбнякъ.** *Narcotica*, нарцеинъ, морфинъ внутрь и подъ кожу, промывательныя съ опиумъ (20 кил. на клизму). Хлороформъ. При отравленіи стрихниномъ подкожныя впрыскиванія кураре, физостигмина, хинина. Противъ столбняка новорожденныхъ: ванны изъ ромашки, промывательныя съ каплей *inct. opii*.

в) **Падучая болѣзнь.** Причинное показаніе: Мѣстныя кровозвлеченія, впоследствии-же мушки и фонтанелл на задней части шеи. Атропинъ. *Vine. acet. et. valerian. Argen. nitric. Kalium bromatum* внутрь и морфій подъ кожу. *Artemisia vulgaris* (въ порошокъ). *Valeriana* (въ формѣ порошка или кашицы) *Asa foetida. Viscum album. Ol. terebinth. Ol. animale Dippellii, Indigo.* Сжатіе сонныхъ артерій. Подкожныя впрыскиванія кураре.



г) *Eclampsia infantum*. Холодное промывательное изъ 3 ч. воды и 1 ч. укуса. Ледъ на голову. Во время припадка горчичники на икры. Послѣ припадка: нѣсколько приѣмовъ каломеля съ окисью цинка. Если угрожаетъ упадокъ силъ, то даютъ средства возбуждіющія (камфору, мускусъ, вино).

д) Пестерія. Лѣчение холодной водой. Психическія вліянія. Морскія купанья. *Valeriana asa foetida* и пр.

е) Катаlepsія. Рвотныя. Холодныя опрыскиванія. Электричество.

ж) Гипнохондрія. Морскія купанья. Гимнастика.

### 17. Болѣзни органовъ лѣченія.

а) Хроническій ревматизмъ суставовъ. Піявки или банки. Горчичники. Обкладываніе свѣжими березовыми листьями. Втиранія горчичнаго спирта, вератрина и хлороформа помазываніе іодовой настойкой. Холодныя души. *Ungt. kalii iodati*, *ungt. hydrarg. cin.* Паровыя бани. Лѣченіе водами въ Ахенѣ, Теплицѣ, Висбаденѣ, Баденѣ-Баденѣ, Вильдбадѣ и пр. Внутрь: *tinct. sem. colch. extr. aconiti et tinct. opii* (4 раза въ день по 15 вкл., іодистый калий).

б) *Arthritis deformans*. Теплыя ванны, помазываніе *tinct. opii*. Теплицѣ, Вильдбадѣ и проч. Какъ въ а.

в) Мышечный ревматизмъ. Какъ въ а.

г) Подагра. Карлсбадѣ, Мариенбадѣ, Киссингенѣ, Висбаденѣ, Гомбургѣ, Виши и проч. *Vinum* или *tinct. sem. colch.*, 4 раза въ день по 30 вкл. Обвертываніе ватой. Строгая діета (слабая). *Narcotica*.

д) Англійская болѣзнь. *Ol. fessoris Aselli*. Углекислая известь къ каждому блюду (пища должна быть по возможности животная) прибавляютъ по *ad. calcis*). Какъ можно болѣе покойное и удобное положеніе.

е) Размягченіе костей. Совѣтывали давать: *acid. phosphoricum*, *ad. calcis*, *ol. fessor. Aselli*, *ferrum*, *salom.* съ *opio*.

ж) Прогрессивная атрофія мышцъ. Пробовали прерывистый токъ, но по большей части тщетно.

### 18. Конституціональныя болѣзни.

#### А. Общія разстройства питанія.

а) Блѣдная немочь. Препараты желѣза. Въ новѣйшее время совѣтуютъ *argen. nitr.* Всего важнѣе крѣпительная пища, здоровый воздухъ. Вино.

**б) Бѣлокровіе.** Совершенно тоже, что и при а.

**в) Цыга** Ежедневно свѣжевыжатыя растительныя соки (кврѣстоцвѣтныя: капуста, рѣдька, хрвнъ, гулявникъ (жеруха) и т. п.). Лимоны, апельсины, вишни, смородина и др. кислыватыя плоды; пивныя дрожжи; чистота, хорошая діета (въ особености свѣжія овощи, свѣжее мясо, пиво).

**г) Верльгофова пятнистая болѣзнь.** Acid. sulphur. Препараты хины. Припадочное леченіе.

**д) Кровоточивость.** Natrum sulphur. При опасныхъ кровотеченіяхъ *secale cognitum*. Въ остальномъ чисто припадочное лѣченіе.

**е) Чрезмѣрная тучность.** Давать въ пищу, какъ можно менѣе крахмалистыхъ и жирныхъ веществъ, и на оборотъ много мяса и вина (способъ Гарвея); въ тоже время побольше движеній; купанье.

**ж) Золотуха.** *Ol. jecoris aselli* и кофе изъ жолудей. Соляныя ванны (Крейпцахъ, Кезень, Ишль, Виттекиндъ). Лѣченіе холодной водой. Йодистый калий. Кранкенгейлевская вода. Всего же важнѣе хорошая обстановка относительно пищи, воздуха и движенія.

**з) Сахарное мочеизнуреніе.** Какъ можно менѣе крахмалистой и сахаристой пищи. Хлѣбъ изъ клевера или сухари изъ миндаля съ яйцами *Natrum bicarbonicum*. Лѣченіе водами въ Карлсбадѣ. Препараты желѣза.

*Б. Заразительныя болѣзни, переносимыя съ животными на человека.*

**а) Malleus.** Совѣтовали: каломель въ большихъ приемахъ, препараты *joda*, лѣченіе холодной водой.

**б) Собачье бѣшенство.** Мѣсто укуса тотчасъ же вырѣзать и прижечь ѣдкимъ кали или каленымъ желѣзомъ. Противъ волобоязни совѣтовали давать ртуть до слюнотеченія. *Belladonna*, испанскія мухи, *shigaea ulmaria*, *parcotica*. По временамъ вдыханія хлорофора.

*В. Острыя заразительныя болѣзни.*

**а) Корь.** По большей части достаточно общихъ наставленій: комната должна имѣть постоянную температуру отъ 13 до 16° Ц. и быть умѣренно темной; ее нужно провѣтривать по возможности каждый день. Надѣвая бѣлье, слѣдуетъ предварительно нагрѣть его. Пока существуетъ сильная лихорадка, давать лишь небольшія порціи водянистаго супа, бѣлаго хлѣба и вареныхъ плодовъ (чтобы противодѣйствовать не рѣдко бы-

вающему запору). Если кашель принимает судорожный характер, особенно ночью, то дают рвотное (іресасіапа), назначают обильное питье, прикладывают къ шеѣ теплыя губки и т. д.

**б) Скарлатина.** Нужно держаться тѣхъ-же правилъ, что и при кори. При чрезмѣрномъ повышеніи температуры тѣла: обертыванія мокрыми простынями и холодныя обливанія или намазываніе всего тѣла саломъ, по 2 раза въ день. Въ остальномъ лѣченіе должно быть припадочное.

**в) Оспа.** Кромѣ соблюденія только-что описанныхъ общихъ правилъ, стараются по возможности предотвратить разрушеніе кожи на лицѣ. Съ этою цѣлю совѣтывали: холодъ, компрессы, смоченные растворомъ сулемы, обмываніе настоемъ *hydrastis canadensis* и т. д. Противъ крупознаго воспаленія гортани вслѣдствіе развитія оспенныхъ гнойничковъ на ея слизистой оболочкѣ назначаютъ рвотное (сург. sulph.) и прижиганіе адскимъ камнемъ. При отежѣ гортани; если не помогаютъ ни вдыханія опылетворенныхъ растворовъ, ни даже надрѣзъ, не остается ничего кромѣ ларинготоміи.

**д) Брюшной тифъ.** При правильномъ теченіи болѣзни особеннаго лѣченія не нужно; комната больного должна быть чистая, объемистая, хорошо провѣтриваемая. Пища сначала очень легкая, потомъ болѣе питательная, но вообще удобоваримая. Въ началѣ болѣзни можно попытаться оборвать ее (два приема каломели по 5 гр. Acid. phosph. или muriat. въ слизистомъ питьѣ). Противъ сильнаго жара при сухой кожѣ обертыванія въ простыни, смоченныя холодной водой, настой наперстянки: противъ головной боли пузырь со льдомъ; противъ поноса квасцы съ опіемъ, уксуснокислый свинецъ, промывательныя изъ адскаго камня; при прободеніи кишекъ большіе приемы опія холодныя компрессы на животъ, совершенный покой, полное воздержаніе отъ пищи; при упадкѣ силъ средства возбуждающія, лучше всего вино. При выздоровленіи *descoctum chinae*, питательная пища. Противъ пролежней профилактика, ungt. decubitum Lilenriethie, прижиганіе адскимъ камнемъ, хлорная вода. Осложненія въ органахъ дыханія лѣчатся по общимъ правиламъ, но рвотнаго камня давать не слѣдуетъ.

**е) Сыпной тифъ.** Пузырь со льдомъ на голову, холодныя обертыванія (12—20° Ц.), обтиранія всего тѣла водой съ уксусомъ. Внутрь acid rhodch. или muriaticum въ слизистомъ питьѣ или съ сиропомъ. При продолжительномъ запорѣ промывательныя. Противъ бреда опій, нарцеинъ. При упадкѣ силъ камфора, эфиръ, мускусъ.

**е) Возвратная горячка.** Холодныя обертыванія. Ванны (въ 25—27,5° по Ц.) Минеральныя кислоты для питья. Хи-

нинъ (совѣтуется Griesinger'омъ и до нѣкоторой степени оказался полезнымъ и въ петербургской эпидеміи). Крѣпкое вино. Въ промежуткѣ по возможности питательная пища.

**ж) Азіятская холера.** Всего важнѣе захватить періодъ поноса, противъ котораго даютъ опій. Внутрь противъ рвоты кусочки льда. Покойное положеніе. Если опій не помогаетъ, то назначаютъ на животъ холодные компрессы, а внутрь каломель, каждый часъ по 1 гр. Для питья холодную воду. Остальное леченіе должно быть чисто припадочное.

**з) Натужной поносъ.** Теплыя припарки на животъ. Если животъ слишкомъ чувствителенъ, а натуги очень сильны, то ставятъ къ животу 10—20 пиявокъ. Опій съ каломелемъ, каждые 2 часа, или *plumb. acet.* съ опиумъ. Промывательныя изъ растворовъ азотнокислаго серебра или дубильной кислоты.

## 10. Болѣзни кожи.

**а) Intertrigo.** Пересыпаютъ порошкомъ изъ *sem. Lycoperdii*, *flor. Zinci* или крахмала. *Ungt. Zinci ab. plumbi.*

**б) Erysipelas.** Обвертываніе ватой, компрессы, смоченные растворомъ желѣзнаго купороса, прикладываніе льда помазывать коллодіемъ, камфорнымъ масломъ или растворомъ *argenti nitr.* При неправильномъ пищевареніи рвотное. Противъ сильной лихорадки: хининъ.

**в) Zona (herpes zoster).** Для уменьшенія болей: припарки, внутрь *parcoticas.* Самую сыпь смазываютъ растворомъ *arg. nitr.* или мазью изъ цинковаго купороса.

**г) Furunculul (чирій).** Противъ боли: разрѣзъ. Противъ возвратовъ вслѣдствіе худосочія лѣченіе молокомъ, *descoote zitmanni* жизнь въ деревнѣ, морскія купанья и т. д.

**д) Лишай (herpes).** По возможности выжидательное лѣченіе.

**е) Крапивница.** Противъ зуда обмываютъ кожу разведенными кислотами.

**ж) Мокнуцій лишай (eczema).** Въ застарѣлыхъ случаяхъ съ сильнымъ утолщеніемъ кожи: натираютъ голову 2 раза въ день зеленымъ мыломъ и затѣмъ смываютъ его посредствомъ души. Если мокнуцій лишай подсохнетъ, то втираютъ еженовнѣно *rix liquida* съ *alcoh.* Если вслѣдствіе такого втиранія разовьется сильное воспаленіе, то прижигаютъ ѣдкимъ кали и затѣмъ дѣлаютъ холодныя примочки. Изъ внутреннихъ средствъ нѣкоторое вліяніе можетъ имѣть развѣ лишъ мышьякъ.

**з) Impetigo:** *Ungt. hydr. albi, solut. zinci sulph.,* слабый растворъ адскаго камня.

и) **Ecthyma**. Пока есть сильныя воспалительныя явленія: теплыя примочки. При образованіи недѣятельныхъ язвъ прижиганіе *arg. nitrico*.

і) **Rupia**. Припарка. *Arg. nitr.*

к) **Psoriasis**. Сначала удалить чешуйки помощію продолжительныхъ теплыхъ ваннъ (въ случаѣ нужды мыломъ и щеткой). Затѣмъ въ теченіи 4—8 дней, по 2 раза въ день, втиранія зеленымъ мыломъ. Невга совѣтуетъ натирать растворомъ сѣрнистой извести, затѣмъ назначить теплую ванну, а потомъ снова натереть всѣ больныя мѣста дегтярной мазью. Blasius и др. болѣе хвалятъ мѣстное употребленіе *ol. russi* одновременно съ назначеніемъ внутрь *solut. arsenic. Fowleri*, 4 раза въ день, по 1—2 япл. Veiel даетъ *pilulae asiaticae*, каждый день по 1—2 пилюли.

л) **Lichen**. Препараты сѣры. Деготь, зеленое мыло, ванны. Внутреннее употребленіе мышьяка.

м) **Prurigo**. Невга и здѣсь совѣтуетъ втиранія раствора сѣрнистой извести (см. к.). Кромѣ того обыкновенно употребляются обмыванія растворомъ сулемы, известковой водой, разведенными кислотами и втиранія дегтярной мази. Veiel даетъ мышьякъ.

н) **Acne vulgaris**. Обмыванія растворомъ ѣдкаго кали или сулемы съ настойкой роснаго ладона. Вода для умыванья Kummerfeld'a; взболтавъ натереть кожу съ вечера, а утромъ стереть сухимъ полотенцемъ приставшую сѣру. Точно также употребляется и сѣрное тѣсто Невг'ы. Veiel третъ узелки acne зубной щеткой съ калийнымъ мыломъ.

о) **Mentagra. Sycosis**. Невга совѣтуетъ вырывать рѣсничными щипчиками волоса, проходящіе сквозь гнойничекъ и затѣмъ втирать утромъ и вечеромъ сѣрное тѣсто. Veiel начинаетъ съ употребленія припарокъ, послѣ чего вырываетъ на пораженномъ мѣстѣ всѣ волоса помощію полосокъ липкаго пластыря и тотчасъ же прижигаетъ крѣпкой уксусной втой.

п) **Acne rosacea**. Болѣзнь эта доступна лѣченію только въ первомъ своемъ періодѣ: сдавливаніе посредствомъ коллодія. Veiel прописываетъ насыщенную свинцовую воду съ квасцами и камфорой. Kummerfeld'овская вода для умываній.

р) **Favus**. Mahon совѣтуетъ втирать *patr. carbon.* и известь въ формѣ мази и посыпать угольнымъ порошкомъ. Слѣдуетъ размягчить струппя помощію припарокъ и втираній жира, затѣмъ вырвать пораженные (сухіе, поблекшіе и обезцвѣченные) волосы рѣсничными щипчиками.

с) **Herpes tonsdens**. Вырваніе волосъ, обмываніе калийнымъ мыломъ, водой, алкоголемъ или растворомъ сулемы.

т) *Pityriasis versicolor*. Натирания зеленым мыломъ 2 раза въ день.

у) Чесотка. 1) *Лѣченіе зеленымъ мыломъ*: Натирать по 2 раза въ день въ теченіи 6—8 дней въ теплой комнатѣ, въ заключеніе ванна. 2) *Лѣченіе по англійскому способу*: Теплая ванна, обертываніе шерстяными одѣялами и затѣмъ троекратныя втиранія съ промежутками въ 12 часовъ мази: изъ зеленого мыла и жиру, черезъ 12 часовъ послѣ третьяго втиранья: теплая ванна. 3) *Быстрое лѣченіе Hardy*: натирають зеленымъ мыломъ ( $\frac{1}{2}$  часа), держать въ ваннѣ (1 часъ), продолжая втиранія, и въ заключеніе смазываютъ все тѣло Helmetich'овой мазью. 4) *Лѣченіе растворомъ сѣрнистой извести* (см. psoriasis): натирають все тѣло въ теченіи получаса зеленымъ мыломъ, сажаютъ на столько же времени въ ванну, слѣдующіе полчаса втирають растворъ сѣрнистой извести и кончаютъ новой получасовой ванной. 5) *Лѣченіе простой сѣрной мазью*: теплая ванна, затѣмъ натирания всего тѣла (за исключеніемъ лица), 2—3 раза въ день, и наконецъ снова ванна.

ф) **Мѣстный чрезмѣрный потъ**. Частое употребленіе холодныхъ ваннъ и обмыванія разведен. acet. aromático.

## 20) Болѣзни сердца.

а) *Endocarditis*. У людей здороваго сложенія общее или мѣстное кровопусканіе. При значительной слабости и угрожающемъ параличѣ сердца возбуждающія срва. Противъ сердечбій inf. digitalis вадые 2 часа по стол. ложкѣ. Противъ водянки тотъ же настой съ kali acet.

б) **Органическіе пороки сердца**. Прямое лѣченіе невозможно, остается лишь дѣйствовать противъ припадковъ и осложненій.

## 21) Болѣзни сердечной сумки.

а) *Pericarditis*. У людей крѣпкихъ мѣстное кровопусканіе (10—12 пиявокъ), пузырь со льдомъ, слабительныя (каломель). У ослабѣвшихъ напротивъ того средства возбуждающія. Противъ сердечбій inf. digitalis, противъ болей narcotica.

б) *Hydropericardium*. Мочегонныя, слабительныя (и тѣ и другія по большей части безъ пользы). Проволь.

## 22. Болѣзни гортани

Вообще необходимо самое тщательное изслѣдованіе гортаннымъ зеркаломъ. Лучшій способъ лѣченія—мѣстный: вдыханія

опылетворенныхъ растворовъ, выжиманіе смоченной раство-  
ромъ губки. Для вдыханій употребляютъ: дубильную кислоту,  
квасцы, arg. nitricum, kali chloricum, natrium chloratum, ammonium chlo-  
ratum, aqua picea, aq. amygd. amar, extr. hyoscyami.

а) **Laryngitis**. Вдыханія (теплыя т. е. посредствомъ па-  
рового аппарата). Дотрогиваніе губкой, смоченной въ растворъ  
ядскаго камня или вдыханіе arg. nitr. въ порошокъ. Прежде наз-  
ывали отвлеченія на кожу.

б) **Крупъ**. Вдыханія (теплыя) воды, дубильной кислоты.  
Прижиганія arg. nitr. Поддерживаніе силъ. Рвотное. Снаружи  
быстро перемѣняемые компрессы, смоченные холодной водой.  
При запорѣ промывательное (3 ч. воды, 1 ч. уксуса). Тра-  
хеотомія.

в) **Ulcus Syphiliticum**. Мѣстное лѣченіе безъ общаго без-  
плодно.

г) **Ulcera tuberculosa**. Теплыя вдыханія, напр. поваренной  
соли съ наркотическими вѣщами. Прижиганіе arg. nitrico. По-  
стоянно имѣть въ виду общее лѣченіе.

д) **Oedema glottidis**. Надрѣзы. Въ неспѣшныхъ случаяхъ  
кровопусканіе и затѣмъ по каплѣ ol. crotonis, каждый часъ Тра-  
хеотомія.

е) **Параличъ гортанныхъ мышцъ**. Электричество, под-  
кожное впрыскиваніе стрихнина (азотнокислаго), желѣзо, сред-  
ства отвлекающія.

### **23. Болѣзни дыхательныхъ вѣтвей и ды- хательнаго горла.**

а) **Катарръ**. Вдыханія раствора поваренной соли или па-  
ровъ нашатыря. Хороши также вдыханія паровъ отъ настоевъ  
такихъ травъ, въ которыхъ есть летучее масло (chamomilla,  
malva, lavandula, valeriana). Если нѣтъ хриповъ, а между тѣмъ  
сильный позывъ къ кашлю: aq. amygd. amar., нарцеинъ, мор-  
фій. При сильныхъ хрипахъ рвотное, особенно у дѣтей при  
bronchitis capillaris. При обильной мокротѣ: mixtura Griffithii, 4 раза  
въ день по столовой ложкѣ. Для куренья ol. pini pumilionis.  
Зельтерская вода съ молокомъ.

б) **Коклюшъ**. Прежде всего чистый воздухъ. 2—3 раза въ  
день посылаютъ дѣтей на  $\frac{1}{2}$  часа въ помещенія, гдѣ очища-  
ютъ свѣтильный газъ. Теплыя ванны. Нарцеинъ ( $\frac{1}{30}$ — $\frac{1}{15}$  гр.),  
морфій. Прежде давали natrum или kali carbon. Дѣтямъ 2—4 лѣтъ  
утромъ и вечеромъ по  $\frac{1}{8}$  (восходя до  $\frac{1}{2}$  гр.) belladonnae до расши-  
ренія зрачка. Со рвотными нужна большая осторожность.

в) **Расширеніе дыхательныхъ вѣтвей.** Противъ слишкомъ обильнаго гнойнаго выдѣленія вдыханія полуторохлористаго желѣза, дубильной кислоты, квасцовъ. Пары скипидарнаго масла. А главное: свѣжій воздухъ, хорошая пища.

## 24. Болѣзни легочной ткани.

а) **Эмфизема.** Систематическое лѣченіе посредствомъ аппаратовъ съ усиленнымъ давленіемъ воздуха. Противъ катарра: указанныя выше вдыханія. Кромѣ того рвотный орѣхъ, rad. sepegae, стрихнинъ, спорынья. Рвотныя. При ожиданіи паралича: камфора, мускусъ, росный ладонъ.

б) **Гиперемія.** Вяжущія холодныя вдыханія. Cremor tartari. Кисловатое питье. Лѣченіе молочной сывороткой, кумысомъ, виноградомъ.

в) **Отекъ.** Рвотныя; камфора, мускусъ, вино.

г) **Кровотеченія.** Холодныя вдыханія (посредствомъ Bergson'овскаго аппарата) воды полуторохлористаго желѣза, дубильной кислоты, квасцовъ. Покойное положеніе. Внутри: Liqur ferri sesquichl (1 ч. на 3 ч. воды); настой наперстянки. Сухая поваренная соль, по чайн. ложкѣ нѣсколько разъ. Elixir acid. Halleri, каждые 2 часа по 10 капель, Secale cognatum. Въ теченіи дня  $\frac{1}{2}$  гр. морфія, вечеромъ pulvis Doveri. Ванны въ Пирмонтѣ, Дрибургѣ.

д) **Крупозное воспаленіе легкихъ.** Укрѣпляющее, лѣченіе Bennett'a: покой, въ пищу бизнтексъ, молоко и другія питательныя, а также легкія слабительныя. Выжидательное лѣченіе: противувоспалительная діета. У людей крѣпкихъ мѣстныя кровопусканія. При сильномъ раздражительномъ кашлѣ и бессонницѣ pulvis Doveri, нарцѣинъ, кодеинъ, морфія. Настой наперстянки. Iresacantha. Вдыханія хлороформа. Хининъ. При ожиданіи отека камфору, мускусъ, крѣпкое вино, flores benzoes 5 гр. каждый часъ или 2. Въ періодъ улучшенія препараты желѣза, особенно tinct. ferri Radem.

е) **Катарральное воспаленіе.** См. катарръ дыхательныхъ вѣтвей. Повторное употребленіе рвотныхъ.

ж) **Омертвѣніе легкаго.** Вдыханія ol. terebinth. Отваръ хины, вино, камфора, мускусъ, plumbum acetisum, креозоть, уголь.

з) **Хроническая бугорчатка.** Въ первое время, какъ и при легочныхъ гипереміяхъ, полезно лѣченіе виноградомъ, молочной сывороткой, кумысомъ (въ Мензелинскѣ, Сарептѣ. Самарѣ; близъ Севастополя и пр.), а также пребываніе на водахъ въ Эмсѣ, Оберзальцбруннѣ, Рейнерцѣ. Позднѣе больныхъ посылаютъ обыкновенно изъ Висбадена и Зодена въ Меранъ, въ началѣ зимы въ Венецію, а подъ конецъ зимы въ Римъ и



Палермо. Генуя и Мадера также пользуются славой и также не заслуживают ее. Нѣсколько болѣе благоприятна жизнь въ Египтѣ, Восточ. Индіи, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Кавказа, Фармацевтическое дѣленіе чисто припадочное.

И) **Острая просовидная бугорчатка.** Сначала большіе приемы хирина, невозбуждающая діета. Впослѣдствіи *digitalis*, кислоты, — *Narcotica*.

## **25. Болѣзни легочнаго мѣшка.**

а) **Pleuritis.** Банки или пиявки къ больной сторонѣ, холодные компрессы. Настои наперстянки. Нарцеинъ, кодеинъ, морфій. Чтобы содѣйствовать всасыванію оставшагося выпота: смазываніе больной стороны іодовой настойкой. Внутрь іодистый калий, іодистое желѣзо, мочегонныя, слабительныя, а главное хорошее питаніе. Проколь.

### III.

## О формахъ лекарства.\*)

а) *Жидкія лекарственныя вещества*: микстуры, декокты и инфузы, эмульсіи и насыщениа (сатураціи).

1. **МИКСТУРЫ** суть смѣси различныхъ лекарственныхъ веществъ въ жидкой формѣ. Если въ составъ ихъ входятъ средства, нерастворимыя въ водѣ, то ихъ нужно бываетъ *эбалтывать*. Растворы горькихъ вытяжекъ въ ароматическихъ водахъ съ прибавленіемъ значительнаго количества вина, спирта или эвѣра—называются элексирами. Если приемы назначаются по столовой ложкѣ, то не слѣдуетъ прописывать болѣе 4—6 унцій за разъ, если же по чайной ложкѣ, то отъ 1 до 3 унцій, а при приемѣ каплями отъ 2—4 драхмъ.

2. **ДЕКОКТЫ (отвары) или ИНФУЗЫ** получаютъ при обработываніи лекарственныхъ (обыкновенно растительныхъ) веществъ горячею водою. Отвары дѣлаются по преимуществу изъ средствъ вяжущихъ или содержащихъ въ себѣ алкалоиды, или имѣющихъ очень плотную кору.

3. **ЭМУЛЬСИИ** (молоку подобныя жидкости) суть тѣсныя смѣси изъ маселъ, камеди и воды. Различаютъ *emulsiones vegetae* (получаемыя чрезъ растираніе съ водою богатыхъ масломъ и содержащихъ бѣлокъ сѣмянъ, каковы напр.: *amygdalae dulces, sem. raparav., sem. cannabis, sem. hyosciami, lactusae* и проч.) и *emulsiones sruviae* (приготовляемыя чрезъ стираніе 4 лотовъ масла съ 2 лотами камеди и 3 лот. воды). 1 яичный желтокъ (*vitellum unius ovi*) приблизительно замѣняетъ 2 Dr. gummi mimosae и представляетъ предъ этою послѣднею нѣкоторое преимущество, когда приходится дѣлать эмульсіи изъ смолистыхъ веществъ. Смолы, содержащія камедь, какъ напр. *asa foetida* или *ammoniacum*, для приготовленія изъ нихъ эмульсіи просто растираются съ чистой водою или же толкнутся съ небольшимъ количествомъ масла, смолы, какъ содержащія, такъ и не содержащія камеди, камфора, мускусъ, бобровая струя, *semen lycopodii*. Никогда не слѣдуетъ прописывать эмульсіи болѣе, чѣмъ сколько можетъ

\*) Заимствовано, также какъ и предъидущая глава, изъ фармакологіи Ф. Шмидта.

быть употреблено въ теченіи дня. Надо избѣгать: кислотъ, температуры выпѣвнѣя, галондовъ и металлическихъ солей.

4. Такъ наз. **сатураціи** (насыщенія) суть растворы углекислыхъ солей при помощи какой-либо кислой жидкости, кислотой которой сильнѣе угольной и потому, вытесняя ее, соединяется съ ея основаніемъ, при чемъ въ растворѣ остается часть освободившейся угол. к. Для этого чаще другихъ употребляютъ: *acidum aceticum (acetum)*, *ac. citricum*, *ac. tartaricum*. При употребленіи чрезъ 2 часа по столовой ложкѣ слѣдуетъ прописывать отнюдь не болѣе 8 унцій. Если желаютъ имѣть растворъ нейтральный (какъ обыкн.), то прибавить нужное количество кислой жидкости предоставляютъ самому аптекарю; для этого, не обозначая количества кислой жидкости пишутъ *quantum satis ad perfectam saturationem*. Или наоборотъ аптекарю предоставляютъ употребить, сколько нужно, углекислой соли; послѣднее дѣлается въ тѣхъ случаяхъ, когда прописываются кислоты, содержащія въ себѣ особые врачебныя средства (*aceticum colchici, digitalis, scillae*).

б) **Плотныя лекарственныя формы**: *Species* (наборы), порошки, таблечки (*morzuli*), пилюли, *linimenta*, мази и пластыри:

1. **Species (наборы)** суть смѣси различныхъ, по большей части растительныхъ, средствъ. Наборы различаются по своей цѣли: такъ есть наборы для настаиванія (какъ чай), для примочевъ (*species ad fomentum*), для промывательныхъ (*species ad enema*), для куреній (*spec. ad suffiendum*), для полосканій (*spec. pro gargarismate*), для подушечекъ изъ травъ (*spec. pro cucurphis*), для припарокъ (*spec. ad cataplasmata*). Различаютъ также и по дѣйствию—таковы: *spec. pectorales, spec. laxantes*.

2. **Порошки**. Въ формѣ порошковъ прописываются вещества весьма различныя; слѣдуетъ впрочемъ избѣгать веществъ расплывающихся, противно пахнущихъ, очень неприятныхъ на вкусъ или ѣдко дѣйствующихъ на ротъ и пищеводъ. Для правы употребляютъ чаще всего сахаръ. Въ дѣтской практикѣ, а также и тамъ, гдѣ въ смѣси есть вещества, легко притягивающія влагу, предпочитаютъ употреблять молочный сахаръ. Чтобы еще болѣе улучшить вкусъ, берутъ сахаръ съ эфирными маслами (*elaeosacchara*)—соединеніе, получаемое чрезъ растираніе обык. *Sacch. albi* съ 1 капл. какого-либо *ol. aeth.*. Къ веществамъ нерастворимымъ и къ очень легкимъ, или на оборотъ весьма тяжелымъ лучше прибавлять вмѣсто сахара *pulvis gummosum* (сахаръ, лакрица и *gummi mimosae*). Въ порошокъ на 1 драх. сахара можно влестъ отъ 1 до 3 капель спиртныхъ настоевъ эфирныхъ маселъ или балзамовъ и отъ 2 до 6 гр. вытяжекъ, (экстрактъ), камедистыхъ смолъ, мускуса, камфоры. При прописываніи отдѣльныя вещества перечисляются одно за другимъ

(каждое въ особой строкѣ), при чемъ приправа пишется подъ самый конецъ; въ заключение ставятъ буквы *M. f. p.* (*miscel fat pulvis*). Всѣ вещества, дѣйствующія болѣе или менѣе определеннымъ образомъ прописываются отдѣльными приемами; вещества же невинныя могутъ быть прописываемы «по чайной ложкѣ, по щепоткѣ и т. п.» Порошки дѣлаются обыкновенно въ 10 (до 20 грн.). При очень малыхъ приемахъ нужно, чтобы порошки были въ лакированной бумагѣ (*da in charta laevigata*). Порошки, въ которыхъ есть вещества, легко притягивающія влагу или же сильно пахучія и легко улетучивающіяся, должны быть прописываемы въ провощенной бумагѣ (*da in charta cerata*). Снаружи порошки употребляются по преимуществу для присыпокъ (*pulv. adpersorii rasma*) или для чистки зубовъ (*pulv. dentifricius*).

**3. Таблочки или куски** (*morsuli, tabellae*) и **шарики** (*otulae*) не слѣдовало бы прописывать вовсе; на ихъ приготовленіе убивается много времени и потому они дороги, а между тѣмъ не представляютъ никакой выгоды.

**4. Облатки** (*trochisci Pastillen*) заслуживаютъ особеннаго употребленія въ дѣтской практикѣ, но только не между бѣдными. Для приправы всего удобнѣе разведенный шоколадъ или сахаръ съ трагантовой слизью, крахмаломъ, бѣлкомъ и т. п. Въсѣ отдѣльной облатки бываетъ отъ 5 гр. до 4.

**5. Кашка** (*electuarium*) представляетъ дѣвкую массу, которую однако можно черпать ложками, не образуя нитей. Это соединеніе какихъ-либо рыхлыхъ порошковъ съ сильно отваренными сладкими плодами или медомъ, сиропомъ. Особенно часто прописываютъ въ формѣ кашки: *sem. lycopodii, fol. sennae tart. depur, flor. sulphuris, kusso, sem. cinae, rad. valerianae, sem. anisi rad. pimpinellae*. Къ тяжелымъ и плотнымъ порошкамъ, сиропы или смолы прибавляется по въсу въ 2—4 раза больше, къ легкимъ же и рыхлымъ въ 4—8 разъ.

**6. Пилюли** (*pilulae*). Пилюльная масса получается всего скорѣе, если клейкую и густую вытяжку какого-нибудь растенія смѣшать съ сухимъ порошкомъ. Нужно количество вытяжки обыкновенно предоставляется аптекарю, а потому пишется слѣдующее: *extracti, q. s. ut. f. massa pilularum, ex qua fermentur etc.* Для веществъ, которые не переносятъ никакихъ органическихъ примѣсей (какъ напр. *argent. nitric.*) берутъ *bolus alba*—эта послѣдняя *cum aq. destil. (q. s.)* даетъ хорошую пилюльную массу. Различаютъ по плотности 4 рода вытяжекъ (*extracta*):

**I. Плотность сиропы.** Для приготовленія пилюль на 1 часть вытяжки 2 части растительнаго порошка.

2. *Гуще сиропи* такъ, что вытяжка стекаетъ съ конца шпателя. На 1 часть вытяжки 1 часть порошка.

3. *Еще гуще* (не стекаетъ со шпателя). На 1 часть вытяжки  $\frac{2}{3}$  растительнаго или же дѣльную часть вакого-либо другаго порошка (напр. сѣры, hydr. sulph etc.).

4. *Совѣтъмъ сухія*. Съ небольшою примѣсью mucilaginis gummi mim. получаютъ пидюли,

Чтобы отдѣльныя пидюли не склеивались между собою, ихъ пересыпаютъ какимъ-либо рыхлымъ сухимъ порошкомъ (sem. lycoperdii, amyllum, pulv. rad. alth., sacch lactis, rad. iridis florent, cassia cinnamom., etc.). При очень непріятномъ вкусѣ ихъ покрываютъ иногда листовымъ серебромъ или золотомъ (obduce argento vel auro foliaceo), а иногда споемъ клея. (f. pilulae colla animati depurata in aqua fervida sotuta obducendae et siccandae) или наконецъ сахарною слизью (f. pilulae mucil. gummi mim. rauhil. obducendae et sacch. albiss pulvere conspergendae).

7. **Маслянистыя (жидкія) мази** (linimenta) суть молочно мутныя, густоватая смѣси изъ разнаго рода маслъ съ ѣдкимъ амміакомъ или мыломъ, употребляются для втираній.

8. **Собственно мази** (unguenta). Основаніемъ служатъ обыкновенно свиное сало (axungia porci, . aders sullus) или ungt. simpl., ungt. cereum, ungt. rosatum. Соли и вытяжки предварительно растираются (какъ можно тщательно) съ водою, а камфора съ небольшимъ количествомъ масла; спиртныя жидкости слегка подогреваются. Тягучія смолистыя вещества сначала нужно разбить въ водѣ или въ яичномъ желткѣ. При прописываніи мазей сперва обозначаютъ вещества дѣйствующія, если основаніемъ мази должна служить кака-либо смѣсь, всегда имѣющаяся въ аптекѣ; въ противномъ случаѣ сначала слѣдуетъ описать приготовленіе этой смѣси.

9. **Пластыри** (emplastra) приготовляются чрезъ стапливаніе свинцоваго мыла, воска или сухихъ смоль (напр. resina pinі, colophonium, etc.) съ 4—8 частями какого-либо жира; терпентинъ же, бальзамы и камедистыя смолы требуютъ отъ  $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{4}$  жира. Къ такой пластырной массѣ, не нарушая ея свойствъ, можно прибавить отъ  $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{16}$  какого-либо мягкаго или сухаго порошковатаго вещества. Чтобы намазать квад. дюймъ полотна, нужно отъ 5 до 10 гр. пластырной массы. Если намазываніе представляется аптекарю, то нужно прописывать величину требуемаго пластыря.

## IV.

Алфавитный перечень растительных простых и сложных средств, какъ отечественныхъ, такъ и иностранныхъ, съ указаніемъ способа приготовленія ихъ, свойствъ и употребленія въ различныхъ бо-  
льзняхъ.

### А.

**Acetum aromaticum.** (Rad. angel., imperatoriae, zedoariae, flaved. cortic. aurant. перегоняются съ aceti vini). Краснобурая жидкость съ ароматическимъ запахомъ и вкусомъ. Упот. для насыщенія (подобно aceti vini) и для примѣсей въ микстурамъ.

**Acetum colchicum.** См. стр. 78.

**Acetum digitalis.** (1 ч. herb. digit. обрабатывается 8 ч. ч. aceti crudi 6 дней). Прозрачна, красновата съ ядымъ и горькимъ вкусомъ. Достойна упот., внутрь въ чистой водѣ отъ 5 до 30 вкл. при хроническихъ страданіяхъ сердца.

**Acetum orii.** (1 ч. orii обраб. 4 ч.ч. aceti distil.). Отъ 2 до 20 вкл. на приемъ. (Blackdop'овы черныя капли содержатъ вмѣсто укуса сокъ дикихъ яблокъ).

**Acetum rubi idaei.** Малиновый уксусъ. Съ сахарной водою даетъ пріятный охлаждающій напитокъ.

**Acetum scillae.** Уксусъ изъ морскаго луку. (2чч. rad. scillae обр. уксусомъ до колатуры въ 18 ч.ч.). Какъ мочегонное, внутрь отъ 10 до 50 вкл. на приемъ—или въ чистомъ видѣ, или же съ микстурами и насыщеніями.

**Acidum citricum.** Лимонная к-та. (Подогрѣтый лимонный сокъ насыщается мѣломъ, осадокъ отфильтровывается, промывается и разлагается acido sulph. dil., затѣмъ снова фильтруется, а чистая жидкость, протекающая сквозь фильтр, выпаривается до  $\frac{1}{4}$  и ставится для кристаллизаціи.) Безцвѣтная и непахучія ромбическія призмы, раств. въ водѣ. Упот. для лимонадовъ, шапучихъ порошковъ, насыщенныхъ.

**Acidum pyrolignosum crudum.** Acetum ligni. Древесный спиртъ. (Доб. при сухой перегонкѣ дерева.). Содержитъ уксусную к-ту, креозотъ, парафинъ, воду и мн. др. в-ства; представляетъ буроватую жидкость съ запахомъ копоти и кислымъ пригорѣлымъ

вкусомъ. Упот. только снаружи въ разведенномъ или же и въ чистомъ видѣ для обмываній и для смачиванія перевязокъ.

**Acidum pyroliginosum. rectificatum.** Очищенная древесная кислота. Внутрь отъ 10 до 30 вкл., разведенныхъ въ водѣ, при размягченіи желудка.

**Acidum tannicum.** Tanninum. Дубильная к-та. (Доб. чрезъ об-работываніе чернильныхъ орѣшковъ въ такъ наз. выдавливаю-щемъ аппаратѣ). Бѣложелтый аморфный порошокъ съ сильно вяжущимъ вкусомъ, безъ запаха, сильно красить лакмусъ, раств. въ водѣ, алкогольѣ и эфирѣ, съ солями окиси желѣза даетъ темноголубые осадки, а съ хиномомъ, бруциномъ, стрих-ниномъ, морфіемъ и кодеиномъ — бѣлые, растворимые въ ук-сусной и молочной к-тахъ. Съ клеемъ, бѣлкомъ и сыровинной образуетъ нераствор. соединения. Внутрь отъ  $\frac{1}{2}$  гр.—6, нѣско-лько разъ въ день въ порошкахъ, пилюляхъ, растворахъ и микстурахъ—при поносахъ.

**Acidum valerianicum.** Валерьянова кислота. (Доб. чрезъ разложеніе помощью сѣрной кислоты и возгонку изъ валерья-новокислой магнезіи, образующейся при приготовленіи ol. valer. aether.). Безцвѣтная, маслянистая, съ запахомъ валерьяны, резко кислая и летучая жидкость; оставляетъ на языкѣ бѣлое пятно; раств. въ водѣ, алкогольѣ, эфирѣ и уксусной ктѣ. Внутрь отъ 2 до 10 вкл. въ слизистыхъ растворахъ.

**Aconitium.** Алкалоидъ аконита (A. napellus). Бѣлая, зерни-стая масса горькаго вкуса. Раств. въ алкогольѣ, эфирѣ и въ 50 чч. горячей воды. Внутрь въ водномъ растворѣ асop. sulphuricum отъ  $\frac{1}{10}$  до  $\frac{3}{4}$  гр. противъ подагры, ревматизма и хроническихъ худосочій. (Гомеопаты употребляютъ преимущественно въ 1 періодѣ воспаленія легкихъ. вообще при лихорадкѣ, при-ливахъ, воспаленіяхъ). Снаружи въ алкогольныхъ растворахъ для впусканія по каплямъ въ слуховой проходъ.

**Aloë lucida s. socotrina. indica, turcica** отъ aloë socotrina (Liliaceae). Гранатовокрасные или бурые куски съ раковистымъ изломомъ, горькаго вкуса и пронипательнаго запаха. Въ алко-гольѣ раств. почти совершенно, въ водѣ на половину. Внутрь всего лучше въ пилюляхъ, какъ раздражающее средство, слабительное, проносное; снаружи въ клистирѣ при ascaris lumbricoides.

**Amigdalinum.** Въ малыхъ приемахъ почти недѣйствующее средство. Его можно давать вмѣсто синильной кислоты. Въ эмуль-сіи сладкихъ миндалей, если къ ней прибавить 17 гр. амигда-лина, будетъ содержаться (по прошествіи нѣсколькихъ часовъ) вдвое болѣе сильной кты, чѣмъ въ водѣ горькихъ миндалей. Эмульсію эту даютъ тамъ же, гдѣ и синильную кислоту отъ 10 до 15 вкл.

**Amylum.** Крахмалъ. Внутрь для пополненія порошковъ (*tartari stibiatî*), для пересыпки пилюль. Снаружи: для присыпокъ, для клистировъ (на клизму берутъ 1 или 2 чайн. ложки крахмала, разводятъ небольшимъ количествомъ воды и затѣмъ наливаютъ  $\frac{1}{2}$ —1 чашки кипятку; если хотятъ прибавить какого-либо наркот. вѣща, то дѣлаютъ это по охлажденію ждсти, предъ самымъ ввыскываніемъ), для постоянныхъ повязокъ.

**Amylum maranthae.** Аррарутъ изъ *marantha arundinacea* или *m. indica*. Сходенъ съ крахмаломъ, только дороже. Для смѣсей аррарута съ различными стручковыми плодами придуманы весьма красивыя названія.

**Aqua asae foetidae.** Вода вонючей камеди. *Aqua asae foetidae composita* (спиртно-водяной дестиллатъ; что бы получить его, берутъ *asae foet.*, *rad. angel.*, *rad. calami.*). Черезъ 2 часа по стол. ложкѣ съ чаемъ изъ мелисы (при гистеріи).

**Aqua foetida antihysterica s. pragensis** (кромѣ *asae foet.* въ составъ этой воды входятъ еще *galban.*, *valerian.*, *castor.*, *myrrh.* и др. аромат.). Мутная ждсть. Внутрь каждые часъ или два по чайной ложкѣ.

**Aqua glandium quercus Rademacheri.** При болѣзняхъ селезенки. По  $\frac{1}{2}$  столов. ложкѣ 4 раза въ день.

**Aqua nictotianae Rademacheri.** Внутрь при холерѣ.

**Aqua nucum vomicarum Rademacheri.** Внутрь 10—30 вкл. нѣсколько разъ въ день. (При страданіяхъ печени).

**Aqua opii** не содержитъ никакого алкалоида, а только эфирное масло. Для глазныхъ примочекъ.

**Aqua lauro-cerasi** см. стр. 61.

**Aqua cerasorum.** *citri*, *cinnamomi simp.* et *vinosa*, *cochleariae*, *chamomillae*, *flor. aurantii*, *foeniculi*, *rosarum* (для глазныхъ примочекъ), *a. rubi idaei*, *petroselini* (для мочегонныхъ микстуръ), *a. menth. crisp. et pip.*, *a. pulsatillae*, *rutae*, *salviae*, *sambuci* и наконецъ *valerianae* употр. не только сами по себѣ, но и для составленія микстуръ.

**Asa foetida depurata.** Чертова дерьмо. Вонючая камедь. (Доб. изъ надрѣзовъ въ верхнихъ частяхъ корней *ferulae asae foetidae* (*umbelliferae*), растущей въ Персіи). Желтоватые, сѣрые или бурые куски различной величины съ чесночнымъ запахомъ (пріятнымъ для истеричныхъ женщинъ) и сильно горькимъ вкусомъ. Гдѣ нельзя употреблять холодныхъ душъ, тамъ чертовое дерьмо составляетъ прекрасное и необходимое срво для временнаго успокоенія истеричныхъ женщинъ. Кромѣ истеріи его употр. съ успѣхомъ и при сердцбевіяхъ (при такъ назыв. сердечной судорогѣ, столь частой у страдающихъ гемороемъ).



Его даютъ внутрь по нѣскольку разъ въ день въ пилюляхъ и эмульсіяхъ. Снаружи въ влистирахъ и какъ нюхательное средство.

**Atropinum** см. стр. 39.

## В.

**Baccae berberidis.** См. стр. 43.

**Baccae juniperi.** См. стр. 133.

**Baccae lauri.** Ягоды лавра. (*Laurus nobilis*). Для ваннъ.

**Balsamum copaivae.** (Добыв. изъ надрѣзовъ въ корѣ *copaiferae officin.* (*leguminosae*, въ западной Индіи и южной Америкѣ). Свѣтлая, прозрачная, маслянистая ждсть съ особымъ запахомъ и непріятно ароматическимъ вкусомъ, не растворяется въ водѣ, но раств. въ алкогольѣ, эфирѣ, жирныхъ и эфирныхъ маслахъ. Дѣйствуетъ подобно всѣмъ *balsamica*, какъ срво, ограничивающее отдѣленіе слизистыхъ оболочекъ. Его даютъ при *bronchitis blennorrhoeica, catarrhus vesic. urin.*, бѣляхъ и триперѣ отъ  $\frac{1}{2}$  до 4 чайн. лож. (запиваютъ *aq. menth. pip.*) въ пилюляхъ, эмульсіяхъ, микстурахъ (взбалтывать передъ приемомъ) и капсулахъ. Снаружи въ влистирахъ.

**Balsamum nucistae.** Мускатный бальзамъ. Довольно плотная, мазевидная, желтобурая масса съ характеристическимъ запахомъ. Только снаружи для растираній живота при раздутіи газами, судорожной рвотѣ и поносѣ, въ особенности у дѣтей, какъ домашнее срво.

**Balsamum peruvianum s. indicum nigrum.** (Добыв. изъ надрѣзовъ въ корѣ *myroxylon peruvianum* (*leguminosae*), онъ вытекаетъ бѣлымъ, отъ кипяченія же съ водою становится темно-краснымъ). Прозрачная, красно-бурая, похожая на сиропъ, ждсть, съ горькимъ ароматическимъ вкусомъ и съ запахомъ, похожимъ на запахъ ладона. Раств. въ алкогольѣ. Внутри, какъ *balsamicum*, въ особенности при хроническихъ ватаррахъ дыхательныхъ органовъ, отъ 10 до 30 вкл. въ чистомъ видѣ, или въ пилюляхъ и эмульсіяхъ. Снаружи для мазей и вдыханій при катаррѣ бронховъ.

**Bebeerin.** (Алкалоидъ изъ коры *nestandra Rodiaei*, растущей въ Гвіянь, гдѣ ее охотно употр. для постройки кораблей. У насъ иногда даютъ внутрь противъ перемежающихся лихорадокъ  $\frac{1}{2}$  — 4 гл. съ весьма сомнительнымъ успѣхомъ.

**Benzoë.** *Resina benzoe.* Росный ладонъ. *Asa dulcis* (смола изъ стугах *bedzoin*, раст. на Суматрѣ, Борнео и Явѣ). Сѣрбурые, смолистые куски съ пріятнымъ запахомъ. Раств. въ алкогольѣ. Только снаружи въ зубныхъ и курительныхъ порошкахъ.

**Brucium.** Бруцинъ (алкалоидъ всѣхъ растений, содержащихъ стрихнинъ). Внутрь отъ  $\frac{1}{10}$  до 5 gr.; рекомендованъ Magendie. Показанія тѣже, что и для стрихнина.

**Butyrum cacao s. oleum cacao.** Масло какао (изъ theobroma cacao). Бѣлаго цвѣта, густоты воска, лучше свиного жира для составленія мазей, но очень дорого; употр. для приготовленія suppositoria.

**Butyrum majonanae s. unguentum majonanae.** Любимое домашнее срво для натирания дѣтей съ легко раздражающейся кожей.

### С.

**Camphora.** Продается въ полукруглыхъ, прозрачныхъ, кристаллически зернистыхъ пластинкахъ съ сильнымъ ароматическимъ запахомъ и ароматично-освѣжающимъ горькимъ вкусомъ. Раств. въ винномъ спиртѣ, эфирныхъ маслахъ, креозотѣ, хлороформѣ и уксусной жидкѣ. Внутрь отъ  $\frac{1}{2}$  до 5 gr. въ порошкахъ, въ пилюляхъ (съ gummi arb. и succ. liquid.), растворахъ (oleum camphoratum: 1 ч. камфоры на 8 чч. ol amygdal., spiritus camphoratus: 1 ч. камфоры на 12 чч. спирта) и эмульсияхъ, при самыхъ различныхъ болѣзняхъ. Снаружи въ клистирахъ, травяныхъ подушечкахъ и припаркахъ для полосканій съ какинь-нибудь слизистымъ вѣщомъ или для обмываній въ видѣ эмульсій, для вдыханій (cigarettes camphorées Raspail'a: стекляныя трубочки, въ которыхъ камфора удерживается посредствомъ ваты), для обкуриваній (камфору подогреваютъ на металлическихъ пластинкахъ, пары собираютъ на вату въ которую и завертываютъ болящую часть), для мазей, для пластырей и мыла.

**Capita papaveris.** Маковые головки. См. стр. 167.

**Caraghen.** Lichen caraghen. Ирландскій мохъ. Внутрь въ видѣ густаго отвара или студени, при легочныхъ страданіяхъ. Домашнее срво.

**Carbo populi s. belosi**—тополовый уголь.

**Carbo vegetabilis depurat s. praeparatus.** Очищенный древесный уголь. (Carbo betulae—березовый уголь). Только снаружи: для полосканій при худомъ запахѣ изо рта, для присыпокъ на омертвѣлыя мѣста (обыкновенно съ равными чч. cort. chinae fusc. и rad. calami), для мазей.

**Cardoleum** (изъ anacardium occidentale). Бурая, дегтевидная масса, раств. въ эфирѣ, алкохолѣ и жирныхъ маслахъ. Нарывное средство.

**Caricae** Фиговыя ягоды (отъ ficus carica). Какъ приправа къ разнымъ species. Снаружи, какъ размягчающее срво.

**Saryophylli.** Гвоздика. (Шлоды отъ *saryophyllus aromaticus*).  
Внутрь 5—10 гр. Снаружи, для зубныхъ порошковъ и травя-  
ныхъ подушечекъ.

**Cetrarin** Лихенинъ см. стр. 66.

**Chininum s. chininum purum.** Хининъ. Бѣлый кристал-  
лическій порошокъ, раств. въ разведенныхъ водахъ и въ алко-  
голь. По вкусу онъ горче 2-го алкалоида хинныхъ корокъ—  
пинхонина. Внутрь  $\frac{1}{2}$ —4 гр.

**Chininum arsenicosum.** Мышьяковисто-кислый хининъ. Отъ  
 $\frac{1}{30}$ — $\frac{1}{6}$  гр. въ водномъ растворѣ противъ лихорадокъ. Дорогъ.  
Дѣйствіе невѣрно.

**Chininum aceticum, citricum, hydrocyanicum, hydrojodicum, lacti-  
cum, nitricum, phosphoricum, muriaticum, tannicum** и **tartaricum** суть  
по большей части негодные препараты.

**Chininum citricum cum ferro** очень дорогъ и потому луч-  
ше замѣнять его препаратами хинина и желѣза отдѣльно.

**Chininum sulphuricum basicum.** Основной сѣрно-кислый  
хининъ. (Грубо истолченную царскую хину вывариваютъ in  
*aqua acidula* (вода, слегка подкисленная сѣрной водой), затѣмъ  
прибавляютъ къ отвару мелко истолченной гашеной извести,  
пока онъ не потемнѣетъ и не станетъ явственно щелочнымъ;  
осадокъ сушатъ, толкутъ и обрабатываютъ *spir. rectificatis*,  
просильтрованную ждуть слегка выпариваютъ, насыщаютъ сѣр-  
ной водой и даютъ кристаллизоваться; полученные кристаллы  
растворяютъ въ водѣ, очищаютъ *carb. animali* и снова остав-  
ляютъ кристаллизоваться). Мелкія нитевидныя иглы безъ запаха,  
съ сильно, но чисто горькимъ вкусомъ. Раств. въ водѣ, если  
прибавить нѣсколько кап. какой-либо кислоты (при чемъ всегда  
образуется соответствующій препаратъ). Внутрь какъ тониче-  
ское нѣсколько разъ въ день; *противъ перемежающейся лихо-  
радки*, перемежающихся невралгій, ревматизма 2—20 гр. въ  
день (за 1 или за 2 часа до приступа лихорадки приемы пре-  
ращаются, за то за 3 или за 4 часа дается двойной приемъ).  
Подожное употребленіе дѣйствуетъ вѣрно и требуетъ менше  
вещества (отъ 2 до 3 гр.). Въ порошкахъ, пилюляхъ и вод-  
ныхъ растворахъ.

**Chininum valerianicum.** Валерьяновокислый хининъ. Внутрь  
въ порошокъ. Весьма дѣйствительный препаратъ противъ пере-  
межающихся невралгій у истеричныхъ женщинъ.

**Chinoidinum.** Остатокъ отъ приготовления хинина, и потому  
ненадеженъ; сухая, блестящевурая, горькая масса, легко раств.  
въ алкоголь и разведенныхъ водахъ. Внутрь 5—30 гр. въ порош-  
кахъ, пилюляхъ и растворахъ, подобно хинину.

**Cinchoninum. Cinchonium,** Алкалоидъ хинныхъ корокъ. (Доб.,

осаждающая какую-либо соль цинхонина аммиакомъ). Тонкая, бѣлая, блестящая игла горькаго вкуса, трудно раств. въ водѣ и эфирѣ, въ алкоголь же легко. Какъ это срво, такъ и *cinchoninum sulphuricum* часто употребляются вмѣсто хинина потому что дешевле.

**Cocculi indicii.** Кукельванъ, рыба ягода (отъ *menispermum cocculus*), отъ 3 до 4<sup>ли</sup> величавы, морщинисты, бураго, а внутри болѣе свѣтлаго цвѣта, очень горькаго вкуса. Вызываютъ: *opisthotonus* и *tetanus*, сродны со стрихниномъ. Такъ какъ кукельванъ мѣшаетъ прокисанію, то его нерѣдко подмѣшиваютъ къ пиву.

**Codeinum** Алкогольдъ опія. см. стр. 189.

**Coffeinum purum.** **Theinum** (въ чайн. листьяхъ), **theobrominum** (въ бобахъ какао), **guaninum** (сѣмена *raullinae sorbilis*). Блестящія, какъ шелкъ, красивые мелкіе кристалы, очень трудно раств. Это срво и

**Coffeinum citricum** употр. при ідиопатической мигрени каждые 2 часа по 1/4—1 г. въ порошкахъ, пастиллахъ (съ сахаромъ) и сиропахъ. Въ бѣдной практикѣ *coff. citricum* можетъ быть замѣненъ прибавленіемъ лимоннаго сока къ настою изъ зеленыхъ кофейныхъ бобовъ.

**Colchicinum.** См. стр. 73

**Coelodium** (Растворъ гремячей ваты въ эфирѣ). Густая, безцвѣтная ждоть съ запахомъ эфира, покрываетъ кожу тонкимъ, какъ бы роговымъ слоемъ. Употребленіе его для склеиванія и для перевязокъ достаточно извѣстно.

**Colocynthis.** см. стр. 89.

**Conium,** См. стр. 82.

**Cortex adstringens brasiliensis** (отъ *acacia jugema*). Свернутые сѣрые, а внутри желтовато-бѣлые куски. Содержитъ 28° дубильнаго вѣща. Внутрь и снаружи (для впрыскиваній), особенно при кровотеченіяхъ и катаррахъ половыхъ органовъ.

**Cortex angusturae (verae).** Кора ангустуры (отъ *bonplandia trifoliata*, rutaceae въ Гвианѣ). Какъ *stomachicum* 10—30 г. нѣсколько разъ въ день въ отварѣ.

**Cortex bebeeru** См. *bebeerin*.

**Cortex cascarillae.** Кора каскариллы. (Отъ *croton eluteria*, *euphorbiaceae*, кустарникъ въ Америкѣ). Приятнаго прянаго вкуса и запаха. Внутрь какъ *stomachicum* въ отварѣ.

**Cortex chinae,** Изъ рода *cinchona*, *rubiacaeae*. Кустарникъ или дерево въ Южной Америкѣ.

Изъ двадцати слишкомъ видовъ хинной корки главные:

<i>Cortex chinae fuscae s. cortex peruvianus.</i>	} Алкалоиды: хининъ, цинхонинъ, хинидинъ, хіостинъ и арициднъ.
и <i>cortex chinae regiae</i> или <i>calivuae.</i>	

Кислоты: хинодубильная, хиновая и хиноватая и красящее вещество (красное).

**China fusca** содержитъ болѣе цинхонина и менѣе хинина, чѣмъ *china regia*. Внутрь при перемежающейся лихорадкѣ въ періодъ аперексіи, въ отварѣ и какъ *tonicum* для выздоравливающихъ.

**Cortex malicornii s. granatorum** См. стр. 199.

**Cortex salicis** см. стр. 216.

**Cortex rhamni frangulae** См. стр. 206.

**Cortex simarubae**. Завязная кора. Отваръ при эпидемическомъ поносѣ,

**Cortex winteranus s. magellanicus** отъ *drimys winteri*. Слабое ароматическое.

**Cortex geoffreae surinamensis**. Слабительное. Внутрь въ видѣ decocta и снаружи въ клистиракъ.

**Cortex mezerei** См. ст. 94.

**Cortex viridis nucum juglandis** См. стр. 132.

**Cortex radices granatorum** (Отъ *punica granatum*). Кора гранатоваго корня: (Дубильная кта, пунигидъ и маннитъ). До сихъ поръ еще лучшее противуглистное срво. Собственно лѣченію предпосылаютъ обыкновенно нѣкоторыя подготовляющія срва, чтобы привести таeniaш, такъ сказать, въ болѣзненное состояніе. Наканунѣ вечеромъ больной ѣстъ селедку, утромъ, въ день лѣченія, пьетъ на тощій желудокъ чашку чернаго кофе, сильно подслащеннаго, и затѣмъ уже приступаетъ къ самому лѣченію.

**Cubebae. Piper caudatum**. Кубебы. (*Piper cubeba, pipercaceae*, на Явѣ). Буро-черные; морщинистые плоды, нѣсколько болѣе обыкновеннаго перца, на твердыхъ стержняхъ, съ неприятнымъ остро-перечнымъ и въ тоже время камфороподобнымъ вкусомъ (Содержать: кубебинъ, кубебовое масло, смолу, воскъ, поваренную соль). Внутрь въ порошкахъ, микстурахъ и пилюляхъ. Сильно слабить; чтобы помѣшать такому дѣйствию, прибавляють опій. Главное употребленіе противъ перелоя.

#### D.

**Daturin**. Алкалоидъ *daturae stramonii*—дурмана. Бѣзцвѣтные блестящіе кристаллы, безъ запаха съ табачнымъ горьковатымъ

вкусомъ. *Planta* употребляетъ его подобно атропину. *Grafe* употребл. его для расширенія зрачковъ тамъ, гдѣ атропинъ почему-либо не переносится. Очень дорогъ.

**Decoctum chinae clarificatum.** Какъ укрѣпляющее срво, каждый 1 часъ или 2 по стол. ложкѣ.

**Delphinium.** См. стр. 98.

**Dextrin.** Крахмальная камедь. (добывается обработываніемъ крахмала сѣрною кислотю). Камедевидная клейкая масса. Главное употребленіе вмѣсто клейстера для постоянныхъ повязокъ при переломахъ.

**Digitalinum.** См. стр. 105.

## Е.

**Elaterium.** Алкалоидъ *momordicae elateriae*—дерябки. Мелкіе, безцвѣтные, очень горькія кристаллы. Легко разтв. въ алко-голь. Внутрь, какъ сильное проносное отъ  $\frac{1}{30}$ — $\frac{1}{16}$  gr. 2—3 раза въ день въ порошкахъ, пилюляхъ или алкогольномъ растврѣ.

**Electuarium lenitivum s. el. sennae.** Слабительная кашка. (*Pulp. tamarind. syr. simpl. tart. dep., fol. sennae pulv.*). Внутрь и всего лучше безъ всякихъ добавленій по чайной ложкѣ до желаннаго дѣйствія.

**Electuarium theriaca.** Териакъ. (*Opii., angelicae, serpentariae, valerianae min., scillae, myrrh., ferri sulph.* съ *vinii malace.* и *mell despur.*). Чернаго цвѣта, съ запахомъ коровяка. Снаружи противъ деуралгіи. Цынъ не употр.

**Elixir ad longam vitam.** Жизненный элексиръ. (*Aloe, bolet. laticis, rhei rad. zedoariae, gentianaе, galangae, theriacaе, croci, sacchari albis.* обработываются *spiriti vini gall.*). Темно-коричневая ждсть. Любимое *stomachicum*, особенно со стороны тайныхъ поклонниковъ алкоголя.

**Elixir paregoricum.** См. стр. 185.

**Elixir e succo glycyrrhizae s. Elixir regis Daniae.** См. стр. 119.

**Emplastrum adhaesivum.** Клейкій пластырь (*ol. olivar. 36 чч., lithargyri 22 чч., colophon. 24 чч. terebenth comm. 2 чч.*). Брать его слѣдуетъ смоченными пальцами, чтобы не приклеился.

**Emplastrum aromaticum s. stomachicum s. de tacamahaca.** Бѣловатаго цвѣта. Употребл. при недѣятельныхъ язвахъ и какъ *emplastrum stomachicum*.

ва **Emplastrum belladonnae.** (*Cer., colophon., ol. oliv., fol. belladon*)

**Emplastrum de cicuta. s. Conii** См. стр. 82.

**Emplastrum galbani crocatum.** Буро-зеленаго цвѣта. Болеутоляющій, пластырь.

**Emplastrum hyosциami.** Пластырь изъ бѣлены. Дѣйствуетъ разбивающимъ и болѣутоляющимъ образомъ.

**Emplastrum meliloti.** Разбивающій или донниковый пластырь. (Воскъ, терпентинъ, трава и цвѣты донника).

**Ergotinum.** См. стр. 230.

**Essentia belladonnae.** (Succ. herb. belladon. recens. expr. обрабатывается равнымъ по вѣсу количествомъ spir. vini recti.). Коричневая ждсть, отъ 6 до 12 кпл. на приемъ.

**Essentia herbae cicutae (Tinct. conii).** См. стр. 81.

**Essentia herbae hyosциami.** (Свѣже выжатый сокъ бѣлены смѣшиваютъ съ равнымъ количествомъ spir. vini recti.) и фильтруется). Коричневаго цвѣта. 5—20 кпл. нѣсколько разъ въ день, срво прекращающее кашель, употр. подобно другимъ наркотическимъ.

**Essentia lactucae virosae** (Succ. rec. expr. cum spir vini recti.) Коричневаго цвѣта. 10—30 кпл. противъ спазматическихъ нейрозъ въ дыхательныхъ органахъ.

**Euphorbium.** Молочайная смола. (Высохшій на воздухѣ сокъ изъ euphorbia officinarum и capariensis, euphorbiaceae, въ Африкѣ). Легко растирающіеся желтоватые куски неправильной формы; при стараніи пахнеть подобно ладону; вкусъ сначала слабо-защитный, а потомъ жгучій. Растворимъ въ эфирѣ, алкогольѣ и терпентинномъ маслѣ. Только снаружн для присыпокъ (съ магнезій) или для мазей при недвѣтельныхъ язвахъ.

**Extractum absinthii.** См. стр. 26.

**Extractum aconiti.** См. стр. 7.

**Extractum aconitii siccu s. pulveratu.** Внутрь отъ 1—iv гр. въ порошкѣхъ или пилюляхъ.

**Extractum aloës aquosum.** Сгущеніе 1 части сабура съ 4 ч. воды). Буро желтаго цвѣта. Какъ drasticum i—iv гр. въ пилюляхъ. Сваружн въ листирахъ (gr. j—v) и для перевязокъ.

**Extractum belladonnae.** См. стр. 38.

**Extractum caincae spirituosum.** изъ rad caincas. 15—30 гр. Мочегонное. Лучше вовсе не употреблять.

**Extractum calami aromatici** (касатика, лепешника). Темно-бураго цвѣта. Раств. онъ даетъ мутную ждсть. По  $\gamma$ —xx гр. на приемъ въ пилюляхъ (или водномъ растворѣ, мутномъ, какъ молоко, желтоватаго цвѣта). Излишенъ, равно какъ и

**Extractum calendulae** (ноготковъ) Темно-зеленаго цвѣта. Въ пилюляхъ и растворѣ, при раковыхъ язвахъ.

**Extractum cannabls indicae** (индійской конопли). (Вывариваютъ in spir. vini rectif. богатая смолою верхушки, cannabis, полученную ждсть выпариваютъ). По  $\frac{1}{2}$ —5 гр. на приемъ. Рекомендовали при душевныхъ болѣзняхъ и cholera asiatica по  $\frac{1}{4}$ —3 гр. въ пилюляхъ.

**Extractum diacodion montani**. Сиропъ изъ маковыхъ головокъ. (Сар. parav, siliqua. dulc, rad. liquit. парятся въ кипящей водѣ въ теченіи 18 часовъ, а потомъ доводятся до густоты сиропа. Буроватаго цвѣта; непрозраченъ. Дѣтямъ при мучительномъ кашлѣ по  $\frac{1}{2}$  чайн. ложкѣ; взрослымъ по стол.

**Extractum cardui benedictae**. См. стр. 60.

**Extractum cascariillae**. Въ пилюл. и раств. Снаружи въ видѣ кашицы для прикладыванія къ деснамъ.

**Extractum cicutae s. conii** См. стр. 81.

**Extractum colocynthidis**. См. стр. 91.

**Extractum corticum auratiorum**. (Спиртная вытяжка изъ корокъ померанцевъ). Внутрь въ пил., микст. и растворахъ. Растворяясь, даетъ мутную ждсть.

**Extractum cubearum aethereum**. Внутрь нѣсколько разъ въ день въ пил. и капсуляхъ. Употреб. подобно кубебамъ.

**Extractum dulcamare** (Добыв. выпариваніемъ горячаго настоя стебельковъ сладко горькаго паслена). Темнокоричневаго цвѣта. По II—x гр. въ пил. и раств. Противъ хроническихъ сыпей, подагры, хрон. катарра дыхательныхъ вѣтвей. Весьма употребит. масса для пил.

**Extractum digitalis purpureae**. (сокъ изъ свѣжихъ листьевъ и двѣтущихъ вѣточекъ обрабатывается спиртомъ). По  $\frac{1}{2}$ —1—2 гр. на приемъ нѣсколько разъ въ день.

**Extractum filicis** (папоротника) aethereum. Желто-бураго цвѣта. Противъ taenia x—xxx гр. въ пил. (пополамъ съ порошокомъ папоротника и въ капсуляхъ).

**Extractum gentianæ**. См. стр. 115.

**Extractum graminis**. См. стр. 250.

**Extractum gratiola**. См. стр. 120.

**Extractum helenii**. Внутрь x—xxx гр. въ пилюляхъ.

**Extractum hellebori nigri**. (черной чемерицы). Внутрь I—v гр. въ пилюляхъ, противъ перемежающихся лихорадокъ.

**Extractum herbae hiosciami** См. стр. 127.

**Extractum herbae Stramonii** См. стр. 95.



**Extractum lactucae virosae.** Темнобураго цв. Внутрь  $\frac{1}{2}$ —10 гр. въ порош., пилюл. и растворахъ при судорожномъ кашлѣ, коклюшѣ и водянкѣ въ груди и сердечнаго мѣшка.

**Extractum ligni quassiae.** Внутрь  $\gamma$ —xx гр. нѣсколько разъ въ день въ пилюляхъ и растворахъ, какъ горькое средство.

**Extractum liquiritiae s. glycyrrhizae** (солодкового корня). Чаше всѣхъ другихъ употреб. какъ масса для пилюль.

**Extractum marrubii.** См. стр. 154.

**Extractum monesiae.** Былъ рекомендуемъ во всевозможныхъ болѣзняхъ, но повсюду оказался бесполезнымъ. Откуда онъ добыв. неизвѣстно. Быть можетъ его слѣдуетъ призвать за слабое тоническое.

**Extractum myrrhae.** Внутрь отъ 5 до 20 гр. въ порошкахъ или пилюляхъ.

**Extractum nicotianae aquosum.** Его рекомендовали, какъ antispasmodicum, но надежды мало оправдались, по  $\frac{1}{2}$ —2 гр. въ пилюляхъ или растворахъ. Снаружи въ клистирахъ при hernia incarcerata, ileus, задержаніи мочи: въ мазяхъ при невралгіяхъ, въ помадахъ (для укрѣпленія волосъ—Dorvault).

**Extractum nucum vomicarum aquosum.** Бураго цв. По  $\frac{1}{8}$ —2 гр. на приемъ.

**Extractum nucum vomicarum spirituosum.** Внутрь отъ  $\frac{1}{16}$  до 1 гр. въ пилюл., раствор. и порош.

**Extractum opii aquosum.** См. стр. 184.

**Extractum pulsatillae** (сазончиковъ). Внутрь  $\frac{1}{2}$  — 3 гр. въ порошок., пилюл. и растворахъ при катарактѣ.

**Extractum rad. colombo.** Темнобур. цв. Въ пил. и раствор. (aq. cinnam.)  $\Pi$ —x гр. При хронич. поносахъ.

**Extractum rathaniae aquosum.** Въ порош., пил. и микстурахъ, особенно при внутреннихъ кровотеченияхъ. Снаружи для вприскиваній при кровотеченияхъ и катаррахъ мочевого канала и влагалища. Тяннивъ всегда заслуживаетъ преимущество.

**Extractum rhei aquosum.** См. стр. 209.

**Extractum rhei compositum. S. catholicum.** См. стр. 209.

**Extractum secalis cornuti.** См. стр. 230.

**Extractum seminum cinnae aethereum.** (Эфирная вытяжка цитварнаго сѣмени выпаривается до густоты меда). Противуглистное  $\gamma$ —xv гр., особенно противъ ascaris lumbricoides. Въ пилюл. (cum sem. cinnae q. s.).

**Extractum senegae.** По  $\gamma$ —x гр. по нѣскольку разъ въ день въ пилюл.; какъ составная масса для пилюль изъ отхарѣвающихъ вѣщъ.

**Extractum taraxaci.** См. стр. 142.

**Extractum trifolii fibrini** (трифоли, трилистника). Темно-бур. цв., весьма горьк. вкуса.

**Extractum valerianae.** См. стр. 256.

## F

**Flores arnicae.** См. стр. 25.

**Flores calendulae.** См. стр. 52.

**Flores chamomillae vulgaris et romanae.** См. стр. 154.

**Flores cinae s. santonici.** См. **Semen cinae.**

**Flores malvae arboreae.** (розоваго проскурняка). (Отъ *altheae s. alcea arborea, malvaceae*). Въ видѣ водянаго или молочнаго отвара, особенно при катаррахъ полости рта и глотки. Домашнее срво.

**Flores meliloti.** (донника) (отъ *melilotus offic.*). Снаружи для смачиванія компрессовъ и для впрыскиванія при обильныхъ нагноеніяхъ.

**Flores rheados.** См. стр. 169.

**Flores pyrethri.** (отъ *pyrethrum caucasicum*—персидская ромашка). Всѣмъ извѣстное срво противъ насѣкомыхъ. Говорятъ, что оно уничтожаетъ также и плащицъ.

**Flores sambuci.** См. стр. 219.

**Folia aurantiorum.** будучи смѣшаны съ разными частями *fol. melissae citratae* и *herb. menth. piper.*, даютъ сборъ охотно употребляемый вмѣсто чая при болѣзненныхъ мѣсячныхъ и брюшныхъ страданіяхъ истеричныхъ жевщанъ.

**Folia bucco s. diosmae crenatae.** (*Rutaceae*, кустарникъ на Мысѣ Доброй Надежды). Запахъ ароматическій, вкусомъ похожъ на мяту. Мочегонное. Употребляется при хроническихъ катаррахъ пузыря и мочеваго канала, при хроническихъ водянкахъ.

**Folia farfarae.** См. стр. 251

**Folia fraxini** (ясени—*Fratinus excelsior*). Противъ подагры, ревматизма и перемежающейся лихорадки.

**Folia huaco.** (Отъ *mikania huaco, lianaeae*, въ Мексикѣ, Венесуелѣ и Гаваннѣ). Совѣтуютъ употреблять отваръ по чашкѣ, каждое  $\frac{1}{2}$  часа при желтой лихорадкѣ, холерѣ, водобоязни укушенія змѣей.

**Folia juglandis.** См. стр. 132.

**Folia lauro cerasi.** (Отъ *prunus lauro cerasus*). Лавровишневые листья. Служать для приготовления лавровишневой воды.

**Folia rhododendri chrysanthi.** См. стр. 210.

**Folia sennae.** Александрийскій листъ (отъ *cassia lenitiva*, *sacsalpineae*, въ Аравіи, Верхнемъ Египтѣ, Нубіи, Абиссиніи). Главныя составныя чч.: катартиль (желтовато-краснаго цвѣта, отвратительнаго вкуса) и смѣла. Какъ слабятъ, въ отварѣ съ чемъ, кофе или съ инбиремъ, анисомъ, лимоннымъ сокомъ, *acid. tart.* (Brandeis употреб. ихъ съ хорошимъ успѣхомъ противъ всевозможныхъ брюшныхъ страданій, по слѣдующей формулѣ: *fol. sennae* обливаются холодной водой и оставляются въ закрытомъ сосудѣ 12 часовъ; получающуюся при этомъ коричневую жидкость варятъ съ кофе). Смѣсь эту приятно принимать, и потому ее можно бы употреблять чаще, чѣмъ это дѣлается до сихъ поръ.

**Folia uvae ursi.** См. стр. 23.

**Fructus capsici annui.** Испанскій или стручковый перецъ (отъ *capsicum annuum*, *Solanaceae*, въ южной Америкѣ и въ западной Индіи). Кеглевидные, блестящекрасные, кожистые стручки съ 2 — 3 гвѣздами и множествомъ бѣловатыхъ сѣмянъ. Запахъ ихъ вызываетъ чиханье, вкусъ жгучеострый. (Капсапиль — густая жидкость). Теперь употребл. лишь снаружи, въ полосканіяхъ при *angina gangraenosa*.

**Fructus immaturi aurantiorum.** Круглые горькие плоды, величиною отъ горошины до вишни. Подобно *sort. aurant.* при разныхъ диспептическихъ состояніяхъ.

**Fructus tamarindorum.** Тамаринды (отъ *tamarindus indica*, *sacsalpineae*). Слабятъ. См. впрочемъ *pulpa tamarindorum*.

**Furfur s. farina amygdalatum.** Миндальная шелуха (остатки отъ выжиманія миндалей при добываніи изъ нихъ жирнаго масла). Только для обмываній.

## G.

**Galbanum s. gummi galbanum:** (Отъ *galbanum offic. umbelliferae*, въ Сиріи, Аравіи и Персіи). Буроватожелтые куски неправильной формы, горькаго вкуса и бальзамическаго запаха. Какъ *emmenagogum* и *antispasmodicum* (при истерическихъ страданіяхъ) II—XX гр. въ пшлуд. или эмульсіяхъ.

**Galla turcicae.** Червивые оушки (плодоватые, бугристые, сѣротемносиваго цвѣта наросты, образующіеся на корѣ *quercus infectoria* отъ укуловъ насѣкомаго *supers gallae tinctoriae*, кладущаго туда свои яйца; наросты эти бывають отъ горошины до виш-

ни величиною). Главн. составн. ч. дубильная кта. Внутрь, какъ *tannicum*, особенно при отравленіяхъ ѣдкими веществами, въ отварѣ. Снаружи ихъ употреб. нѣкоторые, какъ *specificum* противъ геморроидальныхъ узловъ, въ формѣ мази. Дѣйствіе ихъ подобно дѣйствию другихъ *tannica*, т. е. вяжущее.

**Glandes quercus tostæ.** См. стр. 201.

**Gummi arabicum s. mimosæ. s. acaciæ.** (Отъ разныхъ видовъ Асасія, добывается изъ надрѣзовъ коры). Въ водяномъ растворѣ аравійской камеди остаются взвѣшенными частицы масла и потому она употребляется для приготовленія эмульсій, щавелевокислыхъ солей, сильныхъ этъ и спиртныхъ растворовъ потому, что въ *gummi arab.* довольно много яблочнокислой извести. Внутрь въ растворахъ — драгоцѣнное срво въ тѣхъ случаяхъ, когда больному непременно хочется имѣть какое либо лѣкарство. Снаружи для присыпоть (чтобы остановить кровь послѣ пиявокъ), клистировъ и впрыскиваній.

**Gummi tragacanthæ.** Трагакантовая камедь. (Засохшій сокъ изъ коры *astragalus verus* [*gummiferus*], кустарникъ, *leguminosae*, въ Малой Азій и Персій). Бѣложелтоватая, тонкія, прозрачныя пластинки. Для составленія пилюль употреб. подобно *gummi arab.*

**Gummi guttæ. Gutti.** Гуммигутъ. (Отъ *garciana*, *guttiferae*, въ восточной Индїи). Красновато-желтые ломкіе куски, съ раковиднымъ изломомъ и острымъ вкусомъ. Какъ проносное  $\frac{1}{4}$ —4 гр. въ пилюляхъ (*succ. patræ carb.*), особенно при противуглистомъ лѣченіи.

## Н.

**Herba et summitates absinthii.** См. стр. 26.

**Herba aconiti.** См. стр. 5.

**Herba althea** См. стр. 16.

**Herba calendulae.** См. **Flores calendulae.**

**Herba belladonae.** См. стр. 34.

**Herba centaureae minoris.** См. стр. 108 (отъ *erythraea centaureum*—золототысячникъ, *gentianae*). *Amarum*. Внутрь въ отварѣ и въ видѣ свѣжаго сока. Кämpфовы клистиры противъ упорнаго запора съ гиппохондріей (гистеріей) состоятъ изъ: *herbae cent. min.*, *rad. tarax.*, *rad. saronag.*, *rad. gramin*,  $\frac{1}{2}$  этой смѣси облить стаканомъ воды выпятивать до половинны и потомъ сдѣлать клистиръ.

**Herba conii maculati s. cicutae terrestris.** См. стр. 78.

**Herba digitatis purpurea.** См. стр. 99.

**Herba hyosciami.** См. стр. 124.

**Herba lactucae virosae.** См. стр. 137.

**Herba ledi palustris.** См. стр. 141.

**Herba lobeliae inflatae** (lobeliaceae, въ Сѣв. Америкѣ). Употреб. преимущественно какъ expectorans (безъ всякаго результата) при asthma и пр., въ настоѣ.

**Herba meliloti** употреб. подобно flores meliloti.

**Herba menthae piperitae et crispae.** См. стр. 156.

**Herba nicotianae.** См. стр. 160.

**Herba polygalae amarae.** См. стр. 194.

**Herba pulsatillae nigricantis.** См. стр. 19.

**Herba sabinae.** См. стр. 134.

**Herba salviae.** См. стр. 218.

**Herba sedi acris. s. sempervivi [tectorum.** См. стр. 231 и 232.

**Herba serpilli** (отъ Thymus serpyllum). См. стр. 247.

**Herba et stipites spiraeae ulmariae.** См. стр. 241.

**Herba stramonii.** (Отъ Datura stramonium). См. Стр. 95.

**Herba taraxaci** (отъ taraxacum offic.—одуванчикъ, synanthegae). Для приготовления extr. taraxaci. Кромѣ того, какъ amagum въ отварѣ.

**Herba trifolii fibrini** (трифоль, gentiane). Въ смѣси съ другими свѣжевыжатями соками (succis recenter expressi) употреб. прежде для весенняго лѣченія страдающихъ геммороемъ. Трифоль есть amagum и по своей удобоваримости не послѣднее между другими горькими средствами. Его нужно прописывать съ herb. tarax., rad. gramin. и herb. card. bened.

**Hydrastis canadensis.** Въ новѣйшее время Garth Wilkinson рекомендуетъ обмываніе и внутреннее употребленіе настоя этой твы, какъ лучшее срво при оспѣ не только для больнаго, но и для предохраненія другихъ лицъ отъ заразы. Наблюденія Wilkinson'a еще ни кѣмъ не проверены.

**Hyoscyaminum.** См. стр. 124.

## I

**Indicum. Indigo.** Голубая краска изъ Indigofera tinctoria (leguminosae, въ Восточной и Западной Индіи, въ Мексикѣ). Въ большихъ приемахъ индиго дѣйствуетъ, какъ рвотное (Sobernheim называетъ его растительной мѣдью). Его употребляютъ въ кашкѣ (v=xv гр.) съ медомъ противъ надучей болѣзни, пласки св. Витта, истерія и пр.

**Infusum sennae compositum s. inf: laxativum viennense.**  
Вѣнское питье (обливають fol. sennae aq. fervidae и прибавляют маннае). Бурокрасная ждсть, отвратительнаго сладкаго вкуса. Известное легкое laxans. Дѣтамъ чайн., а взрослымъ стол. ложками.

## К

**Kino. Gummi kino.** (Высохшій на воздухѣ сокъ изъ коры *pterocarpus senegalensis*, изъ семейства *parilionaceae*. Твердые темно-рубиновые куски, раств. въ водѣ и въ алкогольѣ. Главн. состав. чч.: дубильная кта и красное цвѣтное вщво. Дѣйствіе, а слѣдовательно и употребленіе сходны съ танниномъ. Внутрь отъ 5—20 гр. нѣсколько разъ въ день въ отварѣ, растворахъ, порошкахъ или пилюляхъ. Дѣлаеть слюну красною. Ради краснаго цвѣта часто входитъ въ составъ зубныхъ кашекъ и порошковъ, а также въ смѣси для присыпоеъ.

**Kusso, Kosso s. flores brayerae anthelminthicae** (*rossaceae*, дерево въ Абиссиніи, гдѣ глистогонныя свойства его листьевъ известны уже болѣе 200 лѣтъ). Въ Европу, его въ первые привезъ Bruce а Brauer въ 1823 г. получилъ его цвѣты, причѣмъ опредѣленіемъ ихъ мы обязаны Kunth'у. Въ продажѣ встрѣчаются мужскіе и женскіе (красное куссо) цвѣтки. Они имѣютъ особый запахъ и острый, противный вкусъ. По Martius'у и Küchenmeister'у, дѣйствующимъ вщвомъ служить содержащаяся въ нихъ благовонная смола. Нужныя для дѣйствія большіе приемы часто вызываютъ желудочно-внѣшнее воспаление. Таenia въ большинствѣ случаевъ выходитъ кусками, голова же нерѣдко остается. Всего лучше давать kosso слѣдующимъ образомъ: kosso дѣлятъ на 2 чч., каждую изъ нихъ распускаютъ въ лимонадѣ и выпиваютъ обѣ порціи въ теченіи часа, предваторительно взбалтывая ихъ. Если появляется тошнота, то принимаютъ лимонный сокъ, матныя лепешечки и пр. Если черезъ три часа послѣ приема большаго все еще не прослабило, то ему даютъ *ol ricini*.

## Л

**Lactucarium.** См. стр. 135 и 137.

**Lactucarium gallicum, Tridax.** См. стр. 137.

**Laminaria digitata** (водоросль изъ семейства *fucaceae*). — сильно разбухаеть и потому употребляется для расширенія свищевыхъ ходовъ, маточнаго рыльца.

**Lichen islandicus.** См. стр. 63.

**Lignum campechianum.** Синее дерево (отъ *haematococcus campechianum*) содержитъ дубильное и красное цвѣтное (гематоксилинъ) вѣща.

**Lignum fernambuci s. brasillense** (отъ *caesalpinia echinata*). Содержитъ цвѣтное и дубильное вѣща и слѣды эфирнаго масла.

**Lignum guaiaci** (отъ *guaiaacum offic.*, rutaceae, въ Западной Индіи). Пышные сивонимы остались лишь одни—памятниками тѣхъ надеждъ, которые питали по поводу этого дерева въ XVI столѣтіи бѣдныя сифилитики. Впрочемъ еще и теперь нынѣ даютъ его въ отварѣ при золотушныхъ и сифилитическихъ (подобно *sassapar.* и вербально вмѣстѣ съ нею) страданіяхъ кожи, ломотѣ и ревматизмѣ.

**Lignum quassiae** (отъ *quassia amara, simarubeae*). Употреб., какъ и *cort. quassiae*, какъ *stomachicum*.

**Lignum sassafras** (отъ *laurus Sassafras, laurineae*, дерево въ Сѣв. Америкѣ). Въ настоѣ употреб., какъ потогонное и мочегонное, подобно *sassapar.* или вмѣстѣ съ нею (*species lignorum*) противъ ломоты, ревматизма, золотухи и хронич. сыпей.

**Lupulinum.** См. стр. 124. (Высушенная смола изъ цвѣтковъ *humulus lupulus*—хмѣль, *urticeae*). Буроватожелтая горькая масса, почти вовсе нераств. въ водѣ, въ алкоголь же легко. Внутрь отъ 5 до 10 гр. на пр. въ порошкахъ, пвлюляхъ (съ *extr. tarax.*) и алкогольномъ растворѣ, какъ *narcoticum* и *antiphrodisiacum*, при болезненно усиленной раздражительности половыхъ органовъ, *chorda venerea, satiriasis*. Снаружи въ мазяхъ.

**Licopodium.** См. **Semen licopodii.**

## М

**Maltum hordei.** Ячменный солодъ (содержитъ крахмалъ, дextrинъ, сахаръ, клеверъ). Внутрь въ отварахъ, какъ питательное и успокоительное срво, при истошающихъ болѣзняхъ. Мальцъ-экстрактъ Гоффа: дрянное и крайне дорогое ниво съ бесполезной примѣсью вѣкоторыхъ травъ.

**Manna.** См. стр. 112.

**Mastiche. Mastix.** (Отъ *pistacia lentiscus*, въ Греціи). Желтоватобѣлыя зерна. Жуютъ при дурномъ запахѣ изо рта, алкогольній же растворъ употреб. для перевязокъ.

**Mel rosatum.** Розовый медъ (1 ч. розовыхъ листьевъ обливаютъ 6 чч. *aq. ferv.*, затѣмъ прибавляютъ 12 чч. *mel. despumati* (медъ, съ котораго снята пѣна) и доводятъ до густоты сиропа). Красноватаго цвѣта. Для вѣжущихъ полосканій.

**Morphium. Morphinum.** См. стр. 185.

**Morphium aceticum.** См. стр. 188.

**Morphium muriaticum s. hydrochloratum.** Соляноклый морфій, употреб. и добыв. подобно предъидущему; раств. въ водѣ и алкогольѣ, безъ цвѣта и безъ запаха.

**Morphium sulphuricum.** См. стр. 188.

**Mucilago salep** (puly. rad. salep. растирають въ aq. fervid., затѣмъ прибавляютъ еще aq. fervidae и взбалтываютъ). При поносахъ у дѣтей съ 1—3 кил. tinct. opii. по чайной ложкѣ.

**Mucilago seminum cydoniae.** См. стр. 92.

**Myrrha.** (Сгущенный сокъ изъ balsamodendron myrrha, terebinthaceae, дерево въ Аравіи). Кругловатые куски отъ свѣтложелтаго до красноватобураго цвѣта съ ароматическимъ запахомъ и горькимъ ароматическимъ вкусомъ. Внутрь, особенно при хронич. катаррѣ дыхател. вѣтвей (и при бѣлахъ) по 5—20 гр. въ порошкахъ (съ сахаромъ), пилюляхъ и микстурахъ (взбалтывать передъ приемомъ). Снаружи для зубныхъ порошковъ, присыпокъ (съ углемъ, квасцами и пр.), полосканій.

## N

**Narceinum.** См. стр. 189.

**Narcotinum. Opian.** См. стр. 189.

**Nicotinum.** См. стр. 161.

**Nuces moschate** отъ myristica moschata, на Молуккскихъ островахъ. Болѣе не употребляется.

**Nux vomica.** Рвотный орѣхъ (отъ strychnos nux vomica, аруцееae, на Цейлонѣ). Главн. составн. чч.: брудинъ и стрихнинъ. Употреб. противъ кардіальгіи, хронич. катарра желудка, паралича мочевого пузыря, параличей двигающихъ нервовъ, параличей отъ отравленія (свинцомъ), послѣ теномоміи, (если антагонисты сократившихся мышцъ не дѣйствуютъ), наконецъ при амбlyоріа и amaurosis. Отъ  $\frac{1}{6}$ —2 гр. въ порошокѣ. Лучше употреблять препараты.

## O

**Oleum absinthi aethereum.** См. стр. 26. Зеленоватаго цвѣта. Внутрь по 2—4 капли на приемъ.

**Oleum amygdalarum amararum aethereum.** Негусто, безцвѣтно, жгуче-остраго вкуса. Принимая на воздухѣ 2 пая O, пе-



реходить въ росноладанную кислоту. Обыкновенно въ нему бываетъ примѣшана синильная кислота (отъ 3—14%) и потому его лучше не употреблять вовсе.

**Oleum amygdalarum dulcium.** Внутрь только для приготовления эмульсій, а снаружи для покрыванія ссадинъ.

**Oleum anisi.** См. стр. 22.

**Oleum cadinum s. juniperi empyreumaticum.** (отъ juniperus sadina). По плотности и виду похоже на деготь, пахветь можжевельникомъ. Lassen и Sully совѣтуютъ втереть (съ 2 чч. жира) по 2 раза въ день при чешуйчатыхъ и бугорковыхъ страданіяхъ кожи (psoriasis, lupus, eczema на лицѣ). А Leiblinger употреб. посредствомъ пульверизатора 2—4 клл. на приемъ при эмфиземѣ.

**Oleum cajeputi rectificatum** (отъ melaleuca cajeputi, mirtaceae, на Целебестѣ). Жидко, безцвѣтно съ ароматич. запахомъ и жгучимъ вкусомъ. Снаружи и внутрь при разныхъ нервныхъ страданіяхъ, въ особенности хвалится Vogt'омъ, какъ ушное срво (съ ol. camph. по клл. на ватѣ въ ухо). Küchenmeister употреб. его какъ anthelminticum. Хорошее срво противъ phthirus inguinalis.

**Oleum calami,** См. стр. 9.

**Oleum camphoratum.** (ol. amygd. dulc 8 чч. camph. 1 ч.). Снаружи для помазыванія меркуріальныхъ язвъ во рту и мѣстѣ, пораженныхъ рожею.

**Oleum cannabis.** См. стр. 55.

**Oleum caryophyllorum.** Гвоздичное масло, любимое народное срво противъ зубной боли.

**Oleum cassiae cinnamomi.** Желтоватобураго цвѣта съ сильно острымъ вкусомъ. Внутрь въ формѣ elaeosacch. отъ  $\frac{1}{2}$ —2 клл.

**Oleum chamomilae aethereum s. purum.** Чистое ромашковое эфирное масло. Густовато, свѣлаго цвѣта.

**Oleum citri s. de cedro** (отъ citrus medica). Лимонное масло. Внутрь, какъ приправа.

**Oleum aethereum coriandri** (отъ coriandrum sativum). 1—3 клл. внутрь.

**Oleum cocos** (отъ cocos nucifera). Бѣлаго цв., легко застываетъ. Идетъ на приготовленіе кольдкрема (противъ трещинъ кожи).

**Oleum corticum aurantiorum** и **oleum aurantii florum.** Употребляются какъ исправляющіе пищеваженія.

**Oleum crotonis s. tiglii.** (Жирное масло изъ сѣмянъ croton tiglium, euphorbiaceae, въ Восточ. Индіи). Желтобурая, густая, сильно раздражающая кожу и раств. въ алкогольѣ ждсть съ остро-

жгучимъ вкусомъ. Въ алкогольномъ или жирно-масляномъ растворѣ (2—4 чч.) противъ хроническаго катарра дыхательныхъ вѣтвей, а также, какъ сильное проносное, при хроническомъ отравленіи свинцомъ, заворотѣ кишекъ, водянкѣ, ischias и пр. Сваружи, какъ сильно отвлекающее срво, но тоже и какъ слабительное (втирають въ животъ, если больной не можетъ глотать).

**Oleum cubebaram aethereum.** Жидко, прозрачно какъ вода, пахнетъ камфорой. Дѣйствуетъ плохо. Приѣмъ 5—15 капель. Сваружи для разрушенія наростовъ на соединительной оболочкѣ глаза. (съ 2 чч. ol. amygdal.).

**Oleum galbani aethereum.** Даютъ, какъ противусудорожное средство.

**Oleum gaultheriae** (отъ *gaultheria procumbens*). Блѣдножелтоватое эфирное масло. Сливаетъ за сильное diureticum и emmenagogum. Важно лишь для косметическихъ приготовленій разнаго рода.

**Oleum hyosiami coctum.** См. стр. 127.

**Oleum lini.** См. стр. 148.

**Oleum macidis s. nucistae.** Масло мускатныхъ цвѣтовъ. По каплямъ на сахарѣ, stomachicum. (Kraus давалъ его въ растворѣ in spir. aeth. для растворенія желчныхъ камней).

**Oleum menthae.** См. стр. 157.

**Oleum olivarum provinciale.** Прованское масло (отъ *olea europaea*). Для приготовленія эмульсій, мазей и пластырей. Въ формѣ *mixtura oleosa* посредствомъ пульверизатора при сухомъ кашлѣ и коклюшѣ. Въ чистомъ же видѣ только при отравленіяхъ, какъ сподручное срво.

**Oleum papaveris.** См. стр. 167.

**Oleum pini pumilionis** (черной сосны). Lewin совѣтуетъ курить въ небольшой трубкѣ (отъ 3—5 вл. въ день) при хроническомъ катаррѣ.

**Oleum ricini s. palmae christi s. castoris.** Касторовое или елещевинное масло (изъ сѣмянъ *ricinus communis*, *euphorbiaceae*). Жирное масло, раств. въ эфирѣ и безводномъ спиртѣ. Легкое слабительное, 1—3 чайн., а взрослымъ 1—3 стол. ложки; всего лучше in aqua ment. pip. Сваружи для елистровъ (1—4 стол. ложек in clusma) и смазыванія волосъ (содѣйствуетъ будтобы ихъ росту).

**Oleum rosmarini s. anthos.** См. стр. 212.

**Oleum rusci s. betulae. empyreumaticum.** Березовый деготь—чистый препаратъ, подъ именемъ же *rix liquida* изъ аптекъ отвлекаютъ обыкновенный деготь. Съ рѣзкимъ запахомъ, употреб. подобно дегтю при болезняхъ кожи (psoriasis).

**Oleum sabinae.** См. стр. 135.

**Oleum sinapis.** Ст. стр. 136.

**Oleum valerianae aethereum.** См. стр. 256.

**Olibanum.** (Отъ Boswellia serrata). Только для ароматическихъ вурений,

**Opium.** См. стр. 170.

**Oxymel colchici.** См. стр. 78.

**Oxymel squillae** (scilliticum). Уксусо-медь съ рястомъ (сгущаютъ до густоты сиропа 1 ч. acet. stillae и 2 чч. mel. despum). Бураго цвѣта, горько-сладковатаго вкуса. Дѣтямъ, какъ есcretogans и diureticum (20 — 30 гр. или какъ emeticum (по чайной ложкѣ); прибавляютъ также къ мочегоннымъ, отхаркивающимъ и противовоспалительнымъ средствамъ. Снаружи для полосканій.

## Р.

**Pululae aloëticae** (Sapon jalap., extr. aloes, spiriti vini rectific. По 2—5 штукъ, какъ слабительное.

**Pululae jalapae s. purgantes.** (Sapon. jalap. 3 чч. rad. jalap 1 ч.) Слабительное.

**Pululae odontalgicae.** Пилули противъ зубной боли (ext. belladon., extr. hyosc., opii., ol saurophyll, rad. pyrethri pulv. Въ пустой зубъ по пилулѣ.

**Piper nigrum.** Черный перецъ (а безъ околоплодника: piper albidum). Въ настоѣ изъ водки противъ поноса, перемежающейся лихорадки, хронич. перелоя. Извѣстное народное срво.

**Pix liquida.** Деготь. Хорошее срво противъ сыпей, не сопровождающихся воспаленіемъ, особенно чесотки. Любимое народное срво.

**Pulpa cassiae.** Мякоть kbacciu. (Толкутъ cassia fistula, вывариваютъ въ горячей водѣ, выпариваютъ и прибавляютъ  $\frac{1}{6}$  ч. сахара). Прибавляютъ къ слабительнымъ микстурамъ и вазкамъ по чаю, или столовой ложкѣ.

**Pulvis Doweri sive ipecacuanhæ opiatu.** См. стр. 184.

**Pulvis gummosus.** (gummi arabici, tragacanth., sacch. albi rad. liquid). По десертной ложкѣ. Противъ кашля, а больнымъ, гонящимся за лѣкарствами, противъ всѣхъ болѣзней. Какъ constituens для порошковъ.

**Pulvis liquiritiae s. glycyrrhizae compositus s. pectoralis.** Курелловъ грудной порошокъ (sem. anisi, sulphuris sublim. loti rad. liquid fol scppae sacch. albis.). По десертной ложкѣ. Прекрасное слабительное для страдающихъ геморроемъ.

**Puvis Marchionis.** (содержитъ піоновый корень *lapids. sancr. cogni cervi* gasp. и пр.). Прежде употреб. при *dentitio difficilis* 2—3 раза въ день по  $\frac{1}{2}$  десертной ложкѣ.

## В

**Radix alcanae.** (Отъ *anchusa tinctoria*). См. Стр. 19.

**Radix allii sativi** (чеснокъ). Помогаетъ пищеваренію и потому противъ хроническаго катарра желудка, противъ скорбута у дѣтей, противъ глисть. Свѣжій сокъ.

**Radix althaeæ.** См. стр. 14.

**Radix angelicæ.** См. Стр. 21.

**Radix arnicæ.** См. стр. 26.

**Radix artemisiæ** (отъ *Artemisia vulgaris*). См. стр. 27.

**Radix s. turiones asparagi.** См. стр. 31.

**Radix belladonnæ.** См. стр. 34.

**Radix bryoniæ.** См. стр. 51.

**Radix caïnca s. cabīnca** (отъ *caïnca gasemosa*, rubiaceæ, кустарникъ въ Бразиліи). Многовѣтвистые корни, въ палецъ толщину, съ желтобурой кожицей зеленою корою и бѣловатой древесиной. Свѣжій корень пахнетъ какъ кофе; вкусъ остро-непріятный, Совершенно оставлены. Прежде употреб. подобно наперстной твѣ, а также какъ *diureticum* и *drasticum*.

**Radix calami** (отъ *acorus calamus*). См. стр. 8.

**Radix et semen colchici.** См. стр. 73.

**Radix colombo** (отъ *menispermum palmatum*, дерево въ Восточ. Африкѣ). Куски отъ 1—3" въ діам. и отъ 1 до 3''' въ толщину. Кожица буроватая, древесина лучистая. Очень горькаго вкуса, отъ іода становится темносинямъ. Главн. состав. чч.: крахмалъ и горькое вѣщо. Противъ хронич. поносовъ, по 10—30 гр. въ отварѣ.

**Radix consolidæ majoris s. symphyti** (отъ *symphytum off.*). См. стр. 242.

**Radix enulæ s. helenii** (отъ *Inula Helenium*). См. стр. 129.

**Radix filicis maris** (отъ *Aspidium filix mas.*). См. стр. 32.

**Radix gentianæ rubræ** (отъ *Gentiana lutea*). См. стр. 115.

**Radix graminis** (отъ *Triticum repens*). См. стр. 250.

**Radix hellebori albi.** Бѣлая чемерица (отъ *veratrum album*, melanthaceæ). Слабого запаха, горько-остраго вкуса. Состав. чч.: вератринъ въ соединеніи съ галлусовой ктой, элаинъ, стеаринъ, желтое цвѣтное вѣщо. крахмалъ, камедь, летучая жирная кта, соли. Теперь только спаружи, какъ срво, возбуждающее чиханье  $\frac{1}{2}$ —2 гр. съ какиѣмъ нибудь нѣжнымъ порошокомъ), и какъ мазь противъ чесотки. Сначала втираются зеленыѣмъ мыломъ, затѣмъ берутъ ванну

и держатъ въ теплицѣ 12 часовъ въ шерстяныхъ одѣялахъ, потомъ каждые 8 часовъ втираютъ  $\frac{1}{3}$  сказанной мази и въ заключеніе берутъ еще ванну).

**Radix hellebori nigri.** См. стр. 121,

**Radix jalapae** (отъ *ipomaea purga*, convolvulaceae, въ Мексикѣ). Желтосѣрые или бурные, легко превращающіеся въ порошокъ, тяжелые куски противнаго вкуса. Главн. состав. чч.: слабительная смола, крахмалъ, вытяжное вѣщо. Внутрь, какъ purgans, 5—30 гр. (дѣтямъ 2—8 гр.) въ порошокъ съ elaeosacch. feniculi s. citri или просто съ 2—3 гр. баломеля, а также въ пилюл.

**Radix ipesacuanhae.** Рвотный корень (отъ *serphaelis ipesacuanha*, rubiaceae, кустарникъ въ Бразиліи и Новой Гранадѣ). Узловатые куски отъ 3 до 4" въ длину и отъ 1 до 3" въ толщину, снаружи сѣробурные, а внутри желтоватобѣлые, ѣдкогорькаго ароматическаго вкуса, несприятнаго запаха; въ порошокъ возбуждаетъ кашель. Главн. составн. часть: эметинъ (6% въ корѣ). Внутрь какъ diaphoreticum, antispasmodicum и stypticum,  $\frac{1}{2}$ —1 гр., какъ тошнотное 1—3 гр., нѣсколько разъ въ день, и какъ рвотное, по 5—20 гр. каждыя 10 минутъ. Въ порошкахъ, пилюляхъ, настояхъ и взбалтываемыхъ микстурахъ.

**Radix junci** (жабика, ситника—отъ *juncus effusus*). Въ отварѣ народное срво противъ мочевыхъ камней.

**Radix levistici s. ligustici.** См. стр. 146.

**Radix liquiritiae.** См. стр. 118.

**Radix ononidis** (отъ *ononis spinosa*—волча). Сладковато-остраго вкуса. Употребл. какъ expectorans.

**Radix paeoniae** (отъ *paeonia offic.*—пионъ). Въ отварѣ и свѣже выжатый сокъ, какъ успокоивающее срво.

**Radix pareirae** (отъ *cissampelos pareira*, menispermaceae, въ Мексикѣ и Зап. Индіи). Снаружи темнобурнаго, а внутри желто-сѣраго цвѣта, безъ запаха, сладковато-горькаго вкуса. Употреб. въ отварѣ какъ мочегонное, а также при каменной болѣзни, слизетеченіяхъ и хронич. воспаленіяхъ мочевыхъ органовъ.

**Radix petasitidis** (отъ *Tussilago petasitis*). См. стр. 251.

**Radix petroselinii** (отъ *Apium petroselinum*). См. стр. 22.

**Radix pimpinellae.** См. стр. 191.

**Radix Rhei s. rhabarbari.** См. стр. 207.

**Radix salep.** (отъ породъ *orchis*). См. стр. 163.

**Radix sassaparillae s. sarsaparillae** (отъ *smilax medica* и *offic.*, asparagusae, въ Мексикѣ и Новой Гранадѣ). Состав. чч.: царапающ., и горькое вытяжное вѣщо, паралепнъ, смолы, крахмалъ, органич.

кты, бѣлокъ. Внутрь въ отварѣ, противъ застарѣлаго сифилиса и (какъ всегда водится) противъ ревматизма и ломоты.

**Radix scillæ s. squillæ** (отъ *scilla maritima* — морской лукъ, Liliaceæ, въ Греціи, Сициліи, Испаніи). Въ формѣ груши, величиною съ кулакъ и болѣе, состоитъ изъ концентрическихъ мясистыхъ слоевъ. Состав. чч.: сдллитвинъ, щавелевокислая пзвѣсть, дубильная кта, камедь, эфирное масло, сахаръ и пр. Будучи втираема снаружи, вызываетъ воспаление кожи. Будучи принимаема внутрь, она то побуждаетъ ко рвотѣ и усиливаетъ отдѣленіе слюны (expectorans), то дѣйствуетъ, какъ мочегонное. Rad. scillæ дается по  $\frac{1}{2}$ —iv гр. вѣскольکو разъ въ день.

**Radix senegæ** (отъ *polygala senega*, polygalæ, въ Сѣв. Америкѣ). Содержитъ: сенегинъ (горьковато-сладкое вытяжное вѣщо), ирисепиловую и дубильную кты, камедь, бѣлокъ, пептивъ, и пр. Дается главнымъ образомъ, какъ expectorans, при хроничес. катаррѣ бронхіи (если въ порошокъ, то x—xx гр.), и какъ diureticum (menagogum) въ отварѣ,

**Radix sumbul** (отъ *valeriana moschata*). Какъ excitans, по 10—20 гр. въ настоѣ. Thielemann рекомендовалъ и при delirium tremens, страдающихъ мочевого пузыря, холерѣ, виттовой пляскѣ и пр.

**Radix taraxaci** (отъ *Leontodon taraxacum*). См. стр. 142.

**Radix tormentillæ**. См. стр. 248.

**Radix valerianæ**. См. стр. 255.

**Radix vincetoxici** (отъ *scuanchum vincetoxicum* — чертова борода, эмѣивый корень). Суррогатъ рвотнаго корня. Приемы вдвое больше.

**Radix zedoariæ** (отъ *curcuma zedoaria*, въ Вост. Индіи). Въ настоѣ. Carminativum и anthelminticum.

**Radix zingiberis**. Имбирь (отъ *zingiber offic.*, scitamineæ, въ Южн. Азіи и Зап. Индіи). Мягко, бѣловатаго цвѣта. Stomachicum. Порошокъ дають на концѣ ножа.

**Resina communis**. Остатокъ отъ перегонки терпентиннаго масла. Желтаго цвѣта, если перегонка продолжалась недолго, а въ противномъ случаѣ чернаго. (Colophonium). Для приготовления пластырей.

**Resina jalapæ** (rad. jalap.) вытягиваютъ виннымъ спиртомъ и прибавляютъ воды, пока не перестанетъ образоваться осадокъ, затѣмъ сушатъ). Бурозеленаго цвѣта. По 5—10 гр. Слабительное съ каломелемъ и сахаромъ.

**Resina pini**. Обыкн. сосновая смола. Снаружи для пластырей и мазей.

**Resina pini burgundica. Pix burgundica. Resina alba**. (Доб. растащиваемъ resinæ com. въ водѣ и пропускаемъ сквозь сито). Свѣтложелтая, ломкая, пріятнаго запаха, горькаго вкуса.

**Resina pini empyreumatica liquida. Pix liquida.** Сосновый деготь. Суаружи для натираній (при eczema и чесоткѣ пополамъ съ чернымъ мыломъ, для мазей (1:4 чч. жира) при psoriasis, lepra и пр., для пластырей (съ 2 чч. ceræ flav.), для вдыханій при катаррѣ бронхій (выпариваютъ деготь въ плоской чашкѣ, слегка подогрѣвая его спиртов. лампой).

**Resina fagi empyreumatica liquida.** Букowyй деготь. Бурая густая ждсть. Небга намазываетъ при psoriasis и eczema слой толщину въ спинку ножа. Черезъ 1—3 дня слой этотъ сходитъ. Если послѣ этого кожа еще ненормальна, то повторяютъ намазываніе еще разъ.

## S.

**Salicinum.** Непзмѣняющееся на воздухѣ, сильно горькое, раств. въ водѣ и въ алкогольѣ, а въ эфирѣ нераств. вцво. Внутрь, 2—10 гр., въ порошкахъ пилюл. и микстурахъ при хронич. катаррѣ и intermittens. Салициномъ поддѣлываютъ хининъ. Салицинъ изслѣдованъ вполне только очень недавно и принадлежитъ вмѣстѣ съ его соединеніями къ важнѣйшимъ веществамъ, почему мы считаемъ не безполезнымъ остановиться на ономъ съ нѣкоторою подробностію.

Первый добывшій въ чистомъ видѣ салицинъ, былъ французскій фармацевтъ Леру въ Vitry-le-Français. Онъ приготовилъ его изъ коры ивы (Salix Helix) и представилъ свою работу Парижской Академіи въ 1830 году съ точнымъ описаніемъ способа приготовленія. Въ тоже самое время и независимо отъ Леру былъ приготовленъ салицинъ А. Бухнеромъ, который описалъ его какъ смолообразное тѣло. Въ томъ же году была опубликована работа, сдѣланная тремя французскими химиками: Пешіе, Пелузъ и Гайлюссакъ, въ которой Пешіе описалъ новый хорошій способъ добыванія салицина изъ коры ивы (Salix Helix), а Пелузъ и Гайлюссакъ описали съ большею точностію физическія и химическія свойства этого тѣла, какъ-то: растворимость его въ водѣ и спиртѣ, точку плавленія, явленія, наблюдаемыя во время прикосновенія его съ сѣрною, азотною и соляною кислотами и т. д. Кроимъ того, они первые опредѣлили анализомъ элементарный составъ салицина и выразили его эмпирическою формулою  $C_9H_8O$ .

Въ концѣ 1830 года Гайлюссакъ прочелъ, въ засѣданіи Парижской академіи наукъ, работу Врассонпот, который открылъ присутствіе салицина также въ корѣ осины (Populus tremula), кромѣ того, онъ упоминаетъ о присутствіи въ этой корѣ еще другаго новаго кристаллическаго тѣла, которое онъ назвалъ популинномъ. Въ напечатанной потомъ работѣ онъ сообщилъ способъ приготовленія новаго тѣла, которое находится не только въ корѣ осины, но также и въ листьяхъ этого растенія и еще въ гораздо большемъ во-

\*

личествъ, чѣмъ въ корѣ. Онъ изслѣдовалъ многія породы тополя *Populus tremula, tremuloides, alba* и *gracilis* и нашелъ въ корѣ ихъ салицинъ; изъ коры же *Populus angulosa, nigra, monilifera, grandiculata, fastigiata* и *balsamea* салицина получить не могъ. Доказалъ, что и въ нѣкоторыхъ видахъ ивы салицинъ не находится и обратилъ особенное вниманіе на образованіе какой-то кислоты, которая не находится въ корѣ тополя готовой, но образуется вслѣдствіе какихъ-то химическихъ реакцій и на большое сходство этой кислоты, съ кислотой, получаемой изъ роснаго ладона. Въ своей работѣ онъ описалъ подробно физическія и химическія свойства новаго тѣла популива, но не указалъ на образованіе изъ него росноладонной кислоты. Вскорѣ за тѣмъ Бухверъ въ Германіи доказывалъ, что онъ первый добылъ салицинъ въ видѣ игльчатыхъ кристалловъ, двумя годами раньше Леру во Франціи.

Въ 1835 году Пагенштехеръ обнаружилъ свое изслѣдованіе надъ масломъ дикой бузины (красавицы луговой) (*Ol. Spiraeae Ulmariae*), которое имѣло нѣкоторое значеніе въ медицинѣ. Онъ въ немъ открылъ вещество съ кислотными свойствами, которое Бухверъ предложилъ назвать ульмаровою кислотой. Пагенштехеръ говоритъ, что это вещество образуетъ соли съ окисями щелочныхъ металловъ, съ окисями металловъ щелочныхъ земель, съ окисями свинца, цинка, мѣди и серебра и описываетъ физическія и химическія свойства этихъ солей. Также упоминаетъ о дѣйствіи хлора, брома, и іода на открытую имъ кислоту. Кромѣ того, онъ доказалъ, что продуктъ дѣйствія азотной кислоты на *Ol. Spiraeae Ulmariae* имѣетъ свойства кислоты, но не опредѣлилъ свойства ея, а указалъ только на нѣкоторое сходство съ пикриновою кислотой.

Послѣ дѣльной работы Пагенштехера вышла годомъ позже въ 1836 году весьма обстоятельная и подробная монографія о продуктахъ разложенія *Ol. Spiraeae Ulmariae* Левига. Работа Левига во всемъ согласовалась съ изслѣдованіями Пагенштехера.

Рафаель Пирія произвелъ рядъ весьма тщательныхъ изслѣдованій относительно этого предмета, результатъ которыхъ онъ обнаружилъ въ 1838 году. Начиная свое изслѣдованіе съ салицина, онъ ближе опредѣлилъ свойства ея и элементарный составъ, и изслѣдовалъ ея содержаніе къ окисляющимъ тѣламъ. Извѣстно было изъ опытовъ Деберейнера, что при дѣйствіи перекиси марганца съ разведенной сѣрной кислотой на большую часть органическихъ веществъ получается, между прочимъ, муравейная и угольная кислоты. Тоже самое получилъ Пирія съ салициномъ. Но когда онъ для окисленія употребилъ смѣсь двухромовокислаго кали съ сѣрною кислотой, то получилъ, кромѣ муравейной и угольной кислотъ, вещество, похожее на эфирное масло. Свойства этого масла названнаго салицилистымъ водородомъ (*hydrure de salicyle*) изслѣдываны.

Дюма нашелъ всѣ анализы, сдѣланные Пирія совершенно вѣр-



ными и, доказавъ тождественность масла сивреи и салицилового рода, онъ приготовилъ хлорспиройлъ и спироломѣдъ изъ масла сивреи, полученнаго отъ Пагенштехера и подвергнулъ ихъ анализу.

Мульдеръ показалъ, что флорицинь, тѣло добываемое изъ коры яблоннаго и грушеваго деревъ, даетъ со свинцомъ соединеніе изомѣрное съ свинцовымъ соединеніемъ салицина; но самый флорицинь отличается отъ салицина тѣмъ, что салицинь при высушиваніи не теряетъ воды, между тѣмъ какъ флорицинь при температурѣ его плавленія теряетъ четыре пая воды; сверхъ того, флорицинь съ двухромокислымъ кали и сѣрною кислотою не даетъ салицистой кислоты.

Годомъ позже Этлингъ публиковалъ полную работу надъ салициловою и спироловою кислотами и надъ салицилимидомъ; онъ подтвердилъ открытіе Дюма о тождественности кислотъ: спироловой и салицилистой; работа его сходна съ работою Пирія, но онъ первый получилъ салицилимидъ (салгидрамидъ), соединеніе, соответствующее хлорозамиду. Салицилимидъ получилъ онъ дѣйствіемъ воднаго амміака на спиртный растворъ салицилистой кислоты. Кромѣ того, онъ описалъ соединеніе, образующееся при дѣйствіи купраммоніа на салицилистую кислоту.

При образованіи этого соединенія, по мнѣнію Этлинга, участвуютъ три пая салицилистой кислоты съ тремя паями амміака при выдѣленіи 6 паявъ воды, на мѣсто которыхъ становятся три пая окиси мѣди. Кромѣ того, онъ доказываетъ существованіе соединеній желѣза и свинца, соответствующихъ соединенію мѣди. Стенгусъ смѣсь ѣдкой извести съ двойнымъ количествомъ салицина подвергнулъ перегонкѣ и получилъ тяжелую маслообразную жидкость; въ ретортѣ осталась углекислая известь въ смѣси съ углемъ; жидкій перегонъ, названный имъ саликономъ онъ сравниваетъ съ креазотомъ; подобное тѣло получено было уже Этлингомъ, но теперь извѣстно, что оно есть нечто иное какъ феноль.

Въ 1842 году Делаландъ занимаясь изслѣдованіемъ свойствъ еумарина, уже описаннаго Буллей и Бутровъ-Шарларомъ замѣтилъ, что при дѣйствіи расплавленнаго ѣдкаго кали на это вещество, происходитъ слѣдующее: сперва освобождается чистый водородъ, потомъ, при дальнѣйшемъ дѣйствіи, получается горючій газъ, имѣющій ароматическій запахъ. Когда реакція кончалась, то смѣсь, окрасившаяся сперва желтымъ цвѣтомъ, дѣлалась безцвѣтною. По раствореніи всей массы въ водѣ и насыщеніи щелочи кислотою осаждается много мелкихъ игольчатыхъ кристалловъ, анализъ которыхъ показалъ ихъ тождественность съ салициловою кислотою (*acide salicylique hydroté*).

Маршанъ получалъ тѣже самые результаты, какъ и Дюма, при дѣйствіи слабой азотной кислоты на индиго. Для повѣрки мысли Жерара, Маршанъ подвергнулъ точному изслѣдованію индиговую

кислоту и всѣ извѣстныя тогда салцилистыя соединенія, именно: салципнѣ, салцилистую, салциловую, (пикриновую) и нитросалициловую, (изъ салциловой) кислоты. Проверка формуль и сравненіе химическихъ и физическихъ свойствъ, связанныхъ тѣмъ подтверждали мысль о тождественности нитросалициловой кислоты съ индиговой. Лоранъ доказалъ потомъ, что пикриновая кислота не принадлежитъ къ ряду индиговыхъ соединеній.

Жераръ обнаружилъ въ 1843 году весьма интересную работу надъ салциномъ. Анализы его совершенно подтвердили вычисленную Пирія формулу для салцина.

Салициловая кислота, полученная Пирія и Левгомомъ изъ салциловорода, и послѣ Делаланомъ — изъ кумарина, была приготовлена Жераромъ изъ салцина. При дѣйстви расквашеннаго ѣдкаго кали на салципнѣ съ тою предосторожностію, чтобы ѣдкое кали было въ избыткѣ, при выдѣленіи водороднаго газа, получается масса, содержащая салциловокислое кали; растворивъ эту массу въ водѣ и пересыщая соляною кислотою, получаемъ салциловую кислоту въ видѣ мелкихъ кристалловъ. Въ жидкости, изъ которой осаждена была салциловая кислота, Жераръ доказалъ присутствіе шавелевой кислоты, равнымъ образомъ онъ замѣтилъ, что, при насыщеніи соляной массы кислотою, выдѣлялась угольная кислота; но случайно ли ея появленіе, или постоянно — этого Жераръ не рѣшаетъ.

Самый насыщенный растворъ ѣдкаго кали не давалъ съ салциномъ, даже при кипяченіи, салциловой кислоты.

При сухой перегонкѣ салциловокислаго амміака Жераръ замѣтилъ, что сначала средняя соль теряетъ часть амміака, (слѣдовательно превращается въ кислоту), потомъ даетъ ѣдкую маслообразную жидкость и возгонъ углекислаго амміака. Маслообразная жидкость, по составу и свойствамъ, совершенно тождественна съ гидратомъ фенола-феноломъ Лорана (Hydrate de phenyle).

Тотъ же самый феноль получается при сухой перегонкѣ, какъ самой кислоты, такъ и большей части солей ея.

Наконецъ салконъ, полученный Стенгусомъ при перегонкѣ салциловой кислоты съ половиною, по вѣсу, ѣдкой извести, есть, очевидно, ничто иное какъ феноль съ салцилалдегидомъ. Образование фенола изъ салциловой кислоты соответствуетъ происхожденію анизола изъ анисовой кислоты, равно какъ бензола, кумола и цинамида изъ кислотъ бензойной, куминовой и цимтовой.

Замѣчательно то обстоятельство, на которое уже Кагуръ обратилъ вниманіе, что органическія кислоты съ шестью аяями кислорода, вмѣсто того, чтобы уступить весь свой кислородъ съ соотвѣтственнымъ количествомъ углерода, подъ вліяніемъ ѣдкой извести и повышенной температуры, теряютъ только четыре аяя кис-

лорода, между тѣмъ какъ остальные два вступаютъ въ соединеніе съ оставшимися элементами.

Замѣчательно, что салицилъ, салициладдегидъ и салициловая кислота, при дѣйствіи азотной кислоты даютъ пикриновую или тринитрофеновую кислоту (Пирія, Маршанъ и др.), которая происходитъ изъ фенола и что салициловая кислота такъ легко даетъ феноль.

Образованіе пикриновой кислоты изъ индиго приближало уже это тѣло и его производныя къ салициловому ряду; Лоранъ, доказавъ тождественность кислоты *trichlorophénique* (*chlorophénisique*) съ *chlorindoptique* (Эрдманъ) и кислоты *quinto chlorophénique* (*chlorophéneique*) съ *chlorindoptique chloré* (Эрдманъ), связалъ феновый рядъ съ рядомъ индиго. Образованіе фенола изъ салициловой кислоты и тождественность индиговой кислоты съ нитросалициловой еще болѣе сближаетъ вещества столь различнаго происхожденія. Наконецъ Жераръ доказалъ фактически тождественность кислоты индиговой (*anilique* Дюма) съ нитросалициловой, приготовленной изъ салициловой. Способъ приготовленія, описанный Жераромъ состоитъ въ слѣдующемъ: на кристаллы салициловой кислоты наливаютъ, дымящуюся азотную кислоту; реакція чрезвычайно сильная; салициловая кислота превращается въ красноватожелтую смолообразную массу. Ее сначала промываютъ холодною водою, чтобы освободить отъ азотной кислоты, потомъ растворяютъ въ кипящей водѣ, изъ которой, по охлажденіи, осаждается кислота въ видѣ желтоватыхъ кристалловъ. Эти кристаллы суть чистая нитросалициловая кислота (*acide indigotique*).

Нитросалициловая кислота, приготовленная этимъ способомъ, желтовата; она окрашиваетъ соли окиси желѣза краснокровянымъ цвѣтомъ, отдѣляетъ пары азотной кислоты при разгоряченіи съ смѣсью переокси марганца съ сѣрною кислотою; растворъ ея окрашиваетъ кожу въ желтый цвѣтъ.

Эта кислота образуется также изъ салицина, если кипятить его съ азотною кислотою, разведенною 10-ю частями воды. При продолжительномъ дѣйствіи азотной кислоты получается только пикриновая кислота.

Нитросалициловая кислота образуется, вѣроятно при дѣйствіи азотной кислоты на антраниловую (*acidie anttranilique*), по крайней мѣрѣ, когда Жераръ слегка разгорячалъ послѣднюю съ обыкновенною азотною кислотою, то краснаго пара не образовалось и изъ смѣси осѣдали листочки, очень растворимые въ водѣ, которые, по его мнѣнію, состояли изъ нитросалицилоксида амміака (*indigotate d'ammoniaque*).

Кромѣ нитросалициловой кислоты Жераръ приготовилъ еще бромсалициловую кислоту. Бромъ дѣйствуетъ какъ дымящая азотная кислота на салициловую кислоту; получается также смолообразная

масса, которая, по раствореніи въ кипящей водѣ, даетъ бѣлый кристаллическій осадокъ, легко растворимый въ спиртѣ и выделяющийся изъ него при выпареніи въ водѣ большихъ кристалловъ.

Пирія нашелъ, что салицинъ есть соединеніе сахара глюкоза съ другимъ тѣломъ, названнымъ имъ салигениномъ. Салицинъ можно раздѣлить на эти два тѣла, если водный растворъ его оставить на нѣкоторое время въ прикосновеніи съ синапзномъ; при обработываніи раствора эфиромъ, салигенинъ растворится въ эфирѣ, а глюкоза останется въ водномъ растворѣ. При выпариваніи эфира остается салигенинъ въ видѣ довольно крупныхъ табличекъ, съ перламутровымъ блескомъ, которыя отъ сѣрной кислоты краснѣютъ, отъ разведенныхъ кислотъ при подогреваніи переходятъ въ салитринъ, отъ азотной кислоты въ салицилистую и пикриновую кислоты, отъ солей окиси желѣза окрашивается въ синий цвѣтъ.

Въ 1843 году 17 апрѣля Кагуръ опубликовалъ маленькую работу, въ которой представилъ въ кратцѣ результаты своихъ изслѣдованій надъ масломъ гаултеріи; составъ и содержаніе масла къ азотной кислотѣ, къ хлору и бромъ, составляютъ предметъ этой работы.

26-го декабря того же года онъ обнародовалъ работу относительно искусственнаго образованія масла, а въ 1844 году напечаталъ подробное описаніе своихъ изслѣдованій надъ масломъ гаултеріи (*Oil of Gaultheriae procumbentis* (New-Jersey), которое въ Европѣ находилось уже около двухъ лѣтъ въ употребленіи какъ благовонное масло подъ названіемъ Oil of Wintergreen. Въ этой работѣ онъ весьма обстоятельно изложилъ всѣ физическія свойства масла, содержаніе его къ различнымъ химическимъ агентамъ и составъ его. Онъ первый анализировалъ масло и нашелъ, что оно представляетъ составъ сложнаго эфира, именно салициловокислаго мефила (*salicylate de méthylène*).

Черезъ смѣсь масла съ растворомъ ѣдкого кали, онъ получилъ въ приемникѣ жидкость, которая, послѣ обработки ѣдкою известью, представляла всѣ свойства мефилового спирта; жидкость же, оставшаяся въ ретортѣ, дала, по прибавленіи минеральной кислоты, обильной осадокъ салициловой кислоты. Съ другой стороны онъ искусственно приготовилъ салицилоксилый мефилъ, черезъ смѣсь, состоящую изъ двухъ частей кристаллизованной салициловой кислоты, двухъ частей мефилового спирта и одной части сѣрной кислоты въ 66° В. Полученный продуктъ имѣлъ совершенно всѣ свойства и составъ масла гаултеріи. Наконецъ, найденный уд. вѣсъ пара естественнаго и искусственнаго салициловокислаго мефила, одинаковъ = 5,42 и соответствуетъ вышеприведенной формулѣ (по ней уд. в. = 5,32).

Относительно дѣйствія ѣдкихъ щелочей на салицилоксилый мефилъ Кагуръ замѣтилъ, что на холодѣ они даютъ съ нимъ кри-

сталлизующіяся соединенія, которыя кислотами разлагаются опять на салициловислый мефилъ и соответственную соль.

Въ жару же ѣдкія щелочи дѣйствуютъ, какъ мы видѣли, иначе. Салициловислый мефилъ разлагается на мефиловый спиртъ и салицилоксилую щелочь, подобно всѣмъ эфирамъ.

Такъ какъ ѣдкія щелочи даютъ на холодѣ съ салицилоксилымъ мефиломъ опредѣленные соединенія, изъ которыхъ кислота опять выдѣляетъ салицилоксилый мефилъ въ первоначальномъ видѣ, то Кагуръ разсматриваетъ его какъ настоящую кислоту, называя его гаультеровою кислотою (*acide gaulthérique*).

Изъ солей этой кислоты (*gaulthérites*) хорошо растворяются въ водѣ гаультеровокислые кали и натръ, менѣе — стронціанъ; соли барита, мѣди, свинца и цинка не растворяются; послѣднія три Кагуръ получилъ двойнымъ разложеніемъ изъ первыхъ.

Кромѣ легкаго способа полученія салициловой кислоты въ большомъ количествѣ масло гаулеріи дало Кагуру много замѣчательныхъ результатовъ: онъ нашель, что при дѣйствіи брома на это масло получаютъ очень опредѣленные соединенія: одnobромосалициловый мефилъ (*salicylate de méthylène monobromé*) и двубромосалициловый мефилъ (*salicylate de méthyle bibromé*). Приготовленіе и свойства этихъ соединеній имъ подробно описаны. Съ ѣдкимъ вали они соединяются прямо, какъ салициловислый мефилъ; кислоты изъ этихъ соединеній выдѣляютъ безъ перемѣны одnobромосалицилоксилый мефилъ и двубромосалицилоксилый мефилъ. Но при разгоряченіи съ ѣдкимъ вали они разлагаются; изъ щелочной массы, по насыщенію кислотою, выдѣляется осадокъ, представляющій составъ бромосалициловыхъ кислотъ. Подобнымъ же образомъ дѣйствуетъ хлоръ и даетъ тоже два соединенія: однохлоросалициловислый мефилъ (*salicylate monochloré*) и двухлоросалициловислый мефилъ (*salicylate de méthylène bichloré*). Амміакъ даетъ со всѣми этими соединеніями соответственные амиды: *salicylamides bromées et chlorées*.

При дѣйствіи дымящейся азотной кислоты на естественное масло гаулеріи и на приготовленный искусственно салициловислый мефилъ, температура сильно повышается и до такой степени, что часть смѣси, выбрасывается изъ посуды, если ее не охладить. Если же соблюсти эту предосторожность, то почти вовсе не освобождается нарѣ азотистой кислоты, а скоро вся жидкость превращается въ кристаллическую массу. Вымывая кипящею водою, избытокъ азотной кислоты и, перекристаллизовавъ остатокъ изъ спирта, получаемъ бѣлые тонкіе шелковистые кристаллы, которые представляютъ всѣ свойства и составъ нитросалициловислаго мефила (*indigotate ou anilate de méthylène*). Вѣрность этого факта была вполне доказана Кругомъ. Особенно интересно то, что дѣйствіе хлора, брома и азотной кислоты устремляется здѣсь на группу кислоты:

а не на группу эфира. Кагуръ замѣчаетъ, что если прибавлять въ нитросалицилокслому мефилу еще дымящей азотной кислоты, то, вѣжеться, образуется промежуточное тѣло, которое не показываетъ реакцій нитросалициловой кислоты. Но если дѣйствовать азотной кислотой до отказа, то получается тѣло, представляющее всѣ свойства и составъ тринитрофеновой кислоты (*acide carbazotique*).

Водный ѣдкій амміакъ дѣйствуетъ иначе, чѣмъ прочія ѣдкія щелочи на масло гаултерін; онъ не даетъ съ нимъ соединенія и во все не растворяетъ его. Но если въ закупоренной стеклянкѣ находитъ смѣсь изъ одного объема салцилокслоаго мефила и пяти или шести объемовъ насыщеннаго воднаго амміака, то масло мало по малу исчезаетъ. Раствореніе совершается въ теченіе нѣсколькихъ дней и жидкость представляетъ тогда буровато-желтый цвѣтъ. При выпариваніи получается вещество, кристаллизирующееся длинными 4-хъ сторонними пластинками; при перегонкѣ этого вещества отдѣляется сперва амміакъ, потомъ скоро сгущается на холодныхъ стѣнкахъ реторты жидкость, застывающая въ свѣтло-желтыя кристаллическія массы. Это вещество, свойства котораго подробно описаны Кагуромъ, есть салциламнидъ (тѣло одинавое по составу, — изомѣрное съ антравиловою кислотой, которую Г. Фрицше получилъ при дѣйствіи ѣдкаго кали на индигу).

Отъ дѣйствія щелочей или сильныхъ кислотъ, употребленныхъ въ избыткѣ оно воспроизводитъ амміакъ и салциловую кислоту.

Нитросалицилокслый мифиль въ жидкомъ амміакѣ не растворяется тотчасъ; но только чрезъ нѣкоторое время. По испареніи полученной краснооранжевой жидкости, остается оранжевокрасное вещество, которое изъ спирта кристаллизуется маленькими желтыми блестящими кристаллами, перегоняющимися отчасти безъ разложенія. При кипяченія съ растворомъ ѣдкаго кали оно даетъ амміакъ и нитросалицилокслое кали. Дѣйствіе безводнаго барита и извести на салцилокслый мифиль представляетъ интересныя явленія. Если зѣуръ этотъ смѣшать съ большимъ избыткомъ безводнаго барита и подвергнуть сухой перегонкѣ то въ приѣмникѣ перейдетъ маслообразная жидкость, большая часть которой не растворится въ ѣдкомъ кали. Это вещество, промытое нѣсколько разъ щелочною водою, очищенное вторичною перегонкою и высушенное надъ хлористымъ кальціемъ, представляетъ совершенно составъ анисола, на образование котораго при перегонкѣ кристаллизованной анисовой кислоты съ избыткомъ ѣдкаго барита Кагуръ указалъ уже прежде. Образование его въ этой реакціи Кагуръ объясняетъ тѣмъ, что фенолы и мифиль соединяются въ минуту происхожденія ихъ (*in statu nascenti*). Свойства этого тѣла и содержаніе его къ брому, азотной и сѣрной кислотамъ изслѣдованы и описаны Кагуромъ.

Въ продажномъ гаултеровомъ маслѣ Кагуръ нашелъ особенное среднее вещество, легче воды; нерастворимое въ ней—это углево-

дородъ онъ составляетъ около  $\frac{1}{10}$  части по вѣсу масла. Приготовленіе его слѣдующее: продажное масло кипятятъ съ вѣрнымъ растворомъ ѣдкого кали, въ ретортѣ остается растворъ салицилоксислаго кали между тѣмъ какъ въ приемникѣ переходитъ смѣсь мефилового спирта, воды и упомянутаго углеводорода. Кагуръ названъ послѣдній гаултериленомъ (Gaultherylene). Смѣсь промывается щелочною водою, потомъ частю, которая увлекаетъ весь древесный спиртъ и слѣды салицилоксислаго мефила, поавшаго, можетъ быть, въ началѣ перегонки въ приемникъ. Промытый продуктъ осушается расплавленнымъ хлористымъ кальціемъ и потомъ перегоняется надъ потассіемъ.

Очищенный такимъ образомъ гаултерилень представляетъ безцвѣтно, удобовижимое масло, пріятнаго запаха, напоминающаго перечное масло. Кипитъ при  $+16^{\circ}$  С. Дымящая азотная кислота, хлоръ, бромъ оказываютъ дѣйствіе на него, но продукты этого дѣйствія не изслѣдованы.

Гаултерилень имѣетъ удѣльный вѣсъ пара и составъ скипидарнаго масла.

Перегоняя двѣ части безводнаго акоголя съ полтора частями кристаллизованной салициловой кислоты и одной частью сѣрной кислоты при  $66^{\circ}$ , Кагуръ получилъ салицилоксислый эфиръ, который въ чистомъ видѣ безцвѣтенъ, тяжелѣе воды, кипитъ при  $+225^{\circ}$ . Къ ѣдкимъ щелочамъ, хлору, брому, амміаку и дымящей азотной кислотѣ содержится точно также, какъ салицилоксислый мефилъ, и даетъ соответственные послѣднему соединенія.

Ко всему сказанному добавимъ еще, что по опытамъ А. А. Бухнера весьма вѣроятно, что въ молодыхъ цвѣтахъ *Spigae Urticae* находится салицивъ. Цвѣточные почки этого растенія содержатъ только слѣды образовавшейся салицилстой кислоты. Вкусъ этихъ почекъ бальзамическій, вязущій горькій, похожій на вкусъ коры ивы, онѣ едва имѣютъ запахъ. При перегонкѣ ихъ съ водою получается чрезвычайно мало салицилстой кислоты, но остатокъ, въ которомъ не отщипывается болѣе присутствіе этой кислоты, даетъ, по прибавленіи двухромокислаго кали и сѣрной кислоты, новое количество салицилстой кислоты.

Бухнеръ обработалъ настою почку цвѣтовъ спиренъ какъ при добываніи салицина, и выпарилъ этуъ настою до густоты сиропа. Хотя послѣ годичнаго храненія изъ него ничего не выдѣлилось, но при обработкѣ его двухромокислымъ кали и сѣрною кислотою получилась салицилстая кислота въ видѣ маслообразныхъ капель и муравейная кислота. Поэтому можно предположить, что салицилстая кислота, появляющаяся при развитіи цвѣточныхъ почекъ образуется изъ салицина, или изъ тѣла ему подобнаго. Послѣ от-

цвѣтѣнія въ цвѣточной метелкѣ не находится ни салицилнстой кислоты ни тѣла, изъ котораго она образуется отъ дѣйствія обильныхъ веществъ.

Вике нашелъ, что 1) салицилнстая кислота или тѣло, изъ котораго она происходитъ весьма распространена въ семействѣ спирейныхъ растений и находится въ различныхъ органахъ ихъ и 2) что кустарничные роды спирей, которые несомнѣнно ближе къ семейству яблочныхъ растений чѣмъ травянистыя содержатъ амигдалинъ.

Перегонъ частей травянистыхъ растений собранныхъ въ Юнѣ, содержалъ салицилнстую кислоту безъ синильной; перегонъ же кустарничныхъ растений содержалъ синильную кислоту, безъ салицилнстой.

Салицилнстая кислота находится въ перегонѣ листьевъ и корнѣ *Spireae Ulmariae*, въ травянистыхъ частяхъ *Sp. digitatae*, *Sp. lobatae*, *Sp. filipendulae*, особенно въ большомъ количествѣ въ листьяхъ полводвѣгущей *Sp. Ulmariae*. Синильная кислота находилась въ перегонѣ *Sp. arunci*, *Sp. sorbifoliae*, *Sp. japonicae*. Ни та ни другая кислота не находилась въ: *Sp. laevigata*, *Sp. acutitifolia*, *Sp. orbiculifolia*.

Вике показываетъ, что листья *Sp. sorbifoliae* и *Sorbi aucupariae* очень между собою сходны, что листья *Sp. arunci*, которые принадлежатъ къ такъ называемымъ многосложнымъ, имѣютъ типически ту же форму.

Простѣйшую форму листьевъ представляютъ двѣ травянистыя спирей: *Sp. lobata* и *Sp. digitat.* Эти травянистыя спирей характеризуются тѣмъ, что при перегонкѣ даютъ салицилнстую кислоту.

Вике говоритъ, если предположимъ, что найденная салицилнстая кислота образуется изъ салицина, а синильная кислота изъ амигдалина, тогда присутствіе этихъ тѣлъ въ этомъ семействѣ представляетъ замѣчательное явленіе, ибо оба тѣла суть сочетанія съ глюкозою и оба тѣла распадаются, приходя въ прикосновеніе съ эмульсиномъ. Салицинъ распадается на глюкозу и салигенинъ, который, принимая два пая кислорода и выдѣляя два пая воды, превращается въ салицилнстую кислоту, а амигдалинъ распадается на синильную кислоту, глюкозу и масло горькихъ миндалей. Салицилнстая кислота изомерна съ бензойной, которая образуется изъ масла горькихъ миндалей по принятіи нѣмъ кислорода. Салиретинъ, который образуется изъ салигенина чрезъ выдѣленіе двухъ паевъ воды иомерируется съ масломъ горькихъ миндалей.

**Sandaraca** (отъ *thuja articulata*). При подогрѣваніи распространяетъ пріятный запахъ.

**Sanguis draconis**. Драконова кровь (оплотнѣлый сокъ изъ плодовъ *dracaena draco*, *palmae*, въ Индостанѣ). Темнокрасное, вытяжковидное вѣщо, етативающаго вкуса, раствор. въ алкогольѣ



и въ эфирѣ. Состав. чч.: дубильная кта, драконинъ, росологонная кта, Внутрь, подобно тавянну, ратанѣ и пр., по 5—20 гр. на пр., въ порош., виюл. и кашкахъ. Преимущественно же съ наружи, какъ красящая примѣсь къ пластырямъ и зубнымъ порошкамъ.

**Santoninum** (алкалоидъ изъ sem. cinae). Мелкіе бѣлые кристаллы, раств. въ алкоголь, эфирѣ, эфирныхъ и жирныхъ маслахъ. Противъ круглыхъ глисть, 1—2 гр. При продолжительномъ употребленіи иногда появляется желтуха, которая впрочемъ исчезаетъ сама собою.

**Saoria s. Sanarja** (высушенные, спѣлые плоды, похожіе на зерна перца отъ маеса риста, кустарникъ въ Абиссиніи). Даютъ противъ ленточной глисты въ гороховомъ или обыкновенномъ тиселѣ. Дѣйствуетъ при этомъ только какъ слабительное.

**Sapo olei ricini.** Клецевинноклая магнезія. Бѣлый мылоподобный порошокъ безъ запаха, съ слегка царапающимъ вкусомъ. Внутрь въ пюл. (съ нѣсколькими каплями алкоголя), по 5—10 гр., или въ чистомъ видѣ, или съ другими послабляющими веществами.

**Sapo terebinthatus s. balsamum vitae externum.** Терпентинное мыло. Желтовато, мазевидно. Снаружи для мазей и втираній.

**Scammonium halepense.** Diagyridion (засохшій сокъ изъ корней convolvulus scammonia., convolvulaceae, въ Греціи, въ Левантѣ). Желтобураго цвѣта, прозрачно, очень ломко, отчасти раств. въ водѣ (мутная зеленая ждсть) и въ алкоголь. Внутрь, какъ drasticum, 1—5—10 гр. въ порош., пюл. или эмульсіяхъ. Лучше впрочемъ не употреблять вовсе потому, что препаратъ этотъ рѣдко бываетъ чистъ.

**Seuae cornutum.** См. стр. 225.

**Semen anisi stellati. s. badiani.** См. стр. 22.

**Semen anisi vulgaris.** См. стр. 22.

**Semen avenae excorticatum.** (Овсяная крупа). См. стр. 40.

**Semen cannabis.** См. стр. 55.

**Semen cardui Mariae.** Сѣмя остропестра или лягушечника. (отъ silybum marianum). Содержитъ жирное масло, горькое вытяжное вещество, соли. Rademacher совѣтовалъ, какъ рвотное и при застояхъ печенъ въ видѣ отвара.

**Semen carvi.** Тминъ (отъ carvum carvi). См. стр. 59.

**Semen cinae, s. cynaе. s. santonici, s. contra.** Цитварное сѣмя (собственно не сѣмя, а еще не развившіеся пыльники п завязи отъ artemisia contra (въ Персіи) и A. Sieberi (въ Палестинѣ). Состав. чч.: сантоновая кта (сантонинъ), растворимое горькое вщво. летучее масло, буроебрая смола. Цитварное сѣмя дается съ

большимъ успѣхомъ, какъ *anthelminticum* противъ *ascaris lumbricoides* и *oxyuris vermicularis*. Его даютъ: какъ *confectio seminum cinae*, а также въ порош., настоѣ, шоколадѣ и кашкѣ.

**Semen cismae** (отъ *cassia absus*). Снаружи въ эмульси нѣсколько разъ въ день пускаютъ въ глазъ по 8—12 кпл. Въ Египтѣ ходячее ср-во при *ophthalmia blenorr.*

**Semen colchici.** См. стр. 73.

**Semen coriandri.** См. стр. 86.

**Semen hyosciami.** См. стр. 125.

**Semen lini.** См. стр. 147.

**Semen lycopodii.** См. стр. 151.

**Semen papaveris.** См. стр. 167.

**Semen sabadillae** (отъ *veratrum officinale*). Вшивое сѣмя. Противъ головныхъ паразитовъ въ формѣ присыпокъ, вастоя или мази.

**Semen sinapis nigrae.** См. Стр. 234.

**Semen Stramonii** См. **Herba stramonii.**

**Siliqua dulcis.** Сладкіе стручки (отъ *ceratonia siliqua*). Какъ прибавленіе къ отхаркивающимъ наборамъ. Употреб. еще и теперъ.

**Siliqua vanillae** (отъ *vanilla aromatica, orchideae*, въ Перу и въ Мексикѣ). Теперъ ваниль употребляютъ лишь для пересыпки пилюль въ изящной практикѣ. Прежде ее давали, какъ *carminativum*, *aphodisiacum* и *antihystericum*.

**Solaninum** См. стр. 239.

**Species aromatae s. pro cucuphis** (для подушечевъ). *Fol. menth. crisp., melissae* 4 части; *fl. lavand.* 2 части *sauroph.*

**Species lignorum.** (*Ligni guajaci, bardanae, saponoriae, rad. liquir. et lig. sassafras*). Въ видѣ отвара при какомъ либо противусифилитическомъ лѣченіи, а также домашнее срво противъ «снпей» въ видѣ чая.

**Species pectoralis cum fructibus.** *Caricar. passul. minor., hordei deglupti, rad. liquir., rad. alth., herb. farfar. herb. hyssopi, herb. carili. veneris.* Въ формѣ чая при катаррахъ дыхательн. путей.

**Species pro cataplasmate.** *Flor. chamom. vulg., herb. malvae, herb et flor. meliloti, farin. semin. lini.*

**Species pro gargarismate.** *Herb. alth, flor. sambuci, flor. malvae rabor.* Для полосканій.

**Species pro infuso pectorali.** *Rad. alth, rad. liquir, rad. iridis florent, fol. farfar, flor. rhoeados, verbasci, sem. anisi stellati.* Употреб. подобно spec. pect. cum fruct.

**Species resolventes.** Herb. menthae pip., herb. origani, flor. cham., flor. lavandulae, flor. sambuci. Для разрѣшенія опухолей въ желѣзахъ.

**Spiritus calami.** 1 ч. rad. calami и 4 чч. spir.). Снаружи для ваннъ.

**Spiritus camphoratus.** (Camph. съ spir. vini rectificatis). Для обмываній при параличахъ, торpidныхъ воспаленіяхъ и помораживаніи. для глазныхъ примочекъ.

**Spiritus cochleariae.** Снаружи для полосканій при цингѣ.

**Spiritus juniperi.** См. стр. 134.

**Spiritus synapeos.** Горчичный спиртъ. Снаружи какъ быстро дѣйствующее rubefaciens. Или просто втираютъ, или наливаютъ 10—30 капл. на пропускную бумагу и такъ прикладываютъ.

**Stipites dulcamare.** Стебельки сладко-горькаго паслена (отъ solanum dulcamara). Даютъ противъ ломоты, хронич. катарра бронхій, коклюша, хронич. сыпей и т. д. въ настоѣ.

**Strychninum purum.** Стрихнинъ (аккалоидъ изъ strychnos pux vomica). Чрезвычайно горькіе кристаллы. Cave: дубильной вѣтк, металлическихъ солей. Вънутрь по  $\frac{1}{16}$ — $\frac{1}{4}$  гр. Лучше не употреблять вовсе.

**Strychninum nitricum.** Вънутрь  $\frac{1}{16}$  —  $\frac{1}{4}$  гр. 2 раза въ день) въ порошкахъ, пилюляхъ и растворахъ. Снаружи для втираній, для вдываній въ Евстахіеву трубу при первомъ шумѣ въ ушахъ (Kramer). На обнаженную кожу (ежедневно по  $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$  гр. и до 1 и даже 2 гр. съ сахаромъ). Существуютъ еще: strychninum aceticum, muriaticum, hydrojodicum, sulphuricum (который чаще другихъ употребляется для подкожныхъ впрыскиваній. Eulenberг впрыскиваетъ отъ  $\frac{1}{18}$  до  $\frac{1}{8}$  гр. Хорошо дѣйствуетъ при enuresis, prolapsus ani, менѣе успѣшно, при параличахъ органовъ движенія; Квитацкій впрыскивалъ при параличѣ языка въ самый языкъ.

**Succus citri.** Лимонный сокъ. Вънутрь въ формѣ сатурацій. Снаружи для втираній, когда опасаются пролежня.

**Succus liquoritiæ.** См. стр. 119.

**Succus juniperi inspissatus s. roob juniperi.** См. стр. 134.

**Succus sambuci inspissatus s. roob sambuci.** См. стр. 220.

**Syrupus amigdalorum s. emulsivus.** Миндальный сиропъ. Придаетъ микстурамъ бѣлый цвѣтъ. Вънутрь, самъ по себѣ, вмѣсто мивд. заульсигъ. Для питья, особенно при переломѣ.

**Syrupus balsami peruviani. s. balsamicus** (1 ч. bals. peruv. съ 12 чч. aq. ferv. и 18 чч. сахара). Прозраченъ, какъ вода.

Внутрь, какъ добавленіе къ отхаркивающимъ лѣкарствамъ и для составленія кашекъ.

**Syrupus berberidum.** См. стр. 43.

**Syrupus cerasorum acidorum.** См. стр. 63.

**Syrupus cinnamomi.** Коричневого цв. Прибав. къ горькимъ и ароматическимъ микстурамъ.

**Syrupus citri.** (1 ч. лимоннаго сока съ 2 чч. сахара). Прибавляютъ къ лѣкарствамъ, имѣющимъ непріятный вкусъ (valeriana и проч.).

**Syrupus corticum aurantiorum.** Желтобур. цв., съ пріятнымъ горьковатымъ вкусомъ. Прибав. къ горькимъ (въ хини) и ароматическимъ микстурамъ.

**Syrupus croci.** См. стр. 89.

**Syrupus florum aurantii s. Naphae.** Бѣлаго цвѣта. Употребляется, какъ syr. cort. aurant.

**Syrupus ipecacuanhae.** Желтобурого овѣта. По чайной ложкѣ въ чистомъ видѣ или съ другими рвотными и отхаркивающими лекарствами.

**Syrupus Iiquiritiae.** См. стр. 119.

**Syrupus oxycocci.** Клюквенный сиропъ. Употребляется какъ малиновый.

**Syrupus rhei.** См. стр. 209.

**Syrupus rheados.** См. стр. 170.

**Syrupus rubidaei.** Малиновый сиропъ. Красиваго краснаго цв., пріятнаго вкуса и запаха. Любимая приправа для всякаго рода микстуръ.

**Syrupus senegae.** (Rad. seneg. обрабатываютъ смѣсью изъ aq. com. и spir. vini rectificatiss. и прибавл. сахару. Желтобурого цв. Прибавл. къ отхаркивающимъ микстурамъ.

**Syrupus senae cum manna.** Бураго цв. Дѣтямъ, какъ ругланъ, по чайной ложкѣ; прибав. также къ слабительнымъ микстурамъ.

**Syrupus spinae cervinae** (rhamni cathartici). (Сокъ свѣжихъ ягодъ смѣшивается съ сахаромъ). Синекраснаго цв., горькаго вкуса. Дѣтямъ по чайн. ложкѣ какъ слабитель. и легкое мочегонное.

**Syrupus violarum.** Фиалковый сиропъ. Прекраснаго сянго цв., отъ щелочей становится зеленымъ, а отъ кислотъ краснымъ.

**Syrupus zingibelis** (изъ rad. zingib.). По десертной ложкѣ; прибавл. также къ горькимъ лекарствамъ.

Т

**Tacamahaca.** (Смола изъ *elaphrium tomentosum*, въ Зап. Индiи). Желтокрасные, противнопахнущіе куски въ орѣхъ величиною. Для вуреній и пластырей.

**Tamarindi s. fructus tamarindolum** (раздавленные плоды и сѣмена отъ *tamarindus indica*, *caesalpineae*, въ Африкѣ). Въ отвѣрѣ, какъ охлаждающее питье и какъ слабительное.

**Terebinthina communis.** Терпентинъ (отъ *pinus sylvestris* и *pinaster*). Желтоватая, густая масса. Содерж. эфирн. масло и смолу. Употреб. только сваружи въ пластыряхъ (особенно противъ ревматизма) и мазяхъ (1:4 жира). Также употр. и остатокъ отъ перегонки терпентиннаго масла — *terebinthina costa* (твердая желтоватая масса) и *terebinthina laricina s. veneta* (отъ *pinus larix*). Изъ послѣдней дѣлаютъ кромѣ того клистиры.

**Tinctura absinthii.** Полынный капли. (1 ч. полыни, травы настаивается 3 дней въ 6 чч. *spir. vini rectificatiss.*) Зеленобурого цвѣта, внутрь по 20—40 капель нѣсколько разъ въ день.

**Tinctura aconiti.** См. стр. 8.

**Tinctura aloës.** (1 ч. сабура, 6 чч. алкоголя.) Темнокоричневого цвѣта. Какъ исправляющее пищевареніе въ какой-нибудь ароматической водѣ, по 5—30 капель на приемъ. Снаружи прибавляется къ клистирамъ.

**Tinctura aromatica.** Пряный капли. (4 чч. *cass. cinnam.* и по 1 ч. *card. min.*, *saryorph.*, *rad. galangae*, *rad. zingiberis* на 8 чч. алкоголя). Внутрь по 20—60 вкл. Даютъ въ сахарной водѣ.

**Tinctura asae foetidae** (1 ч. *as. foet.* на 6 чч. вин. спирта). По 10—60 вкл. съ  $\frac{1}{2}$  ээира.

**Tinctura benzoës** (1 ч. *resinae. benz.*, 6 чч. *spir. vini*). Буроватого цвѣта. Для обмываній при ссадинахъ на соскахъ и съ косметическою цѣлью. По столовой ложкѣ на каждое умыванье.

**Tinctura calami aromatici.** См. стр. 9.

**Tinctura calami composita** (*rad. calami*, *rad. zedoariae*, *rad. zingib. fruct. immatur. anrant*, алког.). Буроватого цв.

**Tinctura canabis indicae** (1 ч. *extr. cann. ind.* на 20 чч. *spir. vini rect.*). Какъ narcoticum. 2—20 вкл., особенно при кровотеченіяхъ изъ матки.

**Tinctura cascariillae.** (sort. *cascar.*, алког. Внутрь 20—60 вкл., нѣсколько разъ въ день. Можетъ быть прибавляема къ укряпляющимъ желудокъ микстурамъ.

**Tinctura catechu** (5 чч. катеху, 24 чч. алког.). По 20—60

кпл. сит. аq. menth. рір. Снаружи для помазыванія пораженныхъ цингою десенъ. Также употреб. *tinctura kino*.

**Tinctura chinae simplex** (1 ч. cort. chinae, 6 чч. вин. спирта).  
Коричневая. очень горькая.

**Tinctura cinnamomi** (1 ч. кориды на 5 чч. вин. спирта). Ко-  
ричневая. По 10—60 кпл., какъ *stypticum* при маточныхъ крово-  
теченіяхъ, каждые  $\frac{1}{2}$  часа или часъ. Приб. также къ зубнымъ  
тинетурамъ.

**Tinctura colocynthis composita** (7 чч. coloc., 1 ч. anisi stell.  
и 96 чч. алког.). Темножелтая. Внутрь отъ 5—20 капель въ ка-  
койнибудь слизи.

**Tinctura convallariæmajalis**. См. стр. 84.

**Tinctura croci**. См. стр. 89.

**Tinctura digitalis**. См. стр. 105.

**Tinctura euphorbii**. См. стр. 109.

**Tinctura gallarum** (1 ч. чернил. орѣшковъ на 6 чч. вин. спир-  
та). Внутрь по 30—60 кпл. При отравленіи алкалоидами. Sieg-  
mund хвалитъ смѣсь изъ *tinct. gall.* и *tinct. jodi* для разрѣшенія  
опухлей въ желѣзахъ.

**Tinctura gentianae**. См. стр. 115.

**Tinctura guajaci ammoniata** (1 ч. res. guajaci на 6 чч. liq.  
ammon. vinosi). Коричневая. По 10—30 кпл., нѣсколько разъ въ  
день, съ какой-нибудь слизью или въ микстурахъ.

**Tinctura guajaci resinae** (1 ч. res. guajaci на 6 чч. вин. спир-  
та). Красноватокоричневая. По 20—60 кпл. въ чистомъ видѣ или  
съ противуревматическими микстурами.

**Tinctura hyociani**. См. стр. 127.

**Tinctura ipecacuanhae** (1 ч. rad. ipes. на 8 чч. вин. спирта).  
Внутрь по 10—30 кпл. Прибавл. къ противусудорожнымъ срвамъ.

**Tinctura opii benzoica**. См. стр. 185.

**Tinctura opii crocata s. laudanum liquidum, sydenhami**.  
См. стр. 184.

**Tinctura opii simplex. s. tinctura thebaica**. См. стр. 184.

**Tinctura pimpinellae**. Коричневая. Внутрь въ чистомъ видѣ по  
30—60 кпл. на сахарѣ при катаррѣ бронхій и гортани. Снаружи  
для полосканій.

**Tinctura ratanhiaе** (1 ч. rad. ratanh., 5 чч. алког.). Красно-  
ватобурая. Внутрь отъ 10—30 кпл. Снаружи для вяжущихъ по-  
лосканій.

**Tinctura rhei aquosa**. См. стр. 209.

**Tinctura rhei vinosa.** См. стр. 209.

**Tinctura secalis cornuti.** См. стр. 230.

**Tinctura seminum colchici.** См. стр. 77.

**Tinctura valerianae.** См. стр. 256.

**Tinctura vanillae.** Приятнаго вкуса но дорога. Для ея приготовления 8 частей алкоголя настаиваются 1 ч. ванили.

**Tinctura zingiberis.** По 10—30 кпл. какъ прибавленіе къ сврамъ, укрѣпляющимъ желудокъ.

**Traumaticinum** (растворъ гутта перчи въ хлороформѣ: 1 ч. на 10—15 чч.). Густая ждсть; при помазываніи быстро высыхаетъ и даетъ гибкую прозрачную оболочку. Снаружи для покрыванія ранъ, язвъ, ожоговъ, пораженныхъ мѣстъ и для шинъ при переломахъ. — Съ *tinct. jodi* образуетъ плотную упругую массу.

**Trochisci.** Чтобы ихъ приготовить, растворяютъ шоколадъ или сахаръ и прибавляютъ трагантовой слизи, крахмала, бѣлка тагъ, чтобы образовалось густое тѣсто, затѣмъ тщательно смѣшиваютъ съ опредѣленнымъ количествомъ лѣкарства, раскатываютъ и вырѣзываютъ отдѣльные кружки. Въ этой формѣ удобно даются трудно или вовсе нестеръ. вѣща.

## U

**Unguentum albae.** Свѣтложелтая.

**Unguentum ad decubitus Autenriethi** (содержитъ дубильно-кислый свинецъ). Не заслуживаетъ употребленія.

**Unguentum basilicum.** Королевская мазь (*ol. prov., ser. flav., coloph., seb. vervec. terebinth. venet.*). Желтоватая. Для перевязыванія худо гноящихся язвъ (*tinct. myrrhae*).

**Unguentum elemi** (*elemi, terebinth., latic., sev. ovil., adip.*). Подобно *ungt. basil.* употреб. для перевязыванія атоническихъ язвъ.

**Unguentum nervinum s. rosmarini compositum** (*sebi vervec., ol. lauri, ol. terebinth., ol. succini rect., ol. menth. pip., ol. rosm., ol. juniperi*). Зеленая.

**Unguentum populeum.** См. стр. 196.

## V

**Veratrinum** (алкалоидъ изъ *rad. hellebor. alb.* и *sem. sabadillae*). Бѣлаго цв. Раств. въ алкоголь, эфиръ и разведенныхъ водахъ. Сильно раздражаетъ слизистую оболочку рта, глотки и носа. Раздражаетъ кишечный каналъ, замедляетъ пульсъ. Даютъ въ ядо-

ляхъ при пнеймоніи, pleuritis, pericarditis, myocarditis и остромъ суставномъ ревматизмѣ. Снаружи въ мази, въ алкогольномъ растворѣ, противъ невралгій, параличей и пр.

**Vinum seminum colchici.** См. стр. 77.

## W

**Wogara. sive.** Ядъ индѣйскихъ стрѣлъ. Хвалять подкожныя впрыскиванія при tetanus. Вызываетъ временной параличъ мышцъ. Противоядіе стрихнина. Benedict имѣлъ прекрасные результаты, впрыскивая при падучей болѣзни 3 раза въ недѣлю по  $\frac{1}{15}$ — $\frac{1}{10}$  gr. Растворъ всегда долженъ быть свѣжій.

---



**СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ**  
**РОДОВЪ И ВИДОВЪ РАСТЕНИЙ,**  
**ВСТРЪЧАЕМЫХЪ ВЪ ДИКОРАСТУЩЕМЪ СОСТОЯННН,**  
**ВЪ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЪ РОССИИ;**  
**РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО СИСТЕМЪ**  
**ЛИННЕА.**

# СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ

РОДОВЪ И ВИДОВЪ РАСТЕНИЙ, ВСТРѢЧАЕМЫХЪ  
ВЪ ДИКОРАСТУЩЕМЪ СОСТОЯНІИ, ВЪ СРЕДНЕЙ  
ПОЛОСѢ РОССІИ; РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО СИСТЕМѢ

ЛИННЕЯ

## Classis I. Monandria.

**Monogynia.** Hippuris vulgaris.

**Digynia.** Callitriche verna.  
autumnalis  
Blitum virgatum.

## Classis II. Diandria.

**Monogynia.** Gratiola officinalis  
Veronica longifolia  
spuria  
spicata  
serpilifolia  
Beccabunga  
anagalis  
scutellata  
officinalis  
chamedris  
latifolia  
prostrata

Veronica montana  
arvensis  
agrestis  
triphyllos  
verna

Utricularia vulgaris  
minor

Licopus vulgaris  
exaltatus

Salvia nemorosa  
pratensis  
austriaca  
verticillata  
campestris  
sylvestris

Circæa lutetiana

Lemna trisulca  
minor

Fraxinus excelsior

Salix fragilis  
viminalis  
starkeana.

**Digynia.** Anthoxanthum odoratum.

\*

**Classis. III. Tviandria.**

**Monogynia.** Valeriana dioica  
                  officinalis  
Fedia carinata  
Gladiolus communis  
                  imbricatus  
Iris graminea  
          sibirica  
          pseudo acorus  
          germanica  
          bohemica  
          flavissima  
          furcata  
Schœnus mariscus  
Scirpus albus  
          palustris  
          acicularis  
          lacustris  
          sylvaticus  
Eriophorum angustifolium  
                  latifolium.

**Digynia.** Alopecurus geniculatus  
Phleum pratense  
Miliun effusum  
Calamagrostis Epigeio  
Agrostis spica venti  
          stolonifera  
Phalaris arundinacea  
Hierochloa borealis  
          australis  
Aira aquatica  
          cœspitosa  
Melica nutans  
Andropogon Ischæum  
Panicum verticillatum  
Triticum repens  
Lolium perenne  
Elimus europæus  
          : avenarius  
Avena pubescens  
Poa trivialis  
          nemoralis  
          sudetica

Poa pratensis  
          annua  
          aquatica  
          compressa  
          media  
Cynosurus cristatus  
Glyceria fluitans  
Festuca avina  
          hirsuta  
          glomerata  
Bromus secalinus  
          mollis  
          arvensis  
          tectorum  
          inermis  
          elatior  
Arundo phragmites.

**Classis IV. Tetrandria.**

**Monogynia.** Scabiosa arvensis  
Succissa pratensis  
          inflexa  
Asterocephalus ochro-  
          leucus  
Asperula cynanchica  
          tinctoria  
          odorata  
Galium verum  
          palustre  
          verum  
          mollugo  
          boreale  
          Aparine  
Plantago maior  
          media  
          lanceolata  
          avenaria  
Cornus sanguinea  
Trapa natans  
Alchemilla vulgaris  
Majanthemum bifolium  
Viscum album.

**Digynia.** *Cuscuta vulgaris*  
*Potamogeton natans*  
           *lucous*  
           *perfoliatus*  
           *crispus*  
*Sagina procumbens.*

**Classis V. Pentandria.**

**Monogynia.** *Liliospermum arvense*  
*Pulmonaria asurea*  
           *angustifolia*  
           *officinalis*  
*Echium rubrum*  
           *vulgare*  
*Licopsis pulla*  
*Myosotis sylvatica*  
           *palustris*  
           *intermedia*  
*Anchusa procera*  
           *officinalis*  
*Symphytum officinale*  
*Asperugo procumbens*  
*Cynoglossum officinale*  
*Echinosperrum Lap-*  
           *pula*  
*Annagalis phænicea*  
*Lisimachia vulgaris*  
           *thyrsiflora*  
           *punctata*  
           *nummularia*  
*Primula veris*  
           *Elatior*  
*Erythræa centaurium*  
*Hottonia palustris*  
*Menyanthes trifoliata*  
*Convolvulus arvensis*  
           *sepium*  
*Hyoscyamus seopolina*  
           *niger*  
           *agrestis*  
           *pallidus*  
*Verbascum Thapsus*

*Verbascum Lichnitis*  
           *nigrum*  
*Polemonium cæruleum*  
*Datura Stramonium*  
*Vinca minor*  
*Solanum dulcamara*  
           *nigrum*  
           *flavum*  
*Physalis Alkekengi*  
*Campanula rotundifolia*  
           *patula*  
           *persicifolia*  
           *lilifolia*  
           *latifolia*  
           *Trachelium*  
           *glomerata*  
           *sibirica*  
*Lonicera xylosteum*  
           *nigra*  
*Rhamnus cathartica*  
           *frangula*  
*Evonymus Europæus*  
*Viola odorata*  
           *avenaria*  
           *canina*  
           *lancifolia*  
           *mirabilis*  
           *tricolor*  
           *arvensis*  
*Impatiens noli tangere*  
*Ribes rubrum*  
           *nigrum*  
*Hedera Helix*

**Digynia.** *Cynanchum vincetoxicum*  
*Gentiana pneumonanthe*  
           *cruciata*  
*Eringium planum*  
           *campestre*  
*Sanicula europea*  
*Bupleurum rotundifolium*  
*Pimpinella magna*  
           *saxifraga*  
           *nigra*  
*Seseli amarum*

Sison podagraria  
Carum carvi  
Cicuta virosa  
Daucus carota  
Sium latifolium  
    augustifolium  
    Falcaria  
Conium maculatum  
Selinum Oreoselinum  
Pastinaca sativa  
Angelica Archangelica  
    carvifolia  
Laserpitium latifolium  
    pruthenicum  
Chenopodium Bonus-Hen-  
    ricus  
    urbicum  
    album  
    ficifolium  
    hybridum  
    glaucum  
    polispermum  
Amaranthus Blitum  
Ulmus effusa

**Trigynia.** Viburnum opulus  
    Sambucus ebulus  
        nigra

**Tetragynia.** Parnassia palustris  
    Drosera rotundifolia  
        longifolia  
    Statica Gmelini  
    Linum flavum  
        catharticum.

**Polygynia.** Myosurus minimus.

### **Classis VI. Hexandria.**

**Monogynia.** Allium avenarium  
    oleraceum  
    Galanthus nivalis  
    Ornithogalum luteum  
        arvense;

Lilium martagon  
Anthericum ramosum  
Asparagus officinalis  
Convallaria maialis  
    Poligenatum  
        multiflora

Juncus effusus  
    conglomeratus  
    capitatus  
    bulbosus  
    pilosus  
Luzula campestris  
Acorus calamus  
Berberis vulgaris.

**Trigynia.** Colchicum autumnale  
Scheuzeria palustris  
Triglochin palustre  
Veratrum nigrum  
    album

Rumex Hydrolapathum  
    crispus  
    acutus  
    acetosa  
    Acetosella

**Polygamia.** Alisma Plantago.

### **Classis VII. Heptandria.**

**Monogynia.** Trientalis europæa.

### **Classis VIII. Octandria.**

**Monogynia.** Erica vulgaris  
    Vaccinium myrtillus  
        vitis idæa  
    Oxycoccus  
    Acer platanoides  
    Oenothera biennis  
    Epilobium angustissimum  
        hirsutum

*Epilobium montanum*  
tetragonum  
palustre  
angustifolium  
*Daphne mezereum*  
cneorum  
*Populus Tremula*  
*Polygonum Bistorta*  
Persicaria  
Hydropiper  
amphibium  
convolvulus  
dumetorum  
aviculare  
avenarium  
*Adoxa moschatelina*  
*Paris quadrifolia.*

**Classis IX. Encadria.**

**Digynia.** *Mercurialis perennis.*

**Hexagynia.** *Butomus umbellatus.*  
*Hydrocharis morsus-ranæ.*

**Classis X. Decandria.**

**Monogynia.** *Arbutus Uva ursi.*

**Digynia.** *Saxifraga granulata*  
*Gypsophila fastigiata*  
*Saponaria officinalis*  
*Dianthus Armeria*  
Carthusianorum  
Atrorubens  
deltoides  
Superbus

*Scleranthus perennis*  
Annus

*Chrysosplenium alternifolium.*

**Trigynia.** *Arenaria trinervia*  
*serpyllifolia*

*Arenaria rubra*  
*Stellaria nemorum*  
media  
uliginosa  
*Holostea*  
*Cucubalus bacciferus*  
Behen  
*Silene noctiflora*  
armeria  
otites  
nutans

**Pentagynia.** *Cerastium aquaticum*  
arvense  
vulgatum  
ovale

*Lychnis Githago*  
dioica  
flos cuculi  
viscaria

*Spergula arvensis*  
nodosa  
*Oxalis Accetosella*  
*Sedum Telephium*  
acre

**Classis XI. Dodecandria.**

**Monogynia.** *Lytrum salicaria*  
*Portulaca olivacea*  
*Asarum europæum.*

**Digynia.** *Agrimonia Eupatoria*

**Hexagynia.** *Stratiotes aloides*

**Dodecagynia.** *Sempervivum tectorum*  
hirtum  
globiferum

**Polygynia.** *Jsopyrum thalictroides.*

**Clasis XII. Icosandria.**

**Monogynia.** *Amygdalus nana*  
*Prunus spinosa*

Prinus avium  
chamocerasus  
padus.

**Di-Pentagynia.** Spirea filipendula  
ulmaria  
Mespilus Oxyacantha  
monogyna  
Pyrus communis  
malus  
aucuparia.

**Pollgynia.** Rubus idæus  
fruticosus  
cæsius  
saxatilis

Fragaria collina  
vesca

Potentilla Tormentilla  
reptans  
verna  
argentea  
recta  
anserina  
alba

Rosa cinamomea  
frutetorum  
pumilis  
spinosissima  
pinpinellifolia  
canina  
Jundzillii  
pumilla

### Classis XIII. Polyandria.

**Monogynia.** Papaver Rhoëas  
Chelidonium majus  
Tilia parvifolia  
Helianthemum vulgare  
Nymphaea alba  
lutea

**Digynia.** Poterium Sanguisorba.

**Pentagynia.** Aquilegia vulgaris  
nigella arvensis

**Pollgynia.** Sagittaria sagittæfolia  
Adonis æstivalis  
dentata

Ranunculus aquatilis  
ficaria  
lingua  
flamula  
auricomus  
cassubicus  
sceleratus  
polyanthemos  
acris  
repens  
bulbosus

Trolius Europeus

Caltha palustris

Anemone hepatica (He-  
patica triloba)

nemorosa  
ranunculoides  
sylvestris

Pulsatilla pratensis  
vulgaris  
patens

Thalictrum aquilegiæfolium  
flavum  
lucidum

### Classis XIV. Didynamia.

**Gymnospermia.** Prunella vulgaris  
grandiflora  
Dracocephalum Ruyschiana  
moldavica  
marchalianus  
serpyllum

Clinopodium vulgare

Melittis melisophilum

Scutellaria galericulata

Ajuga pyramidalis  
genovensis  
reptans

Teucrium Chamædrys  
Scordium

Origanum vulgare  
           sylvestris  
           aquatica  
           arvensis  
           austriaca  
 Galeobdolon luteum  
 Galeopsis Ladanum  
           Tetrahit  
           versicolor  
 Lamium maculatum  
           album  
           purpureum  
           amplexicaule  
 Glechoma hederaceum  
 Nepeta cataria  
 Stachys annua  
           Sylvatica  
           recta  
           palustris  
 Leonurus cardiaca  
 Ballota nigra  
 Betonica officinalis  
 Marrubium vulgare  
 Phlomis tuberosa

**Angiosperma.** Orobanche major  
                   Caryophyllacea  
 Lathræa squamaria  
 Euphrasia officinalis  
           lutea  
 Melampyrum arvense  
           nemorosum  
           sylvaticum  
 Rhinanthus crista galli  
           minor  
 Pedicularis palustris  
           scepttrum  
 Linaria minor  
           vulgaris  
 Scrofularia nodosa  
           aquatica  
           glandulosa  
 Digitalis purpurea  
           ochroleuca  
 Verbena officinalis

**Classis XV. Tetradynamia.**

**Nucamentacea.** Raphanus raphanistrum.  
                   jsatis tinctoria

**Siliculosac.** Alisum murale  
                   rostratum  
                   incanum

Draba verna  
           nemorosa  
           muralis

Cochlearia Armoracia  
 Thlaspi arvense

**Siliquosæ.** Cardamine amara  
                   pratensis

Arabis arenosa  
           Thaliana

Hesperis matronalis  
 Sisymbrium Sophia

          Alliaria  
 Sinapis arvensis

**Classis XVI. Monadelphica.**

**Triandria.** Bryonia alba

**Pentandria.** Erodium cicutarium

**Decandria.** Geranium sanquineum  
                   sylvaticum  
                   pratense  
                   palustre  
                   pusillum  
                   Robertianum

**Polyandria.** Malva sylvestris  
                   rotundifolia  
                   crispa  
                   Alcea

Lavatera thuringiaca.  
 Althæa officinalis



**Classis XVII. Diadelphia.**

- Serandria.** Fumaria officinalis  
vaillanthus  
Corydalis bulbosa
- Octandria.** Polygala vulgaris  
amara
- Decandria.** Ononis spinosa  
hircina  
mittis  
Onobrychis sativa  
vulgaris  
Trifolium hybridum  
repens  
montanum  
agrarium  
spadiceum  
rubens  
arvense  
pratense  
alpestre  
Genista tinctoria  
germanica  
Cytisus nigricans  
sessilifolius  
Orobus albus  
vernus  
niger  
Lathyrus latifolius  
Vicia sativa  
sepium  
cracca  
sylvatica  
dumetorum  
Ervum tetraspermum  
hirsutum  
Lotus carniculatus  
Medicago sativa  
falcata  
lupulina  
Astragalus cicer  
onobrychis  
glycyphyllos  
coronilla va-  
ria.

**Classis XVIII. Poliadelphia.**

- Polyandria.** Hypericum perforatum  
montanum  
dubium

**Classis XIX. Syngenesia.**

- Cynarea.** Cirsium rivulare  
Carlina vulgaris  
nutans  
acanthoides  
crispus  
palustris  
arvensis  
lanceolatus  
oleraceus  
Onopordon Acanthium  
Arctium Lappa  
tomentosum  
Serratula tinctoria  
Echinops sphærocephalus  
Centraurea scabiosa  
cariacea  
cyanus  
axylaris  
phrygia
- Eupatoriæ.** Eupatorium cannabi-  
num  
Bidens cernua  
tripartita  
Tusilago Farfara  
Gnaphalium vulgare  
Artemisia vulgaris  
campestris  
absinthium  
marschalliana
- Radiæ.** Erigeron acris  
canadense  
Jnula hirta  
salicina  
pulicaria  
Britanica

Helenium  
Aster Amelus  
Solidago virga aurea  
Cineraria alpestris  
aurantiaca  
integrifolia  
Senecia vernalis  
Jacobæa  
vulgaris  
Matricaria chamomilla  
Chrysanthemum Leucan-  
themum  
segetum  
Pyrethrum carymbosum  
Anthemis coluta  
arvensis  
tinctoria  
Achillea millefolium  
magna  
Calendula arvensis.  
**Cichoreæ.** Crepis tectorum  
biennis  
Hieratium præmorsum  
Auricula  
dubium  
pilosella  
echioides  
umbellatum  
Bacchium  
collinum  
Sonchus arvensis  
Prenanthes muralis  
Leontodon Taraxacum  
Lactuca virosa  
scariola  
Tragopogon pratensis  
major  
Picris hieracioides  
Apargia hispida  
Hypochoeris radicata  
maculata  
Cychorium jntybus  
Lapsana communis.

**Classis XX. Gynandria.**

**Monandria.** Orchis masculata  
morio  
millitaris  
latifolia  
macula  
bifolia  
Gymnadenia conopsea  
Epipactis palustris  
**Diandria.** Cyripedium Calceolus  
**Hexandria.** Aristolochia Clematidis

**Classis XXI. Monoecia.**

**Androgynia.** Calla palustris.  
Euphorbia helioscopium  
lucida.  
Ciparissias.  
pallustris.  
villosa.

**Triandria.** Carex dioica  
canescens  
arenaria  
humilis  
œderi  
striata  
fulva  
pilosa  
limosa

Sparganium ramosum  
**Tetrandria.** Urtica dioica  
urens  
Alnus glutinosa  
Xantium strumarium

**Octandria.** Myriophyllum spicatum  
verticillatum  
Corylus Avellana

**Deca-Polyandria.** Betula alba  
nana  
Carpinus Betulus  
Fagus sylvaticus  
Quercus Robur  
pedunculata.

**Monadelphia.** *Ceratophyllum demersum*

*Pinus sylvestris*  
*Typha latifolia.*

**Classis XXII. Dicoecia.**

**Pentandria.** *Humulus Lupulus*

**Polyandria.** *juniperus communis.*

**Classis XXIII. Poligamia.**

*Atriplex laciniatum*  
*patulum*

**Classis XXIV. Cryptogamia.**

1) RILICES.

**Equisetæe.** *Equisetum palustre*  
*hyemale*  
*arvense.*

**Lycopodeæ.** *Lycopodium clavatum*  
*complanatum*  
*Selago.*

**Ophloglosseæ.** *Botrychium Lunaria.*

**Filices veræ.** *Polypodium vulgare*  
*phegopteris*  
*Pteris aquilina*  
*Asplenium Filix-femina*  
*Aspidium Filix-mas*  
*fragile.*

2) MUSCI FRONDOSI ET HEPATICI.

*Phascum cuspidatum*  
*subulatum*

*Gymnostomum ovatum*  
*truncatum*

*Anoctangium ciliatum*  
*pulvinatum*

*Sphagnum latifolium*  
*squarrosum*  
*acustifolium*

*Splanchium ampulaceum*

*Eucalypta vulgaris*

*Grimmia apocarpa*  
*pulvinata*

*Weissia lanceolat*

*Maschalocarpus filiformis*

*Dieranum bryoides*  
*adiantheides*  
*taxifolium*  
*flagellare*  
*glaucum*  
*virens*

*Didymoden homomalus*

*Polytrichum formosum*  
*nanum*

*Syntrychia ruralis*

*Barrula muralis*  
*unguiculala*  
*Convoluta*

*Orthotrichum crispum*  
*striatum*

*Neckera pennata*

*Fontinalis antipiretica*

*Pohlia elongata*

*Lekea attenuata*  
*subtilis*  
*sericea*

*Bartramia pomiformis*

*Meesia uliginosa*

*Climatium dendroides*

*Hypnum sylvaticum*

*fluitans*  
*palustre*  
*molusam*  
*squarrosum*  
*cordifolium*  
*populeum*  
*purum*  
*prælongum*

*Bryum argenteum*

*capillare*  
*cæspiticum*  
*nutans*  
*annotinum*  
*cuspidatum*  
*hornum*

Mnium palustre  
    androgynum  
Jungermania dilatata  
    levigata  
    heterophylla  
    reptans  
    complanata  
    byssacca  
    setacea  
    furcata  
Marchantia polymorpha  
    conica

3) LICHENS.

Verrucaria muralis  
    epidermidis  
    obisacea  
Graphis curvula  
    phæa  
Lecidea vesicularis  
Cladonia papillaria  
    racemosa  
    fusca  
    degenerans  
    pixidata  
Parmelia florida  
    plicata  
    fraxinea  
    farinacea  
    prunastri  
    islandica  
    stellaria  
    furra  
    murorum  
    atra  
    varia  
    angulosa  
Peltigera rufescens  
    venosa  
Calitium tigillare  
    salicinum  
    subtile  
    rascidum  
    cinereum

4) ALGAE.

Chara tomentosa  
    vulgaris  
Conferva fasciculosa  
    rivularis  
    fracta  
Oscillatoria flos aquæ  
    muralis  
    limosa  
Vaucheria terrestris  
Nostoc commune  
    pruniforme  
Cocochlaeris stagrina  
Badiaga fluviatilis.

5) MYCETES.

Sphæria digitata  
    polymorpha  
    fusca  
    paronia  
    incrustans  
    filicina  
    graminis  
    Coryli  
    spermoides  
Hysterium quercinum  
    pulicare  
Agaricus muscarius  
    pantherinus  
    procerus  
    dypeolarius  
    melleus  
    Russala  
    flavo virceus  
    Georgii  
    serahilatus  
    terminosus  
    necator  
    trivialis  
    deliciosus  
    piperatus  
    exsuccus  
    emeticus

<b>Agaricus</b> dryophilus	<b>Telephora</b> ochracea
purus	incarnata
lepileus	<b>Leotia</b> truncorum
campestris	<b>Phallus</b> impodicus
floccosus	<b>Peziza</b> inguinaus
mollis	vesiculosa
decipiens	virginia
sterquilinus	<b>Sclerotium</b> semen
atremartarius	Brassicæ
<b>Merulius</b> cantharellus	clavus
muscorum	<b>Lycoperdon</b> avedatum
destrucus	pratense
<b>Dedalea</b> quercina	giganteum
gibbosa	plumbeum
rubescens	<b>Tremella</b> mosenterica
<b>Boletus</b> luteus	<b>Mucar</b> mucedo
granulatus	<b>Myxotrichum</b> chartarum
scaber	<b>Coremium</b> candidum
edulis	<b>Jsaria</b> collæ
subtomentosus	<b>Erincum</b> populinum
cyanescens	betulinum
perennis	roseum
squamosus	pyrinum
frondosus	Sorbi
adustus	acerinum
radiatus	<b>Puccinia</b> potentillæ
betulius	variabilis
tomentorius	adoxæ
igniarius	Anemonæ
dryadeus	<b>Uredo</b> cancellata
odoratus	penicellata
obliquus	cornuta
destructus	Urticæ
mucidus	Ranuncularum
<b>Hydnum</b> imbricatum	Pinus
repandum	candida
cyathyforme	linearis
<b>Telephora</b> terrestris	campanulæ
rubiginosa	appendiculata
tabacina	sitophila
	segetum

# **АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ**

**русскихъ, нѣмецкихъ и французскихъ названій  
растений, описанныхъ въ „Цѣлебномъ Травникѣ“.**

1.

**Указатель русских названій.**

	стр.		стр.
<b>А.</b>		Баранчики . . . . .	198
Ааронова борода . . .	27	Баранья трава . . . .	14-25
Авранъ . . . . .	119	Барбарисъ . . . . .	42
— аптечный . . . . .	119	— обыкновенный.	42
Адамова голова . . . .	32	Барвинокъ . . . . .	260
Айва . . . . .	91	Батеръ . . . . .	241
Аиръ . . . . .	8	Бедренецъ . . . . .	191
Аистникъ . . . . .	116	— каменистый . . . .	191
— вонючій . . . . .	116	Безвременный цвѣтъ .	73
Алебастреникъ . . . . .	120	Береза . . . . .	} 44
— стѣнной . . . . .	120	— бѣлая . . . . .	
Ампрыгъ . . . . .	23	— ерникъ . . . . .	
Анисъ . . . . .	22	— низкая . . . . .	
— обыкновенный . . . .	22	— пушистая . . . . .	
— звѣздчатый . . . . .	22	Берескледъ . . . . .	110
Анютины глазки . . . .	261	— обыкновенный . . . .	110
Арбузь . . . . .	91	Бирючина . . . . .	146
Армудъ . . . . .	134	Благодать . . . . .	119
Артышь . . . . .	92	Блошница . . . . .	107
Артышь . . . . .	134	Бобовникъ . . . . .	17
Арца . . . . .	134	Бобровина . . . . .	158
		Богородская трава . . .	247
<b>Б.</b>		Божье дерево . . . . .	26
Багунъ . . . . .	141	Божій бытъ . . . . .	67
— болотный . . . . .	141	Божья милость . . . . .	119
Багульникъ . . . . .	141	Болдырьянъ . . . . .	255
Базиликъ . . . . .	163	Болдиголовъ . . . . .	78
Балга . . . . .	210	Борецъ . . . . .	5
Балданъ . . . . .	206	Бородавочникъ . . . . .	69
		Бородавочница . . . . .	69
		Борецъ . . . . .	122

II

	стр.		стр.
Боръ . . . . .	219	Василекъ . . . . .	59-60
— дерево . . . . .	219	Василисникъ . . . . .	246
Бросовая трава . . . . .	46	Бахта . . . . .	158
Брусника . . . . .	254	Верба . . . . .	216
— обыкновенная . . . . .	254	— бѣлая . . . . .	216
Брюква . . . . .	50	— пятимужная . . . . .	216
— Полевая . . . . .	50	— ложка . . . . .	216
Бубенчикъ . . . . .	130	Вербейникъ . . . . .	152
Будра . . . . .	117	— полусечный . . . . .	152
— подзучая или		Вербинникъ . . . . .	257
душистая . . . . .	117	— бѣлый . . . . .	257
Бузина . . . . .	219	— черный . . . . .	258
— деревянная . . . . .	219	Верескъ . . . . .	107-159
— красная . . . . .	220	— обыкновенный . . . . .	107
— черная . . . . .	219	— ягодный . . . . .	159
Бузникъ . . . . .	220	Вересъ . . . . .	184
Буковица . . . . .	43-198	Вероника . . . . .	258
— бѣлая . . . . .	198	— лежачая . . . . .	258
— черная . . . . .	43	— ручейная . . . . .	259
Бутень . . . . .	66	Веселые глаза . . . . .	261
— лѣсной . . . . .	66	Ветла . . . . .	216
Быковникъ черный . . . . .	258	Вика коничья . . . . .	195
Бѣлена . . . . .	124	Виноградъ . . . . .	262
— бѣлая . . . . .	127	Вишня . . . . .	62
— черная . . . . .	124	— жидовская . . . . .	190
Бѣлица . . . . .	68	Ведоглазъ . . . . .	68
Бѣлоголовецъ . . . . .	241	Водоленъ сухой . . . . .	29
Бѣлокопытникъ . . . . .	250	Водосборъ . . . . .	23
— чумный . . . . .	251	— обыкновенный . . . . .	23
Бѣлокрыльникъ . . . . .	53	Водягодиникъ . . . . .	249
— болотный . . . . .	53	Водяной лагушникъ . . . . .	162
Бѣльцы . . . . .	42	Водяныя маковки . . . . .	162
Бѣшеница . . . . .	69	Водяныя орѣхи . . . . .	249
— водяная . . . . .	69	Водяная шандра . . . . .	152
		Водяной перецъ . . . . .	195
		Волкобой . . . . .	5
		Волконогъ . . . . .	152
		Воловикъ . . . . .	18
		— аптечный . . . . .	18
		— красный . . . . .	19
		Воловій языкъ . . . . .	19
<b>В.</b>			
Вадьямъ дикій . . . . .	99		
Валеріана . . . . .	255		
— аптечная . . . . .	255		
Варуха . . . . .	71		



		III
	стр.	стр.
Воловьё око . . . . .	68	Горлянка синяя . . . . . 13
Водоглотка . . . . .	13	Горохъ . . . . . 194
Водошпа . . . . .	60	Горумица . . . . . 48
Волчье лыко . . . . .	94	Горчанка . . . . . 114
Волчье яйцо . . . . .	151	— желтая . . . . . 114
Волчья ягода . . . . .	94	— пурпуровая . . . . . 115
Волчий перецъ . . . . .	94	— точечная . . . . . 115
— корень . . . . .	5	— венгерская . . . . . 115
Волчникъ . . . . .	93	Горчица . . . . . 48-234
Волчья лапа . . . . .	152	— бѣлая . . . . . 48-237
Волчець . . . . .	60	— полевая . . . . . 58-236
— кудрявый . . . . .	60	— черная . . . . . 234
Вонючка . . . . .	78	Гравилать . . . . . 117
Воробейникъ . . . . .	150	— береговой . . . . . 117
— аптечный . . . . .	150	Гранатникъ . . . . . 199
Вороній глазъ . . . . .	189	Гребенникъ . . . . . 116
Воронецъ . . . . .	10-189	Греча душистая . . . . . 4
Восковой ягодный ве- рескъ . . . . .	159	Гробная трава . . . . . 260
Вьюнокъ . . . . .	86	Грушовка . . . . . 199
— заборный . . . . .	86	— круглолистная . . . . . 199
Вѣтреница . . . . .	19	Грушица дикая . . . . . 199
— прострѣльная . . . . .	20	Грыжовникъ . . . . . 123
— лѣсная . . . . .	19	— голый . . . . . 123
— печочная . . . . .	20	Губка бѣлая . . . . . 12-47
Вязъ . . . . .	251	— древесная . . . . . 46
Ваха . . . . .	78	— вербная . . . . . 47
		— пахучая . . . . . 47
		— земляная . . . . . 151
<b>Г.</b>		Гуни . . . . . 91
Гаклушь . . . . .	42	Гусиная пажить . . . . . 197
Ганусъ . . . . .	22	Гусиная лапа . . . . . 68-143
Гасникъ . . . . .	43	Гусиная лапка . . . . . 67
Гвоздичка полевая . . . . .	98	Гулявица . . . . . 4
— кустистая . . . . .	98	— благовонная . . . . . 4
Глазница . . . . .	110	— тысячелистная . . . . . 4
Глухая крапива . . . . .	137	— чехотная . . . . . 4
Головоломъ . . . . .	78-150	Гулявникъ . . . . . 238
Голубки . . . . .	23	
Горець . . . . .	195	<b>Д.</b>
— водоперечный . . . . .	195	Двоелистникъ . . . . . 250
Горичникъ . . . . .	190	Двузубецъ . . . . . 46
— аптечный . . . . .	190	— трираздѣльный . . . . . 46

	стр.		стр.
Дербенникъ . . . . .	153	<b>Е.</b>	
— обыкновенный . . . . .	153	Ежевика . . . . .	214
Девясиль . . . . .	129	Ель обыкновенная . . . . .	191
— большой . . . . .	129		
— меньшей . . . . .	130	<b>Ж.</b>	
— слабительный . . . . .	130	Жабинець . . . . .	204
Девясильный лопуш-		Жаблигъ . . . . .	197
никъ . . . . .	251	Жабнигъ . . . . .	204
Девятильникъ . . . . .	243	— болотный . . . . .	204
Денежникъ . . . . .	152	— вредный . . . . .	204
Деревей . . . . .	4	— полевой . . . . .	204
Дереза . . . . .	214	— огненный . . . . .	204
Десятисильникъ . . . . .	243	— остросочный . . . . .	204
Дехтарка . . . . .	78	— язычный . . . . .	204
Дикий тернъ . . . . .	42	— чистотель-	
— чеснокъ . . . . .	232	ный . . . . .	205
Дикий перецъ . . . . .	94-231	Желтолень . . . . .	190
Дияя артишоки . . . . .	232	Желтяникъ . . . . .	210
Донникъ . . . . .	155	Женеволосная трава . . . . .	10
— аптечный . . . . .	155	Жеруха . . . . .	143-237
Дождевикъ . . . . .	151	— огородная . . . . .	143
Дремликъ . . . . .	163	— струйчатая . . . . .	238
Дровъ . . . . .	114	Живокость . . . . .	98-242
Дубровка бѣлая . . . . .	245	Живучая трава . . . . .	13
— трилистная . . . . .	244	Живучка кровельная . . . . .	232
— пирамидная . . . . .	13	Жигунецъ . . . . .	69
Дубовка . . . . .	245	Жигучка . . . . .	253
Дубовыя ягоды . . . . .	261	Жимолость . . . . .	150
Дубъ . . . . .	200	— благовонная . . . . .	150
Дурманъ . . . . .	95	— козья . . . . .	150
Дурнишникъ большой . . . . .	95	Жминда . . . . .	46
Душица садовая . . . . .	164	— головчатая . . . . .	46
— обыкновенная . . . . .	165	— красная . . . . .	46
Дягиль . . . . .	21	— лозоподобная . . . . .	46
— аптечный . . . . .	21	Журавика . . . . .	254
— лѣсной . . . . .	21	Журавлина . . . . .	254
Дымянка . . . . .	113		
— аптечная . . . . .	113	<b>З.</b>	
— орѣшчатая . . . . .	113	Завалець . . . . .	224
Дыня . . . . .	90	Завитки . . . . .	19
Дѣтская трава . . . . .	163		
Дѣтскія ядрышки . . . . .	163		

	стр.
Заячьи стоячий . . . . .	248
Записка луговая . . . . .	246
Заячьи ушки . . . . .	57
Заячьи капуста . . . . .	230-242
Заячий щевель . . . . .	166
Звѣробой . . . . .	127
Земный дымъ . . . . .	113
Земляника . . . . .	111
— лѣсная . . . . .	111
Земляница . . . . .	111
Златоцвѣтъ . . . . .	68
Змѣй трава . . . . .	27
Змѣевникъ . . . . .	119, 241
— двудомный . . . . .	119
— кустарный . . . . .	119
Змѣеголовникъ . . . . .	106
Змѣиная трава . . . . .	241
Змѣя . . . . .	53
Зобный корень . . . . .	224
Золотень . . . . .	240, 246
Золотуха . . . . .	246
— желтая . . . . .	246
Золотничка . . . . .	190
— болотная . . . . .	190
Золотая розга . . . . .	240
Золототысячникъ . . . . .	108
Золотникова трава . . . . .	108
Зоря . . . . .	145

### И.

Ибунка . . . . .	259
Ива . . . . .	216
— бѣлая . . . . .	216
— пятимужная . . . . .	216
— хрушная . . . . .	216
Ивановъ цвѣтъ . . . . .	68, 241
Илемъ . . . . .	251
— полевой . . . . .	251
Иръ . . . . .	8
— обыкновенный . . . . .	8
Иръ пѣмецкая . . . . .	131

	стр.
Исопь . . . . .	128
Истодъ . . . . .	194
— горькій . . . . .	194
<b>И.</b>	
Иудино дерево . . . . .	195
<b>Ис.</b>	
Иадило . . . . .	244
Иалина . . . . .	259
— обыкновенная . . . . .	259
Иалужница . . . . .	53
Иалуферъ . . . . .	243
Иамшеломка . . . . .	221
— козья . . . . .	221
Иамфарница . . . . .	53
Иамчадалка . . . . .	142
Иаперы . . . . .	57
Иаперовый кустъ . . . . .	57
Иапуста . . . . .	47
— толстолиственная . . . . .	230
— огородная . . . . .	48
— вочанная . . . . .	48
— рѣпчатая . . . . .	50
Иасатикъ . . . . .	8, 130
— болотный . . . . .	130
— германскій . . . . .	131
— сибирскій . . . . .	130
— синий . . . . .	131
Иашка . . . . .	4
Иаштанъ дикій . . . . .	10
— конскій . . . . .	10
Ивять . . . . .	91
Иашкара . . . . .	209
Иеларскъ . . . . .	209
Иервель . . . . .	222
Иирвазонъ . . . . .	25
Иислица . . . . .	42, 166, 215
— галунъ . . . . .	42
— малая . . . . .	215

	стр.		стр.
Басица обыкновенная . . . . .	215	Корень ластовичный . . . . .	31
Бихавель . . . . .	4	Коровникъ . . . . .	21
Бишенецъ . . . . .	86	— аптечный . . . . .	21
Кленъ . . . . .	3	Коровякъ . . . . .	257
Клещеница . . . . .	27	— бѣлый . . . . .	257
Клоповникъ . . . . .	141	Корольки . . . . .	68
Клубочникъ обыкновенный . . . . .	118	Короставигъ . . . . .	222
Клюква . . . . .	254	— — полевой . . . . .	222
Кманъ . . . . .	89	Косматикъ . . . . .	223
Кожевенное желтое дерево . . . . .	210	Кощачья трава . . . . .	244
Козелецъ . . . . .	223	Кощечникъ . . . . .	258
— дикій . . . . .	223	Кощечья лапки . . . . .	119
Козлобородникъ . . . . .	248	Кощечья мята . . . . .	159
Козьи, рожки . . . . .	46	— трава . . . . .	159
Козій ростъ . . . . .	259	Крапива . . . . .	252
Козья морда . . . . .	259	— большая . . . . .	252
Кокорникъ . . . . .	25	— бѣлая . . . . .	137
Кокорышъ . . . . .	113	— глухая . . . . .	137
Кокушкины слезки . . . . .	165	— двудомная . . . . .	252
Кокушница двулистная . . . . .	163	— дикая . . . . .	143
— широколистная . . . . .	163	— меньшая . . . . .	253
— мужская . . . . .	163	Крапъ . . . . .	212
— женская . . . . .	163	Красавица . . . . .	34
Колдуныя . . . . .	139	Красный корень . . . . .	224
Колокольчики . . . . .	23, 86	Крессъ . . . . .	58, 143
Колокольчикъ повилочный . . . . .	86	— водяной . . . . .	237
Колосница . . . . .	241	— дикій . . . . .	144
— годовая . . . . .	241	— луговой . . . . .	58
— лѣсная . . . . .	241	— перечный . . . . .	144
— нѣмецкая . . . . .	242	— садовый . . . . .	143
Кольва . . . . .	48	Крестовникъ . . . . .	232
Кояндра . . . . .	86	— дикій . . . . .	232
Комарникъ . . . . .	119	Кринъ . . . . .	146
Коница . . . . .	54	Кроставикъ . . . . .	4
— водяная . . . . .	108	Кротовикъ . . . . .	117
Кноплянка . . . . .	46	Крушина . . . . .	206
Конская грива . . . . .	108	— обыкновенная . . . . .	206
Конскій полей . . . . .	242	Крыжовникъ . . . . .	211
— чеснокъ . . . . .	245	Кубышечки . . . . .	162
Коперь . . . . .	138	Кувшинка бѣлая . . . . .	162
Копытень . . . . .	29	— желтая . . . . .	162
— европейской . . . . .	29	Кудри душистыя . . . . .	117

	стр.
Куйбаба . . . . .	142
Куманина . . . . .	214
Кундуть . . . . .	233
Кунжукъ . . . . .	233
Купальница . . . . .	204
Купена . . . . .	85
Куриная слѣпота . . . . .	204
Курослѣпъ . . . . .	18, 53
— малый . . . . .	18
— болотный . . . . .	53
Курь-зелье . . . . .	159
Курятникъ . . . . .	114
— вонючій . . . . .	114

## Л.

Лабазникъ . . . . .	241
Лавруша . . . . .	93
— вѣчнозеленая . . . . .	93
Лаврикъ волчій . . . . .	94
Лавровишня . . . . .	60
Ладанъ земляной . . . . .	115
— лѣсной . . . . .	114
Ландышъ . . . . .	84
— майскій . . . . .	84
— многоголѣбчатый . . . . .	85
Лапушникъ . . . . .	25
— малый . . . . .	25, 262
Лапчатка . . . . .	198
— ползучая . . . . .	198
Ластовочный корень . . . . .	31
Лататье . . . . .	162
Лебеда . . . . .	33
— дикая . . . . .	67
— душистая . . . . .	67
— садовая . . . . .	33
— собачья . . . . .	68
Ленъ . . . . .	147
— кокушкинъ . . . . .	149, 195
— пропускной . . . . .	149
— слабительный . . . . .	149
Лепешкинъ татарскій . . . . .	8

	стр.
Лжекакаця . . . . .	211
Лилія бѣлая . . . . .	146
Линнея . . . . .	147
— сѣверная . . . . .	147
Липа . . . . .	247
Лишай печеночный . . . . .	63
— вшивый . . . . .	63
— прыщеватый . . . . .	144
— собачій . . . . .	144
Лисье ядро . . . . .	163
Лиственница . . . . .	192
Лихорадочная трава . . . . .	192
Ложечная трава . . . . .	71
Лозина . . . . .	216
Ломонось . . . . .	69
Лопухъ провялый . . . . .	137
Лоскутница . . . . .	59
— ржаная . . . . .	60
— шелушистая . . . . .	60
Луговая рута . . . . .	246
Лукъ . . . . .	14
— огородный . . . . .	14
Львиноустъ сердечный . . . . .	143
Львинохвостъ . . . . .	143
Лѣсная буквица . . . . .	241
Лютникъ . . . . .	204
— почечуйный . . . . .	205
Лягушечный песокъ . . . . .	82
Лягушникъ . . . . .	138
— водяной . . . . .	162

## М.

Майоранъ . . . . .	165
— кошечій . . . . .	244
— лошадиный . . . . .	245
Маисъ . . . . .	263
Маковки водяныя . . . . .	162
Макъ . . . . .	167
— бѣлый . . . . .	167
— бѣгунъ . . . . .	167
— красный . . . . .	168

	стр.		стр.
Макъ полевой . . . . .	168	Молодилъ сайгачій . . .	230
— садовой . . . . .	167	Молочай . . . . .	109
Малина . . . . .	214	— болотный . . . . .	109
Маммура . . . . .	213	— плащевой . . . . .	109
Мандрагоръ . . . . .	39	— придорожный . . . . .	109
Маргаритка . . . . .	42	— солнечный . . . . .	109
Марена Кизлярская . . .	212	— ѣдкій . . . . .	109
Марь . . . . .	66	Морковь . . . . .	96
— благовенная . . . . .	66	— лѣсная . . . . .	96
— красная . . . . .	67	— огородная . . . . .	96
— кудрявецъ . . . . .	67	Морошка . . . . .	213
— трехугольная . . . . .	68	Морской салатъ . . . . .	71
Материнка . . . . .	165	Мотодилъ . . . . .	231
Материкъ . . . . .	250	Мохна . . . . .	198
Маточникъ . . . . .	155	Мохъ волосистый . . . . .	195
Матрёнка . . . . .	246	— водяной . . . . .	82
Мать-да-мачиха . . . . .	250	— грудной . . . . .	63
Мачокъ дикій . . . . .	168	— зѣмляной . . . . .	144
Медвѣжій виноградъ . . .	23	— исландскій . . . . .	63
Медвѣжье ушко . . . . .	257	— Олений . . . . .	63
Медвѣжьи ягоды . . . . .	23	— собачій . . . . .	63
— пучки . . . . .	21	Мудрость лекарская . . . . .	238
Медовка . . . . .	155	Мунгальскій чай . . . . .	116
Медуница . . . . .	199	Мутнигъ . . . . .	99, 78
— аптечная . . . . .	199	Мухоморъ . . . . .	12
— пятнистая . . . . .	199	Мыльнянка . . . . .	220
Медуничникъ . . . . .	241	— аптечная . . . . .	220
Мелисса турецкая . . . . .	106	Мышьи уши . . . . .	123
Медколенестникъ . . . . .	107	Мята англійская . . . . .	157
— ѣдкій . . . . .	107	— болотная . . . . .	155
Миндаль дикій . . . . .	17	— кудрявая . . . . .	156
Могильница . . . . .	260	— лѣсовая . . . . .	156
Могучникъ . . . . .	197	— перечная . . . . .	157
— гусиный . . . . .	197	— садовая . . . . .	155
— пятилиственный . . . . .	198	Мяхунка . . . . .	190
Можжевельникъ . . . . .	133		
— обыкновенный . . . . .	133		
— донской . . . . .	134		
— казацкій . . . . .	134		
Можжуха . . . . .	134, 246		
Молка . . . . .	197		
Молодилъ большой . . . . .	232		

## III.

Наперсточная трава . . . . .	99
Нардъ . . . . .	139
Негнѣючка . . . . .	246

Некленъ . . . . .	стр. 3
Нитчатка ручейная . . . . .	82
Нищая трава . . . . .	69
Нюотки . . . . .	52
Нюотная трава . . . . .	123
Норочникъ . . . . .	224
— узлозоренный . . . . .	224

●.

Облапа . . . . .	29
Обвивальня заборная . . . . .	86
Образки . . . . .	19
— горные . . . . .	27
Обхватка . . . . .	29
Овесь . . . . .	40
Овсяница . . . . .	111
— пловучая . . . . .	111
Огурецъ . . . . .	90
Огуречная трава . . . . .	47
Одногубка . . . . .	13
Однолѣсячникъ . . . . .	19
Однолгодникъ . . . . .	189
— четверолистн. . . . .	189
Одуванчикъ . . . . .	143
Ожина . . . . .	214
Оксамитъ . . . . .	23
Ольха . . . . .	16
— клейкая . . . . .	16
— обыкновенная . . . . .	16
— сѣровая . . . . .	16
Омегъ . . . . .	69
— пестрый . . . . .	78
Омела . . . . .	261
Орлики . . . . .	23
Орлякъ . . . . .	198
Орѣшки земляныя . . . . .	113
Орѣшникъ обыкновенный . . . . .	87
— грецкй . . . . .	131
Орѣхи камыщичіе . . . . .	17
Осеникъ . . . . .	73
Осина . . . . .	195

	ГХ
	стр.
Ословья уста . . . . .	19
Осока песчаная . . . . .	58
Осокоръ душистый . . . . .	196
— черны . . . . .	196
Осотъ . . . . .	60, 240
Очанка . . . . .	245
Очитокъ . . . . .	232
Очная помощь . . . . .	110
— трава . . . . .	110
Очной корень . . . . .	255
— цвѣтъ . . . . .	18

III.

Павлиныя очки . . . . .	23
Павунъ . . . . .	158
Пажитъ гусиная . . . . .	197
Павленъ . . . . .	3
Павлунъ . . . . .	244
Папоротникъ мужской . . . . .	32
Параличная трава . . . . .	244
Пасленъ сладко-горькй . . . . .	239
Пахучка . . . . .	159
— сухолгодная . . . . .	159
Перелойная трава . . . . .	190
Переступень . . . . .	51
Перецъ водяной . . . . .	195
— собачй . . . . .	195
— дикй . . . . .	231
Песчаница . . . . .	58
Песй гроздь . . . . .	150
Песы вишни . . . . .	34
Петровъ крестъ . . . . .	139
Петровы батогп . . . . .	69
Петрушка . . . . .	22
Пигва . . . . .	91
Пижма . . . . .	4, 243
— обыкновенная . . . . .	243
Плаунъ . . . . .	151
Плевель . . . . .	150
Плоховецъ . . . . .	94
Плѣшивецъ . . . . .	142

Х

	стр.
Плющикъ . . . . .	117
Плющъ . . . . .	121
Повой воинскій . . . . .	52
— благовоный . . . . .	52
Подбѣлъ . . . . .	250
Подлѣсникъ . . . . .	29
Подмаренникъ . . . . .	114
— ползучій . . . . .	114
Подорѣшникъ . . . . .	29
Ползучій Тимьянъ . . . . .	247
Полуница . . . . .	111
Полушечная трава . . . . .	152
Полынь . . . . .	26
Попово гуменцо . . . . .	142
Попова скуфья . . . . .	142
Посконь дикая . . . . .	108
Потогонная трава . . . . .	155
Почовикъ . . . . .	259
Почечуйникъ . . . . .	195
Преградъ . . . . .	5
Прикрышъ . . . . .	5
Продѣльникъ . . . . .	159
— многолѣтній . . . . .	159
Просвири . . . . .	154
Проскурнякъ . . . . .	16
Прострѣлъ . . . . .	5
Прыщенецъ . . . . .	204
Птичій клей . . . . .	261
Пузырная трава . . . . .	190
Пухлякъ-плоховецъ . . . . .	94
Пхиновникъ . . . . .	25
Пчелососка . . . . .	137
Пырей . . . . .	250
Пѣтушокъ . . . . .	130
Пѣтушья нога . . . . .	204
Пьяная трава . . . . .	209
Пьянишникъ . . . . .	209
Пятилистникъ . . . . .	198
Пятипалишникъ . . . . .	198
<b>Р.</b>	
Разрывъ трава . . . . .	32

	стр.
Рай-дерево . . . . .	196
Растиральникъ . . . . .	4
Ревень . . . . .	207
Репейникъ . . . . .	138
Розмаринъ . . . . .	212
Ромашка . . . . .	154
— аптечная . . . . .	154
Ростротъ . . . . .	245
Росянка . . . . .	107
— круглолистная . . . . .	107
Рута . . . . .	215
— полевая . . . . .	113
Рѣжуха . . . . .	237
Рѣпа дикая . . . . .	50
Рѣпникъ обыкновенн. . . . .	13
Рябинка . . . . .	4
Ряска . . . . .	141
— меньшая . . . . .	142
— многокоренная . . . . .	142
— трилобная . . . . .	142
<b>С.</b>	
Сабельникъ . . . . .	8,130
Саженецъ . . . . .	14
Салатъ . . . . .	135
— дикій . . . . .	137
— ядовитый . . . . .	137
Салець . . . . .	163
Сальникъ . . . . .	242
Самшитъ . . . . .	52
Сатиръ . . . . .	163
— бѣлый . . . . .	163
Сарсапарель европей- ская . . . . .	239
Свекла . . . . .	43
Свиной хвостъ . . . . .	190
Свѣтликъ . . . . .	110
Селеникъ . . . . .	220
Сельдерей . . . . .	22
Сердечная трава . . . . .	143
Сердечникъ . . . . .	143



Сердечникъ полевой. . .	143
Сердечный цвѣтъ. . .	47
Серебrenникъ. . . . .	197
Сіумъ водяной. . . . .	238
— широколиственный	238
Синеголовникъ. . . . .	108
Синюха. . . . .	60
Сирень. . . . .	242
Скabiоза луговая. . . . .	222
Сквипидарникъ. . . . .	29
Скороспѣлка бѣлая. . . . .	42
— аптечная. . . . .	198
Скрыпунъ. . . . .	230
Сладкогорькое. . . . .	239
Смолка. . . . .	31
Смольникъ. . . . .	25
Смолянка. . . . .	58
Смородина. . . . .	211
— красная. . . . .	211
— черная. . . . .	211
Собачій языкъ. . . . .	92
Сабачки. . . . .	46
Сабачникъ. . . . .	92
— аптечный. . . . .	92
Собачья мята. . . . .	42
Собачій зубъ. . . . .	250
Собачья голова. . . . .	224
— ягода. . . . .	206
Сокольникъ. . . . .	123
— волосатый. . . . .	123
— зонтико-	
цвѣтнй. . . . .	123
Соколий перелетъ. . . . .	115
Солнцева трава. . . . .	69
Солодка. . . . .	118
Соломонова печать. . . . .	82
Солянка. . . . .	218
— кали. . . . .	218
Сонъ трава. . . . .	19
Сонная одурь. . . . .	34
Сонное зелье. . . . .	39
Сорочья ягода. . . . .	239

	XI
	стр.
Спаржа. . . . .	31
Споронья. . . . .	225
Старина. . . . .	232
Старовина. . . . .	224
Стародубка. . . . .	115
— крестовая. . . . .	115
Стачка. . . . .	163
Стоголовникъ. . . . .	60
Стоцвѣтъ. . . . .	42,68
Стрѣлолистникъ. . . . .	215
— обннн. . . . .	215
Стрѣльчатая трава. . . . .	215
Стрѣлка. . . . .	158
Стручечникъ. . . . .	31,166
Сулахъ. . . . .	210
Сухой водоленъ. . . . .	29
Сухотный корень. . . . .	27
Сушеница. . . . .	111
	<b>Т.</b>
Табакъ. . . . .	160
Таволча. . . . .	241
— нитковидная. . . . .	241
Тагамагакъ. . . . .	196
Тальникъ черный. . . . .	216
Тина рѣчная. . . . .	82
Тминъ. . . . .	59
— обннновенный. . . . .	59
Толокнянка. . . . .	23
— медвѣжья. . . . .	23
— стелющаяся. . . . .	23
Тополь бѣлый. . . . .	196
Тонырка. . . . .	241
Трилистникъ. . . . .	19
— чистый. . . . .	19
Тросникъ. . . . .	92
Трочечный цвѣтъ. . . . .	261
Трутеникъ. . . . .	46
Трясучка. . . . .	241
Тыква горькая. . . . .	89
Тысячелистникъ. . . . .	4
— красноцв. . . . .	4

<b>У.</b>	стр.
Увѣчная трава . . . . .	139
Ужовникъ . . . . .	223
Узикъ . . . . .	248
Уманъ . . . . .	129
Умъ-да-разумъ . . . . .	18
Уснея . . . . .	63

**Ф.**

Фиалка . . . . .	260
— душистая . . . . .	260
— собачья . . . . .	261

**Х.**

Хасанъ . . . . .	142
Хвостовая трава . . . . .	190
Хлѣбница . . . . .	53
— болотная . . . . .	53
Хмѣль . . . . .	124
— обыкновенный . . . . .	124
Христофорова трава . . . . .	10
Хрѣвъ . . . . .	206

**Ц.**

Цареградскій красный корень . . . . .	18
Царикъ . . . . .	163
Царскій скипетръ . . . . .	257
Царская свѣча . . . . .	257
Царь . . . . .	163
Цикорій . . . . .	69
— дикій . . . . .	69, 142
Цинготная трава . . . . .	71, 259

**Ч.**

Чабрецъ . . . . .	247
Чагирскій чай . . . . .	116

Чай-буръ . . . . .	стр. 247
— мунгалскій . . . . .	116
— лѣсной . . . . .	147
— луговой . . . . .	152
Частуха . . . . .	14
— обыкновенная . . . . .	14
Чемерица черная . . . . .	121
Червяница трава . . . . .	19
Череда . . . . .	46
Черемуха . . . . .	63
Черная мелиса . . . . .	247
Чернобыльникъ . . . . .	27
Черногривъ . . . . .	209
Чернокорень . . . . .	92
— обыкновенн.	92
Чернокудреникъ . . . . .	42
Черноталь . . . . .	216
Черныя псинки . . . . .	34
Черпобѣль турецкій . . . . .	57
Чертова борода . . . . .	31, 248
Чертово зелье . . . . .	31
Чертовы яблоки . . . . .	89
Чертопологъ . . . . .	60
Чехотная трава . . . . .	4
Чечина трава . . . . .	195
Чешуйчатый корень . . . . .	139
Чистецъ . . . . .	116
Чистотѣль . . . . .	66
— большой . . . . .	66
Чистыякъ . . . . .	113, 130
— меньшей . . . . .	205
Чумный корень . . . . .	251

**Ш.**

Шабилъ . . . . .	209
Шалфей . . . . .	218
Шафранъ . . . . .	88
— луговой . . . . .	73
Шандра . . . . .	154
— водяная . . . . .	152
Шаровидная трава . . . . .	118

	стр.		
Шелковое лыко . . . .	94		
Шелковица . . . . .	159	<b>Я.</b>	стр.
Шерошница . . . . .	31		
— душистая.	31	Яблоня . . . . .	154
Шиговникъ . . . . .	25	Ягоды вѣтренныя . . .	34
Шильникъ водяной . .	14	Яловець . . . . .	133
Шильная трава . . . .	114	Ярутка стѣнная . . . .	246
Шиповникъ . . . . .	212	Ясенець . . . . .	99
Шламда . . . . .	241	Ясень . . . . .	112
Шлемовникъ . . . . .	224	Ясменникъ . . . . .	31
Шпинадъ дикій . . . .	68	Яснотка . . . . ., . .	137
		— бѣлая . . . . .	137
<b>Щ.</b>		Ячмень . . . . .	123
Щавель заячій . . . . .	166		
— садовый . . . . .	214	<b>Ѳ.</b>	
— водяной . . . . .	214	Ѳиміанъ . . . . .	247
Щитовка обыкновенная	224	— чабрець . . . . .	247

## II.

### Алфавитный указатель немецких названий.

<b>A</b>		Стр.	C
Agaricus . . . . .		12	Birke . . . . . 44
Ahorn . . . . .		2	Blutkraut. . . . . 153
Akeley. . . . .		23	Bocksbart . . . . . 249
Alant . . . . .		139	Boletus . . . . . 46
Ampfer . . . . .	214, 215	154	Boretsch . . . . . 47
Andorn . . . . .		19	Braunwurz . . . . . 224
Anemone . . . . .		21	Brombeerstrauch . . . . . 213, 214
Angelica . . . . .		21	Bruchkraut . . . . . 123
Apfelbaum . . . . .		154	Brunnenkresse . . . . . 237
Aron . . . . .		27	Buchsbaum . . . . . 52
Artischocke . . . . .		92	
Augentrost . . . . .		110	<b>C</b>
			Calmus . . . . . 8
<b>B</b>			Camferkraut. . . . . 53
Bärentraube. . . . .		23	Caperstrauch . . . . . 57
Bärlapp . . . . .		151	Christophskraut. . . . . 10
Baldrian . . . . .		255	Cichorie . . . . . 69
Ballote . . . . .		42	Coloquinte . . . . . 89
Basilienkraut . . . . .		163	Conferve . . . . . 82
Beinwell . . . . .		242	Coriander. . . . . 86
Berle . . . . .		238	
Berufungskraut. . . . .		107	<b>D</b>
Betonie . . . . .		43	Diptam . . . . . 99
Beifuss . . . . .		26	Dosten . . . . . 164
Biebernell . . . . .	22, 191	137	Dotterblume. . . . . 53
Bienensaug . . . . .		124	Drachenkopf. . . . . 166
Bilsenkraut . . . . .			

<b>E</b>	
	Стр.
Ehrenpreis . . . . .	258
Eibisch . . . . .	16
Eiche . . . . .	201
Einbeere . . . . .	189
Eisenhut . . . . .	5
Enzian. . . . .	114
Ephed. . . . .	121
Erbse . . . . .	194
Erdbeere . . . . .	111
Erdrauch . . . . .	113
Erle . . . . .	16
Erythräe . . . . .	108
Esche . . . . .	112

<b>F</b>	
Färberröthe . . . . .	212
Faulbaum. . . . .	206
Fetthenne. . . . .	230, 231
Fichte . . . . .	191
Fingerhut . . . . .	99
Fingerkraut . . . . .	197, 198
Flachs. . . . .	147
Flechte . . . . .	144
Flieder spanischer. . . . .	242
Flockenblume . . . . .	59
Frauenhaar . . . . .	10
Fröschlöffel . . . . .	14

<b>G</b>	
Gänsedistel . . . . .	240
Gänsefuss. . . . .	66
Gagel . . . . .	159
Gamander . . . . .	244
Gartenkresse . . . . .	143
Gauchheil. . . . .	18
Geissblatt. . . . .	150
Gerberstrauch . . . . .	210
Gerste. . . . .	123
Geum . . . . .	116
Ginster . . . . .	114

	стр.
Gleisse . . . . .	11
Gnadenkraut. . . . .	119
Goldrute . . . . .	240
Granatbaum. . . . .	199
Günsel . . . . .	113
Gundelrebe . . . . .	47
Gurke . . . . .	90
Gypskraut . . . . .	120

**H**

Haarstrang . . . . .	190
Habichtskraut . . . . .	123
Hafer . . . . .	40
Hahnenfuss . . . . .	204, 205
Hanf . . . . .	54
Hartheu . . . . .	127
Haselstaude . . . . .	87
Haselwurz . . . . .	29
Hasenohr . . . . .	51
Hauswurz . . . . .	232
Heidekraut . . . . .	107
Heidelbeere . . . . .	254
Heilkraut. . . . .	122
Helmkraut. . . . .	224
Himbeere. . . . .	214
Hohlzahn. . . . .	114
Hollunder . . . . .	219
Hopfen . . . . .	124
Hufattich. . . . .	250, 251
Hunds-rose . . . . .	212
Hundswürger . . . . .	31

**I, J**

Isländische moos . . . . .	63
Johannisbeere . . . . .	211
Judenkirsche . . . . .	190

**K**

Kälberkropf . . . . .	66
Katzenmünze . . . . .	159

## XVI

Kellerhals . . . . .	Срп.	93
Kerbel . . . . .		222
Kirsche . . . . .		60
Klette . . . . .	25,	138
Knöterich . . . . .		195
Kohl . . . . .		48
Kolza . . . . .		48
Königs-trauben-farn . . . . .		166
Krapp . . . . .		212
Kratzkraut . . . . .		60
Kreuzblume . . . . .	194,	195
Kreuzdorn . . . . .		206
Kreuzkraut . . . . .		232
Kugelblume . . . . .		118
Kugelschwamm . . . . .		151
Kümmel . . . . .	59,	89

## L

Labkraut . . . . .		114
Lakritze . . . . .		118
Laserkraut . . . . .		138
Lavendel . . . . .		139
Lerche . . . . .		192
Liebstockel . . . . .		145
Liguster . . . . .		146
Lilie . . . . .		146
Linde . . . . .		247
Linnäe . . . . .		147
Löffelkraut . . . . .		71
Löwenschwanz . . . . .		143
Löwenzahn . . . . .		142
Loich . . . . .		150
Lungenkraut . . . . .		199
Lysimachie . . . . .		152

## M

Majoran . . . . .		164
Mais . . . . .		263
Malve . . . . .		154
Mangold . . . . .		43
Mannstreu . . . . .		108

Masliebe . . . . .	Срп.	42
Maulbeerbaum . . . . .		159
Mayblume . . . . .		84
Maylilie . . . . .		84
Melde . . . . .		33
Melisse . . . . .		155
Melone . . . . .		90
Mistel . . . . .		261
Mohrrübe . . . . .		96
Mohn . . . . .		167
Münze . . . . .		155
Mutterkorn . . . . .		225
Mutterkraut . . . . .		154

## N

Nachtschatten . . . . .		239
Nelke . . . . .		98
Nessel . . . . .	252,	253
Niesswurz . . . . .		121

## O

Ochsenzunge . . . . .		18
Odermennig . . . . .		13
Osterluzey . . . . .		25

## P

Pappel . . . . .	195,	196
Parnassie . . . . .		190
Pfeilkraut . . . . .		215
Porst . . . . .		141
Primel . . . . .		198

## Q

Quecke . . . . .	!	250
Quendel . . . . .		247
Quittenbaum . . . . .		91

<b>R</b>	
	Стр.
Rhabarber . . . . .	207
Ragwurz . . . . .	163
Rauke . . . . .	238
Raute . . . . .	215
Rettig . . . . .	206
Rheinfarn . . . . .	243
Rhododendron . . . . .	209
Ringelblume . . . . .	12
Ringelkraut . . . . .	159
Rittersporn . . . . .	98
Rosmarin (wilder) . . . . .	212
Roskastanie . . . . .	10
Rüster . . . . .	251
Ruhrkraut . . . . .	119

<b>S</b>	
	Стр.
Sadebaum . . . . .	134
Safran . . . . .	88
Salat . . . . .	135
Salbey . . . . .	218
Salzkraut . . . . .	218
Sauerdorn . . . . .	42
Sauerklee . . . . .	166
Saumfarn . . . . .	198
Scabiose . . . . .	222
Schafgarbe . . . . .	4
Schaumkraut . . . . .	58
Schierling . . . . .	78
Schlangenkraut . . . . .	53
Schneeball . . . . .	259
Schöllkraut . . . . .	66
Schotendorn . . . . .	211
Schuppenwurz . . . . .	139
Schwertlilie . . . . .	130
Schwingel . . . . .	111
Seerose . . . . .	162
Segge . . . . .	58
Seidelbast . . . . .	94
Seifenkraut . . . . .	220
Sellerie . . . . .	22
Senf . . . . .	234, 237

	Стр.
Sesamkraut . . . . .	233
Sinngrün . . . . .	260
Smilax . . . . .	239
Skorzonere . . . . .	223
Sonnenthan . . . . .	107
Spargel . . . . .	31
Spierstaude . . . . .	241
Spindelbaum . . . . .	110
Spitzklette . . . . .	262
Stachelbeere . . . . .	211
Stechapfel . . . . .	95
Steinbrech . . . . .	221
Steinklee . . . . .	155
Steinmandelbaum . . . . .	17
Steinsame . . . . .	150
Storchschnabel . . . . .	116
Syrenen . . . . .	242

<b>T</b>	
	Стр.
Tabac . . . . .	160
Täschelkraut . . . . .	246
Taraxacum . . . . .	142
Teichrose . . . . .	162
Thuya . . . . .	246
Tormentille . . . . .	248
Tollkirsche . . . . .	34
Traubenfarn . . . . .	166


<b>U</b>	
	Стр.
Ulme . . . . .	251

<b>V</b>	
	Стр.
Veilchen . . . . .	260

<b>W</b>	
	Стр.
Wachholder . . . . .	133
Waldmeister . . . . .	31

# XVIII

	Срп.		Срп.
Waldrebe . . . . .	69	Wollkraut . . . . .	257
Wallnuss . . . . .	131	Wolverley . . . . .	25
Wasserdost . . . . .	108	Wucherblume . . . . .	68, 154
Wasserlinse . . . . .	141	Wurmfarrn . . . . .	32
Wassermelone . . . . .	91		
Wassermerk . . . . .	238	<b>Y</b>	
Wassernuss . . . . .	249		
Wasserschierling . . . . .	69	Ysop . . . . .	128
Wegedorn . . . . .	206		
Weide . . . . .	216	<b>Z</b>	
Weinstock . . . . .	262		
Wiesenraute . . . . .	346	Zahnrübe. . . . .	51
Winde. . . . .	86	Zeitlose . . . . .	73
Windröschen. . . . .	19	Ziest . . . . .	241
Wintergrün . . . . .	199	Zottenblume . . . . .	158
Wolfsfuss . . . . .	152	Zweizahn . . . . .	46
Wolfsmilch . . . . .	109	Zwiebel . . . . .	14





### III.

## Алфавитный указатель французских названий.

<b>A</b>			
	Стр.	Année . . . . .	129
Acanthe d'Allemagne . . . . .	122	Aurone . . . . .	26
Ache des montagnes . . . . .	145	Avoine. . . . .	40
Actée . . . . .	10		
Agripaume. . . . .	143	<b>B</b>	
Aïrelle carneberge. . . . .	254	Ballotes . . . . .	42
— ponctuée . . . . .	254	Barbe de chèvre . . . . .	108
Alisma aquatique . . . . .	14	Barbotine. . . . .	243
Alkekenge . . . . .	190	Bardane . . . . .	138
Allelouia . . . . .	166	Basilic . . . . .	163
Aluïne. . . . .	26	Baume aquatique . . . . .	155
Ambroisie . . . . .	67, 68	— crépue . . . . .	156
Amendier nain . . . . .	17	— poivrée . . . . .	157
Ancolie . . . . .	23	Belladone. . . . .	34
Anémone. . . . .	19	Benoite officinale . . . . .	116
Angélique. . . . .	21	— à ruiseaux . . . . .	116
Anis . . . . .	22	Berce . . . . .	122
Anserine . . . . .	66	Berle chervi. . . . .	238
Arbousier. . . . .	23	— à feilles étroites . . . . .	238
Argentine. . . . .	197	Bette commun . . . . .	43
Aristoloché . . . . .	25	Betoine officinale . . . . .	43
Arroche des jardins . . . . .	33	Bidens. . . . .	46
Asperge . . . . .	31	Blanc d'eau . . . . .	162
Artichaut . . . . .	92	Blette en tête . . . . .	46
Aune . . . . .	16	— effilce . . . . .	46

\*

Bluet . . . . .	60	Chataire . . . . .	159
Boucage . . . . .	191	Chêne . . . . .	201
Bouillon blanc . . . . .	257	Chervi . . . . .	238
Bois gentil . . . . .	94	Chevrefeuille . . . . .	150
Bolète . . . . .	46	Chicorée sauvage . . . . .	69
Bouleau blanc . . . . .	144	Chiendent . . . . .	250
Bourrache officinale . . . . .	47	Chou . . . . .	48
Bourdane . . . . .	206	— de chien . . . . .	159
Bourgène . . . . .	206	Cigues des marais . . . . .	69
Branche ursine . . . . .	122	Citronnelle . . . . .	155
Brayette . . . . .	198	Clandestine . . . . .	139
Bruyère . . . . .	107	Clematide des haies . . . . .	69
Bugle . . . . .	13	Cognastier cultivé . . . . .	91
Buglosse . . . . .	18	Coloquinte . . . . .	89
Buis . . . . .	52	Colza . . . . .	48
Bupievre . . . . .	51	Concombre . . . . .	90
		Conferve des ruisseaux . . . . .	82
		Consolation . . . . .	69
<b>C</b>		Consoude officinale . . . . .	242
Cabaret oreille d'homme . . . . .	29	Coq des jardins . . . . .	243
Caille-lait-grateron . . . . .	114	Coquelicot . . . . .	168
Calla des marais . . . . .	53	Coqueret . . . . .	190
Camphrée de Montpellier . . . . .	53	Corneille . . . . .	152
Capillaire de Montpellier . . . . .	10	Cornelle . . . . .	249
Câprier . . . . .	57	Corniche . . . . .	249
Cardamine de prés . . . . .	58	Corniole . . . . .	249
Careilade . . . . .	124	Coucou . . . . .	198
Carotte . . . . .	96	Coudrier . . . . .	87
Carvi ordinaire . . . . .	59	Coussinet . . . . .	254
Casside . . . . .	224	Cranson officinal . . . . .	71
Cassis . . . . .	211	Cresson aléhois . . . . .	143
Cauquenaudier . . . . .	93	— de cheval . . . . .	259
Centurée . . . . .	59	— de fontaine . . . . .	237
— bleue . . . . .	224	Cynoglosse officinale . . . . .	92
Cerfeuil sauvage . . . . .	96		
Cérisier . . . . .	60, 62	<b>D</b>	
— à grappes . . . . .	63	Daphne Garou . . . . .	93
Chanvre . . . . .	54	— laureole . . . . .	93
Chanvrin . . . . .	108	Doigtier . . . . .	99
Chardon beni . . . . .	60	Dopte-venin . . . . .	31
— Roland . . . . .	108		
Chasse-bosse . . . . .	152	<b>E</b>	
Chataigne d'eau . . . . .	250	Echarbot . . . . .	250
Chataigne cornue . . . . .	250		

Eclaire . . . . .	66	Gentiane jaune . . . . .	114
Épervière piloselle. . . . .	123	— blanché . . . . .	138
— ombellifère . . . . .	123	Germandrée des chats . . . . .	244
Epinard immortel . . . . .	214	— aquatique . . . . .	245
Épine-vinette . . . . .	42	Glayeul des marais . . . . .	131
Érable . . . . .	3	Globulaire . . . . .	118
Ergot . . . . .	225	Glouteron . . . . .	25, 138
Erigeron acre . . . . .	107	Gotet commun . . . . .	27
Ethuse . . . . .	11	Grace de Dieu . . . . .	119
Eupatoire d'Avicenne. . . . .	108	Grande ciguë . . . . .	78
Euphorbe des marais. . . . .	109	— marguerite . . . . .	68
Euphrasie . . . . .	110	— Pâquerette . . . . .	68
<b>F</b>		Grassette . . . . .	230
Fausse Rhubarbe . . . . .	246	Grémil officinal. . . . .	150
Faux turbith . . . . .	138	Grenadier . . . . .	199
Faux-acacia . . . . .	211	Grosseillier . . . . .	211
Fenouil de Porc . . . . .	190	Gui à baies blanches. . . . .	261
Flambe . . . . .	131	Guimauve . . . . .	16
— batarde . . . . .	130	Gypsophile des murs . . . . .	120
— d'eau . . . . .	130	<b>H</b>	
— de Sibérie . . . . .	130	Hannebane . . . . .	124
Flèche d'eau . . . . .	215	Hellébore noire. . . . .	121
Foin du Parnasse . . . . .	190	Herbe cachée . . . . .	139
Fougère mâle . . . . .	32	— au charpentier . . . . .	232
Fraisier . . . . .	111	— à Chiron . . . . .	168
— en arbre . . . . .	23	— à la courure . . . . .	230
Framboisier . . . . .	219	— aux courronnes . . . . .	212
Fraxinelle. . . . .	99	— aux cuillers . . . . .	75
Frêne . . . . .	112	— aux yeux . . . . .	69
Fumeterre . . . . .	113	— aux hernies . . . . .	123
Fusain. . . . .	110	— de St. Jean . . . . .	27
<b>G</b>		— à la manne . . . . .	111
Galéopsis. . . . .	114	— de la matrice. . . . .	139
Gantelée . . . . .	99	— aux perles . . . . .	150
Gants de Notre-Dame . . . . .	99	— au pucilage . . . . .	260
Garance . . . . .	212	— à Robert . . . . .	116
Garde-robe . . . . .	26	— du siège . . . . .	224
Genêt des teinturiers . . . . .	114	— aux sorciers . . . . .	95
Genévrier commun . . . . .	133	— aux teigneux . . . . .	138, 251
		— de la trinité . . . . .	261
		— au turc . . . . .	123
		Herniole . . . . .	123

## XXII

Hièble . . . . .	Crp.	220	Livèche . . . . .	Crp.	145
Houblon . . . . .		124	Loque . . . . .		239
Hyssope . . . . .		128	Lycopode en massue . . . . .		151
<b>I</b>					
Iacée . . . . .		60	Lys blanc . . . . .		146
Immortelles . . . . .		119	— d'étang . . . . .		162
Inule campane . . . . .		129	— jaune d'eau . . . . .		162
— dysenterique . . . . .		130	<b>M</b>		
Ivraie . . . . .		150	Macre . . . . .		247
<b>J</b>					
Jolie filipendule . . . . .		241	Macle . . . . .		249
Jonc odorant . . . . .		8	Madratte . . . . .		139
Jaunet . . . . .		162	Mais . . . . .		262
Joubarbe des toie . . . . .		232	Maronnier d'Inde . . . . .		11
— des vignes . . . . .		230	Marrube cammun . . . . .		154
<b>K</b>					
Kumin . . . . .		89	— d'eau . . . . .		152
<b>L</b>					
Laceron . . . . .		240	Matricaire cammomille . . . . .		154
Laiche . . . . .		58	— officinale . . . . .		154
Laitron commun . . . . .		240	Mauve sauvage . . . . .		154
Laitue . . . . .		135	Mélézé . . . . .		192
— sauvage . . . . .		137	Melilot . . . . .		155
— vireuse . . . . .		137	Melisse de Moldavie . . . . .		106
Lampourde glouteron . . . . .		262	Melon . . . . .		90
Langue de bœuf . . . . .		18	— d'eau . . . . .		91
Laser . . . . .		138	Menthecoq . . . . .		243
Laurier-cérise . . . . .		60	Mercuriale . . . . .		159
Lavandule . . . . .		139	Meurons . . . . .		214
Ledum des marais . . . . .		141	Mille-feuille . . . . .		4
Lentille d'eau . . . . .		141	— pertuis perforé . . . . .		127
Lichen . . . . .	63,	144	Moldavique . . . . .		106
Lierre commun . . . . .		121	Molène commune . . . . .		257
— terrestre . . . . .		118	— noir . . . . .		258
Lilas commun . . . . .		242	Mouron des champs . . . . .		18
Lin . . . . .		147	Moutarde blanche . . . . .		237
— purgatif . . . . .		149	— des champs . . . . .		236
Linnée du Nord . . . . .		147	— noir . . . . .		234
Liseron épineux . . . . .		239	Muguet . . . . .	31,	84
— des haies . . . . .		66	Mures de renard . . . . .		214
Liset piquant . . . . .		239	— sauvages . . . . .		214
			Murier . . . . .		159
			Myrthe batarde . . . . .		159
			<b>N</b>		
			Nicotiane tabac . . . . .		160
			Noyer . . . . .		131

Nuprun . . . . .	Стр. 206	Pied de loup . . . . .	Стр. 152
Nymphe des eaux . . . . .	162	— de-vean . . . . .	27
<b>O</b>			
Oeillet . . . . .	98	Piment royal . . . . .	159
Oignon . . . . .	14	Pissenlit . . . . .	142
Orcanette . . . . .	18	Pitasite . . . . .	138
Orchis . . . . .	163	Plateau blanc . . . . .	162
Orge . . . . .	123	— jaune . . . . .	162
Origan marjolaine . . . . .	164	Pois . . . . .	194
— sauvage . . . . .	165	Poivre de Brabant . . . . .	159
Orme . . . . .	251	— de muraille . . . . .	231
Orpin brulant . . . . .	231	Poligala amer . . . . .	194
Ortie blanche . . . . .	137	— commun . . . . .	195
— dioïque . . . . .	252	Pomme épineuse . . . . .	95
— piquante . . . . .	253	Pommier . . . . .	154
— puante . . . . .	241	Populage . . . . .	53
Oseille . . . . .	166, 215	Potelée . . . . .	124
— commune . . . . .	215	Primerolle . . . . .	198
— patience . . . . .	214	Pteris aigle impériale . . . . .	198
— surelle . . . . .	215	Pulmonaire . . . . .	199
Osmonde . . . . .	166	Pyrole . . . . .	199
<b>P</b>			
Pain de coucou . . . . .	166	<b>Q</b>	
— d'oiseau . . . . .	231	Queue de porc . . . . .	190
Panicant des champs . . . . .	108	<b>R</b>	
Paquerette . . . . .	42	Raifort . . . . .	206
Pas d'âne . . . . .	250	Raisin de renard . . . . .	189
Patience aquatique . . . . .	215	Régliſſe . . . . .	118
Pavot des jardins . . . . .	167	Régne des bois . . . . .	31
Peigne de Vénus . . . . .	222	— des prés . . . . .	241
Petite Centaurée . . . . .	108	Renoncule . . . . .	204
— Ethuse . . . . .		Renouée poivre d'eau . . . . .	195
— bardane . . . . .	262	Reprise . . . . .	230
— ivette . . . . .	244	Rhododendron . . . . .	209
— oseille . . . . .	166, 215	Rhubarbe . . . . .	207
Perce-bosse . . . . .	152	Ronce . . . . .	213
— feuille . . . . .	51	— de St. François . . . . .	214
Peuplier tremble . . . . .	195	Rondelle . . . . .	29
— balsamique . . . . .	196	Roquette . . . . .	48
Pervenche . . . . .	230	Rosée du soleil . . . . .	107
Percil . . . . .	22, 66	Rose de Noël . . . . .	121
Pied d'alouette . . . . .	98	Rosier sauvage . . . . .	212
		Rue fétide . . . . .	215
		— des prés . . . . .	246

XXIV

S

Срп. 134

Sabine . . . . . 134

Safran batard . . . . . 73

— cultivé . . . . . 89

Sagesse des chirurgiens . . . . . 238

Salicaire . . . . . 153

Saligot . . . . . 250

Salsapareille d'Europe . . . . . 239

Salsifis des près . . . . . 249

Sapin . . . . . 191

Saponaire . . . . . 220

Saxifrage . . . . . 222

Sauge . . . . . 218

Saule blanc . . . . . 216

— fragile . . . . . 216

— noire . . . . . 216

Scabieuse des champs . . . . . 222

Sceau de Salomon . . . . . 85

Scorzonère petite . . . . . 223

Scrophulaire noueuse . . . . . 224

Sedum orpin . . . . . 230

— brulant . . . . . 231

Serpolet . . . . . 247

Sesam d'Orient . . . . . 233

Sumac fustet . . . . . 210

Sureau à fruits noir . . . . . 219

— hièble . . . . . 220

Surelle . . . . . 166

Souci d'eau . . . . . 152

— des jardins . . . . . 52

Soude . . . . . 218

Souchet long . . . . . 92

Stachys annuel . . . . . 242

— d'Allemagne . . . . . 242

Stramoine . . . . . 95

T

Tabac des Vosgues . . . . . 25

Tanaisie balsamite . . . . . 243

Tatque casside . . . . . 225

Teraspic . . . . . 246

Tertianaire . . . . . 225

Teucrium polium . . . . . 245

— chamaidrys . . . . . 245

Thé d'Europe . . . . . 258

— du Mexique . . . . . 67

Thuya articulé . . . . . 246

Thym bâtard . . . . . 247

Tilleul . . . . . 247

Tormentille droite . . . . . 258

Toussilage . . . . . 250

— petasites . . . . . 251

Trefle d'eau . . . . . 158

Trique madame . . . . . 231

Troène . . . . . 146

Trompette du jugement . . . . . 95

Truffe d'eau . . . . . 250

Tue-chien . . . . . 73

— loup . . . . . 5

Turbith des montagnes . . . . . 138

Turquette . . . . . 123

V

Valeriane officinale . . . . . 255

Veilleuse . . . . . 73

Veillot . . . . . 73

Verge d'or . . . . . 240

Vermiculaire . . . . . 231

Veronique beccabunga . . . . . 259

— mâle . . . . . 258

Vesse-loup . . . . . 151

Vigne . . . . . 262

— blanche . . . . . 51

— de Judée . . . . . 239

— vierge . . . . . 239

Violette de chien . . . . . 261

— odorante . . . . . 260

— pensée . . . . . 261

— des sorciers . . . . . 260

Viorne . . . . . 69

— objer . . . . . 260

# **АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ**

**БОЛѢЗНЕЙ,**

**противъ которыхъ указаны въ „Цѣлебномъ  
Травникѣ“, средства и способы леченія.**

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

болѣзней, противъ которыхъ указаны въ «Цѣлебномъ Травникѣ»  
средства и способы леченія.

### А.

- Англійская болѣзнь—9, 34, 72, 115, 139, 166, 192, 199, 202, 213, 247.  
Аневризмы 62, 101.  
Антоновъ огонь—9, 133, 231, 212, 231, 245.  
Апоплексія—84, 89.  
Астеническое кровотеченіе—72, 152, 162, 190, 211.  
Астеническія болѣзни — 21, 28, 62, 129, 139, 143, 156, 213, 245,  
246, 261.  
Астеническія яввы—83, 143, 246.  
Атонія—152, 292.

### Б.

- Багровыя пятва (на ногахъ) —71, 143.  
Безгласіе—139.  
Бездѣйствіе членовъ—82, 140, 158.  
Безплодіе—135, 139.  
Безсонница —162, 167, 169.  
Блѣдная немочь — 9, 89, 116, 129, 139, 155, 158, 160, 165, 201, 212,  
213, 243, 245.  
Боли застарѣлыя—4.  
Боли ночныя 8, 20, 70.  
Боли подагрическія—34, 196, 219, 220, 261.  
Боли родовыя — 18, 106, 155.  
Боли судорожныя—4.  
Боль въ животѣ—116, 139, 146, 156, 233, 241.  
Боль личная—125, 175.  
Боль въ почкахъ—116, 148, 149, 199, 216, 253.  
Боль въ поясницѣ—4, 16, 116, 147, 210, 213.  
Боль ревматическая—6.  
Боль суставовъ—6.  
Болезни брюшныя—28.



## XXVIII

- Болязни грудныя—55, 90, 92, 120, 128, 169, 194, 195.  
Болязни желудочныхъ оболочекъ—44.  
Болязни желчныя—91.  
Болязни женскихъ половыхъ органовъ—135, 137, 139, 146, 160.  
Болязни заразительныя—51.  
Болязни кожи—23, 25, 71, 93, 94, 108, 124, 138, 142, 210, 214, 221, 223, 224, 239, 245, 252.  
Болязни легкаго—65, 213.  
Болязни мочевого пузыря—138, 240.  
Болязни мочевыхъ путей—3, 148.  
Болязни нервныя—86, 212.  
Болязни печени—3.  
Болязни повальныя—52, 109.  
Болязни почекъ—18, 42, 96, 240.  
Болязни селезенки—3.  
Болязни судорожныя—87.  
Бородавки—52, 109, 196.  
Брюшное полнокровіе—66.  
Бубоны—29.  
Въли—9, 10, 13, 26, 53, 55, 77, 85, 111, 116, 119, 129, 135, 138, 143, 152, 158, 162, 198, 199, 211, 214, 221, 232, 238, 246, 252, 260.  
Вѣшество мыткы—79, 102, 156.

## В.

- Венерическія болязни—20, 40, 55, 70, 120, 131, 132, 138, 210, 220, 252.  
Вереда—49, 231.  
Вертлужная ломота—85, 147, 213, 244.  
Веснушки—232.  
Виттова пляска—27, 36, 55, 67, 76, 79.  
Водобоязнь—36, 55, 144.  
Водянка—7, 9, 14, 31, 48, 53, 58, 60, 70, 71, 74, 82, 91, 92, 103, 107, 109, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 130, 131, 133, 134, 142, 143, 146, 149, 158, 191, 192, 194, 206, 214, 218, 219, 220, 221, 223, 231, 234, 326, 238, 240, 243, 244, 245, 252, 260.  
Воспаленіе глазъ—3, 37, 38, 76, 79, 94, 132, 137, 163, 190, 214, 233.  
Воспаленіе въ груди—138, 233, 240.  
Воспаленіе десенъ—232.  
Воспаленіе дыхательныхъ путей—118, 126, 154.  
Воспаленіе железъ—80.  
Воспаленіе кишекъ—127, 161, 232, 233, 240.  
Воспаленіе легкихъ—148, 199, 221.  
Воспаленіе матки—85.  
Воспаленіе мозга—166.  
Воспаленіе мочевыхъ путей—19, 126.

- Воспаленіе печени—138, 221, 240.  
 Воспаленіе половыхъ органовъ—126.  
 Воспаленіе почекъ—138, 162, 233.  
 Встры—89, 146, 157, 209, 250.  
 Вятраная колика—67, 109, 139, 156, 165.

## Г.

- Гастралгія—26, 125.  
 Геморой—23, 85, 142, 151, 250.  
 Геморoidalное кровотеченіе—4, 11, 117.  
 Гипертрофія сердца—7, 101.  
 Глазныя болѣзни—20, 84, 110, 125, 192.  
 Глисты—9, 18, 26, 28, 32, 50, 58, 59, 67, 79, 83, 96, 99, 109, 110,  
 119, 122, 130, 132, 143, 144, 146, 158, 192, 198, 206, 208, 215,  
 216, 231, 232, 238, 243, 245, 253, 256.  
 Глухота—93, 147, 156, 196.  
 Гниллая горячка—9, 21.  
 Гнилость десенъ—9, 117, 240.  
 Гнилость во рту—113.  
 Гноетеченіе—162.  
 Головная боль—28, 30, 43, 44, 52, 70, 84, 85, 89, 102, 106, 139, 163,  
 164, 165, 190, 192, 205, 244, 247.  
 Головокруженіе—139, 164.  
 Горловые болѣзни—13, 159, 214.  
 Горячки—40, 43, 55, 63, 102, 117, 129, 158, 214, 232, 245, 254, 262.  
 Грудница—41, 55, 116, 138, 232, 233, 241, 248.  
 Грудныя опухоли—31.  
 Грудныя припадки — 3, 13, 23, 50, 59, 87, 132, 190, 199, 210, 219,  
 247, 251, 258.  
 Грудныя трещины—116, 132, 163, 196.  
 Грыжа—49, 80, 85, 89, 108, 123, 161, 168, 192, 202.

## Д.

- Діарея—212.  
 Душевыя болѣзни—36, 102, 122, 176.

## Ж.

- Жаба—13, 20, 36, 71, 80, 125, 128, 132, 138, 141, 148, 166, 191, 199,  
 202, 214, 217, 220, 224, 235, 236, 260.  
 Желваки (шейные)—42, 43.  
 Желтуха—3, 18, 23, 33, 53, 55, 58, 60, 92, 108, 111, 113, 118, 142,  
 143, 160, 162, 191, 206, 213, 221, 223, 231, 232, 240, 246, 253,  
 254, 259, 262.

Желтяница—138, 142, 166, 199.

Желчные припадкы—30, 113.

Желчь (разлитіе)—46.

### З.

Забывчивость—139.

Завалы—3, 30, 31, 53, 57, 58, 63, 106, 108, 123, 129, 162, 223, 244, 245, 246.

Завалы брюшныя — 30, 33, 42, 43, 48, 53, 60, 71, 89, 96, 113, 127, 143, 160, 213, 221, 233, 237, 240, 245, 262.

Завалы желудка—4, 92.

Завалы печени—13, 61, 108, 113, 142, 160, 190, 199, 213.

Завалы селезенки—57, 62, 108.

Задержание мочи—162, 195, 245.

Задумчивость—221.

Занозы—67.

Запахъ рта—87.

Запоръ—74, 85, 90, 92, 122, 148, 154, 192, 222, 233, 246.

Запоръ кровей—30, 52, 53, 57, 62, 67, 85, 89, 92, 99, 108, 113, 116, 121, 132, 139, 143, 155, 158, 160, 163, 165, 190, 191, 213, 221, 241, 242, 245.

Запоръ мочи—9, 15, 42, 113, 147, 148, 223.

Засореніа кишечнаго канала—149.

Застои влаги—139, 220.

Затвердѣніе груди — 128.

Затвердѣніе железъ—31, 62, 83, 86, 95, 120, 221, 223.

Затвердѣніе печени—126, 190.

Зобъ—12, 83, 84, 130, 205, 224, 262.

Золотуха — 9, 31, 46, 58, 83, 96, 115, 124, 126, 132, 138, 142, 158, 166, 211, 224, 239, 247, 249.

Золотушныя затвердѣнія—40, 83.

Зубная боль — 4, 6, 8, 59, 68, 80, 94, 109, 125, 127, 130, 161, 165, 190, 191, 196, 203, 204, 215, 233.

Зудъ—6, 79, 98, 126, 233, 259.

### И.

Ижога—26.

Измурительный потъ—47.

Икота—156, 165.

Ипохондія—47, 48, 57, 62, 127, 142, 143, 157, 208, 221, 224, 240, 244, 245, 251.

Истерика—40, 53, 58, 67, 86, 88, 116, 127, 146, 155, 157, 160, 191, 196, 208, 241, 244, 217, 255, 261.

Истерическія страданія—6, 27, 137, 140, 238.

## Н.

- Каменная болянь — 14, 23, 48, 49, 67, 75, 96, 107, 111, 114, 118, 123, 133, 138, 142, 148, 150, 192, 198, 214, 233, 237, 238, 240, 249, 254.
- Катаръ—16, 36, 124, 126, 152, 208, 235, 238, 239.
- Катаръ барабанной полости—161.
- Катаръ Евстахiевой трубы—161.
- Катаръ мочевого пузыря—151, 234.
- Кашель—10, 18, 21, 23, 49, 55, 60, 64, 67, 79, 83, 85, 87, 95, 116, 118, 119, 120, 123, 128, 138, 141, 148, 154, 157, 160, 166, 167, 169, 194, 198, 199, 210, 210, 223, 237, 244, 245, 249, 251, 253, 259.
- Кашель повальный—129.
- Коклюшъ—25, 36, 53, 61, 76, 79, 125, 151, 234, 239.
- Кожки—18, 22, 35, 41, 80, 85, 87, 96, 118, 148, 155, 161, 165, 167, 223, 232, 233, 241, 252.
- Колотья—42, 49, 60, 149, 150, 165, 169, 164, 195, 219, 240.
- Колгунъ—122, 152.
- Конвульси—232, 235.
- Корь—51, 85, 132, 168, 223.
- Костюда—120, 165, 167.
- Краснуха—48, 132.
- Красныя пятна—(на лицѣ)—142.
- Кровавая моча—4, 127, 240, 253, 259.
- Кровавый поносъ—72, 89, 96, 112, 116, 130, 141, 148, 152, 195, 208, 232, 235, 258, 261.
- Кровотеченiе—18, 23, 46, 85, 102, 111, 116, 119, 130, 138, 151, 198, 200, 202, 211, 247, 229, 231, 253, 256, 260.
- Кровотеченiе изъ легкихъ—127.
- Кровотеченiе изъ мочевыхъ органовъ—238.
- Кровотеченiе носовое—138, 152, 248, 253.
- Кровохарканiе—13, 20, 62, 64, 87, 90, 118, 119, 127, 148, 191, 198, 214, 223, 232, 238, 242, 245, 246, 253, 254, 260.

## Л.

- Лихорадка — 16, 19, 21, 40, 43, 48, 63, 86, 90, 111, 117, 122, 142, 146, 155, 158, 164, 166, 169, 197, 198, 199, 207, 212, 214, 218, 220, 221, 223, 231, 237, 238, 240, 245, 252, 254, 260.
- Лишай—6, 68, 71, 98, 142, 150, 158, 196, 214, 223, 233, 235, 245, 252.
- Ломота — 9, 18, 20, 25, 29, 40, 43, 50, 53, 55, 59, 60, 74, 109, 111, 115, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 141, 147, 149, 155, 158, 167, 191, 194, 195, 198, 204, 210, 219, 233, 235, 245, 252, 253.
- Ломота въ ногахъ—30, 45.

## XXXII

Ломота простудная—106, 119, 195, 210, 245.  
Лунализм.—72.

### М.

Маточное кровотечение—4, 117, 138, 203, 229, 238, 260.  
Маточные припадки—43, 89, 139, 191, 261.  
Маточные сназмы—52.  
Меланхоли — 30, 36, 40, 48, 62, 70, 95, 111, 126, 120, 128, 142,  
146, 166.  
Мигрень—19, 35.  
Мозоли (волны)—52, 82, 109, 231, 232.  
Мокротный кашель—49, 190, 206, 221.  
Мокроты—34, 44, 118, 143, 144, 148, 165, 205, 219, 222, 223.  
Молочница—96, 132, 144, 148, 152, 218, 232.  
Мочервъзъ — 18, 87, 91, 92, 132, 148, 162, 164, 232, 233, 240, 248,  
249, 258, 262.  
Мочетечение—20.

### Н.

Нарывы—49, 79, 108, 126, 148, 192.  
Насморкъ—30, 44, 53, 84, 163, 165, 234, 244.  
Невромическія страданія мочевого пузыря—23.  
Невралгія—6, 7, 35, 55, 94, 102, 136.  
Недержаніе мочи—23,  
Неподвижность суставовъ—71, 210  
Нервное раздраженіе—35.  
Нервные припадки стр. 125, 256.  
Ногтовда—68, 106, 155, 214, 231, 232, 258.

### О.

Обмороки—43, 84, 85, 98, 139, 155, 235, 241, 247.  
Огневки—40, 109, 133.  
Одышка—18, 21, 25, 28, 36, 48, 58, 67, 71, 76, 79, 101, 139, 143,  
147, 148, 160, 161, 234, 245, 251, 253, 259.  
Ожоги—13, 15, 44, 55, 87, 91, 95, 122, 132, 149, 192, 196, 231, 232,  
233, 241, 247, 252.  
Ознобленія—49, 60.  
Ознобъ—225.  
Овъзелость чинновъ—43.  
Опухоли—12, 29, 34, 49, 52, 66, 68, 70, 86, 95, 109, 116, 120, 125,  
126, 128, 129, 132, 139, 142, 147, 148, 156, 158, 162, 165, 167,  
192, 194, 196, 210, 219, 220, 224, 233, 241, 245, 247, 249.  
Опухоли золотушныя—62.

- Опухоли мягкія (на головѣ у дѣтей)—140.  
 Опухоли скуловые—40.  
 Опухоль желѣзъ—127, 206.  
 Опухоль живота (у роженницъ)—68.  
 Опухоль костей—132.  
 Опухоль суставовъ—213.  
 Осиплость—157, 260.  
 Оспа—51, 85, 132, 223.  
 Остановка мочи—50, 222.  
 Остановка мѣсячныхъ очищеній—23, 66, 96, 133, 135, 156, 222.  
 Отращеніе отъ пищи—156.  
 Отеки—139, 140, 156, 163 165, 191, 196.  
 Отеки ногъ—108, 142, 219, 251.  
 Отрышка—85.

## III.

- Падучая болѣзнь—12, 18, 27, 84, 89, 95, 139, 164, 221, 232, 241, 242,  
 247, 251.  
 Параличная разслабленность—67, 140, 155, 164.  
 Параличъ—20, 25, 57, 71, 83, 89, 110, 139, 140, 210, 229, 236.  
 Параличъ мочевого пузыря—23, 152.  
 Параличъ ногъ—67.  
 Параличъ язычныхъ нервовъ—30.  
 Парши—53, 68, 80, 87, 141, 158, 162, 192, 232, 252, 253.  
 Паховики—12, 14, 40, 49, 66, 120, 148, 241.  
 Перелой—135.  
 Переломъ костей—83, 124, 252.  
 Переменяющаяся лихорадка—4, 5, 9, 25, 28, 29, 45, 60, 62, 84, 107,  
 108, 115, 116, 117, 122, 133, 152, 154, 202, 204, 215, 216, 234,  
 242, 245.  
 Перхота—18, 87, 148.  
 Поврежденія легкихъ—43, 165.  
 Подагра—43, 111, 113, 117, 130, 155, 158, 192, 210, 224, 233, 244,  
 245, 251.  
 Помѣшательство—122.  
 Понось—10, 16, 20, 25, 44, 55, 63, 89, 111, 116, 117, 119, 130, 152,  
 155, 157, 161, 167, 176, 198, 200, 203, 208, 211, 214, 231, 238,  
 252, 254, 258, 260.  
 Потеря крови—64.  
 Потуги—148.  
 Потъ (ногъ)—66.  
 Похотливость.—156.  
 Почечные припадки—55, 90.  
 Почечуй мокротной—129.  
 Почечуиыя шишки—34, 85, 91, 95, 196, 205, 224, 231, 233.

## XXXIV

- Припадки мочевого пузыря—18.
- Припадки простудныя—42, 45, 142, 260.
- Приглушение зрѣнія—123.
- Проказа—49, 113, 141, 142, 192, 232.
- Простудныя болѣзни—84, 118, 164, 167, 169, 210, 232, 247.
- Прыщи—12, 213.
- Пятна роговидной оболочки—20.

## Р,

- Раздраженіе мочевыхъ путей—90.
- Размягченіе костей—213.
- Разслабленіе маточнаго рукава и задняго прохода—199, 240.
- Разстройство мѣсячныхъ кровей—86, 88, 113, 146, 201, 235, 245.
- Разстройство пищеварія—9, 22, 49, 60, 66, 85, 115, 139, 208, 216, 237.
- Расширеніе начальственной артерій—7, 101.
- Раковыя затвердѣнія—116, 223.
- Ракъ—14, 80, 82, 97, 126, 132, 252.
- Раны—13, 18, 27, 42, 51, 53, 67, 85, 96, 118, 119, 121, 122, 128, 129, 130, 138, 142, 143, 152, 156, 158, 190, 192, 198, 224, 231, 246, 249, 251, 252, 260.
- Раны глазныя—152.
- Раны въ горлѣ—205, 220.
- Раны десенъ—215.
- Рвота—156, 157, 158, 163, 199, 203.
- Ревматизмъ—21, 28, 55, 58, 60, 76, 93, 102, 134, 135, 136, 143, 151, 158, 163, 196, 210 219, 234, 239, 244, 245, 256.
- Регулы (прекращеніе ихъ)—26.
- Родимчлкъ—18, 23, 87, 98.
- Рожа—45, 103, 151, 158, 219, 235.
- Рытлкъ—117, 158.

## С.

- Свѣтобоязнь—79.
- Сердцебіеніе—31, 106, 143, 155.
- Синія пятна на ногахъ—71.
- Сифилисъ—25, 93, 132, 230.
- Сифилисъ вторичный—58, 120.
- Скарлатина—4, 37, 77.
- Склерръ—80.
- Скорбутъ—25, 71, 138, 206, 236, 239.
- Слабость желудка—85, 87, 113, 116, 117, 156, 163, 245.
- Слабость зрѣнія—60, 85, 161.
- Слабость матки—157.

- Слабость нервовъ—43, 53, 98, 139, 143, 157, 244.  
 Слабость памяти—139.  
 Слабость пищеварительныхъ органовъ—28, 73.  
 Слизетеченіе—124, 161, 208.  
 Слякота—45, 110.  
 Спазмы—18, 58, 67, 106, 143, 146, 147, 148, 155, 156, 157, 169, 212, 244, 247, 261.  
 Столбнякъ—36, 55, 79.  
 Страданія бленорейные—133, 135, 154, 176, 216.  
 Страданія дыхательныхъ вѣтвей—133, 176, 216, 239.  
 Страданія желѣзъ—94, 132.  
 Страданія катарральныя—133, 154, 239.  
 Страданія кожи—79, 122, 132, 235, 239.  
 Страданія мочевыхъ органовъ—133, 151, 216:  
 Страданія нервные—43, 53, 76, 79, 88, 102, 122, 176, 201.  
 Страданія печени—66.  
 Страданія половыхъ органовъ—133, 216, 239.  
 Страданія почекъ—23.  
 Страданія слизистыхъ оболочекъ—132.  
 Страданія суставовъ—125.  
 Струпья—49, 53, 109, 162, 192, 213, 232.  
 Струщя на головѣ—3.  
 Судороги—22, 35, 40, 43, 58, 61, 79, 88, 95, 125, 134, 136, 137, 146, 208, 209, 235, 247.  
 Судороги матки—80.  
 Судороги маточнаго рыльца—126.  
 Судороги шейки мочевого пузыря—126.  
 Судорожныя корчи—140, 147.  
 Сумашествіе—36, 62, 63, 89, 95, 102, 111, 120, 166.  
 Сухотка—28, 64, 87, 90, 118, 132, 142, 162, 199, 221, 261, 262.  
 Сухотка дѣтская—9, 83, 202, 213.  
 Сыпи—45, 48, 59, 90, 111, 126, 129, 130, 143, 147, 158, 210, 235, 256.  
 Сыпи застарѣлыя—8.  
 Сыпи наложныя—129, 219, 221, 222, 246, 249, 259.  
 Сыпь пузырьчатая—152, 208.  
 Съмятченіе—162.

## Т.

- Темная вода—30, 113, 120.  
 Тесемочная глеста—84, 110, 132, 207.  
 Теченіе (звляшнее) мѣсячныхъ кровей—152, 168.  
 Течаніе слизи изъ мочевого канала—119, 152, 190, 199.  
 Тифъ—124, 235, 244, 256.  
 Тиагра—43.  
 Трещины на сосцахъ—92, 232.  
 Трещины на языкѣ—232.



## XXXVI

- Трудныя роды—146, 227, 240.  
Трясеніе членовъ—127, 129, 139, 140, 261.  
Туберкулезныя страданія—124, 239.  
Тупость зрѣнія—139.  
Тусклость глазъ—123.  
Тяжелый слухъ—139.

### У.

- Угри—85, 142.  
Ударъ—244, 247.  
Удушье—49, 47, 53, 60, 63, 89, 128, 129, 138, 165, 206, 223, 251,  
260, 261.  
Укушеніе бѣшенныхъ собакъ—18, 44, 115, 144, 241.  
Утомленіе—161.  
Ушибы—25, 60, 67, 83, 113, 120, 128, 139, 140, 143, 152, 156, 245.  
Ушные болѣзни—84.  
Уязвленіе—140, 148, 156.

### Х.

- Холера—55.  
Хрипота—28, 34, 49, 96, 148, 157, 199, 260.  
Хроническая ломота—8.  
Хроническій катарръ—60, 63, 161.  
Хроническія болѣзни дѣтей—117.  
Хроническое воспаленіе глазъ—161.  
Хроническое воспаленіе почекъ—23.  
Худосочіе—28, 71, 96, 106, 108, 129, 132, 158, 164, 213, 221, 245.

### Ц.

- Цынготная болѣзнь—3, 4, 9, 14, 23, 48, 50, 63, 71, 73, 90, 91, 96,  
107, 109, 111, 113, 124, 143, 153, 196, 199, 214, 215, 217, 231,  
234, 237, 238, 242, 254, 259, 262.  
Цынготная ломота—71, 72, 129.  
Цынготная порча соковъ—113.  
Цынготный параличь—72.  
Цынготныя пятна—72.  
Цынготныя раны—113, 166.

### Ч.

- Чихотка—4, 18, 36, 42, 43, 47, 49, 62, 63, 68, 71, 79, 82, 90, 94,  
96, 102, 114, 116, 118, 119, 123, 127, 128, 138, 142, 143, 148,  
162, 165, 195, 199, 214, 217, 223, 234, 237, 239, 251, 253, 254,  
258, 259, 260.  
Червая желчь—120.

Чесотка—45, 49, 66, 68, 70, 98, 113, 120, 122, 129, 130, 141, 142,  
147, 158, 190, 205, 06, 22, 223, 224, 233, 246, 259.  
Чирья—59, 108.

**III.**

Шишки гемороядальные—68, 126, 196, 247, 258.  
Шолуды—19, 41, 52, 68, 91, 109, 141, 143, 205, 231, 233.

**Э,**

Эклампсія—55, 151, 235.  
Эпилепсія—27, 36, 51, 102, 122, 125, 151.

**Я.**

Ядовитые раны—140.  
Язвы—4, 9, 14, 18, 20, 25, 28, 31, 45, 49, 52, 57, 60, 70, 81, 95, 96,  
112, 126, 132, 135, 151, 158, 164, 166, 192, 198, 200, 208, 224,  
240, 245, 247, 249, 251, 252.  
Язвы венерическія—9, 80, 96, 110, 116, 117, 132, 197, 202.  
Язвы внутреннія—4, 164.  
Язвы гнилыя—14, 77, 96, 108, 117, 118, 129, 138, 190, 197, 200, 217,  
231, 240, 241, 245, 246.  
Язвы на головѣ—3.  
Язвы на двтородныхъ частяхъ—116, 253.  
Язвы костоздныя—9.  
Язвы легкаго—13, 164, 194.  
Язвы мокнуція—232.  
Язвы нечистыя—68, 150, 221, 238, 245.  
Язвы ногъ—67, 210, 214, 248.  
Язвы раковыя—120, 166, 220, 231, 253.  
Язвы въ рту—71, 92, 132, 152.  
Язвы на сосцахъ—116.  
Язвы хроническія—71.  
Язвы худосочныя—70, 221, 231, 259.

## ИСТОЧНИКИ.

Кромѣ рукописныхъ матеріаловъ, при составленіи «Цѣлебнаго Травника», служили пособіями слѣдующія сочиненія:

*Botanique-médiale*; par Moquin-Tandon. 1 vol.

*Flore française*; par M. Boissieuval. 3 vol.

*Manuel de l'herboriste*; par Fontenelle et Tollard. 2 vol.

*Manuel d'Hygiène*; par M. Morin. 1 vol.

*Manuel de médecine*; par Morin. 1 vol.

*Naturaliste-preparateur*; par M. Boitard. 2 vol.

*Manuel de Pharmacie*; par Fontenelle. 2 vol.

*Manuel d'Histoire naturelle médicale*; par M. Lesson. 2 vol.

*Histoire naturelle des végétaux*; par J. B. Lamarck. 30 vol.

*De la Pulmonie*; par Doussin-Dubreuil. 1 vol.

*Dictionnaire de Chimie*; par Ferd. Hoefer. 1 vol.

*Dictionnaire de Médecine pratique*; par Ferd. Hoefer. 1 vol.

*Dictionnaire de Botanique pratique*; par Ferd. Hooyer. 1 vol.

*Principes de la Toxicologie*; par Barse. 1. vol.

*Traité de médecine légale*; par Orfila. 3 vol.

*Elément d'histoire naturelle médicale*; par Richard. 3 vol.

*Formulaire de poche à l'usage des praticiens ou Recueil des formules les plus usitées dans la pratique médicale*; par Richard. 1 vol.

.....

*Anleitung die in mittleren und nördlichen Deutschland wildwachsendes Pflanzen zu bestimmen.* Von Cürrie. 1 Bd.

*Deutschland's Bärliuge.* Von F. Grafen, von Berehtold und I. Pfund.

*Taschen-Ecylopädie der medicischen Klinik*; von Dr. M. Frank. 1 Bd.

*Das Verhalten der wichtigsten Alcoloide gegen Reagentien.* Von Dr.

A. Planta-Reichenau.

~~~~~

*Martius.* Flora mosquensis.

*Reliquiae Botanicae.* S. Enumeratio plantarum in itinere per deserta Asiae mediae ab. A. Lehman annis 1839—1842 collectarum. Al. Bunge.

*Caroli Linnaei.* Flora Suedica.

.....

- Очерки Московской флоры.* (Жур. Сад. 1856 г.).  
*Очерки Крымской флоры.* (Журн. Сад. 1856 г.).  
*Очерки Сибирской флоры.* (Журн. Сад. 1857 г.).  
*Московская флора.* Каузмана.  
*Петербургская флора.* Шнейдера.  
*Дополненіе къ алтайской флорѣ.* С. Щеглеева.  
*Фармакологія.* Эстерлена.  
*Фармакологія.* Шмидта.  
*О легочной чахоткѣ.* Ниммейера.  
*Врачебный травникъ.* Кашинскаго.  
*О Салициловыхъ соединеніяхъ.* Либиха.  
*Книга для экскурсій.* К. Глазль.
-

# ОПЕЧАТКИ.

| СТР. | СТРОКА.        | Напечатано:      | Слѣдуетъ читать: |
|------|----------------|------------------|------------------|
| 4    | снизу 22 и 23  | Киавекъ.         | Бихавекъ.        |
| 5    | сверху 13 и 14 | Eisenhut.        | Eisenhut.        |
| 22   | — 21           | Pimpineua.       | Pimpinella.      |
| 31   | снизу 6        | Asperuba.        | Asperula.        |
| 32   | сверху 5       | Aspedium.        | Aspidium.        |
| 39   | снизу 2        | Покрикъ.         | Покринъ.         |
| 42   | сверху 1 и 2   | Червоку древикъ. | чернокудревикъ.  |
| 42   | — 9            | Ausdauerude.     | Ausdauernde.     |
| 42   | снизу 6        | Gemenier.        | Gemeiner.        |
| 46   | сверху 7       | Zweisahn.        | Zweizahn.        |
| 46   | — 7            | Bidenstrifolié.  | Bidens trifolié. |
| 46   | — 18           | Erbeerespinat.   | Erdbeerspinat.   |
| 59   | — 20           | Cavri.           | Carvi.           |
| 60   | снизу 23       | Centraurea.      | Centaurea.       |
| 63   | сверху 9       | Rrunus.          | Prunus           |
| 67   | — 1            | Fhé.             | Thé.             |
| 91   | снизу 11       | Gemeinerer.      | Gemeiner.        |
| 95   | сверху 4       | Stechapitel.     | Stechapfel.      |
| 96   | — 6            | огородная.       | огорожая.        |
| 98   | — 3            | Concolida.       | Consolida.       |
| 99   | — 13           | Digtalis.        | Digitalis.       |
| 107  | — 16           | Heidekraut.      | Heidekraut.      |
| 108  | снизу 21       | Euratoir.        | Eupatoire.       |
| 110  | — 24           | L'Euphrasic.     | L'Euphrasie.     |
| 110  | — 13 и 14      | Spindelqaum.     | Spindelbaum.     |
| 111  | сверху 1       | flutans.         | fluitans.        |
| 121  | — 18           | черемица.        | чемерица.        |
| 134  | снизу 13       | Junipersus.      | Juniperus.       |
| 137  | — 25           | лопухъ.          | лопухъ.          |
| 144  | — 17           | Лишай.           | Лишай.           |
| 144  | — 16           | Elechte.         | Flechte.         |
| 147  | — 16           | Nordislhe.       | Nordische.       |
| 162  | сверху 7       | Lymphe.          | Nymphe.          |
| 165  | — 15           | Oriagnum.        | Origanum.        |
| 198  | снизу 19       | Primnla.         | Primula.         |
| 198  | — 2            | Asidium.         | Aspidium.        |
| 199  | сверху 11      | адпятнстая.      | пя пятнстая.     |
| 199  | — 11           | Lugenekraut.     | Lungenkraut.     |
| 204  | — 11           | Benoncule.       | Renoncule.       |

|      |           | Напечатано:         | Слѣдуетъ читать:    |
|------|-----------|---------------------|---------------------|
| стр. | строка.   |                     |                     |
| 245  | снизу 13  | Koblauch.           | Knoblauch.          |
| 250  | сверху 1  | truffed'.           | fruffe d'.          |
| 250  | снизу 5   | мать; и мачиха;     | ; мать и мачиха;    |
| 259  | сверху 12 | Guellen.            | Quellen.            |
| 287  | — 23      | 75.                 | 73.                 |
| 287  | — 24      | 7.                  | 75.                 |
| 289  | снизу 1   | 9.                  | 95.                 |
| 299  | сверху 13 | An. Pulsatilla.     | An. Pulsatilla.     |
| 305  | снизу 18  | 7.                  | 9.                  |
| 306  | сверху 5  | .....               | 8.                  |
| 311  | — 2       | 3 {                 | {                   |
| 319  | — 4       | 2) Spinosa. L.      | 2) P. Spinosa. L.   |
| 321  | — 3       | Книжница.           | Княженица.          |
| 321  | — 4       | 2) K. Arcticus. L.  | 2) R. Arcticus. L.  |
| 323  | — 11 и 12 | R. G. anina.        | R. Canina.          |
| 333  | снизу 6   | Chaerophyllum. L.   | Chaerophyllum. L.   |
| 335  | сверху 1  | Sambneuis. L.       | Sambucus. L.        |
| 346  | — 7       | Ghrysanthemum. L.   | Chysanthemum. L.    |
| 349  | — 1       | Eriginiae.          | Ericineae.          |
| 356  | — 14      | Physatis. L.        | Physalis. L.        |
| 360  | снизу 14  | V. Friphyllos. L.   | V Triphyllos. L.    |
| 364  | — 17      | 01.                 | 10.                 |
| 368  | сверху 13 | Gallobdolan.        | Galeobdolan.        |
| 368  | снизу 8   | G. uteum.           | G. luteum.          |
| 368  | — 7       | Caleopsis.          | Galeopsis. L.       |
| 370  | — 5       | XVIII. L. Hyssopus. | XVIII. Hyssopus. L. |
| 373  | — 13      | Chnepodium.         | Chenopodium.        |
| 376  | сверху 10 | R. Aquaticus. L.    | R. Aquaticus. L.    |
| 383  | — 1       | Gorylus.            | Corylus.            |

## ОПЕЧАТКИ ВЪ ПРИБАВЛЕНІИ.

|      |           | Напечатано:         | Слѣдуетъ читать:    |
|------|-----------|---------------------|---------------------|
| стр. | строка.   |                     |                     |
| 45   | сверху 11 | Органовъ леченія.   | Органовъ движенія.  |
| 45   | снизу 8   | ol. fescor. Aselli. | Ol. fescor. Asseli. |
| 48   | сверху 15 | 10. Болъзны кожи.   | 19. Болъзны кожи.   |
| 48   | — 26      | Furnnculus.         | Fungulus.           |
| 48   | — 29      | herbes.             | herbes.             |
| 64   | — 22      | Colchieinum.        | Colchicinum.        |
| 64   | — 23      | Collodium.          | Colodium.           |
| 64   | снизу 6   | eluteria.           | elateria.           |

## СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ РОДОВЪ И ВИДОВЪ И ПРОЧ.

| СТР. | СТРОКИ.  | Напечатано:          | Слѣдуетъ читать:     |
|------|----------|----------------------|----------------------|
| 4    | сверху 1 | <i>Triandria.</i>    | <i>Triandria.</i>    |
| 5    | — 8      | <i>Lithospermum.</i> | <i>Lithospermum.</i> |
| 5    | связу 5  | <i>Scopolina.</i>    | <i>Scopolina.</i>    |
| 7    | сверху 1 | <i>Arenaria.</i>     | <i>Arenaria.</i>     |
| 7    | — 18     | <i>fls cuculi.</i>   | <i>flos cuculi.</i>  |
| 8    | — 1      | <i>Prinus.</i>       | <i>Prunus.</i>       |
| 9    | связу 12 | <i>Sanguineum.</i>   | <i>Sanguineum.</i>   |
| 10   | — 21     | <i>Centraurea.</i>   | <i>Centaurea.</i>    |
| 11   | сверху 7 | <i>Senecia.</i>      | <i>Senecio.</i>      |
| 11   | — 6      | <i>macula,</i>       | <i>maculata.</i>     |
| 12   | — 11     | <i>Filices.</i>      | <i>Filices.</i>      |

# ОГЛАВЛЕНИЕ.



## ОГЛАВЛЕНИЕ.

|                                                                                                                                                              | стр.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Предисловіе . . . . .                                                                                                                                        | 3.     |
| <b>Вступленіе</b> . . . . .                                                                                                                                  | 5—52.  |
| <i>О сборъ, приготовленіи, сохраненіи, и употребленіи ошечественныхъ растений . . . . .</i>                                                                  | 5—10.  |
| Корни . . . . .                                                                                                                                              | 6— 7.  |
| Травы и листья . . . . .                                                                                                                                     | 7— 8.  |
| Цвѣты . . . . .                                                                                                                                              | 8— 9.  |
| Сѣмена и плоды . . . . .                                                                                                                                     | 9—10.  |
| Корки деревь и шишки . . . . .                                                                                                                               | 10.    |
| <i>Предварительныя свѣдѣнія о цѣлебныхъ свойствахъ растений и ихъ дѣйстви на человѣчскій организмъ . . . . .</i>                                             | 10—38. |
| Слизь . . . . .                                                                                                                                              | 11.    |
| Крахмаль . . . . .                                                                                                                                           | 11.    |
| Бѣлковина . . . . .                                                                                                                                          | 11.    |
| Камедь . . . . .                                                                                                                                             | 12.    |
| Сладко-сахарныя вещества . . . . .                                                                                                                           | 12.    |
| Кисло-сладкія и кислыя вещества . . . . .                                                                                                                    | 12.    |
| Кислота угусная . . . . .                                                                                                                                    | 12—13. |
| Масляно-жирныя . . . . .                                                                                                                                     | 13.    |
| Смолистыя вещества . . . . .                                                                                                                                 | 13.    |
| Бальзамическія . . . . .                                                                                                                                     | 14.    |
| Летучія масла . . . . .                                                                                                                                      | 14—16. |
| Спиртныя вещества . . . . .                                                                                                                                  | 16—17. |
| Усыпительныя вещества . . . . .                                                                                                                              | 17—18. |
| Горько-экстратныя вещества . . . . .                                                                                                                         | 18—19. |
| Вяжущія вещества . . . . .                                                                                                                                   | 19—21. |
| Вяжущія-горькія вещества . . . . .                                                                                                                           | 21.    |
| Испражняющія смолисто-острыя вещества . . . . .                                                                                                              | 21—23. |
| Разъѣдающія смолисто-острыя вещества . . . . .                                                                                                               | 23.    |
| Щелочныя вещества . . . . .                                                                                                                                  | 23—27. |
| Противоядныя вещества . . . . .                                                                                                                              | 27.    |
| Яды, отравленія ими и противоядія . . . . .                                                                                                                  | 27—38. |
| <i>Классификація отечественныхъ цѣлебныхъ растений и растительныхъ веществъ, по главнымъ составнымъ началамъ и дѣйстви оныхъ на нашъ организмъ . . . . .</i> | 39—52. |

|                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                         | стр.       |
| Ятрышниковыя . . . . .                                                                                                  | 390.       |
| Касатиковыя . . . . .                                                                                                   | 391.       |
| Спаржевыя . . . . .                                                                                                     | 391—392.   |
| Лилейныя . . . . .                                                                                                      | 392—393.   |
| Киперовыя . . . . .                                                                                                     | 393—394.   |
| Злавыя . . . . .                                                                                                        | 394—395.   |
| Ситниковыя . . . . .                                                                                                    | 396.       |
| О Герборизации или сборъ растений . . . . .                                                                             | 397—416.   |
| О Герборизации . . . . .                                                                                                | 399—408.   |
| Списокъ растений, расположенный по времени ихъ цвѣтенія . . . . .                                                       | 409—416.   |
| <b>Прибавленіе къ цѣлебному травнику.</b>                                                                               |            |
| Чахотка и ея леченіе . . . . .                                                                                          | 3—34.      |
| Свѣденія о леченіи главнѣйшихъ болѣзней . . . . .                                                                       | 53—35.     |
| О формахъ лекарственныхъ веществъ . . . . .                                                                             | 54—57.     |
| Алфавитный перечень растительныхъ простыхъ и сложныхъ средствъ, какъ отечественныхъ такъ и иноземныхъ . . . . .         | 58—100     |
| Перечень растений встрѣчаемыхъ въ средней полосѣ Россіи, расположенный по системѣ Линнея . . . . .                      | 1—14       |
| <b>Алфавитный указатель названій растений описанныхъ въ цѣлебномъ травникѣ . . . . .</b>                                |            |
| Указатель русскихъ названій . . . . .                                                                                   | I—XXIV     |
| Указатель нѣмецкихъ названій . . . . .                                                                                  | I—XIII     |
| Указатель французскихъ названій . . . . .                                                                               | XIV—XVIII  |
| Указатель французскихъ названій . . . . .                                                                               | XIX—XXIV   |
| <b>Алфавитный указатель болѣзней, противъ коихъ въ цѣлебномъ травникѣ, указаны средства и способы леченія . . . . .</b> |            |
|                                                                                                                         | XXV—XXXVII |
| <i>Источники изъ которыхъ заимствованы свѣденія о цѣлебныхъ растенияхъ . . . . .</i>                                    | XXXVIII    |







